

JAHR, G.H.G (see &p. m middle of brok)



LOUIS DEBACQ

## MÉDICAMENTS

HOMEOPATHIQUES.

se mivenora, imprimenta.

PARTICION de 14º CARRO

# MEDICA MENTS

HOMEOPATHIQUES.

PARIS,
E. DUVERGER, IMPRIMEUR,
4, RUE DE VERNEUIL.

## RÉPERTOIRE.

# REPERTOIRE

## TABLE DES MATIÈRES.

	Pages.
Préface	xviíj
Affinité des médicaments	xix
1. Aconitum napellus, aconit napel	1
2. Agaricus muscarius, oronge fausse	4
3. Alumina, alumine	5
4. Ambrea grisea, ambre gris	6
5. Ammonium carbonicum, sous-carbonate d'ammoniaque.	9
6. Anacardium orientale, fève de Malac	10
7. Angusturæ cortex, écorce d'angusture	11
8. Antimonium crudum, sulfure d'antimoine	13
9. Argentum foliatum, argent	14
10. Arnica montana, tabac de montagne, doronic d'Alle-	
magne	16
11. Arsenicum album, arsenic	19
12. Asa fætida, asa fétide	21
3. Asarum europæum, asaret d'Europe, cabaret	22
4. Aurum foliatum, or	24
5. Baryta carbonica, carbonate de baryte	25
6. Belladonna, belladone, morelle furieuse	27
7. Bismuthum, bismuth, étain gris	30
8. Borax veneta, borate de soude	31

45. Crocus sativus, safran.

		8
19.	Bovista, vesse-loup des bouviers	32
20.	Bryonia alba, vigne blanche	33
21.	Caladium seguinum	35
22.	Calcarea carbonica, carbonate de chaux	36
23.	Camphora, camphre	38
24.	Cannabis sativa, chanvre	39
25.	Cantharides, cantharides, mouches d'Espagne	40
<b>2</b> 6.	Capsicum annum, poivre de Guinée	42
27.	Carbo animalis, charbon animal	43
28.	Carbo vegetabilis, charbon végétal	44
29.	Castoreum, castoreum	45
<b>3</b> 0.	Causticum, caustique	46.
31.	Chamomilla vulgaris, camomille commune	48
32.	Chelidonium majus, grande chélidoine	50
33.	China, quinquina	51
34.	Cicuta virosa, ciguë aquatique	54
35.	Cina, semen contra	55
36.	Cinnabaris, cinabre, sulfur rouge	56
37.	Clematis erecta, clématite droite	57
38.	Cocculus, coque du Levant	58
39.	Coffea cruda, café	60
40.	Colchicum autumnale, colchique d'automne	61
41.	Colocynthis, coloquinte	62
42.	. Conium maculatum, grande ciguë	64
43.	. Copaiva balsamum, baume de copahu	66
1.1.	Corallia rubra, corail rouge	id.

		09.
		Pages.
46.	Cuprum, cuivre,	68
47.	Cyclamen europæum, pain de pourceau	70
48.	Daphne mezereum, mézéreon, bois gentil	. 71
49.	Datura stramonium, pomme épineuse	72
ŏ0.	Diadema (aranea), araigne	73
51.	Digitalis purpurea, digitale pourprée	74
52.	Drosera rotundifolia, rosée du soleil	75
53.	Dulcamara, douce-amère	76
54.	Eugenia iambos	78
55.	Euphorbium, euphorbe	id.
	Euphrasia, euphraise	- 79
	Ferrum, fer	80
58.		81
9.		id.
30.	Gratiola officinalis, gratiole	83
	Guajacum officinale, gaïac	84
	Helleborus niger, ellébore noir, rose de Noël	85
	Hepar sulfuris calcarea, foie de soufre calcaire	86
	Hyosciamus niger, jusquiame	88
	Ignatia amara, sève de saint Ignace	89
	Indigofera tinctoria, indigo	91
	Iodium, iode	92
	Ipecacuanha	id.
	Kali carbonicum, potassium, sous-carbonate de potasse.	
70.	Kali hydriodicum, hydroiodate de potasse	94
	Lachesis trigonocephalus	
	Lamium album, ortie blanche	97
		98

73. Laurocerasus, laurier cerise	ages 98
7 Laurocenaeus Janrier cerise	98
jo. Laurocorusus, laurici cerisci	
74. Ledum palustre, romarin sauvage	99
75. Lycopodium, lycopode	1,01
76. Magnesia carbonica, magnésie	104
77. Magnes artificialis, aimant	105
78. Magnetis polus arcticus v	107
79. Magnetis polus australis	108
80. Manganum, manganèse	110
81. Menyantes trifoliata, trèfle d'eau	111
82. Mercurius solubilis, sous-proto-nitrate de mercure	112
83. Mercurius sublimatus, deutochlorure de mercure	115
84. Moschus, musc	116
85. Muriaticum acidum, acide muriatique	117
86. Murias magnesiæ, muriate de magnésie	118
87. Natrum carbonicum, sous-carbonate de soude	110
88. Natrum muriaticum, muriate de soude	120
89. Natrum sulphuricum, sulfate de soude	123
90. Nicolum carbonicum, nickel	1 2/
91. Nitrum, nitrate de potasse	125
92. Nitri acidum, acide nitrique	126
93. Nux vomica, noix vomique	12'
94. Oleander	13
95. Oleum animale, huile animale	132
96. <i>Opium</i> , opium	1-3/
97. Paris quadrifolia, parisette, raisin de renard	id
98. Petroleum, pétrole	130

99. Petroselinum, persil.

		Pages.
100.	Phellandrium aquaticum, phellandre aquatique	137
101.	Phosphorus, phosphore	138
102.	Phosphoricum acidum, acide phosphorique	141
103.	Platina, platine	142
104.	Plumbum, plomb	145
105.	Prunus spinosa, prunier sauvage	146
106.	Pulsatilla, coquelourde	id.
107.	Ranunculus bulbosus, renoncule bulbeuse	151
108.	Ratanhia	152
	Rheum, rhubarbe	id.
110.	Rhododendron crysanthum, rosage à fleurs blanches	153
111.	Rhus toxicodendron, sumac vénéneux	155
112.	Ruta graveolens, rue des jardins	158
113.	Sabadilla, cevadille	159
1 i4.	Sabina, sabine	
	Sambucus nigra, sureau	
	Sassaparilla, salsepareille	
	Secale cornutum, seigle ergoté	id.
118.	Selenium	165
119.	Senega, poligale de Virginie	166
120.	Sepia	168
121.	Silicea, silice	1.7.1
122.	Spigelia, spigélie	174
123.	Spongia tosta, éponge	176
124.	Squilla maritima, scille	177
125.	Stannum, étain a contra l'éposition account de le son se le son de	178
	Staphisagria, staphisaigre	180
	50	

TABLE DES MATIÈRES.

393

394	TABLE DES MATIERES.	
		Pages.
127.	Strontiana	183
128.	Sulphur, soufre	184
129.	Sulphuricum acidum, acide sulfurique	186
130.	Tabacum, tabac	188
131.	Taraxacum, pissenlit	189
132.	Tartarus emeticus, tartre émétique	190
133.	Terebenthinæ oleum, térébenthine	192
134.	Teucrum marum	193
135.	Thermæ Teplitzenses, eaux de Tæplitz	194
136.	Thuja occidentalis	195

136.	Thuja occidentalis	•	•	*	*	*	•		- 4	8	. 19
137.	Valeriana minor, petite valériane		6		٠	٠					19
138.	Veratrum album, ellébore blanc		٠		•		٠	÷			20
139.	Verbascum tapsus, bouillon blanc							•	٠	٠	20

140.	Viola odorata, violette de mars			•	•	•	•	٠			20
141.	Viola tricolor, pensée	•	ě,		₹.	1.1%	•	18	÷	1000	i ia

142.	Vitex agnus castus, gatilier,	petit poivre	
1/3	Zincum - zinc		20

## RÉPERTOIRE.

Table des abréviations	4 6	• · ·	*		Ý	#1	211
I. VERTIGES		.:		i i			213
1. Selon la nature		*****	: :		¥'.	4	id.
2. Symptômes accessoires	•	`,		<b>6</b> 3	4	 •	id.
3. Selon le temps et les circonstances	٠						214
TI ODNIIDII ATION							215

	rages.
1. Selon la nature	215
2. Selon le temps et les circonstances	216
III. DÉFAUT DE L'ESPRIT ET DE LA MÉMOIRE	id.
1. Selon la nature	id.
2. Selon le temps et les circonstances	217
IV. SYMPTOMES INTÉRIEURS DE LA TÊTE	218
1. Selon leur nature et leur siége	id.
2. Selon le temps et les circonstances	223
V. EXTÉRIEUR DE LA TÊTE	226
1. Selon la nature	id.
2. Selon le temps et les circonstances	228
VI. YEUX	229
1. Selon la nature	id.
A. Autour des yeux et dans les orbites	id.
B. Sourcils	id.
C. Paupières	230
D. Dans les angles des yeux.	231
E. Dans le globe et dans les yeux en général	id.
F. A l'égard de la vue	233
2. Selon le temps et les circonstances	234
VII. OREILLES.	234 236
1. Selon la nature	id.
A. Aux oreilles	id.
B. Concernant l'ouïe	
2. Selon le temps et les circonstances	237
	238
	239
1. Selon la nature de la constant de	id.

	Pages.
A. Au nez	239
B. A l'égard de l'odorat	241
2. Selon le temps et les circonstances	id.
IX. FACE	242
1. Selon la nature	id.
A. Face en général	id.
B. Aux lèvres et aux commissures	246
C. Dans la mâchoire inférieure	247
D. Au menton	248
2. Selon le temps et les circonstances	id.
X. DENTS	249
1. Selon la nature	id.
A. Gencives	id.
B. Aux dents 2 1	250
2. Selon le temps et les circonstances	252
XI. CAVITÉ DE LA BOUCHE ET GORGE	254
1. Selon la nature	id.
A. Cavité de la bouche, mucus et salive	id.
B. Langue et parole	256
C. Palais	258
D. Dans le gosier	id.
2. Selon le temps et les circonstances	260
XII. GOUT	261
1. Selon la nature	id.
2. Selon le temps et les circonstances	262
XIII. APPÉTIT ET SOIF	263
Salon la nature le temps et les circonstances	id.

	Pages.
XIV. RAPPORTS	266
. Selon la nature	id.
2. Selon le temps et les circonstances	267
XV. NAUSÉE ET VOMISSEMENT	268
1. Selon la nature	id.
A. Nausée	id.
B. Vomissement	269
2. Selon l'heure et les circonstances	270
XVI. ESTOMAC, RÉGION PRÉCORDIALE ET HYPO-	
CHONDRES	271
1. Selon la nature	id.
A. Dans l'estomac	id.
B. Dans la région précordiale	272
C. Dans les hypochondres	273
AA. Dans l'hypochondre droit	id.
BB. Région de la rate	274
CC. Dans les deux hypochondres	id.
2. Selon l'heure et les circonstances	id.
XVII. VENTRE ET AINES	276
1. Selon la nature	id.
A. Dans le ventre	id,
B. Dans l'aine et dans l'anneau inguinal	id.
C. A l'extérieur du ventre	id.
2. Selon le temps et les circonstances	28,1
XVIII. ÉVACUATIONS ALVINES	282
1. Selon la nature	id.
2. D'après des symptômes accessoires	286

	ges.
	286
B. Pendant l'évacuation	id.
	287
XIX. ANUS, RECTUM, PÉRINÉE	288
1. Anus et rectum	id.
	289
XX. EXCRÉTION DE L'URINE	id.
1. Selon la nature	id.
2. Symptômes accessoires	292
A. Avant d'uriner	id.
B. Pendant qu'on urine	id.
C. Après avoir uriné	id.
XXI. ORGANES URINAIRES	293
1. Vessie	id.
2. Urètre	id.
XXII. PARTIES GÉNITALES DE L'HOMME	294
1. Selon les sensations	id.
A. Parties génitales en général	id.
B. Dans le cordon spermatique	id.
C. Aux testicules	id.
D. Au scrotum	295
E. A la verge 1	id.
F. Au gland	id.
G. Au prépuce	296
2. Selon les fonctions	id.
	297
A. Après le coît	id.

TABLE DES MATIÈRES.	<b>39</b> 9
	Pages
B. Après la pollution	297
XXIII. PARTIES GÉNITALES DE LA FEMME	id.
1. Selon les sensations	id.
2. Selon les fonctions	298
3. Symptômes de la menstruation	300
A. Avant les règles.	id.
B. A l'apparition des règles	id.
C. Pendant les règles	id.
D. Après les règles	301
XXIV. CORIZA	id.
1. Selon la nature, le temps et les circonstances	id.
2. Selon les symptômes accessoires	303
XXV. RESPIRATION	id.
1. Selon la nature	id.
2. Selon l'heure et les circonstances	305
XXVI. TRACHÉE-ARTÈRE ET LARYNX	306
1. Selon les sensations	id.
2. Selon le temps et les circonstances	307
XXVII. TOUX	308
1. Selon la nature	id.
2. Selon le temps et les circonstances	309
3. Symptômes accessoires	311
XXVIII. POITRINE, RÉGION PRÉCORDIALE	312
1. Selon la sensation	id.
A. Dans la poitrine	id.
B. Extérieur de la poitrine	315
C. Aux mamelles	id.

	Pages.
D. Aux mamelons	316
E. Au cœur et dans la région précordiale	id.
F. Dans le creux de l'aisselle	317
2. Selon l'heure et les circonstances	id.
XXIX. EXTÉRIEUR DU COU ET DE LA NUQUE	319
1. Extérieur du cou	id.
2. A la nuque	id.
XXX. RÉGION DORSALE ET LOMBES	320
1. Selon les sensations	id.
A. Aux omoplates	id.
B. Dans le dos même	321
C. Dans le sacrum	32 <b>2</b>
D. Au coccix	id.
2. Selon l'heure et les circonstances	id.
XXXI. EXTRÉMITÉS	323
1. Selon la sensation	id.
A. Membres supérieurs	id.
B. Membres inférieurs	329
2. Selon le temps et les circonstances	335
XXXII. AFFECTIONS GÉNÉRALES	338
XXXIII. SYMPTOMES PRÉDOMINANTS	344
1. Symptômes généraux essentiels	id.
2. Symptômes généraux accessoires	348
A. En général	id.
B. Aux parties malades	349
3. Heures de la journée	350
4. Conditions et causes essentielles	id.

\$						rages.
XXXIV. GLANDES, OS ET ARTICULAT	IOI	NS				556
1. Glandes						id.
2. Os						id.
A. Au périoste						id.
B. Aux os mêmes			٠			558
3. Articulations						id.
XXXV. PEAU						359
1. Symptômes de la peau en général .						id.
2. Éruptions						56 <sub>1</sub>
3. Dartres					·	362
4. Taches			ľ		i	id.
5. Ulcères		į	į	·	•.<	563
6. Gonflement	•	·	i	•	•	364
7. Prurit	·	į		•	•	365
XXXVI. SOMMEIL		i	•	•	•	366
1. Somnolence et sommeil en général.	·		•	•	•	id.
2. Symptômes du sommeil		i	·	•	•	36S
A. En s'endormant		Ċ	•	•	•	<i>id</i> .
B. Pendant le sommeil	i	•		•	•	id.
C. Au réveil	•	•	•	•	٠	
3. Souffrances qui empêchent de dormin	•	•	٠	•	•	56 <sub>9</sub>
4. Rêves	•	•	•	٠	•	570 ,
XXXVII. FIÈVRE	٠	•	•	•	•	371.
1. Froid	•	•	•	٠	•	572
A. Selon la nature, le temps et les	•	•		٠	٠	id.
B. Selon les symptômes accessoires.	cir	con	sta	nce:	S.	id.
2. Frissons	•	•	٠	٠	•	id.
	•	•	•	51		id.
				UA		

Pa	_
A. Selon la nature, le temps et les circonstances 3	72
B. Selon les symptômes accessoires	73
5. Horripilation is a real a figure of the results of the second of the	74
A. Selon la nature, le temps et les circonstances	id.
B. Selon les symptômes accessoires	75
4. Chaleur	id.
A. Selon la nature, le temps et les circonstances.	id.
	576
5. Sueurs	577
A. Selon la nature, le temps et les circonstances	id.
	378
6. Fièvres compliquées	id.
A. Selon la nature, le temps et les circonstances	id.
B. Selon la relation du froid à la chaleur et à la	
	379
C. Souffrances pendant la fièvre	58o
	382
Selon la nature, le temps et les circonstances	id.

FIN DE LA TABLE DES MATIÈRES.

## TABLE DES ABRÉVIATIONS.

- 1. Acon., Aconitum napellus.
- 2. Agar., Agaricus muscarius.
- 3. Alum., Alumina.
- 4. Ambr., Ambra grisea.
- 5. Amm., Ammonium carbonicum.
- 6. Anac., Anacardium orientale.
- 7. Ang., Angusturæ cortex.
- 8. Ant., Antimonium crudum.
- 9. Arg., Argentum foliatum.
- 10. Arn., Arnica montana.
- 11. Ars., Arsenicum album.
- 12. Asa, Asa fœtida.
- 13. Asar., Asarum europæum.
- 14. Aur., Aurum foliatum.
- 18. Bar., Baryta carbonica.
- 16. Bell., Belladonna.
- 17. Bism., Bismuthi magisterium.
- 18. For., Boracicum natrum.
- 19. Bov., Bovista plumbea.
- 20. Bryon., Bryonia alba.
- 21. Calad., Caladium segninum.
- 22. Calc., Calcarea carbon.
- 23. Camph., Camphora laurus.
- 24. Cann., Canuabis sativa.
- 25. Canth., Cantharides.
- 26. Caps., Capsicum annuum.
- 27. Carb. an., Carbo animalis.
- 28. Carb. veg., Carbo vegetabilis.
- 29. Cast., Castoreum.
- 30. Caust., Causticum.
- 31. Cham., Chamomilla vulgaris.
- 32. Chel., Chelidonium majus.
- 33. Chin., China.
- 34. Cic., Cicuta virosa.
- 35. Cin., Cina.
- 36. Cinn., Cinnabaris.

- 37. Clem., Clematis erecta.
- 38. Cocc., Cocculus.
- 39. Coff., Coffea cruda.
- 40. Colch., Colchicum autumnaie.
- 41. Coloc., Colocynthis.
- 42. Con., Conium maculatum.
- 43. Cop., Copaivæ Balsamum.
- 44. Cor., Corallium.
- 45. Croc., Crocus sativus.
- 46. Cupr., Cuprum metallicum.
- 47. Cycl., Cyclamen europæum,
- 48. Daph., Daphne mezereum.
- 49. Dat., Datura stramonium.
- 80. Diad., Diadema aranea.
- 51. Dig., Digitalis purpurea.
- ... D ... 110.11
- 52. Dros., Drosera rotundifolia.
- 53. Dulc. Dulcamara.
- 54. Eug., Eugenia jambos.
- 55. Euph., Euphorbium.
- 30. Euphr., Euphrasia off.
- 87. Fer., Ferrum metallicum.
- 58. Fil., Filix mas.
- 59. Graph., Graphites.
- 60. Grat., Gratiola.
- 61. Guaj., Guajacum off.
- 62. Hell., Helleborus niger.
- 63. Hep., Hep. sulfuris calcareum.
- 64. Hyosc., Hyoscyamus niger.
- 04. 11/03c., 11/0scyamus mg
- 65. Ign., Ignatia amara.
- 66. Ind., Indigo.
- 67. Iod., Iodium.
- 68. Ipec., Ipecacuanha.
- 69. Kal., Kali carbonicum.
- 70. Kal. hydr., Kali hydriodicum.
- 71. Lach., Lachesis trigonocephalus.
- 72. Lam., Lamium album.

- 73. Laur., Laurocerasus.
- 74. Led., Ledum palustre.
- 75. Lyc., Lycopodium.
- 76. Magn., Magnesia carbonica.
- 77. Mgs, Magnes artificialis.
- 78. Mgs arc., Magnetis polus arcticus.
- 79. Mgs aus., Magnetis polus australis.
- 80. Mang., Manganum.
- 81. Men., Menyanthes trifoliata.
- 82. Merc., Mercurius vivus.
- 83. Merc. subl., Mercurius sublimatus corros.
- 84. Mosch., Moschus.
- 85. Mur. ac., Muriaticum acidum.
- 86. Mur. magn., Murias magnesiæ.
- 87. Natr., Natrum carbonicum.
- 88. Natr. mur., Natrum muriaticum.
- 89. Natr. sulf., Natrum sulph.
- 90. Nic., Nicolum carbonicum.
- 91. Nitr., Nitrum.
- 92. Nitr. ac., Nitri acidum.
- 93. Nux, Nux vomica.
- 94. Oleand., Nerium oleander.
- 98. Ol. an., Oleum animale.
- 96. Op., Opium.
- 97. Par., Paris quadrifolia.
- 98. Petr., Petroleum.
- 99. Petros., Petroselinum.
- 100. Phell., Phellandrium aquaticum.
- 101. Phos., Phosphorus.
- 102. Phos. ac., Phosphori acidum.
- 105. Plat., Platina.
- 104. Plumb., Plumbum metallicum.
- 105. Prun., Prunus spinosus.
- 106. Puls., Pulsatilla nigricans.
- 107. Ran., Ranunculus bulbosus.
- 108. Rat., Ratanhia.

- 109. Rhm. Rheum.
- 110. Rhod., Rhododendron chrysanthum.
- 111. Rhs, Rhus toxicodendron.
- 112. Rut., Ruta graveolens.
- 113. Sabad., Sabadilla.
- 114. Sabin., Sabina.
- 115. Samb., Sambucus nigra. 116. Sass., Sassaparilla.
- 110. Bassaparma.
- 117. Sec., Secale cornutum.
- 118. Sel., Selenium.
- 119. Sen., Senega.
- 120. Sep., Sepia.
- 121. Sil., Silicea.
- 122. Spig., Spigelia anthelmia
- 123. Spong., Spongia marina.
- 124. Squill., Squilla maritima
- 128. Stann., Stannum.
- 126. Staph., Staphysagria.
- 127. Stront., Strontiana.
- 128. Sulph., Sulphur.
- 129. Sulph. ac., Sulphuri acidum.
- 130. Tab., Tabacum.
- 131. Tar., Taraxacum leontodon.
- 132. Tart., Tartarus emeticus.
- 133. Tereb., Terebinthinæ oleum.
- 134. Teucr., Teucrium marum.
- 135. Therm., Thermæ teplitzenses.
- 136. Thuj., Thuja occid.
- 137. Valer., Valeriana minor.
- 138. Veratr., Veratrum album.
- 139. Verb., Verbascum tapsus.
- 140. Viol. od., Viola odorata.
- 141. Viol. tric., Viola tricolor.
- 142. Vit., Vitex agnus castus.
- 143. Zinc., Zincum.

## RÉPERTOIRE.

#### I. VERTIGES.

#### 1. SELON LA NATURE.

BALANCEMENT (comme par). Calad., fer., thuj.

CHANCELLEMENT. Cham., cic., ferr., phos. ac., sen., spong., (nic., ol. an., tereb.).

CHRONIQUE. Petr., phos., nux.

Dos (qui s'élève le long du). Sil.

Engoundissant. Bell., sec., bov., led., sab., zinc.

FRONTALE (dans la région). Rhm.

GÉNÉRAL (en). Acon., ant., arn., bell., dig., merc., natr. mur., nux, petr., phos., puls, rhs, sec., thuj., zinc., agar., carb. an., cocc., cupr., graph., lyc., mgs arc., op., sulph., valer., veratr., (ambr., mgs, viol. od.).

Ivresse (comme d'). Agar., cocc., graph., nux, op., puls., sec., cham., dat., hyosc., led., mgs aus., rhs, spig., valer., verat., (asa, rut., therm.).

MOUVEMENT (sensation de) devant les yeux. Mosch., sep., (laur., mgs, olean.).

Mouvement dans la tête. Sep.

Occiput (dans l'). Zinc.

PROVENANT d'une sensation profonde dans le cerveau. Zinc.

Secousses (par). Natr. mur., (mgs).

Subir. Agar., (verb., tereb.).

Semi-latébal. Mgs arc.

TIRAILLANT. Mgs arc., zinc.

Tomber (à faire). Acon., agar., amm., ars., caust., cic., coloc., hep., led., sabad., sec., sil., spig., (mgs, phell., rhod., rut., tereb., therm.).

- à gauche. Dros., euph.
- de côté. Con., daph., squil., zinc.
- en avant. Ran., rhs, fer., natr. mur.
- en arrière. Rhs.

TOUNNOYANT. Arn., nux, phos., valer., veratr., viol. od., cic., con., cupr., fer., mur. ac., natr. mur., (bism., chel., euph., grat., natr. sul., ran., rhod., rut., tab.).

#### 2. SYMPTÔMES ACCESSOIRES.

Anxiété. Bell., rhod.

Besoin de se coucher. Nitr. ac., op.

Bourdonnement d'oreilles. Puls., (sen ).

Céphalalgie. Cupr., dat., anac., ars.,

Vertiges.

canth., puls., phos., stront., tart., (arg., tab., verb.).

CONNAISSANCE (perte de). Bell.

CRAINTE de la mort. Rhs.

z 14 vertiges.

DIFFICULTÉ de parler. (Par.).

Epistaxis. Sulph.

Estomac douloureux. Ambr., kal.

Evanouissement. Cham., croc., hep., sabad.

FACE PALE. Puls.

FAIBLESSE. Zinc., (nic.).

HORRIPILATION. Chel.

MALAISE. Ant., merc., puls., acon., amm., arn., bell., carb. an., phos., sass., sil., spig., squill., stront., (arg., tab., tereb.).

Obscurcissement des yeux. Acon., arg., canth., eic., dat., hep., hyosc., merc., nux, oleand., puls., sabad., sabin., zinc., (lam., par., tereb.).

Scintillement devant les yeux. Bell., daph., ign., tart., (olean.).

Somnolence. Arg.

Tête chaude. Puls.

- faible. Camph., chin., spong.

TREMBLEMENT. Dig.

VENTRE douloureux. Spig.

Vaciliation. Acon., mgs arc., cham., con., ipec., kal., mgs aus., mur. ac., nux, thuj., (mgs, tart.).

Vomin(envie de). Puls., cocc., lyc., (arg.).

Vomissement. Calc.

VOYANT les objets renversés. Eug.

3. selon l'heure de la journée et les circonstances.

Am (au grand). Agar., sep., (oleand., ran.).

- amélioration. Mur. magn., sulph. ac.

Assis (étant). Sulph., puls., stann., staph., thuj., (grat., lach., viol. od.).

Baissant (en se), Lyc., petr., valer., acon., bell., led., plumb., (ol. an.).

Baillé (après avoir). Agar.

Couché (étant). Thuj., staph., (calad., mgs).

- amélioration. Chin., (phell.).

CHALEUR (par la). Lyc.

Debout (étant). Phos. ac., plat., rhm, spig., (arg.).

Esprit (par l'application de). Natr.

FIXANT (en) long-temps quelque chose.
Sass.

Jour (en pressant la). Verb.

LISANT (en). Arg., grat.

- à haute voix. (Par.).

Lir (dans le). Nux, (rhod.).

-(en sortant du). Phos., cham., mur. ac., rhs, sep., (nic.).

MARCHANT (en). Chin., phos. ac., spig., thuj., (asar., lach., tereb.).

- à l'air libre. Calc., dros., (tar.).

MANGEANT (en). Arn., mur. magn., (mgs).

Mancé (après avoir). Nux, cham., kal., petr., puls., rhs, (natr. sul.).

MATIN (le). Agar., carb. an., nux, cham., kal., mur. magn., sep., squill., (nic.).

Vertiges.

Vertiges.

215

MIDI (à). Nux, arn., mur. magn., (natr. sul).

- (après). Sep.

Montant (en). Calc., (bor.).

Mouvement (par le). Chin.

— de la tête. Hep., acon., arn.

REDRESSANT (en se). Acon., carb. an., bell., bryon, cic., con., (laur.).

- la tête. Arn., chel.

REGARDANT (en) en haut. Puls., plumb, sil., thuj.

Sièce (en quittant son ). Thuj., petr, sabad., spig, (asar., laur.).

Soleil (par le). Agar.

Soin (le). Nux, puls., amm., ars., kal., merc., plat., (mgs).

TOUBNANT (en se). Con.

— (en) la tête. Coloc., kal.

Vin (après avoir bu du). Bov., natr., zinc.

VOITURE (en allant en). Hep., sil. Yeux (en fermant les). Ars., (grat.).

#### II. OBNUBILATION.

#### 1. SELON LA NATURE.

CHANCELLEMENT. Bell., camph., cham., cic., fer., mur. magn., phos. ac., sec., spong., (nic., ol. an., tab., tereb.).

— avec malaise. Thuj., (tereb.).

CONNAISSANCE (perte de). Bell., natr. mur., plat., bov., canth., hyosc., kal., laur., mgs arc., nux, rhs, stann. veratr., (chel.).

EMBARRAS. Calc., sulph., magn., petr.

- chronique. Calc.

Éblouissement. Kal.

Éве́темент. Aur., cocc., graph., dulc., kal., rhm, (asar.).

Engourdissement. Bell., op., rhs, sabad., sec., hov., led., sabin., tart., valer., zinc.

Espair fatigué. Aur., calc., led., natr., nux, puls., stann., sep., spig., spong., (sel.).

- obtus. Acon., calc., plat.

Toubdissement. Calc., kal., sit., natr. mur., samb., verat., (bism.).

IVERSSE. Agar., cocc., con., graph., led., op., nax, puls., sec., alum., bell., bov., caps., caust., cham., dat., hyosc., mgs aus., rhs, sil., spig., thuj., valer., verat., (arg., asar., eug., rhod., rut., therm.).

Obnubiliation. Cocc., nux, op., rhm, verat., (rhod.).

OBSCURCISSEMENT. Nux, caust., dig., natr., op., rhm, (men.).

Sensation comme d'une planche devant la tête. Acon., cale., plat.

- de refroidissement. (Ol. an.)

Sens obtus. Anac., asa, caps., cham., tart.

- (perte des). Caps., cic.

Tête entreprise. Aur., nux, op., plat., rhs, rhod., acon., asa, caps., caust., dig., dros., hyosc., jod., sec., sep., staph., squill., tart., thuj., viol. tric., (asar., bism., diad., men., sen.)

- entreprise (occiput.) Ambr., carb. ani., plumb.

- comme après des pollutions. Daph.

Tetr comme après avoir été ivre. Nux, puls., daph., rhm, (cor.).

- vide. ant., ars., sabad., staph., thuj., (cuph., men., sen., verb.).

2. SELON L'HEURE DE LA JOURNÉE ET LES CIRCONSTANCES.

Air ( au grand ). Amélioration. Ars., ( men. ).

Assis (étant). Asar.

Boissons (par les) spiritueuses. Con.

Bu (après avoir). Cocc.

CHAMBRE (dans une). Acon., ars., (men.).

- chaude. (Acon.)

DÉBAUCHES nocturnes (après). Nux, puls.

Déjeuner (avant). Calc.

ECRIT (après avoir). Sil.

Ivnesse (après). Nux, carb., veg.

Ovnavuai um.

Lu (après avoir). Sil.

Lit (en sortant du ). Graph., rhod.

Mangé (après avoir). Nux, cocc., con., petr., (men.).

MARCHANT (en). Camph.

MATIN (le). Calc., graph., rhod.

Midi (à). Nux.

OREILLES (en grattant derrière les). Calc.

Som (le). Sil.

TABAG (par la fumée du ). Alum.

Tête (en appuyant la). Amélioration. Diad.

TRAVAUX (par les) intellectuels. Nux, natr., puls., aur., magn., sil.

VIN (après avoir bu du). Bov., con., (cor.).

### III. DÉFAUT DE L'ESPRIT ET DE LA MÉMOIRE.

#### 1. SELON LA NATURE.

Affaissement de l'esprit. Aur., calc., led., natr., nux, puls., stann., sep., sil., spong., (sel.).

Comprénension difficile. Olean., cham., con., daph., (ambr.).

Confusion des mots en parlant. Alum., caust., lyc.

- en écrivant. Mgs arc., puls.

CONNAISSANCE (perte de). Bell., natr. mur., bov., canth., hyosc., kal., laur., ings arc., nux, rhs, stann., verat., (chel.).

Délire. Acon., bell., dat., hyosc., ars., dulc., op., phos. ac., samb.

DISTRACTION. Bov., oleand., caust., croc., merc., natr. mur., plat., sep., (arg., ol. an., verb., vit.).

Espair obtus. Hell., hyosc., olean., dat., laur., phos. ac., (ran.).

— (faiblesse d'). Anac., bar., aur., con., op.

- (égarement de l'). Bell., dat., cupr., hyosc., plat., verat., aur., con.

EXCITATION. Ang.

Fureur. Bell., camph., canth., dat., hyosc., agar.

Hébétude. Hyosc.

HYDROPHOBIE. Bell., canth... dat., hyos.

I DÉES (manque d'). Verat.

- vagues. Acon., puls., viol. odor., mgs aus., valer., (tab.).

ILLUSIONS. Bell., dat., op., plat., staph., sabad.

IMAGINATION exaltée. Chin., coff., mur. ac., op., phos., puls., viol. odo., sabad., valer., (lach., tab., verb.).

- obtuse. Daphn,, phos. ac., cham., cycl., op., sabad., spong., staph. veratr., (ran., sel.).

INADVERTANCE. Phos. ac., mgs.

INAPTITUDE au travail. Natr., agar., sep., spig., spong., staph., (sel.).

Insensibilité. Hyosc., phos. ac.

Lazis. (Lach.)

MALADRESSE. BOV.

MANIE. Bell., cic., dat., hyosc., ant., agar., ars., cocc., con., cupr., lyc., op.

Mémoire (défaut de). Kal., petr., sil.

- (faiblesse de). Alum., anac., bov., sulph., acon., caust., colch., con., daph., dig., laur., mgs arc., merc., natr. mur., olean., rhs, sep., spig., staph., viol. odo., (therm. verb.).

Mors (on choisit les). Puls., thuj.

Oubli. Bar., acon., colch., croc., phos., plat., stront., viol. odo., (guaj., rhod., therm.).

Paroles incohérentes. Alum.

- embrouillées. Camph., hyosc., plat., cupr., lyc., op., (lach.).

Pénétration. Coff., op., viol. odo., (lach.).

Pensée (confusion de la ). Phos. ac.

Pensée difficile. Aur., carb. veg., daph., lyc., nitr. ac., sabad., sep., sulph., (men., ran., sec.).

- (lenteur de la). Chin, carb. veg., thuj., (men., rut.).

— (perte de la ). Daph., canu., merc., mgs arc., (asar., ol. an., ran., rhod.).

Penses (on n'est pas disposé à). Nitr. ac., petr., staph., (therm.).

— (impuissance de). Acon., alum., natr. mur., phos. ac., thuj.

PROPHÉTISATION. Agar.

RÉFLEXION (sans). Hell., natr. mur., phos. ac., olean., rhs, rut., spig., valer., (ambr., vit.).

Rêves. Cham., (ang.).

SENS (aberration des). Bell., phos. ac., sec., valer.

Somnambulisme. Acon., phos. ac., (mgs).

STUPIDITÉ. Op., con., daph., petr., phos. ac., sil., stann.

2. SELON L'HEURE DE LA JOURNÉE ET LES CIRCONSTANCES.

Affliction (après). Bell.

CHAGRIN et colère (après). Plat.

CHALEUR (dans la) de la journée. (Sel.)

CHAMBRE (dans la). Natr.

Errorts (après des) intellectuels. Natr., nux, puls., plat.

FRAYEUR (après la). Bell.

MATIR (le). Phos.

Nur (la). Dulc., bell.

Repos (dans le). Natr.

Som (le). Sil.

218 Défaut de mémoire.

TRAVAUX intellectuels (par les). Mur. ac., aur.

— nocturnes (après des). Colch., (sel.). Vertices (pendant les). Natr. mur., sec.

Défaut de mémoire. bov., canth., led., nux, sabin., stann., zinc., (chel.)

VIEILLARDS (chez les). Bar., op., aur., con.

### IV. SYMPTOMES INTÉRIEURS DE LA TÊTE.

F. SELON LEUR NATURE ET LEUR SIÉGE.

BALLOTTEMENT dans le cerveau. Acon., chin.

BATTEMENT. Mang., natr. mur., mgs aus., (natr. sul.).

- à l'occiput. (Ran.)

Boule montante. Acon., plumb.

BOURDONNEMENT. Calc., fer., graph., kal., mur. magn., natr., (cinn., mgs).

BRISEMENT. Chin., aur., hell., ipec., nux, (euphr.).

- dans le cerveau. Veratr., (ang.).
- dans le vertex. Chin.
- dans les côtés. ( Nic. )
- dans le front. (Rat.)
- dans l'occiput. Euph.

CEPHALALGIE frontale. Acon., ars., bell., bism., bryon., calc., coloc., con., croc., cupr., dat., diad., guaj., hyosc., ign., natr. mur., nic., olean., ran., sabad., sabin., sil., stann., tart., teucr., thuj., valer., arn., asa, camph., cann., canth., caps., caust., con., daph., dros., jod., lyc., mgs arc., magn., plat., samb., sass., spong., staph., stront., sulph., zinc., (cor., ol. an., rat., rhod., tab., tarax., therm., verb., viol. od., viol. tric., vit.).

- hystérique. Valer.

Céphalalgie nerveuse. Bell.

- au-dessus de la racine du nez. Mosch., camph., dulc., hep., hyosc., tart., zinc., (viol. tric.).
- semi-latérale. Cham., cic., coloc., nux, puls., sep., acon., aur., coff., croc., daph., dig., kal., lyc., phos., mgs arc., petr., sec., sil., thuj., veratr., (guaj., kal. hyd., ran.).
- spasmodique. Mosch., nitr.
- jusqu'aux yeux. Sen.
- au-dessous des yeux. Bor., natr. mur., phos. ac., acon., bar., carb. veg., cic., lyc., sep., (ol. an., sel.).
- déprimant les yeux. Carb. an.
- à travers les yeux. Eug., natr., sil., (asar., par.).

CHALEUR. (Ind., phell.)

- dans la tête. Arn., ran., sulph., canth., chin., hell., laur., lyc., mang., nitrac., rhm, sep., sil., stront., (phell.)
- dans les tempes. (Tab.)
- dans le front. Sil.
- brûlante. Arn., eug., merc., rhs, (bism.).
- — dans le front. Bryon., cupr., stann.
- a travers les yeux. Eug.
- dans les côtés. Mang.
- dans les tempes. Mang., spig.

Symptômes de la tête.

CHALEUR brûlante dans l'occiput. Mang.

COMPRESSION. Men., staph., alum., camph., graph., inosch., spig., thuj., (arg., kal. hyd.).

- dans le front. Cann., plat.
- dans l'occiput. Natr.
- dans les tempes. Thuj.
- à la racine du nez. Mosch.

Congestion. Ant., aur., bell., chin., fer., kal., op., phos., ran., rat., sep., sulph., therm., thuj., arn., asa, camph., cann., coff., coloc., dulc., lyc., mgs aus., mang., merc., mosch., nitr., nitr. ac., nux, plumb., rhs, sil., (bor., chel., cor., lach., sen., tab., viol. odor.).

Constriction. Anac., merc., verat., tart.

- dans le front. Hyosc.
- dans l'occiput. Camph.
- au-dessus de la racine du nez. Camph.

CONTRACTION. Graph., valer., (bism., grat., vit.)

- dans le front. (Bism.)
- Coves. Clem., mur. ac., sulph. ac.
- dans le front. Acon.

CREUSEMENT. (Kal. hyd.)

- DECHIREMENT. Anac., asar., canth., caps., cham., con., guaj., lyc., merc., phos. ac., puls., arn., aur., cin., coloc., kal., led., mgs aus., mur. ac., natr. mur., nux, rhm, samb., sep., sil., spig., sulph., (arg., mgs, nic., ol. an., rat., rhod.).
- dans les côtés. Merc., agar., caps., dig., phos., thuj., zinc., (guaj., vit.).
- dans les tempes. Daph., lyc., merc., puls., arn., chin., dig., samb., (arg., cast., clem., therm., vit.).

Symptômes de la tête. 219
Déchirement dans le front. Lyc., canth., caps., ign., samb., sass., (guaj.).

- dans le cerveau. Ign., (ind., vit.).
- dans le vertex. Ambr., lyc.
- dans l'occiput. Canth., carb. veg., thuj.
- à travers les yeux. Sil.
- jusque dans les dents. Merc., lyc.
- jusque dans le cou. Merc.

Dépression. Cupr., laur., mgs arc., tart.

Distension. Caps., mgs arc., tart.

- Douleur du cerveau. Bell., bov., bryon, calc., daph., hyosc., ign., lam., tart., verat., caust., coff., dig., samb., (colch., cycl., ind., ol. an., ran., vit.).
- qui augmente progressivement et diminue de même. Plat.
- qui disparaît subitement. Sulph. ac.
- par accès. Valer., verat., sep.
- de coupure. Arn., caps., (bism.).
- de coups. Plat., valer., (rut.).
- d'écartement. Bell., staph., bryon., daph., spig., (kal. hyd.).
- - dans le front. Ran.
- 🚣 dans le vertex. Ran.
- d'engourdissement. Bell., laur., op., staph. anac., ant., ars., bov., cic., cin., cupr., daph., dulc., hell., mosch., nitr., phos., rhm, rhs, sulph., tart., thuj., valer., (cycl., mgs, verb.).
- dans le front. Sabad., stann., verb., calc., hyosc., oleand., (therm.).
- dans les tempes. Sabad.
- — au dessus de la racine du nez.

  Mosch.
- intermittente. Valer., plat.

Douleur occipitale. Colch., ign., mur. ac., mosch., natr. mur., nitr., petr., tarax., thuj., zinc., camph., canth., caps., carb. an., carb. veg., kal., mang., magn., rhs, sep., spig., tart., plumb., (bism., ind., viol. tric.).

- ostéocope. Arg., ipec.
- périodique. Bett.
- de refroidissement. Acon., (ol. an.).
- d'ulcération. Bor., cast.
- dans le vertex. Cast.
- troublant le sommeil, Chin, sil., verat,
- dans les tempes. Anac., caust., chin., lyc., merc., puls., tab., teucr., therm., thuj., sabad., asa, cann., carb. veg., calc., cocc., dig., kal., mang., mur. magn., phos. ac., plat., samb., spig., stann., stront., sulph., zinc., (ang., arg., chel., guaj., par., ran., rhod., tarax., viol. tric., vit.).
- --térébrante. Sabin., agar., hep., merc., sep., spig., (clem., natr. sul.).
- dans le vertex. Chin.
- - profonde dans le cerveau. Ign.
- dans le côté. Puls,
- - au-dessus des yeux. (Ol. an.)
- dans le front et les tempes, Ant.
- de vissement. Sabad.
- dans le vertex. Cast., chin., cocc., con., cupr., thuj., ambr., calc., dat., graph., lyc., natr., squill., (ran.).

EBRANLEMENT du cerveau. Arn., cic.

ELANCEMENT. Acon., caust., con., sass., stront., valer., alum., arn., canth., caps., mang., merc., natr. mur., petr., plat., puls., sep., squill., sulph., ac., thuj., (cycl., euph., nic., rhod.).

ELANCEMENT au-dessus des yeux. Phos. ac., natr. mur., (ol. an., sel.).

- à travers les yeux. Natr., sil.
- dans les tempes. Caust., puts., dig., kal., phos. ac., (tab., tarax.).
  - dans le front. Con., cupr., dat., staph., sulph., tart., valer., (rhod., tarax.).
- dans le cerveau. Guaj., ign., (ind.).
- dans l'occiput. (Viol. tric.)
- dans le vertex. Con.

ÉTOURDISSEMENT. Natr. mur., (cinn.).

Faiblesse. Dat., phos., ambr. Fermentation (bouillonnement). Dig.,

mur., magn., phos., (ind.).

FOULLEMENT. Bar., clem., mgs aus., (mgs).

- dans le front, Bryon,
  - au-dessous de la racine du nez. Tart.

FOURMILLEMENT. Rhs., mgs aus., sulph.

- dans le front. Sabad.
- dans le vertex, Cupr.
- dans les tempes. Plat.

FROID. Calc., laur., val., (chel.).

GLOUSSEMENT. Sulph., (par.).

Goutte dans la tête (migraine). Coloc., natr. mur., sep., ign., ipec., magn., mosch., nux, stann., (eug.). (Comp. Envie de vomir, Vomissement, Mal de cœur.)

HYDROPISIE des ventricules. Bell., dig.

Inflammation du cerveau. Bell., bryon., hyosc.

Loundeur comme d'un poids sur le cerveau. Acon., carb. veg., kal. l.yd., laur., men., natr. mur., nic., nux, oleand., op., puls., rat., rhs, sabin., tab., thuj.,

Symptômes de la tête.

ars., asa, aur., cic., coff., con., dat., hell., hyosc., ign., lyc., mosch., mur. magn., nitr., nitr. ac., petr., rhm, sep., sil., spong., squill., staph., tart., (asar., phell., sen., tereb., verb., viol. od., viol. tric.).

LOURDEUR dans l'occiput. Mur. ac., natr. mur., thuj., carb. an., plumb., tart., (bism., tarax.).

-dans le front. Nic., sabin., acon., (bism.).

MARTELLEMENT. Acon., bell., calc. caps., cham., ign., nitr. ac., puls., sil., sulph., aur., bov., cann., canth., carb. veg., coce., fer., lyc., rhm, rhs, sass., veratr., (asar., cast., kal. hyd., euph., par., rhod., sen.).

- dans le cerveau. Calc.

- dans l'occiput. Petr., sep.

- dans le front. Ars., croc., natr. mur.

- dans les tempes. Therm., cocc., stann., (tab.).

MOUVEMENT du cerveau dans le crâne. Acon., dig., laur., kal., spig.

- vermiculaire. Sass.

MURMURE. Caust., sulph.

Nécessité de se coucher. Calc., con., fer., lyc., mosch., natr. mur., nux, oleand., petr., phos. ac., (sel.).

OBSCURGISSEMENT. Caust., graph., rhm.

- dans le front. Hyosc.

OBTUSION. Cin., thuj., (chel., teucr., therm.).

PÉTILLEMENT. Puls.

PINCEMENT. Petr., (verb.).

PESANTEUR sur les yeux. Bor., acon., carb. veg., natr. mur., sep.

PESANTEUR dans le cerveau. Caust., colch., (ol., an., vit.).

Dympromes at ta toto.

- dans l'occiput. Ing., colch., kal., mang., petr., thuj., (arg., tarax.).
- dans les côtés du cerveau. Agar., mang.
- dans les tempes. Anac., chin., rhod., sabad., teucr., thuj., asa, cann., carb. veg., dig., plat., samb., zinc., (arg., quaj., par., ran., tab., viol. tric., vit.).
- dans le front. Arn., coloc., ign., rhod., sabad., stann., tener., thuj., valer., acon., bryon., calc., caust., daph., dig., jod., hyosc., plat., samb., strout., tart., zinc., (arg., cor., guaj., ran., sen., tab., tarax., therm., verb., viol. tric., vit.).
- dans le vertex. Chin., ran.

PLENITUDE. Bor., caps., chin., merc., petr., spong., (grat., nic., tereb.).

- dans le front. Acon., nic.

PRESSION. Anac., ang., arn., bov., chin., cupr., phos. ac., plat., rhs, rhod., sabin., sass., spig., staph., valer., veratr., verb., viol. tric., zinc., ars., bell., bov., cann., canth., cin., coloc., daph., diad., dulc., hell., kal., lyc., magn., merc., nitr.ac., nux, petr., plumb., sabin., samb., spong., sulph., sulph. ac., tart., thuj., (ambr., bism., eug., euph., guaj., men., ol. an., rut., sen., tab., tarax., tereb.).

- au-dessus des yeux. Bor., acon., carb. veg., natr. mur., sep.
- dans le cerveau. Gaust., colch., (ol. an., vit.).
- dans l'occiput. Ign., colch., kal., mang., petr., thuj., (arg., tarax.).
- dans les côtés. Agar., mang.

Symptômes de la tête. Pression dans les tempes. Anac., chin., rhod., sabad., teucr., thuj., asa, cann., carb. veg., dig., plat., samb., zinc.,

(arg., guaj., par., ran., tab., viol. tric., vit. ).

- dans le front. Arn., coloc., ign., rhod., sabad., stann., teucr., thuj., valer., acon., bryon., calc., caust., daph., dig., jod., hyosc., plat., samb., stront., tart., zinc., (arg., cor., guaj., ol. an., ran., sen., tab., tar., therm., verb., viol. tric., vit.).

- dans le vertex. Chin., (ran.).

pesante. Cin., led., mgs arc., (men.).

- vers le dehors. Ign., acon., bryon., laur., mgs arc., thuj.

- par le front. Oleand., asa, caps., dros., sil., spong., staph., thuj., (cor., rat.)

- - par les yeux (asar., par.).

- dans les tempes. Chin., bryon., sulph., (par.).

- dans les tempes. Chin., bryon.

- vers le dedans. Anac., plat.

PRURIT dans la tête. Dig.

Pulsations. Bell., croc., spong., (asar., bor., cycl., par. ).

- dans les tempes. Thuj., (chel.).

- dans l'occiput. Rhs.

RESONNEMENT. Lyc., nux, phos., (grat.).

- dans les tempes. Stront.

RESSERREMENT. Camph., graph., mosch., thuj., (arg.).

- au-dessous de la racine du nez. Mosch.

- dans l'occiput. Nitr.

Symptômes de la tête.

Secousses. Natr. mur., puls., valer., bell., mur. ac., nux.

- dans le front. Thuj.

- dans les tempes. Thuj.

Sensation d'air dans le cerveau. Aur., (cor.).

- d'eau dans le cerveau. Dig., samb. - d'éclatement. Chin., merc., natr.

mur., rat., asar., caps., nux, olean., sil., spig., spong.

- d'écorchure. (Mgs.)

- comme si le cerveau tombait en avant. Bryon., dig., laur.

- d'engourdissement. Mur. magn.

- dans le front. Plat., thuj.

- d'un clou. Agar., coff., ign., nux, plat., arn., hep., sulph. ac., (mgs).

- dans le côté de la tête. Agar., anac., plat.

- - dans le vertex. Thuj.

- de creux. Cocc., (cor.).

- comme par de la fumée. Sulph. ac.

- de gonflement. Ran., (par.).

- d'un lien qui entoure la tête. Iod., merc., sulph.

- de légèreté du cerveau. Amm., rhs.

- de quelque chose de vivant. Petr., croc., (asar.).

- de pelotement dans le cerveau. Arn., tart.

- qui pousse en dehors par le front. Sil., spong., staph., thuj.

- de saisissement comme par une griffe (dans la tempe.) Mur. magn.

--- de serrement d'étau. Plat.

— de raideur. Phos.

- de vide. Puls., cocc., dat., (cor., sen.).

- SENSATION des vagues dans le cerveau. Coff.
- Sensibilité du cerveau. Bell., Bryon., hyosc.
- Serrement de crampe. Ang., coloc., plat., (eug.).
- dans le front. Ign.
- Stupidité. Con., hell.
- TAPAGE. Mang., mur. magn.
- Tension. Plat., asa, lyc., nitr. ac., nux, samb., stront., (men., par.).
- au-dessus de la racine du nez. Hep., tart.
- dans l'occiput. Mang., mosch.
- -dans les tempes. (Ang.)
- dans la partie antérieure de la tête.
   Dig., rhod., calc.
- dans le vertex. Calc.
- TENAILLEMENT dans les tempes. Alum., spig., (kal. hyd.).
- TITILLATION dans le front. Sabad., (viol. od.).
- TIBALLLEMENT. Acon., cham., cin., coloc., cupr., kal., mgs arc., mang., nux, sil., squill.
- dans le front. Stann., magn., natr. mur., sil., zinc., (guaj., rhod., sen.).
- dans l'occiput. Zinc., magn., mosch., nitr., (tereb.).
- dans les tempes. (Rhod., sen.)
- dans les côtés de la tête. Valer.
- à la racine du nez. Tart.
- TRESSAILLEMENT. Ign., mgs, (rat.).
- dans l'occiput. Thuj.
- TROUBLE comme après l'ivresse. Carb. an., nux, nitr., puls.
- Veilles (comme après des). Nux, puls., (ambr.).

# 2. SELON LE TEMPS ET LES CIRCONSTANCES.

- Am (au grand). Nux, chin., daph., fer., phos., sulph., (ang.).
- amélioration. Diad., acon., ars., mang., phos., zinc., (tab., viol. tric.).
- -- (à l') Chaud., Iod.
- ( par un courant d' ). Bell., coloc., valer.
- (par l'). Froid. Carb. an., aur., fer.
- ( en passant de la chambre au grand). Mang.

Anxieté (avec). Rhm, stront., ambr.

Appétit (avec manque d'). (Sel.)

Assis (étant) amélioration. (Lam.)

BAIN (après un) de rivière. Ant.

- Baissant(ense). Bryon., cor., calc., camph., coloc., dig., ign., laur., nux, petr., plat., puls., sep., sil., spig., thuj., (asar., cycl., sen.).
- amélioration. (Viol., tric.)

Boisson (par la). Cocc.

- du café. Nux, cham., ign.
- du thé. Chin., (sel.).
- des spiritueux. Calc., (sel.).

Bouche (par le mouvement de la). Spig.

Bras (avec tressaillement du). Veratr.

BRUIT (par le). Con., iod., phos. ac., spig.

CHAGRIN (après). Natr. mur., phos., (mgs).

- CHALEUR (avec) universelle. (Cor., natr. sulf.)
- (dans la) du lit. Bell.

```
puls., ipec.
- amélioration. Mang., sulph.
                                          - ( avec douleur d' ). Veratr.
- chaude. Sen.
                                          EVANOUISSEMENT (avec). Dat., graph.,
CHANCELLEMENT (avec). (Nic.)
                                            lyc.
CHEVEUX (en liant les). Nitr.
                                          EVEILLANT (en s'). Bov., natr. mur.,
Cœur (avec battement de). Tart.
                                            thuj., (mgs).
Coliques (avec). Rhm.
                                          ÉTRANGLEMENT (avec). Stann.
- (alternativement avec des), Cin.
                                          FACE (avec chaleur à la ). Calc., stront.,
Conversation (éloignement pour la).
                                            (ang., diad.)
  Thui.
                                          - avec pâleur. Alum., phos.
Couché (étant). Camph., puls., bell.,
                                          - avec rougeur. Stront., thuj.
  coloc., lyc., sep.
                                          Fievre (avec). Led.
- amélioration. Chin., hell., ign.,
                                          FIXANT (en) un objet. Spong.
  olean:
                                          FLATUOSITÉS ( par le mouvement des
COUCHER (qui force à se). Calc., con.,
                                             amélioration. (Mgs.)
  fer., lyc., mosch., natr. mur., nux,
                                          Foule (dans la). Magn.
  olean., petr., phos. ac., (sel.).
                                          Fou (à devenir). (Therm.)
Course (par la). Bell., bryon.
                                          Frisson (avec). Daphn., hell., mang.,
CRIER (qui force à). Sep.
                                            petr., thuj.
DÉBAUCHES (par) nocturnes. Nux, puls.,
                                          FROID (avec) du corps. Arn.
  ipec.
                                          Frottement (par le) amélioration. (Ol.
DEBOUT (étant). Tart., (arg.).
                                             an.)
Découvrant (en se). (Cor.)
                                           Fumée (par la) du tabac. Ant.
Déjeuner (après). Lyc.
                                          — amélioration. Diad.
Doigts (avec déchirement des) alterna-
                                          Gosier (avec constriction du). Veratr.
  tivement. Nitr.
                                          Horripilation (avec). Daph.
- (avec froid des). Hell.
                                          Humeur (avec mauvaise). Stann., thuj
- (avec pâleur des). Veratr.
                                          Jeun (à). Petr.
Dormi (après avoir). Cocc., bov., thuj.
                                          Jour et nuit. (Viol. tric.)
EBRANLEMENT (par). Arn., cic., bell.,
                                          Indifférence (avec). Puls.
phos. ac.
                                          Inquiétude (avec). Lyc., (par.).
ECHAUFFEMENT (par). Carb. veg., lyc.,
                                          LASSITUDE (avec). Alum.
  sep.
Ecrit (après avoir). Cale., sil.
                                          LECTURE (par la). Cin., arn., (arg., natr.
                                             sulf., vit.).
ENDORMANT (en s') amélioration. (Ang.)
```

Symptômes de la tête.

CHAMBRE (dans la). Ars., zinc., (nic.,

sen.).

Symptômes de la tête.

Épistaxis (avec). Ant., coff., mgs arc.

ESTOMAC (avec fatigue d'). Carb. veg.

Lumière (par la vive) du jour. Sep.

MACHOIRES (avec tremblement des). Carb. veg.

- ( avec déchirement dans les ). Cham.

MARCHANT (en). Nux, arn., caps., chin., iod., puls., sass., stront., tart., (viol. tric.).

- amélioration. Canth.
- vit e.Bell., bryon.
- au grand air. Alum., nux, cin., con., fer., petr., (nic.).
- - amélioration. Coloc., thuj.
- après. Amm., calc.

MATIN (le). Aur., graph., nux, petr., phos., thuj., sulph., carb. an., cin., croc., mgs aus., natr. mur., nitr., puls., samb., squill., stann., zinc., (mgs, rhod.).

MIDI (à). Nux, zinc., carb. veg., (natr. sul.).

- (avant). Sep., sil.
- (après). Bell., coloc., graph., lyc., sil., stront., (sel.).

Montant (en). Arn.

- l'escalier. Ant., bell., (men., par.).

MOUVEMENT (pendant le). Nux, spig., Anac., chin., mang., plat., samb., staph., thuj., (bism., vit.).

- amélioration. (Mur. ac.)

Musique (par la). Ambr., phos.

NAUSÉE (avec). Eug., natr. mur., nux, ant., ign., ipec., kal., magn., mosch., sep., sil., stann., stront., sulph., veratr., (arg., tab., ran.).

Nuir (la). Chin., merc., bell., bov., dig., phos., plat., tart., veratr., (eug., par.).

Nuque ( avec douleur de la). Sil., mosch., puls., veratr.

— (avec raideur de la). Magn., spig., veratr., (arg.).

ODEURS (par les) fortes. (Sel.)

ODONTALGIE (avec). Daph., hyosc., nux, merc., thuj., cast., clem., therm.

Ovic (avec diminution de l'). Dat., dulc., (grat.).

Parler (en entendant). Phos.

Parole (par la). Acon., cocc., coff., con., iod., sil., spig.

Pas (en faisant un faux). Led.

Pensée (par la). Cinn., par., arn., (mgs).

- à la douleur amélioration. (Viol. tric.)

Риоторновие (avec). Euph., puls.

Pression (par la) extérieure. (Cast.)

- amélioration. (Par.)

PÉRIODIQUE. Nux, arn.

QUOTIDIEN. Natr. mur., sil., coloc., lyc., mur. magn., natr., sep., squill., zinc., (sel.).

REDRESSANT (en se). Bov., mur. ac., (lam., viol. tric.).

Refroidissement (par). Bell., dulc., (ol. an.).

Région précordiale (avec douleur de la). (Ang.)

Rècles (à l'apparition des) amélioration. Veratr.

Repas (après le). Cocc., nux, zinc., arn., carb. veg., rhs, (cinn., men., natr. sul.).

Repos (dans le). Caps.

Reins (en faisant des efforts des). Calc.

Réveil (au). Bov., natr. mur., thuj., (mgs).

226 Symptômes de la tête.

Rine (par le). Phos.

Sang (bouillonnement du). Phos.

— (avec congestion du). Bell.

Soir (avec). (Eug.)

Som (le). Eug., lyc., puls., sulph., amm., carb. veg., cinn., dig., mang., petr., phos., sep., stront., thuj., tart., (ang.).

Soleil (par le). Natr., (sel.).

Somnolence (avec). Stront., (natr. sul.).

SUEUR (avec). Plat., (natr. sul.).

- (avec) froide. Graph.

TEMPS (pendant le) humide. Rhod.

TEMPÉRATURE (par le changement de la). Sil.

Tête (en appuyant la) amélioration. Bell., diad., staph.

- ( en enveloppant la ) amélioration.

  Mur. magn.
- (en redressant la ). Bov.
- (en couvrant la ). Valer.
- (par le mouvement de la ). Nitr., caps., spig., (cor.).
- (en serrant fortement la). Calc.

Toucher (au). Camph., cupr., sass., (arg., cast.).

Toux (pendant la). Spig.

TRISTESSE (avec). (Sel.)

# Symptômes de la tête.

URINES (avec abondance des). Veratr., (eug., sel.).

Veau (après avoir mangé du ). Nitr.

VENTRE (avec mal au). Rhm.

- alternativement. Cin.

Vertices (avec). Cupr., dat., anac., ars., canth., puls., phos., stront., tart., (arg., tab., verb.).

VOITURE (en allant en). Cocc., kal., graph., iod.

Vomin (avec envie de). Ars., alum., asar., camph., ign., (arg., tereb.).

Vomissement (avec). Eug., nux, sep., veratr.

YEUX (avec gonflement des). Rhm.

- -- ( avec contraction des ). Natr., mur., nitr., tart.
- (avec douleur des). Veratr. Sen., croc., cin., cocc., led., natr., mur., (Diad.)
- (en levant les). Carb. an.
- (avec larmoiement). Eug., spong.
- (avec obscurcissement). Dat., ign., mur. ac., natr. mur., puls., (cyc., grat.).
- (par le mouvement des). Nax, bell., dig., mgs arc., mur. ac.

# V. EXTÉRIEUR DE LA TÊTE.

1. SELON LA NATURE.

BATTEMENT. Sulph., guaj.

BRISEMENT. Hell., petr.

Bosses. Kal.

Boutons au front. Aur., hep., led., mur. ac., natr mur., (par.).

Boutons aux tempes. Mur. ac.

CALVITIE. Bar., lyc.

CHALEUR. Kal. byd.

- au front. Nitr., (diad.).
- brûlante. Coloc., sabad., (tab.).
- au front. Sabad., (men., diad.).

- CHEVEUX (chute des). Ambr., ant., calc., hep., lyc., natr. mur., nitr. ac., phos., sulph., staph., aur., bov., fer., graph., kal., merc., petr., sep., sil., (sel.).
- des côtés de la tête. Graph.
- — (de la barbe). Natr. mur.
- (sécheresse des). Kal.
- qui deviennent gris. Lyc.
- (douleur des). Chin., veratr., alum., calc., daph., spig., thuj., (cinn.).
- (hérissement des). Canth., spong., zinc.
- Contraction de la peau. Carb. veg., rhs.
- - au front. Arn.
- à l'occiput. Chin.
- - au vertex. Plat.
- CROUTES. Ars., bar., calc., graph., lyc., rhs, sil., staph., bov., hep., merc., natr. mur., oleand., petr., sulph.
- aux tempes. Alum.

DARTRES. Rhs.

- au front. Aur.
- — squammeuses. Aur.
- DÉCHIREMENT. Natr., bryon., dig., lyc., (guaj., ol. an.).
- aux tempes. (Guaj.)
- Démangeaisons. Daph., puls., rhod.
- Desquammation de la peau. Olean.
- Disposition à se refroidir. Kal., lyc., natr. mur., phos.
- Douleur de coup. (Rut., rhod.)
- d'écorchure. Arg., hep., dros., nux, staph., zinc., (ol. an., par.).
- de meurtrissure. (Rhod.)
- ostéocope. Daph., ant., ipec., (cinn., rhod.).

- Douleur du périoste. (Rut.)
- rhumatismale. Staph.
- de suppuration intérieure. Petr., rhs, (rhod.).
- d'ulcération. Sulph. ac., (kal. hyd.).

ÉCORCHURE. Bov.

- ELANCEMENT. Caust., dig., (cycl., guaj.).
- aux côtés de la tête. Phos.
- au front. Chin., dig.
- aux tempes. Dig., thuj., (guaj.).
- au vertex. Caust.
- Endolorissement. Ars., bar., carb. veg., daph., hell., nux, petr., thuj., (natr., sulph., rhod.).
- Engoundissement (sensation d'). Caust., plat
- ÉRUPTION. Lyc., petr., merc., nitr. ac., sulph., (sen.).
- au front. Aur., led., mur. ac., natr. mur., sep., sulph., (par.).
- aux tempes. Mur. ac.

ERYSIPÈLE. Euph.

Exostose. Aur.

- au front. Aur.

FAIBLESSE. Arn., (phell., tab.).

FOURMILLEMENT. Arn., led., (ran., tab.).

- au front. Led.

- FROID. Veratr., (kal. hyd., merc. subl., vit.).
- glacial. Calc., agar., veratr.

FURONCLES au front. Led.

- GONFLEMENT. Ars., cham., rhs.
- au front. Sep.
- (sensation de). Guaj.

GROSSEURS tubércuses. Aur., sil.

```
228 Extérieur de la tête.

Horripilation. (Sen.)

Mobilité grande. (Lam.)
```

MOUVEMENTS convulsifs. Dat., cupr.

Nodosités. Hep., ars., led., sil.

Pression. Dig., olean.

- au front. Chin., cic.

- aux tempes. Thuj.

PRURIT. Daph., graph., led., oleand., puls., sep., staph., thuj., zinc., (cycl., rhod., rut., vit.).

- au front. Led.

PULSATION. (Guaj.)

RAIDEUR. Caust.

RONGEMENT. (Men.), oleand., staph., thuj., (rut., vit.).

Rucosirés au front. Sep.

SENSATION de chaleur. Verat.

- d'augmentation de volume. Bov., dulc., (ind.).

— de gouttes d'eau tombant sur la tête.

- de rampement. Staph.

- de ténuité du crâne. Bell.

Sensibilité. Chin., bell., bov., carb. an., carb. veg., hell., nitr., nitr. ac., sil., spig., spong., (sel.).

Secousses. Cic.

SUEUR. Calc., graph., rhm, sil.

- froide. Hep.

- au front. Led., rhm.

- froide. Bryon., cin., ipec., veratr.

TACHES jaunes au front. Natr.

TENSION. Caust., mgs arc., (asar., lam., ol. an., vit.).

- au front. Phos., par., viol. od.

- à l'occiput. Viol. od.

Extérieur de la tête.

Tension du cuir chevelu. Arn.

TÉRÉBRATION. LYC.

- en enfonçant la tête dans l'oreiller. Bell.

Tête (flexion de la). Sulph.

— (augmentation de la) chez les enfants. Calc., sil.

— ( la ) tombe en arrière. Dig., asar., bell.

TIRAILLEMENT. Puls., staph.

— dans les tempes. Thuj.

- aux cheveux. Canth., rhs, (ind.).

TREMBLEMENT. Cocc.

TRESSAILLEMENT. Bryon., cic., hell.

Veines (gonflement des) aux tempes.

Thuj.

VERRUES au front. Rhim, (viol. od.).

2. SELON LE TEMPS ET LES CIRCONSTANCES.

Air (au grand ). Amélioration. Hep.

Assis (étant). (Guaj.)

Baissant (en se). Hell.

Debout (étant). (Guaj.)

CHEVEUX (en rebroussant les). Puls., rhs.

Couché (étant). Thuj.

Enfants (chez les). Calc., sil.

Femmes (chez les) en couche. Calc., natr. mur., sulph.

GRATTANT (en se). Kal. hyd.

MACHANT (en). Thuj.

MARCHANT (en) amélioration. (Guaj.)

- au grand air. Graph.

Montant (en). Hell.

Exterieur ae la tele.

MOUVEMENT (par le). Hell., bell.

Nuit (la). Lyc., ol. an.

PEIGNANT (en se). Natr. sul.

PIEDS (avec froid aux). Veratr.

Pression (par la) extérieure, amélioration. Hell.

Quotidien. Natr.

REINS (par un effort de). Arn., calc., rhs.

Soir (le). Calc., sil., rhod.

Têre (en se couvrant la) avec le chapeau. Carb. an., carb. veg., nitr. ac., sil.

Exterieur de la tete.

TOUCHER (au). Chin., daph., ars., bov., bryon., fer., hell., nux, petr., rhs, sil., spig., thuj., (arg., cinn., par., rhod.).

VENT (par un) violent. Nux.

## VI. YEUX.

#### 1. SELON LA NATURE.

# A. Autour des yeux et dans les orbites.

Air maladif. Cin.

CERCLES bleus autour des yeux. Chin,, ipec., phos., phos. ac., sec., ars., cocc., graph., hep., kal., lyc., olean., rhs, sabad., sabin., sep., staph., sulph., verati., (bism.).

- jaunes. Nitr. ac., spig.

CHALEUR brûlante. Con.

Contraction. (Verb.)

Démangeaison au-dessous des yeux, Con,

Douleur en général, Bell., spig.

- d'écorchure. Plat.

— de déchirure. (Natr. sulph.)

- obtuse. Arn.

ÉLANCEMENTS. (Rhod.)

Enfoncement des xeux. Anac., chin., phos., stann., ars., cic., cupr., dros., fer., nit. ac., phos. ac., sec., spong., staph., sulph., (teuer.).

— (sensation d'). Ambr., cod., (teucr.)

FOURMILLEMENT. Con.

GONFLEMENT. Rhs.

Mouvement vertigineux. Bov.

Fression. Sen., arn., bov., chin., sep., spig., stann., (rhod.).

PRURIT. Con.

SERREMENT de crampe. Plat.

TENSION. Plat.

Traction. Stann.

#### B. Sourcils.

CHALEUR brûlante. Dig.

Déchirement. Thuj.

Douleur d'écorchure. Plat.

Exuption boutonneuse. Kal., thuj., (cupr., guaj., par., sec.).

Fics. Thuj.

Frémissements. (Ang., ol. an.).

Poils (chute des) des sourcils. Sec.

PRESSION. Dig.

PRURIT. Thuj., (par., sec., vit.).

RONGEMENT. Plat., (par., vit.).

Tension, Plat.

TRESSAILLEMENT. Cin., daph., (ol. an.).

VERBUES. Caust.

200 Yeux.

C. Paupières.

BLEVES. Dig.

Boutons. Sec., hep.

CHALEUR brûlante. Phos. ac., sen., bell., calc., nux, olean., stann., sulph., (sec.).

CHUTE. Acon., bell., graph., mur. ac., op., spig., sep., (phell.).

CLIGNOTEMENT. Croc., euphr.

CLÔTURE. Hyosc., cham., hep., natr. mur. COLLEMENT. Agar., dig., nux, (tarax.).

Compression. Asa, (viol. tric.).

Contraction. Nux, plumb., (euphr., tab., rhod.).

Convulsions. Cham., rhm, (plat.).

CRAMPES. Croc., hep., merc., (rhod., rut., sen., viol. od.).

Cuissons. Calc., mgs, aur., sil.

DARTRES. Bryon., sep.

Démangeaisons. Rhs, spig., (clem., ol. an. ).

Dépression. (Chel.).

Difficulté à ouvrir. Sep., caust., cocc., kal., merc., nitr. ac., phos., spig.

Distorsion. Sen.

Douleur d'écorchure. Hep., nux, spig., valer.

- tranchante. Calc.

Dureté. Spig.

ÉCHIMOSES. Arn.

ELANCEMENTS. Mgs arc., stann.

ENDOLORISSEMENT. Mgs arc., mang., spig., valer.

FREMISSEMENTS. Agar. , plat. , croc. , stront. , (ol. an., phell., rhod., sen.).

FROID. Phos. ac.

FOURMILLEMENT, Sen.

GONFLEMENT. Ars., thuj., acon., arn., bell., graph., iod., kal., mang., merc., mur. ac., natr., nux, valer., (cycl., sen.).

Yeux.

Gorgées de sang. Bell.

Inflammation. Ars., caust., hep., puls., staph., sulph., thuj., lyc., natr., zinc., (therm.).

- des glandes de Meib. Puts., dig.

Nodosités. Calc., staph., thuj.

(therm.). Ouverture spasmodique. Bell., laur.,

ORGELET. Puls., lyc., sep., stann.,

op., (ang.). PARALYSIE. Sep., verat., bell., dat., nitr. ac., op., spig., zinc.

Pesanteur. Sep., acon., bell., graph., nux, spong., (euphr., natr. sul.).

Pression (sur les ). Sen., ambr., spong. PRURIT. Mgs arc., nux, (euphr., ol.

an., sec., vit.). RAIDEUR. Rhs.

RACCOURCISSEMENT. ( Guaj. )

RENVERSEMENT. Bell.

RONGEMENT. (Vit.).

Rougeur. Acon., ant., graph., natr. mur., nux, sulph.

Sécheresse. Rhs, veratr., acon., mgs arc., mgs aus., (euphr.).

Sécrétion de mucosité. Sen., alum., dig.,

graph., nux, sulph.

Sensation d'enflure. Valer.

- paralytique. Rhs, graph., plumb.

Tension. Acon., olean. TRACTION. Mgs arc., (sen.).

TREMBLEMENT. Plat.

1 eux.

TRESSAILLEMENT. Caust., dulc., euph.,

ipec., mgs arc., stront., (ind., men.,

D. Dans les angles des yeux.

CHALEUR brûlante. Phos. ac., agar., phos.,

CHASSIE. Ant., ipec., staph., (bism.,

Dénangeaison. Carb. veg., con., daph.,

ULCÉBATION. Merc., spig., natr. mur.

ol. an., sen.).

Agglutination. (Cast.)

COULEUR bleue (des). Sass.

sil., staph., (ran.).

staph., thuj.

euphr. ).

Cuisson. Phos.

Endolorissement. Agar.

Fistule lacrymale. Stann., calc., petr.

Fourmillement. *Plat.* 

Douleur d'écorchure. Ran., nux.

Gonflement des glandes lacrymales. Sil. Larmoiement. Iod.

Matière collante. (Voyez Chassie.) Agar., natr. mur.

PRURIT. (Voy. Démangeaison.) Carb. veg., con., (euph.).

Pus. Nux.

Sensation de sécheresse. Thuj.

E. Dans le globe des yeux et dans les yeux en général.

BATTEMENTS. Calc., rhm.

Chaleur brûlante. Ars., bryon., calc., merc., mur. magn., nic., rhod., thuj., alum., aur., arn., canth., caust., cic., coloc., con., phos., spig., stann., staph., stront., sulph. ac., tart., valer.,

(ang., asar., cast., diad., eug., kal. hyd., rat., rhod., rut., sen., tarax., viol. od.).

Yeux.

251

CHALEUR du dedans en dehors. Eug.

CHALEUR. Bell., mang., veratr., con., op., phos., plat., (diad., verb., viol. od.).

CICATRICE à la cornée. Euphr.

CHATOUILLEMENT. Agar.

COLLEMENT par suppuration. Caust.

Compression. Veratr., plat.

Concestion sanguine. Sen.

Conjonctive boursouflée. Bell.

- jaune. Bell., con., iod., mur. magn., phos. ac., sep.

CONTRACTION. Squill., (rat., rhod.).

Convulsions. Op., bell., camph., canth., cupr., hyosc., laur., petr., sec., stann., verat.

- du globe tourné en haut. Plat.

CRAMPES. Bell.

Cuisson. Lyc., iod., natr. mur., plat.

Déchirement. Kal., led., lyc., nux, veratr.

Dépression. Hell.

DILATATION. Ant.

Distorsion. Dig.

Douleur de brisure. Hep.

- d'arrachement. Sil.

- de coupure. Calc., merc., coloc., puls.

- d'écorchure. Zinc., (cor.).

- nerveuse. Cic., spig.

-- des muscles. Carb. veg.

- spasmodique. Cann.

- térébrante. Puls.

ELANCEMENT. Ant., calc., graph., lyc., nit. ac., puls., sass., spig., spong.

- du dedans en dehors. Natr.

232 Yeux.

Endolorissement. Carb. veg., sulph., arn., merc., plat., sass., spig.

Etingelles. Bell., bryon., dat.

FAIBLESSE (impuissance). Stann., veratr., bell., bov., chin., con., merc., phos.

ac., rhm, sen., spig., tart., zinc.

Fixité du regard. Op., acon., arn., ars., bell., camph., cic., dat., hell., hep., laur., kal., mgs arc., (ang.).

Fongus médullaire. Bell.

- hématode. Sil., calc., lyc., sep.

Fremissement. Stann.

FROID. Con., mgs arc., calc., lyc., plat.

INFLAMMATION. Acon., ars., bell., graph., hep., led., lyc., magn., merc., mang., puls., rhs, spig., sulph., veratr., chin., con., cupr., natr. mur., nux, sil., sep., thuj., (clem., merc. subl., ran., rat., tarax., therm.).

- aiguë. Acon., merc., nux, bell., puls.
- artritique. Ant., coloc.
- catarrhale. Cham., puls.
- chronique. Nux, sulph. ac., (euphr.).
- érysipélateuse. Hep.
- produite par des corps étrangers.

  Acon., arn., calc., hep., sulph.
- scrofuleuse. Ars., calc., caust., chin., dig., dulc., euphr., puls., sulph., hep., ign., magn., merc., natr. mur., nux.
- syphilitique. Merc., nitr. ac.

LARMOHEMENT. Arn., coloc., dat., dig., euphr., graph., lyc., merc., phos., rhs, sabad., sen., sil., veratr., bell., bryon., caust., chin., ferr., hep., ign., jod., kal., led., mgs arc., mgs aus., nux, spig., spong., tart., (cast., eug., ran., teucr.).

LARMES acres. Natr. mur., bell., coloc., led., spig.

- brûlantes. Arn., bell.

- avec prurit. Euphr., dig., led., spig.

Immobilité. Amm., hep.

Mouvement convulsif. Bell., cham.

Mucus (sécrétion de). Alum., dig.

Obscuberssement de la cornée. Cann., puls., sen., sulph., calc., magn., (ang., euph.).

PESANTEUR. Hell.

PRESSION. Agar., anac., calc., carb. veg., caust., lyc., nitr. ac., phos. ac., sen., thuj., valer., zinc., alum., ambr., asa, bell., caps., dig., mang., nux, plat., plumb., rhs, spig., spong., staph.,

cast. natr., sul., ran., rhod., tab.).

- vers l'intérieur. Calc., cor., sen., zinc., aur., cann., (bism.).

stront., sulph. ac., tart., (ang., bism.,

- de dedans en dehors. (Sen.)

Proéminence. Bell., acon., arn., aur., con., hep., hyosc., mgs arc., op., squill., veratr., (aug., merc. sub.).

PRURIT. Merc., valer., agar., con., nux, rhs, sil., staph., sulph., zinc., (clem., eug., euph., kal. hyd., ol. an., tab., teucr.).

Purilles (contraction des). Verat., anac., camph., mang., squil.

- dilateés. Acon., bell., calc., carb. an., op., veratr., agar., croc., dat., dig., guaj., hyosc., ipec., laur., led., mang., spig., (cycl., sec., vit.).

- l'une dilatée, l'autre resserrée. (Rhod.)

- (immobilité des ). Laur., op., sec.

- (insensibilité des). Dat.

Pus. Agar., nux, tar.

Pustules sur la cornée. Merc.

ROUGEUR. Acon., bell., rhs, thuj., aur., con., cupr., hyosc., mur. magn., nux, sil., spig., verat.

SAIGNEMENT. Bell., cham., nux.

Sclérotique bleue. Veratr.

Séchebesse. Mang., staph., veratr., (asar., rhod., sen.).

SENSATION d'expulsion du globe de l'œil. Guaj., par., spig.

- d'extension. Caust., daph., phos. ac. plumb., spig., (asar., par., sen.).
- de sable. Caps., caust., chin., phos., stront., thuj.

Souffrance comme par défaut de sommeil. Thuj.

comme après avoir pleurés ( Tab., teucr.)

SUGILLATION. Nux.

SUPPURATION. Agar., nux, tarax.

TACHES sur le globe de l'œil. Nux.

-- sur la cornée. Ars., aur., bell.. con., euphr., hep., nitr. ac., calc., lyc., sep., sil.

Tension. Aur., plat.

TIRAILLEMENT, Cann.

TRESSAILLEMENT. Agar., nic., cham., stann.

Ulcération. Nitr. ac.

Ulceres sur la cornée. Euphr., hep., calc.

YEUX éclatants. Bell., bryon., dat.

- bov., chin., fer., hyose., merc., phos. ac., sabin., (chel.).
- vitreux. Phos. ac., sep.

# F. A l'égard de la vue.

ABERRATION en général. Dat., dig., euphr., sen., valer.

AMAUROSE. Aur., dulc., phos., rhs, sil., bell., dig., guaj., sec.

— commençante. Bell., caust., hyosc., merc., natr. mur., puls., sulph., tart., chin.

Anneaux. Nitr., puls.

- lumineux. Stront.

Augmentation des objets. Laur., nic.

Auréoles autour de la lumière. Anac., bell., staph.

Broullard. Phos. ac., merc., plumb., (sec., phell.).

CARACTERES (confusion des). Natr. mur., dros., graph., sil., (sen.).

- (impossibilité de lire les petits). Natr.
- (les) paraissent renversés. Cic.

CATARACTE. Cann., con., magn., puls., caust.

Cécité subite. Acon., dat., merc., sil.

- pendant le jour. Sulph., veratr., ant., phos., sil.
- pendant la nuit. Bell., hyosc., veratr.

Couleurs (on voit des). Con., cic., dig., nitr. ac.

- bleue. Stront.
- grise. Phos., sil., (rat.).
- jaune. Canth., dig.
- irisée. Nitr.
- noire. Phos.
- rouge. Canth., dig.
- verte. Dig., sep.

234 Yeux.

DIMINUTION des objets. Plat.

DIPLOPIB. Cic., hyosc., dat., iod., nitr. ac., petr., puls., veratr., (euph., sec.).

EBLOUISSEMENT devant les yeux. Con., dros., kal., phos. ac., lyc., natr., nitr. ac., sil., (sen.).

ECLAIRS devant les yeux. Natr., spig., staph.

FAIBLESSE de la vue. Agar., anac., nic., aur., cann., led., phos., plat., sec., staph., (lam., tab.).

FLAMMES devant les yeux. Aur., bell., bryon., dulc., puls., sil., staph., (viol. odor.).

FREMISSEMENT. Nax, amm., caust., daph., graph., ign., led., lyc., petr., plat., staph., sulph., tart., (mgs, oleand., sen.).

Lumière éclatante devant les yeux. Valer., camph.

- (recherche de la). Acon., bell.

Moirié (on ne voit que la) des objets.

Mur. ac., natr. mur.

MOUVEMENT devant les yeux. Cic., euphr., thuj.

MYOFIE. Carb. veg., con., dat., phos., phos. ac., thuj., valer., anac., graph., mang., nitr. ac., plumb., puls., (ang., euph., grat., ol. an., rat., viol. od.).

OBSCURCISSEMENT. Cic., dros., nitr., puls., calc., con., fer., graph., iod., laur., lyc., natr. mur., nitr. ac., oleand., phos., sil., spig., thuj., (cycl., men., tab.).

PHOTOPHOBIE. Acon., bell., graph., merc., nux, chin., cic., euphr., hep., ign., kal., puls., (kal. hyd., tarax.).

PLUMES devant les yeux. Lyc., calc., natr., natr. mur.

Points. Nitr. ac.

noirs. Con., merc., natr., natr. mur.,

PRESBYOPIE. Carb. an., dros., sulph., calc., con., lyc., natr. mur., nux, petr., sil., spig., (nic.).

Raies lumineuses devant les yeux. Natr. mur.

Scintillement. Aur., bar., dig., sil., valer., veratr.

SENSIBILITÉ. Sulph., ant., bell., lyc., sep., (cast., sen.).

STRABISME. Alum., bell., hyosc.

TACHES devant les yeux. (Sec.)

TREMBLEMENT des objets devant les yeux. Plat.

Vacillation de la lumière. Anac.

Voile. Sulph. Croc., dig., natr. mur., petr., plat., sep., tart., thuj., (tab., verb.).

- foncé. Caust.

Vue confuse. Dig.

- indistincte. Cann., dat.

— trouble. Agar., anac., dig., euphr., lyc., rut., amm., calc., cin., cocc., croc., hep., mgs aus., merc., natr., natr. mur., phos., phos. ac., plat., plumb., sass., sep., staph., tart., thuj., valer., (ang., phell., rhod., sen., tab., verb.).

# 2. SELON LE TEMPS ET LES CIRCONSTANCES.

AIR (au grand). Merc., sil., sulph. ac.
— (à l') froid. Dulc.

Assis (étant). Mur. ac.

- (après avoir été). Tart., verat.

I eux.

BAILLANT (en). Sabad.

BAISSANT (en se). Graph., natr. mur.

CAMPHRE (par l'odeur du). Nitr.

CAUSES (par des) mécaniques. Acon., arn., calc., hep., sulph., sulph. ac.

CHAMBRE (dans la). Con., dig., sulph. ac.

CLARTÉ (en fixant la). Phos. ac., mur. magn., nux, sabad.

Couché (par le). Veratr.

CRÉPUSCULE (dans le). (Mgs.)

DINER (après le). Calc.

Douleum (pendant la) sur d'autres parties. Sabad.

ECRIVANT (en). Sep., (rhod., sen.).

Effort (par) de la vue. Carb. veg., rut., cin., mang., merc., (cast., nic.).

ÉVEILLANT (en s'). Mgs arc., nux, phos.

FERMANT (en) les yeux. (Cor.)

Fièvre (pendant la). Led.

FIXANT (en) quelque chose. Carb. veg., cin., spig., spong., sulph. ac., plat., rhm, (Phel., rhod., sen.).

FROTTANT (en) les yeux. (Sen.)

FROTTEMENT (par). Con., stront.

- amélioration. Cin., (ol. an.).

LECTURE (par la). Dros., natr. mur., rut., calc., cin., con., dulc., graph., sep., sil., thuj., (asar., grat., men., natr. sul., rhod., sen.).

— à la lumière. Calc., rut.

— en général. Lyc., (cast., rut., sen.).

-- des bougies. Lyc., dros., mang., sep., sil., staph., (cast., cor., natr. sul.).

- au soleil. Sulph., cast.

- à la lumière du jour. Con., hell., kal.,

nux, sep., dros., graph., nitr. ac., samb., sil., sulph., thuj., rhod.

Lit (après avoir quitté le). Veratr.

MARCHANT (en). Cic., natr. mur.

- au grand air. Con., fer., sabad,, thuj.

MATIN (le). Kal., nux, acon., dat., mgs arc., mgs aus., nitr. ac., phos., sep., sulph., (chel., euphr., tarax.).

MOUVEMENT (pendant le). Spig., (tab.).

— des yeux. Arn., chin., dig., mgs aus., mang., plumb., spig., (cor.).

Nouveau-nés (chez les). Cham.

Nuit (la). Carb. veg., cocc., croc., hyosc., lyc., mur. magn., rhs, sep., stann., staph., veratr., alum., hep., natr. mur., nux, phos., (cast., euph.).

Obscurité (dans l'). Bar., staph., etront., valer.

Oubli (avec). Cic.

Ovie, alternant avec la diminution de l'ouïe. Cic.

Périodiquement (qui revient). Merc., rhod.

REGARDANT (en) quelque chose de blanc. (Tab.)

— (en) de côté. (Ol. an.)

SAIGNEMENT (avec) de nez. Ind.

Som (le). Lyc., nic., sen., anac., chin., iod., mgs aus., merc., nitr., sass., sep., staph., valer., (cast., mgs, natr. sul., sen.).

Sommett (dans le). Rhm.

Somnolence (avec). Viol. od., plat., (viol. tric.).

Tre (pendant le mal de). Cin., eug., natr. mur., veratr., cocc., croc., dat., euphr., ign., led., mur. ac., nitr., puls.,

rhm, spong., tart., (cycl., diad., grat., sen.).

Toucher (au). Dig., hep., agar., aur., caust., nux.

Toussant (en). Sabad.

VENT (au). Phos., thuj.

Verrices (avec). Canth., cic., daph., dat., hep., hyosc., ign., merc., nux, olean., puls., sabad., sabin., tart., zinc., (lam., par., tereb.).

r eux.

Vie (avec dégoût de la). Acon.

YEUX (en ouvrant les). Nux.

# VII. OREILLES.

#### 1. SELON LA NATURE.

# A. Aux oreilles.

BATTEMENT. Calc., hep., nitr. ac., phos., rhm, thuj.

Carie de l'apophyse mastoïde. Aur., nitr. ac., sil.

CHALEUR. Alum., asar., carb. veg., natr. mur., puis., (bor.).

- qui sort. Canth.
- brûlante. Ang., ant., ign., spig.
- du dedans en dehors. Sil.

Cérumen (accumulation de). Con., sil.

- (manque de). Carb. veg.
- rouge comme du sang. Con, (1999)
- liquide. Kal., sil. 10 \ 100
- putride. Con.

CLAQUEMENT. Sabad.

CLIQUEMENT. Bar., calc.

Compression. Thuj.

Congestion. Sulph.

CONTRACTION. Dig., spong.

CROUTES. Puls., boy.

— derrière les oreilles. Hep., graph., sep.

Dartres. Caust., sep.

Dischirement. Con., merc., puls., zinc.,

ambr., anac., bell., chin., nux, spig., sulph.ac., thuj., (caps., guaj., ind., kal., hyd., ol. an., rhod., tab., verb.).

Déchirement derrière les oreilles. Ambr., (ind.).

- de crampe. Phos. ac.
- de coup. Arn., rut.

Dureté. (Sel.).

ÉCORCHURE derrière les oreilles. Petr.

- (douleur d'). Caust., sep., bor.

Écoulement de sang. Merc., graph., petr.

- de pus. Alum., amm., aur., bov., caust., kal., merc., petr., puls., sep., sulph., zinc., (bor.).
- d'humidité jaune. Phos.
- puante. Asa, aur., lyc.

ELANCEMENTS. Arn., con., mang., merc., nux, phos. ac., zinc., alum., ant., bell., caust., cham., chin., hell., hep., kal., natr. mur., sass., stann., thuj., (chel., kal. hyd., nic., ran., tab., viol. od.).

- de dedans en dehors. Kal., sil.
- derrière les oreilles. Arn., sulph., dig.

ENGELURES. Agar., mgs aus.

EPREINTES. Guaj., mang., nux, plat., anac., caust., dulc., lyc., merc., mur. ac., sabad., spig., spang., stann., thuj., zinc., (asar., euph., guaj., rhod.).

ERUPTION. Bar., bov., mur. ac., puls.

derrière les oreilles. Bar., staph.

ERYSIPÈLE. Puls.

Exchoissance fongueuse. Merc.

FOUILLEMENT. Hell.

GLANDES enflammées. Bell., kal., merc., rhs, cham.

engorgées. Bell., cham., kal., merc., rhs, carb. an., con., sil.

- douleur. Merc., bell.

- induration. Con.

GONFLEMENT. Puls., alum., ant., caust., natr. mur., sep., zinc., (bor.).

- derrière les oreilles, Carb, an. (tab.).

- du périoste derrière les oreilles. Carb. an., (tab.).

GLOUSSEMENT. Bar., sil.

Humidité derrière les oreilles. Petr.

Inflammation des oreilles. Puls., bell., bor., kal.

Noposités derrière les oreilles. Bar.

POLYPE. Calc.

Poussement en dehors. Puls., caust., (natr. sul.).

PRESSION. Spig., aur., caps., rut., sabad., spong., (sen.).

- derrière les oreilles. Thuj.

PRURIT. Amm., agar., caps., hep., sep., spig., (arg., sel.).

Pulsation. Mur. magn., spig.

RONGEMENT. Plat., (arg.).

ROUGEUR. Puls., ant., carb. veg., chin., hep.

- d'un côté. Ign.

derrière les oreilles. Petr., (tab.).

Sécheresse. Graph., nitr. ac., petr.

Secheresse (sensation de). Petr., phos.

OI CULLOS.

SECOUSSES. Plat.

Sensation de chaud. Mgs arc.

— de froid. Alum., plat.

- d'une cheville. Sep., spig.

- d'engourdissement. Plat.

— comme si du vent sortait de l'oreille.

Chel.

- - chaude. Canth.

— d'un ver. (Rhod.).

Sensibilité. (Kal. hyd.)

SERREMENT. Plat., thuj., cin., mur. ac., spig., (ang.).

Tension. Dig., asar.

TÉRÉBRATION. Hell., sil., (rhod.).

TRACTION. Con., phos. ac., stann., (cycl., teucr.).

- du dedans en dehors. Con.

- du dehors en dedans. (Verb.).

- derrière les oreilles. Dig.

TRESSAILLEMENT. Puls., cin., rhod., spig.

ULCERATION. Amm., merc., puls., lyc., spong., stann.

Ulceres dans l'oreille. Bov., camph.

#### B. Concernant l'ouïe.

Ant., aur., earb. an., caust., natr. mur., puls., sulph., ars., bell., calc., carb.

veg., eroc., dulc., hep., led., magn., mgs arc., merc., nitr. ac., petr., phos.,

rhm, sabad., spig., sulph. ac., veratr., (cast., nic., ol. an., sen., therm., vit.).

CLAQUEMENT, éclatement. Sil., (therm.).

CLOCHES (on entend le son des). Sil., valer., cale., led., (cast.),

Oremes.

Difficulté de l'ouïe. Alum., anac., calc., cic., iod., lyc., mang., mur. ac., natr., nitr. ac., petr., phos., puls., sil., ars., bar., croc., graph., hyosc., magn., merc., mur. magn., phos. ac., sabad., sep., spig., spong.

— pour la parole. Phos.

Diminution de l'ouïe. Merc., asa, bov., calc., con., kal., rhin, plumb., sabin., sulph. ac., (ang., asar., cor., cycl., lam., mgs, par., sec.).

— d'un seul côté. Ambr., aur.

Grondement, roulement. Plat., canth., petr., (chel., rhod.).

Musique (dégoût pour la). Sep., viol. od.

- du violon. Viol. od.

- (sensation de). Mang., spig., ars., natr., puls., sil., (verb.).

OBTURATION. Sil., mang., nitr. ac., sulph., veratr., (men.).

OREILLES (comme si quelque chose était placé devant les). Led., mgs arc., mur. magn., sabad., sulph. ac., (men., verb.).

Sensibilité. Natr., lyc., phos. ac., con., coff., magn., mur. magn., (calad., kal. hyd., sen.).

- extraordinaire. Lyc., coff., sep., sil., sulph.

Sons (on entend des). Merc., phos.

Surdiré. Ant., arn., led., mgs arc., mur. magn., natr., sep., verat., (nic., sec., therm., verb.).

TINTEMENT, chantement, cris, sifflement.

Carb. veg., chin., con., graph., lyc.,
nux, stann., valer., (rat., vit.).

TYMPAN ( relâchement du ). Rhm.

Voix (on entend des). Cham.

2. SELON LE TEMPS ET LES CIRCONSTANCES.

Air (au grand). Lyc., (euph., tab.).

Amygdales (par l'augmentation des). Staph., aur., merc., nitr. ac.

AVALANT (en) Bar., bov., calc., mang., (rhod.).

BRUIT (pendant le). Natr., zinc., acon., lyc., magn., mur. magn., sil., (calad.).

CHAGRIN (après). Sulph.

CHAMBRE ( dans la ). Mgs.

Couché (étant). Bar.

Douleur ( par la ) dans d'autres parties.

Mang.

Endormi (après s'être). (Calad.)

Enfants (chez les). Zinc.

ÉRUPTION ( avec ) à la tête. Lyc.

ÉTERNUANT (en). Bar.

Fièvre intermittente ( par suppression de). Calc.

Gorge (avec mal de). Cham.

Jour et nuit. Hell.

Lit (au). Thuj.

Lune (pendant la pleine) aggravation. Sil.

MACHANT (en). Sen.

MARCHANT (en ). Bar., mang.

- au grand air. Con.

MILIAIRE (à la suite de la). Puls.

Mouchant (en se). Hep., stann.

- amélioration. Mang., merc., sil.

Musique (par la). Coff., phos. ac., sep., (tab., viol. od.).

Nuit (la). Cham., dulc.

Oreilles.

ODONTALGIE ( pendant l'). Cham., merc., puls., (nic.).

PARLANT (en). Mang., mur. magn., (teucr.).

Pieds (avec les) froids. Thui.

- (en appuyant le). Mur. magn.

PÉRIODIQUE (à retour). Spig.

Quinine (après l'usage du). Calc., puls.

Refroidissement (après un). Dulc., merc., nux.

RIANT (en). Mang.

Oreilles. Som (le). Alum., carb. veg., thuj., sulph. ac.

239

Tête (par mal de ). Merc., ars., dulc.,

Toucher (par le ) amélioration. (Cast.)

Unine (avec sécrétion abondante d'). Thui.

Vertige (pendant le). Puls., (sen.).

VIEILLARDS (chez les). Sulph.

Voix (en lisant à haute). (Verb.)

Vue ( alternant avec affection de la ). Cic.

## VIII. NEZ.

1. SELON LA NATURE.

A. Au nez.

BATTEMENT. Coloc.

Boutons. Carb. an., sil.

- suppurants. Plumb., tarax. (therm.).

CANCER. Aur., sep., calc., sulph.

CARIE. Aur., merc.

CHALEUR. Mgs arc.

- brûlante. Cin., stann., ars., carb. an., led., nitr., sulph. (kal. hyd., nic.).

Compression. Acon.

Congestion sanguine. Amm.

Constriction. Hell.

Contraction. Nitr., sabad.

CRAMPE à l'aile du nez (ambr.).

CROUTES dans les narines. Ran., thuj. ant., arn., aur., calc., cic., cocc., graph., lyc., mur. magn., rat., spig., stront.

CROUTES au bout du nez. Carb. veg., sep.

- sous le nez. Bar.

DARTRE squammeuse. Aur.

Déchirement (douleur de). Lyc., (ind., kal. hyd., nic.).

- dans la racine du nez. Mang.

Démangeaison. Euph., sabad.

Douleur incisive. (Ind.)

— de coup. Arn., (viol. od.).

— de brisure. Bell., hep.

- d'ulcération. Nux, rhs.

DURETÉ. Thuj.

ÉCORCHURE. Ant., agar., daph., phos., (kal. hyd.).

- ( douleur d'). Hep., daph., mur. magn., nux.

Efficient du nez. Ars., phos. ac., rhs, sec., staph.

240 Nez. Endolomssement. Mura magn.; led.,

rhs.

ELANCEMENT. Nitr., spig.

ENGELURE. Agar. mgs aus.

ÉPHÉLIDES. Phos., sulph.

EPISTAXIS. Arn., bell., carb. veg., coff., croc., ipec., merc., mosch., phos., rat., sabin., sulph., acon., bryon., cann., caps., con., fer., hep., led., lyc., nitr., nitr. ac., puls., rhs, sep., sil., (ambr. ang., ars., bar., caust., dulc., kal, magn., mgs arc., nux, petr., phos.

ac., sabad., sec., sep., tereb.).

- le sang est âcre. Nitr.
- est noir. Croc.
- est clair. Dulc., merc.
- est chaud. Dulc.
- est épais. Croc.
- des croûtes de sang se forment dans le nez. Stront., (ambr.).

Enuption dartreuse. Spig., (aur.).

- sur le nez. Aur., natr., sil., spig., (nic.).
- à la pointe. Caust., spong.

FOUILLEMENT. Coloc., nitr.

FOURMILLEMENT. Sabad., carb. veg., mosch., plat., spig., (ran., teuer.).

Frémissement. Stront.

FURONCLE. Alum., sil.

GERCURES. Carb. an.

GONFLEMENT. Arn., aur., bell., bryon., merc., phos., ran., zinc., alum., ars., bov., cann., canth., kal., mur. magn., nitr., phos. ac., sep., thuj., (cor., nic.).

- -- des os. Aur.
- de couperose. Cann.

GRIFFEMENT. Nitr.

HEMORRHAGIE. Bell., led., phosi-

Inflammation. Aur., bell., hep., nitr., agar., natr. mur., sep., (rat., phell.).

IVez.

— érysipélateuse. Plumb.

Insensibilité. Natr. mur.

OBTURATION par enflure. Lyc.
ODEUR désagréable du nez. Phos.

- fétide. Bell., phos.

Os (douleur des) du nez. Natr. mur. aur., carb. an., hyosc., merc., sil. thuj., (colch.).

PEAU (desquammation de la). Aur

- (fendillement de la). Ant.
- ( mort de la ). Natr. mur.

PESANTEUR. Colch.; sil., stann.

POLYPE. Teucr.

PRESSION. Hyosc., (colch., ol. an., vit.)

— à la racine du nez. Dulc., hep., zinc. (ol. an., rut.).

PRURIT. Sabad., caust., sep., spig., (chel. sel.).

Pus (écoulement de). Con., aur., calc. cic., phos. ac.

Rongement. Sil.

ROUGEUR. Aur., bell., phos., merc. (nic.)

- à la pointe du nez. Calc., carb. an. mgs arc., rhs.
- --- aux angles. Plumb.

SANG (mouchement de). Agar., caust. phos., puls., thuj.

Sécheresse. Bell., calc., cann., graph., natr. mar., phos., sil., sulph., bar. bryon., cic., con., ign., nitr. ac., petr. sep., spig., zinc., (ambr., sen., tab.)

(sensation de), Sil., con., daph., petr.)

Secousses, Plat.

Sensation de froid. Arn., ign., nux, verat.

- d'engourdissement. Plat., (ol. an., viol. od.).

- de suppuration intérieure. Natr. mur.

Sensibilité. Agar., aur., natr., sil., (kal. hyd.).

SERREMENT de crampe. Plat.

- à la racine du nez. Arn., hyosc., zinc.

SUEUR froide. Rhm.

TACHES rouges. Iod., phos. ac., (calc., carb. an., mgs arc., rhs).

- jaunes. Sep.

- brûlantes. Iod

Tannes. Sep., sil.

- noires. Sulph.

TENSION. Graph., thuj., (chel.).

- à la racine du nez. (Men.)

TÉRÉBRATION. Natr. mur., spig.

TIRAILLEMENT. Thuj. (chel.).

des narines. Lyc., sil., ant., aur., cocc., mur., ac., natr., spig., squill., staph., zinc., (cor., phell.),

Verrues. Caust.

Vésicules. Ant., (mgs, phell.).

B. A l'égard de l'odorat.

ODEUR de chaux. Mgs arc., sulph.

- de corne brûlée. Sulph.

- de coriza. Puls., sulph.

- d'écrevisse. Lyc.

- de fromage, Nux,

Opeus de fumier. Anac., (mgs).

— de lumiguon, Nux.

- de poudre. Calc.

— de poussière. Mgs are.

- de pus. Sen., sep.

putride. Calc., mgs arc., (men.).

-- de soufre. Nux.

- d'ulcère. Sen.

2000

- qui produit des nausées. (Men.)

Odorat émoussé. Anac., calc., kal., daph., (rhod., tab.),

— (manque d'). Anac., natr. mur., puls., sep., sil., daph., hep., ipec., mur. magn., zinc.

- (surexcitation de l'). Agar., con., (lyc.).

— (susceptibilité de l'). Acon., bar., colch., (graph., tab.).

2. SELON LE TEMPS ET LES CIRCONSTANCES.

Baissant (en se). Rhs, amm., sil.

Coriza (pendant le). Mur. magn., natr. mur., puls., ars., cin., cocc., spig., squill., staph., (kal., hyd., phell., rhod.).

ECHAUFFEMENT (après). Thuj.

FACE (avec paleur de la ). Carb. veg.

LARMOIEMENT (avec). Teucr.

Lit (au). Caps.

MATIN (le). Ambr., caust, magn., (caps.).

Nur (la). Lyc., rhs.

OBSCURCISSEMENT (avec) de la vue. (Ind.)

Pression ( par ) extérieure, Sil.

12 IVez.

PRESSION (par) extér. amélioration. (Vit.) Règles (par suppression des). Bryon.

Somment (pendant le). Merc.

Soir (le). Sulph. ac.

SUFFOQUER (à ). Euph., hell.

Tête (avec mal de). Ant., mgs arc, coff., nitr.

Nez.
Toucher (au). Hep., aur., mur. magn., nitr., sil.

Toussant (en). Merc.

Toussotant (en). Rhs.

VERTIGES (avec). Sulph.

VIN (par le). (Tab.).

# IX. FACE.

#### 1. SELON LA NATURE.

## A. Face en général.

Amaigrissement. (Sel., tab.)

Anxieté (expression d'). Bell., canth.

Aspect hébété. Dat.

- maladif. Cin., nux, sulph., cupr., mang., rhs, sil., (bism., natr. sul., teucr.).
- de mort. Ars., canth., sec., verat.
- pâle. Phos., sec.
- timide. Bell., dat., hyosc.

BATTEMENT. Staph., ars.

Bosses. Ant.

- qui suppurent. Calc.

BOUFFISSURE. Bell., kal., op., phos., acon., amm., arn., ars., aur., cin., cocc., hyosc., ipec., laur., magn., sep., spig., (lach.).

- au-dessous des yeux. Phos.

BOUTONS. Kal., natr. mur., nitr. ac., phos., thuj., veratr., (eug., par.).

- dans les favoris. Ambr.
- autour de la bouche. Phos.
- au front. Aur., led., mur. ac., natr. mur., (par.).

Boutons aux tempes. Mur. ac. est grande

- purulents. Tart., veratr. (par.)
- - au front. Rhod. amin considers

CHALEUR. Acon., arn., bell., op., petr., plat., amm., bov., bryon., cham., chin., cocc., con., hep., lyc., nux, rhs, sabad., squill., stront., sulph., thuj., valer., veratr., (con., diad., laur., ran.).

- au front. Cham., nitr., (diad.).
- d'un seul côté. Arn., cham., ign., (tab.).
- passagère. Graph., ambr., bov., cocc., kal., thuj., (tab., teucr.).
- brûlante. Ars., nitr., plat., rhs, staph., dros., euph., spig., veratr., (diad., ind., laur., mgs).
- - autour de la bouche. Rhs.

CANCER. Ars.

Congestion sanguine. Bell., dat., (ind.).

Convulsions. Bell., cham., op., cupr., ipec., rhm.

- de la bouche. Bell., cham., op.

GOULEUR jaune. Sec., sep., ambr., arn., ars., bell., bryon., calc., carb. veg., caust., hep.

- - autour de la bouche. Sep.

Face. Face. 24

Courtur jaune au-dessus du nez et des joues. Sep.

— — aux tempes. Caust.

- grise. Laur.

- jaune grise. Carb. vegicometinog)

- sale. Phos., sec. 1 27 tob

COUPEROSE. Ars., carb. an., calc., veratr.

- autour de la bouche. Veratr.

CRAMPES. Ambr., sep., (ol. an., ran.).

CROUTES. Ars., bar., merc., suss., sulph., cic., thuj., (viol. tric.).

- au-dessous du nez. Bar.

- sur le front. Calc.

- aux tempes. Alum.

DARTRES. Ars., aur., bov., graph., led., petr., sabad., (kal. hyd., nic.).

— autour de la bouche. Graph., phos., sep., (par.).

- aux tempes. Alum.

au front. Aur.

DARTRE farincuse. Ars.

DECHIREMENT (doubleur de). Agar., arg., coloc., hep., spig., thuj., (ind., kal. hyd., rat., therm.).

Démangeaison. Plat., (rat., vit.).

- autour de la bouche. Plat.

Distorsion de la face. Bell., cupr., dat., merc. subl., plat., rhs, sec., squill.

- de la bouche. Dat., op., plat., sec.

- d'un seul côté. Graph.

DISTENSION. Colch., thui.

Douleur de coup. Cin., (rat.).

- de coupure. Bell., therm.

- d'écorchure. Puls.

- - autour de la bouche. Plat. 100 %

ELANCEMENTS. Ars., sil., spong., staph., (guaj.).

Endolorissement d'un seul côté. Phos.

ENGOURDISSEMENT (douleur d'), Plat., (verb.).

EPHELIDES. Lyc., natr., calc.

— sur le nez. Phos., sulph.

Enverion. Calc., cic., hep., rhs, sass., amm., ant., bar., caust., con., dulc., graph., ign., kal., led., lyc., natr., natr. mur., phos., sep., staph., thuj., (tab.).

- chronique. Rhs, sulph., hep.

autour de la bouche. Graph., rhs.

- - sous le nez. Squill.

-- au front. Aur., led., mur. ac., natr. mur., sep., sulph., (par.).

- aux tempes. Mur. ac.

ERUPTION miliaire. Cham., veratr.

- varioleuse. Arn.

ERYSIPÈLE. Bell., camph., carb. an., cham., graph., hep., rhs, sulph., (rut., therm.).

- vésiculaire. Euph., rhs.

FACE pâle. Amm., arn., carb. veg., cham., chin., cin., graph., merc., nux, phos., plumb., sulph., anac., bov., calc., cic., coloc., con., cupr., daph., dig., dulc., hell., ign., ipec., iod., led., magn., mur. magn., oleand., op., petr., phos. ac., puls., rhs, sabin., sec., sep., sil., spong., stann., sulph.ac., tart., veratr., zinc., (kal. hyd., natr. sul., teucr., therm.).

- d'un seul côté. Cham., ign.

- bleuâtre. Bell., bryon., cham., cin., acon., ars., con., cupr., hyosc., ign., veratr., (ang.).

FACE bleuâtre autour de la bouche. Cin.

- rouge bleuâtre. Bell., bryon.
- fonce. Bell., bryon., op., sec.
- couleur terreuse. Chin., lyc., mur. magn., nux, petr., ars., bryon., carb. veg., croc., fer., laur., natr. mur., plumb., sil., (therm.).
- huileuse. Lyci, natr. muri, plumb., (sel.).
- duisante. Aur., natr. mur., rhs.
- jaune notratre. Chin.
- bourgeonnée. Led., nux, zinc.

FOUILLEMENT. Bov., euph., thuj.

FOURMILLEMENT. Acon., arn., nux, plat., rhs, sec., (grat., vit.).

FROID. Cham., cic., plat., veratr.

- autour de la bouche. Plat. (voy. Sensation de froid.)

FURONCLES, Alum.

- au front. Led.

- GONFLEMENT. Ars., cham., euph., graph., magh., rhs, bar., calc., con., daph., dat., laur., lyc., merc., natr. mur., nux, spig., veratr.
- bov., cham., kal., mgs ard., petr., spong., stann., staph., (kal. hyd.).
- d'un seul côté. Bell., nitr. ac., (nic.).
- (sensation de). Acon., bar., puls., samb., sulph. ac., (grat., nic.).

GOURME. Ars., bar., merc., sass., sulph., viol. tric.

HORRIPILATION. Puls., (cor., rhod.).

LIGNE jaune sur le nez et sur les joues.

Sep.

Nodosités. Ars., led.

Face.
Novostres au front. Con., ars., cic., led.,

- aux tempes. Thul.

sil.

- Os (inflammation des). Staph., auri
- (gonflement des). Aur., bov.
- (douleur des). Agar., arg., daph., thuj., ars., asa, colch., dig., mur. magn., nitr. ac., oleand., plat., sep., sil., spig., stann., staph., stront., valer., (chel., cor., guaj., rat., rut.).

PEAU ( desquammation de la ). Canth., rhs.

- (épaississement de la ). Bell., (viol. tric. ).
- (dureté de la). (Viol. tric.)
- (fissures à la). Sil.
- ridée, Dat.

Peau (rudesse de la). Graph., rhs, sep.

- au front. Sep.

PICOTEMENTS. Dros.

Pression. Arg., daph., rhs, asa, bryon., cin., plat., stann., staph., (verb.).

PRURIT. Calc., con., lyc., nux, rhs, (chel., rūt., vit.).

- autour de la bouche. Rhs.
- au front. Led.

PULSATION. Cham., croc.

RHUMATISME. Acon.

ROUGEUR de la face. Acon., bell., chin., nuc., op., cocc., dat., fer., hep., hyosc., ign., rhs, sulph., veratr., (ran.).

- des joues. Chin., kal., mur. ac., nitr., nux, valer.
- brûlante. Plat., op., bell., bryon., dule., ign., lyc., mur. ac., sabad., samb., stann., stront., thuj.
- d'un seul côté. Cham., ign., arn.

ROUGEUR circonscrite. Lyc., bar., dulc., phos., stann.

SENSATION de brisement. (Cor.)

de chaleur. Magn., nitr. ac.

- de froid. Agar.

d'engourdissement. Plat., asa, samb., oleand., (rut.).

- de paralysie. (Ol. an., sen.)

- de pesanteur. Alum., (nic.).

- de tiraillement à la peau. Canth.

- de rampement. Vit.

- de rongement. (Ind.)

- de toile d'araignée. Bar., graph.

SERBEMENT de crampe. Plat., cin., daph., mur. magn., nitr. ac., rhs, valer., (ang.).

SURUR. Natr. mur., magn., mgs, thuj. - au front. Led., rhm.

à la joue sur laquelle on est couché. Acon.

- froide. Rhm, veratr.

veratr. Bryon., ein., ipec.,

TACHES bleues. Fer.

- brunes hépatiques. Sulph.

- épaisses. Carb. an.

— jaunâtres. Graph., kat., natr., ciod., hell., hep.

- - sur la lèvre supérieure. Natr.

- sur les joues et le nez. Sep.

- - au front. Natr.

- - aux tempes. Caust.

— — autour de la bouche. Sep.

- rouges. Carb. an., mgs arc., sabad., sulph., (ambr.).

CANNES. Sulph.

TANNES sur le nez. Sulph. . aingudo ana-

Tension. Alum., aur., bar., rhs, asa, coloc., lyc., magn., mur. magn., nitr., plat., phos., puls., samb., sulph. ac., (chel., grat., ol. an., phell., rat., verb., viol. od., viol. tric.).

- d'un seul côté. Phos.

au front. Par., phos., (viol. od., viol. tric.).

- des muscles. Ang.

Tic douloureux (prosopalgie). Bell., bryon., calc., daph., hep., kal., lyc., nux, nitr. ac., phos., sep., spig., thuj., verb., ars., asa, coloc., con., nux, magn., plat., stann., staph., stront., valer., veratr., (cor.).

Térébration. Bov., ign., stront., thuj., euph.

TRAITS (relâchement des). Coloc., op.

Traction. Golch., dig., hep., stann., valer., (chel., cor., ol. an.).

TREMBLEMENT. Agar., ambr., op.

TRESSAILLEMENT. Colch., rhs, spig., (cor.).

- des muscles. Agar, bell., cann., daph., (ambr., men.).

- autour de la bouche. Bell.

Tubérosités. Alum?, magni

Vésicules. Ant., valer.

Visage (le) paraît fatigue. Staph.

- altéré. Dat., (ol. an.).

- have. Arn., chin., sec., staph., bell., dros., laur., oleand., op., plat., rhs, squill., stann.

- effilé. Ars., phos. ac., rhs., sec., staph.

- sombre. Alum., magn., natr. scl.

- serein (hilarité). Dat.

VISAGE chagrin. Magn., (natr. sul.).

- qui peint le désespoir. Canth.

- rouge brunatre. Bryon., op.

- qui brunit. Iod.

— qui change de couleur, Bar., bell., croc., kal., magn., op., phos.

- qui change d'aspect. Squill.

YEUX caves. Anac., chin., phos., stann., ars., cic., cupr., dros., fer., nitr. ac., op., phos. ac., sec., spong., staph., sulph., (teucr.).

(cercles bleus autour des). Chin., ipec., phos., phos. ac., sec., ars., cocc., graph., hep., kal., lyc., oleand., rhs, sabad., sabin., sep., staph., sulph., veratr., (bism.).

(cercles jaunes autour des). Nitr. ac., spig.

#### B. Aux lèvres et aux commissures.

Ampoults sanguines à la lèvre supérieure. Natr. mur.

APHTES. Ipec.

Boutons. Ant., merc., petr., phos., rhs, thuj., (mgs, rut.)

— aux commissures. Petr

— — purulents. Tart.

CHALEUR brûlante. Arn., merce; Ths; sabad., spig., staph., (rhod.).

— à la lèvre supérieure. Daph.

CANCER. Ars., sulph., con., sil.

CHALEUR. Ars., (ambr.).

Convulsions. Bell., cham., dat., ipec., oleand., op.

Contraction. Calc.

CRAMPE. Calc., caust., kal., ran., (ambr., ang.).

CROUTES. Merc., petres staph.

— à la lèvre supérieure. Cic.

- aux commissures. Petro ob nomes

Cuisson. Arm, igni, merc., phos. lac., plat., zinc.

Face.

- à la lèvre supérieure. Natr. mur.

- à la lèvre inférieure. Cham., daph., puls., (nic.).

— aux commissures. Merc., zinc.

DARTRES. Phos., (par.).

DESQUAMMATION. Naw, con., plumb., sulph. ac.

Distorsion de la bouche, Bell.

Douleur d'écorchure. Ant., hep., ign., ipec., plat., sabad.

ELANCEMENTS. Sabad.

ENDOLORISSEMENT. Nux.

Engourdissement. (Ambr., cylc., oleand.)

Enurrion. Alum., ars., ipec., merc., spong., thuj., (nic.).

- à la lèvre supérieure. Daph.

- aux commissures. Bell., hep., magn., natr., veratr.

- vésiculaire. Con., kal., mur. magh., plat., rhod. que seupitaged somme

— a la lèvre supérieure. Valer.,

- - aux commissures. (Sen.)

Frémissement. (Cast.)

FOURMILLEMENT. Arn.

FROID (sensation de) à l'angle. Plat.

Gençunes. Caps., carb. veg., ars., ign., merc., phos., phos. ac., plat., zinc., (kal. hyd.). again. dis.). again.

- à la lèvre supérieure. Natr. mur., par., (sel.).

Have. GERCURES à la lèvre inférience. Cham:

TACHES hépatiques. Sulph-

daph., puls.; (nic.). aux commissures. Merc .. veratr.

zinc., (tab., therm.).

GONFLEMENT. Arn., bell., kal., merc., merc. subl., nitr. ac., sulph., ( mgs ).

- de la lèvre supérieure. Bell., bov., lyc., natr. mur., (arg., par.).

- de la lèvre inférieure. Alum., daph., puls., sep., (merc. subl.).

- (sensation de) de la lèvre supérieure. Oleand.

Induration de la lèvre supérieure. Bell., (cycl.).

Lèvres bleues. Agar., caust., cupr., dig., lyc., phos., (ang.).

- brunes, Oleand.

- chargées. Zinc.

noires. Chin.

- - de mucosités. (Kal. hyd.)

gluantes. (Kal. hyd.)

noires. Acon., ars., chin., merc phos. ac.

- pâles. Caust., lyc.

- rouge foncé. Bell.

Nodosités. Hep., sep., sulph.

RENVERSEMENT de la lèvre inférieure. (Merc. subl.)

RONGEMENT (sensation de). Plat.

Rudesse. Merc., mur. magn., tab.

SAIGNEMENT. Ign.

Sécheresse. Ars., lyc., bell., chin., con., dros., hyosc., ign., mang., merc., plat., rhs, (kal. hyd., rhod., therm.).

Sueur à la levre supérieure. Acon.

TACHES jaunes sur la lèvre supérieure. Natr.

Tension. Lyc. qed ....elo ...io

a la levre inférieure. Puls., sep.

Face.

TRESSAILLEMENT, Ars., dulc.

- de la lèvre supérieure. Carb. veg., thuj., zinc. .... I the contract time is a feet a

ULCERATION. Graph., merc., cic., con., kal., nux, staph., zinc.

-- à la lèvre supérieure. Daph.

- à la lèvre inférieure. Phos. ac., sil.

- aux commissures. Bov., mang., phos., arn, graph., hep., merc., nitr. ac., zinc.

# C. Dans la mâchoire inférieure.

BATTEMENTS, BOV.

Bourons purulents. (Par.)

CRAMPES. Agar., mgs arc., rhs, spong. stann., (ang., nic.).

- de la mâchoire inférieure ( trismus ). Bell., cic., op., plat., ang., camph. mang., sec., sulph, veratr., (ang., olan.).

CRAQUEMENT. Rhs.

Cuisson. (Par.)

Déchirement (douleur de). Bov., plumb., (ind., vit.).

DIFFICULTÉ d'ouvrir la bouche. Caust. colch., nux, sass., (nic., of. an.).

Douleurs arthritiques. Caust.

Endolorissement. (Nic.)

ÉLANCEMENTS. Hep., mang., sil., thuj., (tab.). Enuption miliaire! (Part)

EXOSTOSE, Sil.

From (sensation de). Plat.

GLANDES (gonflement des ) Bell, graple,

natr. mur., nitr. nc., sulph., bov., calc., camph., cic., clem., hep., kal., merc., rhs, sil., spong., staph., sulph. ac., thui., veratr., (arg., cor.).

GLANDES (douleur des). Merc., calc., cic., rhs, staph., (cor.).

— (induration des). Cocc., con., hep., merc.

GONFLEMENT. Acon., arn., ars.

- (sensation de). Caust.

LUXATION facile. Hep., ign., mgs arc., petr., rhs, staph.

( sensation de ). Phos. ac., mgs arc., (cor.).

Os (douleur des). Plumb., plat.

PARALYSIE. Arn.

PINCEMENT. Bryon.

Pression dans l'articulation. Bryon.

RAIDEUR. Caust., nux, sass., ( nic., ol. an.).

RONGEMENT. (Ind.)

Tension. Caust., merc., sass.

TÉRÉBRATION. (Ind.)

TRACTION. Agar., caust., cupr., sil.

TRESSAILLEMENT. Thuj., mang.

Ulcere fistuleux. Calc.

#### D. Au menton.

Bosses. Hep.

Boutons. Rhs, thuj.

COUPEROSE. (Verb.)

CROUTES. Cic.

DARTRES. Bov., nux, sil.

DÉMANGEAISON. Plat.

DOULEUR d'écorchure, Ant., hep., plat.

Encoundissement (sensation d'). Plat.

Enverion. Hep., zinc.

FROID (sensation de). Plat.

FURONCLE. Sil.

PRURIT. Zinc.

Réseau veineux. Plat.

TENSION. Verb.

Traction. Agar., caust., cupr.

# 2. SELON LE TEMPS ET LES CIRCONSTANCES.

Pace.

Air (au grand). Valer.

- (par l') froid. Dulc.

AVALANT (en). Merc., (cor.).

BAILLANT (en). Hep., ign., mgs are rhs, (cor).

Baissant (en se). (Cor., verb.)

Bouche (en ouvrant la), Hep., phos.

- (en fermant la). (Cor.)

CÉPHALALGIE (avec). Alum., calc., phos stront., thuj., (ang., diad.).

CHALEUR ( dans la ) amélioration (Therm.)

DINER (après le). Nux, cham., mang petr., sep.

FROID (avec) général. Arn.

FROTTANT (en) amélioration. Plumb.

GONFLEMENT (avec ) des glandes du cou

Gorge (avec mal de). Merc., verair., (nic.)

Lir (au). Petr.

- en (quittant le). Bov.

MANGEANT (en). Natr. mur, amm.

MARCHANT (en) au grand air. Mur. ac.

MATIN (le). Bov., petr., spig., thuj., (ka hyd., mgs).

Mini (à). Spig.

MORDANT (en). (Cor., verb.)

MOUVEMENT (pendant le). Squill.

- (par le) de la mâchoire inférieure. Bryon., mgs arc., rhs.

Nez (avec saignement de). Carb. veg.

Nuit (la). Ars., hep., sil.

ODONTALGIE (pendant l'). Arn., cham., daph., merc., ars., aur., bar., bov., camph., mgs arc., natr., petr., puls., sil., staph., veratr., (therm.).

- (après l'). Bov., cham.

PARLANT (en ). Squill.

Pression (par) extérieure. Cupr., (verb.).

Pression (par) extérieure amélioration.
Bryon.

RIANT (en). Mang., (tab.).

Réveil (au ). Spig.

Salivation (avec). (Mgs.)

Sommert (dans le). Rhm.

Som (le). Arn., nux, plat., thuj., (mgs, par.).

Toucher (au). Cor., hep., cin., cupr., daph., merc.

- - amélioration. Thuj.

Ulceres (avec) des jambes. Sil.

VERTIGES (avec). Puls.

VIN (après avoir bu du). Sabad.

# X. DENTS.

I. SELON LA NATURE.

A. Gencives.

BATTEMENT. Sulph.

BOUTONS Phos. ac., plumb.

Cuisson. Merc., tereb., petr.

Déchirement (douleur de). (Teucr.)

DOULEUR. Mgs arc., carb. an., mur. magn., spong., staph., stront., (arg., rut.).

Econchures. Carb. veg., nitr. ac., sep.

- (douleur d'). Merc., tereb., alum., clem., graph., puls., thuj., (rhod.).

ELANCEMENTS. Puts., petr., sabad., (kal. hyd.).

Engoundissement. Mgs arc.

EXCROISSANCES. Staph.

FOURMILLEMENT. Arn.

Gencives blanches. Merc., staph.

- bleues. Oleand., sabad.

- brûlées (comme). (Par.)

- pâles. Bar., plumb., staph.

- spongieuses. Merc., tereb., ( arg.).

GERÇURES. Plat.

GONFLEMENT. Hep., mgs arc., merc., nux, sulphi, agar., alum., bar., belt., calc.,

30

carb. an., cast., cocc., graph., mur. magn., natr., natr. mur., petr., phos., phos. ac., plumb., sep., spong., staph., stront., thuj., (ambr., arg., kal. hyd.,

Inflammation. Nux.

PRURIT. (Rhod.)

rhod.

PUTRIDITE. Nux.

RETRACTION. Merc., carb. veg., hep., phos. ac., (therm.).

ROUGEUR. Carb. an., phell.

REGOSITÉS. (Par.)

SAIGNEMENT. Bor., carb. veg., merc., nux, phos. ac., tereb., ars., bar., mur. magn., natr. mur., phos., sep., sulph., zinc., (arg., rut.).

Suppuration. Caust., canth., carb. veg.

Ulceration. Merc., staph., bell., carb. veg.

- (douleur d'). Kal. hyd., (phell.).
- fistuleuse. Caust., natr. mur.

Vésicules, Daph.

#### B. Aux dents.

ALLONGEMENT. Caust., alum., arn., ars., bryon., camph., daph.

BATTEMENT. Caust., nitr. ac., plat., spig., (ol. an., par.).

CHALEUR brûlante. Bar., magn.

- des incisives. Phos. ac.

CRAMPE. Plat.

BAQUEMENT en frottant. (Sel.)

CHUTE. Sec.

CONTRACTION. Carb. veg.

CREUSEMENT. (Rat.)

DECHIREMENT. Agar., merc., rhs, rhod., zinc., anac., bell., carb. veg., chin., hell., hyosc., nux, oleand., phos. ac., plumb., sil., spig., (ol. an., viol. od.).

Dents.

- dans la mâchoire supérieure. Agar., plumb., (mgs).
- dans les mâchoires. Carb. veg.
- dans les dents molaires. Merc., mang., zinc., (rhod., tab.).
- dans les incisives inférieures. (Teucr.).
- dans les racines des dents. Merc.

DENTITION difficile. Calc.

DENTS qui deviennent creuses. Sep., plumb., staph., (sel.).

- fétides. Calc., plum., rhs.

Douleur. Natr., lyc., magn., (mgs).

- dans les incisives supérieures. Bov.

Douleua dans les incisives inférieures. (Sen.)

- dans les molaires. Graph.
- de brisement. Ign.
- d'écartement. Sabin.
- d'écorchure. Nux, rhs.
- d'arrachement. Ipec.
- arthritique. Cycl., rhs.
- dans les mâchoires. Caust.
- rhumatismale. Mgs arc., rhs.
- dans les incisives. Mgs arc.

Dents.

Dents.

25 F

JAUNISSEMENT. Iod., lyc., nitr. ac.

LISSEMENT. (Sel.)

MACHONNEMENT continuel. Cham.

Mucosité aux dents. Magn., plumb., (sel.).

Pression. Chin., euph., bov., mgs.

- dans les molaires. (Ind.)
- d'écartement, Mur. ac.

Pulsations. Hvosc., merc.

PUTRIDITÉ. Amm.

RONGEMENT. (Nic.)

- violent, Thuj.

SAIGNEMENT. Nic., bor., zinc., (ambr., rat., tar.).

Sang acide. (Rat., tar.)

Secousses. Mgs arc., plat., sulph.

Sensation de creux. Oleand.

- d'engourdissement. Chin., petr.

Sensibilité. Mang., natr. mur.

- des dents inférieures. Natr.
- des dents incisives. (Sen.)
- - supérieures droites. Sass.
- de la pointe des dents. Sulph.

SERREMENT. Sabin., thuj.

Sortie des dents. Caust.

— d'eau putride. Nic.

Térébration (douleur de). Daph., nux, spig., (cycl.).

Tension. Coloc.

- dans la mâchoire supérieure. Aur.

Douleur par accès. Ipec., puls.

- obtuse. (Chel., cycl.)

- d'ulcération. (Kal. hyd., ol. an.)

- dans les dents creuses. Mgs arc., ant., bar., chin., cocc., con., merc., rhs, sabad., spig., sulph., thuj., (ambr., par., tab.).

DURETÉ. (Sel.)

EBRANLEMENT. Amm., carb. veg., arn., ars., carb. an., chin., cocc., merc., nux, rhs, sec., stann., sulph.

- des dents inférieures. (Chel.)

- ( sensation d' ). Bryon., merc., oleand.

ECAILLEMENT. Staph.

ELANCEMENT. Daph., graph., merc., sep., bar., calc., caust., clem., con., dros., euph., hell., kal., magn., sulph., valer., (cycl., therm.).

- dans les molaires. Sabad.

Emoussement. Sulph., ac., daph.

ENDUIT noir. Chin.

- qui devient noir. Sep., staph.

FOURMILLEMENT. Mur. ac., rhs.

FOUILLEMENT. Nux, plat., puls., sen.

Friabilité. Euph.

Froid. (Ol. an.)

- dans les incisives. (Asar.)

Gonflement de la mâchoire supérieure. Stann.

Grincement. Ars., ant., bell., dat., sec., veratr.

HEURTEMENT. Ars.

252 Dents.

TIRAILLEMENT. Puls., coloc.

TRACTION. Bov., puts., rhod., staph., ambr., amm., bell., bryon., calc., canth., chin., clem., con., hep., nux, plat., zine., (cycl., ol. an, par., rhod., tab.).

- dans les mâchoires. Aur., carb. veg.
- dans les dents molaires. Zinc., (rhod.),
- dans les dents inférieures. Thuj.

TRESSAILLEMENT, Puls., amm., anac., bryon., chin., clem., hep., mgs aus., merc., nitr. ac., plumb., spig., stront., (cast., ol. an.).

Ulcere fistuleux, Caust., natr. mur.

2. SELON LE TEMPS ET LES CIRCONSTANCES.

Affaissement ( avec ) général. Mang.

Air (au grand). Phos., sulph.

- amélioration. Mgs arc.
- froid (par l'). Hyosc., (mgs).
- — amélioration. Puls.
- (par un courant d'). Sulph., calc., sep.

ACITATION (avec). Magn., mang.

— — dans le lit. (Clem.).

Anxiété (avec). (Clem., ol. an.)

Assis (étant). Ant.

Boisson (par la). Sabin.

- chaude. Cham., nux, dros.
- amélioration. Lyc.

Dents.

Boisson froide. Graph., nux, calc., cin.,

mur. ac., staph., (mgs).

- d'eau froide. Spig.

Bruit (par le). Calc.

CHALEUR (par la). Mgs arc., puls., graph., hell., hep., phos. ac., sabin.

— amélioration. Nux, rhs, ars., bov., sulph. ac., (cast.).

CHAMBRE (dans la). Puls., hep.

Chauds (par les corps). Calc., merc., har., hell., mgs aus., phos. ac., puls.

- amélioration. (Kal. hyd., therm.)
- (en mangeant). Phos.

Сотсне (étant). Clem., sulph. ас.

- - amélioration. Spig.
- sur le côté douloureux. Ars.

Découvrant (en se). (Clem.)

DENTS (en serrant les). Graph., sep., (phell., tab.).

Endormant (en s'). Ant.

- - amélioration. Merc.

Enfants (chez les). Cham.

Esprit (avec l') fatigué. Nux.

FACE (avec douleur de la). Daph., mero,

- (avec érysipèle de la). Cham., therm.
- (avec gonflement de la). Veratr.
- (avec pâleur de la). Puls.

FEMMES (chez les). Bell.

enceintes. Alum., calc., magn., sep.

FRISSON (avec). Pals., euph.

From (par le). Agar., magn., sulph. ac.

FROIDES (par les choses). Calc., merc., hell., mang., phos. ac., plumb., thuj., (cast., kal. hyd., par.).

Dents.

Jambes (avec douleur des). Ant.

Joves (gonflement des). Arn., cham., aur., bar., mgs arc., merc., petr., staph.

INSPIRANT (en ). Bell., cin., mgs arc., natr. mur., spig., staph., (diad., sen.).

Jour et nuit. (Sil.)

Lèvres (gonflement des). Bov., natr.

Lit (au). Merc., puls., alum., amm., graph., magn., nitr. ac., phos. ac., sabin., sulph. ac., ol. an.

- amélioration. Lyc.

- (ensortant du) amélioration. Oleand., sabin.

MACHANT (en). Alum., euph., chin., sab., staph., thuj.

Mangeant (en) froid. Con.

MANGER (pendant le). Merc., mur. magn., natr., bell., bryon., canth., clem., cocc., euph., hep., kal., sabin., thuj., (cast., rat.).

-- (après le ). Belt., chin., mgs arc., bryon., magn., spig., staph.

MARCHANT (en) amélioration. Mgs arc.

- au grand air. Con.

— amélioration. Bov., mgs arc.

MATIN (le). Tereb., caust., mur. ac., natr. mur., phos., phos. ac., sulph.

Midi (avant). Mang.

Nuit (la). Ars., cham., merc., puls., sil., ambr., bell., bov., clem., graph., hell., lyc., magn., natr., oleand., petr., phos., sabin., staph., (cast., cycl., kal. hyd., rat., rhod.).

ORAGE (pendant l'). Rhod.

OTALGIE ( avec ). Cham., merc., puls., sep., (euph., nic., rhod.).

Périodique. Diad.

Pression (par) extérieure. Tereb.

- - amélioration. Alum., kal., mur. magn., phos.

Quotidien. Tereb., (diad.).

Règles (avant les). Bar.

- (pendant les). Amm., carb. veg., kal., sep., bov., graph., natr. mur., phos.

SALIVE (avec accumul. de). Stront., (rat.).

Soir (le). Puls., sulph., alum., amm., bov., graph., sabin., spig., sulph. ac., (nic., rat.).

Sucement (par le) des dents, Nic., rat.

TABAC (en fumant du). Sabin., spig.

Tempes ( avec douleur aux ). Bar., calc., caust., con., magn., sulph., zinc.

Temps (pendant le ) humide. Bov., rhod.

Tête (avec mal de). Daph., hyosc., merc., nux, thuj., (euph., therin.).

Тиє (après avoir bu du). Thuj.

Toucher (au). Euph., hep., mur. magu., bell., natr. mur., petr., puls., stront., (cast., chel., rhod.).

Voiture (en allant en). Lyc.

YEUX (avec douleur aux). Bar., caust. calc., natr. mur., sulph.

# XI. CAVITÉ DE LA BOUCHE ET GORGE.

#### 1. SELON LA NATURE.

## A. Cavité de la bouche, mucus et salive.

Afflux d'eau à la bouche. Carb. veg., dig., sabad., staph., bryon., alum., daph., hell., hep., ipec., led., mur. magn., rhs, tart., (asar., grat., rhod.).

- douceatre. Dig., sabad., amm., plumb.
- — aigre. Amm., tar.
- - acerbe. (Par.)

Aphres. Bor., merc., nitr. ac., sulph., sulph. ac., thuj., ars., nux, plumb., (agar., ipec.).

Apreté. Carb. veg., daph., dig.

CHALEUR. Cham., laur., (cinn.).

COLLEMENT. Veratr.

Contraction. (Asar.)

CRAMPE. Laur.

CRACHATS. Natr. mur., alum., caust., petr., phos., plumb.

— muqueux. Hep., kal., phos., plat., caust., lyc., sep., thuj., (bism., lam., sel., tar., teucr.).

CREVASSES. Phos. ac.

Cuisson. Duph., cham., laur., (merc. subl.).

Déchirement. Colch.

Difficulté d'ouvrir la bouche. Caust., colch., nux, sass., nic., (ol. an.).

Ecorchures. Daph., phos.

- (sensation d'). Alum., sabad.

Ecume à la bouche. Bell., dat., calc., camph., cham., cupr., hyosc., sec., veratr.

- sanguinolente. Dat., sec.
- jaune verdâtre. Sec.
- claire. Sec.
- rouge. Bell.

Engourdissement. Bov., ind., lyc.

Excroissances. Staph.

EXFOLIATION. (Par., tar.)

- (sensation d'). Agar., phos. ac., spig.

FOURMILLEMENT. Zinc.

GLANDES salivaires (gonflement des).
Thuj.

- - (douleurs des). Acon.

GONFLEMENT. Amm., bell., merc., sen.

- sanguin. Canth.

HÉMORRHAGIE. Beil., led., phos.

Inflammation. Acon., bell., merc., sen., nux, veratr.

Mucosité (accumulation de) dans la bouche. Caust., par., phos. ac., stann.

alum., caps., nux, petr., phos., plumb., rhs, samb., sil., spig., thuj., zinc., (arg., bism., mgs, sel.).

Mucosité (accumulation de) dans le pha-

rynx. Carb. veg., caust., colch., mur. magn., ran., sen., stann., zinc., ambr., arn., bryon., petr., puls., plat., rhs, spig.

- acide. Lam., tar.
- amère. Arn.
- blanche. Spig.
- collante. Phos. ac., phos., samb.
- difficile à cracher. Mur. magn., aur., spong., staph.
- épaisse. Mur. magn., par., phos. ac., ran., bryon., caps., cham., nux, phos., plumb., puls., samb., (arg., sen.).
- facile a expectorer. Carb. veg., bryon., stann., (arg., mgs).
- gélatineuse. Arg.
- grisâtre. Ambr.
- jaunatre. Spig.
- rouge. Thuj.
- salée. Rhs.
- sanguinolente. Alum., mur. magn., (bism., sel.).
- transparente. Plumb.
- verdâtre. Colch., par., plumb.

Nodosités. Magn.

Druk imaginée. Mang., stront.

- putride. Aur., nitr. ac., sen.
- de fromage. Aur.
- de raifort. Agar.
- urinaire, Graph.

Opeur de poix. Canth.

- d'ognon. Petr., (kal. hyd.).
- fortement fétide. Agar., aur., merc., sulph, ambr., ars., carb. an., sep., spig., stann., (cast.).

PUTRIDITÉ. Caps., carb. veg., dulc., merc., nux, ars., nitr. ac., sep., sil., sulph.

Rougeur, Acon.

- SALIVATION. Colch., dig., dulc., euph., merc., merc. sub., nitr. ac., sulph., sulph. ac., calc., canth., cham., op., ran., thuj., veratr., zinc.
- avec vomiturition. Euph., puls.
- avec soif. Dulc.
- avec horripilation. Euph., ang.
- avec sécheresse de la bouche. Colch.

SALIVE ( accumulation de ). Ign., sabad., sen., alum., bar., bov., camph., dig., hell., hep., ipec., kal., mgs aus., merc., phos., plumb., rhm, rhs, sabin., spig., staph., thuj., zinc., (asar., eug., grat., nic., par., rhod.).

Salive acerbe. (Par.).

- acide. Ign., alum., calc., (rhod.).
- âcre. Veratr.
- amère. Thuj.
- aqueuse. Colch., dig., mgs aus., merc.
- blanche. Sabin., spig., ran.
- chaude. (Asar.)
- collante. Cann.
- de goût métallique. Ran., zinc.
- de mauvaise odeur. Dig.
- douceâtre. Dig., sabad., alum., phos., plumb., puls., (nic.).

256 Cavité de la bouche.

Salive écumeuse. Bryon., camph., canth., sabin., spig., (eug.).

- épaisse. Camph., (eug.).

- sanguinolente. Arn., canth., clem., hyosc., magn., nux, staph., thuj.

= salée. Ant., euph., merc. sub., phos., veratr.

- savonneuse. Bryon.

SANG (crachement de). Acon., arn., cop., led., phos., sabin., ipec., (voy. Hémoptisie.)

- coagulé dans la bouche. Canth.

SECHERESSE. Acon., bar., bell., bryon., carb. veg., lyc., sen., asa, cann., dat., mur. ac., nux, op., petr., phos. ac., plumb., puls., sep., sulph., veratr., (calad., cinn., euph.).

- de la bouche. Colch.

chs, stront., sulph. ac.

TRISMUS. Bell., cic., op., ang., camphr., magn., sec., sulph., veratr., (ol. an.).

Ulceres. Merc., plumb., zinc.

- syphilitiques. Merc., nitr. ac.

— mercuriels. Nitr. ac., arg., aur., bell., hep.

Vésicules. Amm., caps., mang., spong., thuj., (ambr.).

# B. Langue et parolë.

AMPOULES. Natr. mur., cham., daph., magn., mang., nux, sabad., spig., spong., squill., (arg., kal. hyd.).

- sous la langue. Cham., rhod.

APHTES. Agar.

Cavité de la bouche.

Apreté. Anac., carb. veg., coloc., ind.

BÉGAIEMENT. Bell., bov., dat., euph., natr., sec., veratr., (tab.).

- en lisant. (Tab.)

CHALEUR. Bell.

— brûlante. Bar., bell., bov., carb. an. caust., mur. magn., phos., plat., rhod. sulph., alum., amm., ars., calc., daph. graph., kal., merc., natr., natr. mur.

Consemption. Mur. ac.

Couleur sale. Sec.

phos. ac., sen.

CRAMPES. Sec.

Cuisson. Acon., asar., chin., hyose. mur. magn., (ang., ind., sen.).

DÉCHIREMENT. Carb. veg., sep.

Démangeaison. Arn., ign., (asar., teucr.)

Desquammation. (Tar.)

- (sensation de). Agar., spig.

DIFFICULTÉ de mouvoir la langue. Lyc.

Douleur. Thuj.

Dureté. Merc.

ELANCEMENTS. Acon., chin., sabad.

Engoundissement de la langue. Hyosc. lyc., natr. mur., plat., puls., rhm.

Enduit de la langue. Lyc., nux, sel.

\_ blanc. Arn., bryon., ign., sep. (bism., sel., sen.).

- brun jaunâtre. (Verb.).

- gris. Tart.

- gris jaune. Ambr.

- jaune. Chin., cocc.

Enduit muqueux. Phos. ac., magn., merc., nitr., puls., sulph.

- noir. Nitr., petr.
- velouté. Merc.

Excoriations. Caust., nitr. ac., sil., hep.

- (sensation d'). Alum., ant., sabad., thuj.

FENDILLEE (langue). Cham., ars., bell., chin., cic., spig.

FOURMILLEMENT. Sec.

Faoip (sensation de). Laur.

GONFLEMENT. Bell., merc., anac., ars., chin., con., dat., hell., thuj., veratr., (merc. subl., sec.),

- de la moitié de la langue. Sil.
- (sensation de). Spig.

GRATTEMENT. (Teuer.).

Inflammation. Bell., merc., canth.

- violente, Ars.

Insensibilité. Colch., rhm.

LANGUE blanche. Agar., anac., magn., phos.

- bleue. Dig., sabad.
- brune. Ars.
- noire. Ars., chin., sec.

Parote difficile. Stann., anac., bell., cann., cic., con., daph., dulc., graph., mgsaus., natr. mur., nux, op., plumb., sec., (sen.).

- avec douleur. Cann.
- empêchée. Magn.
- faible. Canth., stann., staph.
- hâtée. Ars., hep.
- indistincte. Calc.

PAROLE lente. Thuj.

- (manque de la). Bett., merc., dat., hyosc., laur., oleand., tart., veratr.
- nasillarde. Bell.
- sifflante. Bell.

Paralysie de la langue. Dat., dulc., mur. ac., op.

PESANTEUR. Mur. ac., anac., bell., colch., natr., natr. mur., nux, plumb., mgs.

RAIDEUR de la langue. Hell., colch., natr.

Rougeur. Bell., cham., veratr.

SAIGNEMENT de la langue. Nitr. ac., phos.

Secheresse. Ars., bell., bryon., calc., dulc., merc.

SENSATION de brûlure. Plat., puls., sabad.

- comme d'un cheveu sur la langue.
- comme si elle était trop longue.

  Mur. ac.
- de mollesse. Daph.
- comme si elle était mordue. Caust.
- de picotement. Phos., plat.
- de sécheresse. Bell.

Sensibilité. Graph., stront., merc.

Suppuration. Canth., merc., (bell.).

Tiraillements. ( Cast. )

TREMBLEMENT. Ars., bell., phos. ac.

TRESSAILLEMENTS. (Cast.)

Tubercules. Magn.

-- au-dessous de la langue. Ambr.

Ulceration. Cic., mur. ac.

Vésicules. Mur. ac.

# C. Au palais.

Apreté. Daph., magn., squill., staph.

CARIE. Aur., merc.

CHALEUR brûlante. Magn., spig., squill., (ind., ran., sen.).

CHATOUILLEMENT. Phos.

CONTRACTION. Arn.

DESQUAMMATION. (Par.)

. - (sensation de). Phos. ac.

DOULEUR incisive. Hell.

ELANCEMENT. Ign.

Engoundissement (sensation d'). Veratr.

EXCORIATION. Daph., nitr. ac., (par.).

- ( douleur d' ). Alum., caust., staph., thuj.

FROID (sensation de). Veratr.

GONFLEMENT. Ars., bar., bell., nux, (par.).

- du voile du palais. Bell., coff., phos. ac., aur., nitr. ac., nux.

GRATTEMENT. Squill., staph.

INFLAMMATION. Bell., nux.

PRESSION. Nux.

RIDES. Phos.

Rougeur du voile du palais. Acon.

Sécheresse. Hell., staph.

Sensation de brûlure. Bar., sep.

- d'ulcération. Amm.

STUPEUR. (Men.)

Térébration. Aur.

TRACTION. Sass.

Ulcene. Aur., nitr. ac., merc., phos. ac., natr. mur.

Vésicules. Nux, spig.

#### D. Dans le gosier.

Angine en général. Bar., coff., kal. hyd., natr. sul., nic., therm., (viol. tric.).

- chronique. Sulph., lyc., natr. mur.
- tonsillaire. Bell.

Aprieré. Ambr., daph., magn., nux, sulph. ac., thuj., veratr., (men.).

Ascension. Mgs aus.

- d'une boule. Mur. magn., plumb., con.
- de quelque chose de chaud. Merc., phos.
- de quelque chose de froid. Veratr.
- du sang. Phos.

Astriction. Daph., plat., sabad., alum., carb. veg., cocc., dat., hyosc., ign., rhs, sass., (rhod.).

BRUIT en avalant. Arn.

- par les liquides. Cupr., laur.

CHALEUR. Cham., cin., laur.

- (sensation de). Zinc.
- brûlante. Bov., euph., sabad., sen., acon., arn., ars., cham., cocc., daph., hyosc., laur., mgs aus., magn., merc., nitr. ac., sec., squill., (cast., guaj., lam., ran., rhod.).
- dans l'œsophage. Euphr., sec., (merc., sel., lam.).
- CHEVILLE (sensation d'une). Nux, plumb., sabad., sulph., bar., cham., hep., graph., ign., led., merc., natr. mur., sabin., sep., (ambr., par.).
- - chronique. Sulph., natr. mur.

CRAMPE. Con., dat., graph., laur., veratr., zinc., (nic., ran., rat.).

- de l'œsophage.

Cavité de la bouché.

Crove membraneux. Acon., hep., phos., spong., dros.

Cuisson. Bar., merc.

Déchirement. Colch., zinc.

- (sensation de). Caps., laur., plat., plumb., zinc.

DEGLUTITION difficile. Alum., bell., ign., acon., con., dat., laur., (arg., chel., ol. an.).

- — de la salive. (Men.)
- douloureuse. Alum., bell., (caps., natr. sulph.),
- empêchée. Bell., canth., dat., carb. veg., cic., cin., con., hyosc., laur., nitr., nux, (natr. sulph.).
- des aliments. Cham.
- des liquides. Bell., canth., cupr., ign., (therm.).
- incomplète. Petr.
- involontaire. Con., mgs aus.

Démangeaison. Teucr.

Distension. Veratr.

ELANCEMENT. Merc., acon., arn., bell., bryon., hep., ign., led., mang., phos. ac., puls., rhs, sulph., (kal. hyd., nic.).

- dans les amygdales. Merc.

Envir continuelle d'avaler. Bell., merc., sabad., thuj.

ETHANGLEMENT. Graph., veratr., (chel., nic.).

EXCORIATION. Plat., daph.

— (douleur d'). Merc., nitr. ac., puls., stann., arg., ars., nux, phos. ac., plat., sen., staph., sulph., thuj.

FOURMILLEMENT. Sec.

Fnoin (sensat. de). Caust., ol. an., veratr.

GONFLEMENT. Petr., sep., thuj., (arg., merc. subl.).

- des amygdales. Bar., calc., hcp., sulph., thuj., (nic.).
- (sensation de). Ars., carb. veg., colch., hep., puls., rhs, sabad., sabin., (arg., veratr., tar.).

GRATTEMENT. Ambr., sabad., sen., bov., con., croc., hep., mang., plat., squill., staph., veratr., (rhod., teucr.).

Inflammation. Acon., arg., bar., bell., dulc., euphr., merc., ran., sen., sulph. nitr. ac., (nic.).

- catarrhale, Cham.
- érysipélateuse. Merc.
- mercurielle. Arg., bell., hep.
- de l'œsophage. Euph.

Luette (allong. de la). Croc., dulc., plat.

- (douleur de la). Nux.
- (goussement de la). Bell., coff., natr. sulph., nux, sen., sulph.
- (inflammation de la). Sen.

MEMBRANE (sensation de décollement de la). Plat.

PARALYSIE. Cocc.

Pression. Puts., ambr., ars., bar., dulc., iod., merc., nux, tart., thuj., veratr., (chel., cinn., kal. hyd., par.).

PRURIT. Bryon.

Rétrécissement. Daph., veratr., (chel.).-

- (sensation de). Alum., bell., calc., carb. veg., cic.

ROUGEUR. Acon., merc.

SECHERESSE. Bell., colch., petr., phos., asa, dat., hyosc., mang., merc., op., plumb., puls., sabad., sass., squill., stann., staph., (calad., cinn., men., ol. an., sen.).

Cavité de la bouche. Cavité de la bouche. 260 Sécheresse (sensation de). Bryon. Efforts (par des). Caust. Secousses. Sep. Enfants (chez les ). Bor., cham., merc., sulph., sulph. ac. Sensibilité, Coff. Suffocation imminente. Bell., veratr. FAIBLESSE générale (avec). Stann. TENSION. Puls., asa, (chel.). GLANDES (avec douleur des) sous-maxillaires. Merc. TIRAILLEMENT. Acon., arn., phos. ac., veratr., (cinn., nic., rat.). Gonflement (avec) de la face. (Nic.) Ulcère. Bell., merc. - extérieur, Bell. - (douleur d'). (Kal. hyd.) - (avec) des glandes sous-maxillaires. - mercuriel. Nitr. ac., (arg., bell., hep.). Veratr. - syphilitique. Merc., nitr. ac. - (avec) des lèvres. (Mgs.) - (avec) des parotides. Cham. 2. SELON LE TEMPS ET LES GRATTEMENT (après) améliorat. Bryon. CIRCONSTANCES. Jour et nuit. Phos. Air (au grand) amélioration. Merc. MACHANT (en). Phos. ac. Anxieté (avec). Euphr. Manger (avant). (Eug.) APOPLEXIE (après). Laur. - (après le ). Sulph., ambr., agar., ars., cham., (lam., verb.). BAILLANT (en). (Men., nic.) - (pendant le). Thuj. Boisson (après). (Lam.) Marche (par la). Bryon. CHALEUR générale (avec). Euph. MATIN (le). Phos., calc., mang., natr. CHAUD (en buvant) amélioration, Alum. mur., puls., sass., sen., (ind., par., - (en mangeant) amélioration. Alum. verb.). Colique (avec). Led. . 1700 . Servis MERCURE (par l'abus du). Arg., nitr. ac., Cov (en tournant le). Bell., hep. bell., hep. Déclutition (hors le temps de la). Alum., Midi (avant). (Sen.) bell., caps., led., nux, plat., puls., - - amélioration. Alum. sabad., sulph., zinc. MINUIT (après). Puls. - (pendant la). Bell., iod., puls., acon., alum., ars., asa, bar., calc., cham., Nausée (après). Veratr. cocc., colch., croc., hell., hep., ign., Nuit (la). Merc., alum., canth., puls., laur., led., mang., merc., natr. mur., (cinn.).

PARLANT (en ). Mur. ac., acon., nic.,

REFROIDISSEMENT (par.) Bar., dulc.

Régurgitation (pendant la). Veratr.

Renvois (avec). Canth.

staph.

nux, phos. ac., rhs, sabad., sep., staph., thuj., veratr., (kal. hyd., nic.).

de la salive. Hep., merc., nux, plat., sabin., sulph., thuj.', zinc., (cinn., ol. an.).

Cavité de la bouche.

Renvois (après) amélioration. Mur, magn.

RESPIRATION (par la) de l'air froid. Nux.

RESPIRATION (par gêne de la). Sass.

- profonde (pendant une). Hep.

Réveil (au). Calc., par.

Soir (avec). Dulc., sabin.

- (avec manque de). Lyc., nux, (calad., cann.).

Cavité de la bouche. Sorr (le). Alum., merc., (bism., mgs. nic., par., viol. tric.).

261

TREMBLEMENT (avec). (Euph.)

TOUCHER (au). Bryon., staph., sulph., thuj.

Toussant (en). Hep., men.

VENT (au). Con.

Vomir (avec envie de). Euph., puls.

# XII. GOUT.

#### 1. SELON LA NATURE.

Acerbe. Alum., mur. ac.

ACIDE. Carb. veg., nux, phos., cocc., kal., magn., mgs arc., mgs aus., nitr. ac., petr., sep., (ol. an., therm.).

- des aliments. Tar., therm.
- en avalant, Nux.
- du pain. Bell., cocc., stann.
- salé. (Rhod.)
- — des aliments. Tar.

Acre. Laur., rhs.

AMANDE (d'). Coff., dig.

AMER. Ang., ant., arn., bryon., calc., carb. an., carb. veg., cham., dat., dig., lyc., sabad., sabin., acon., amm., ars., bar., con., graph., hell., kal., magn., merc., natr., natr. mur., nitr. ac., nux, petr., spong., sulph., (diad., euph., grat., kal. hyd., men., phell., ran.).

- acide. Petr., rhs, sulph.

AMERTUME en buvant du café. Sabin.

- - du lait. Sabin.
- en fumant du tabac. Camph., mgs arc.

Amertume en mâchant ou pendant la déglutition. Puls.

- en mangeant. Dat., camph., sabin., sulph., (ran.).

- quelque chose d'acide. Rhs.

- — du pain. Asar., phos. ac., puls., rhs, sass., thuj.

- de la salive. Sabin.

Aqueux. Caps., staph.

- des aliments. Cupr.

ARGILE (d'). Chin., phos.

- des aliments. Chin.

ARRIÈRE-GOUT des aliments. Phos. ac.

- du lait. Ign.
- du pain. Phos. ac.

ASTRINGENT. Alum.

Bois (de). Colch., dat., magn., (cor., rut.).

Bruck (de). Puls., ran., squill.

Cuivre (de). Rhs, sulph., (vit.).

Désagréable. Ager., sabad., zinc.

- des aliments. Sabad.
- du tabac. Squill.

Diminué. Puls.

DOUCEATRE. Merc., plat., alum., aur., coff., cupr., dig., laur., mgs aus., sabad., spong., thuj., (asar., ind., phell., ran.).

DOUX-AMER. (Kal. hyd.)

— des aliments. Squill.

du pain. Merc.du potage. Squill.

du tabac. Sel.de la viande. Squill.

Émoussé. Sec., (sen.).

FADE. Bryon., thuj., caps., coloc., dig., dulc., ipec., mang., staph., thuj., (asar., chel., euph., guaj., verb.).

- des aliments. (Cycl., ol. an., rut.)

FARINE (de). (Nic.)

FÉTIDE. Spig.

FROMAGE (de). Phos.

Fulicineux du pain. Nux.

GATÉ. Bar., kal.

GLUTINEUX. (Calad.)

GRAS. Caust., mang., sabin.

HERBACÉ. Nux, sass., (calad.).

- de la bière, Nux, stann.

Huileux. Mang., sil.

IMAGINAIRE. Hep., puls., stront.

Instribute des aliments. Ars., dros., magn., mgs arc., nux, rhm, sass., squill., staph., sulph., tart., (cor., cycl., kal. hyd., mgs, rhod., sen.).

— de la bière. (Mgs.)

- du pain. Sil. De Leant Lean Bearing

- du tabac. Tart., (mgs, tar.).

MÉTALLIQUE. Cocc., mgs aus., merc., nux, sen., (mgs, vit.).

MENTHE poivrée (de). Veratr.

1 (32)

Moisi. Mgs.

Muqueux. Dig., plat., (sen.).

Perdu. Bell., dat., natr. mur., sil., veratr., ars., bryon., kal., lyc., puls., rhin.

Goût.

Poivre (de). Daph.

Poix (de). Canth.

Pus (de). Puls.

sulph. ac.

PUTRIDE. Arn., bryon., cham., merc., nux, puls., rhs, veratr., bell., bov., cupr., mur. ac., sep., spig., sulph.,

Rance. Mur. ac., euphr., (kal. hyd.).

Sale. Carb. veg., merc., ars., tart., (merc. subl.).

- des aliments. Carb. veg., sulph.,

- (trop peu). Thuj.

SANG (de). Alum., amm., bov., sabin., (bism.).

SAVONNEUX. Dig.

Sec. (Rut.)

Suif (de). Valer.

TILLEUL (d'infusion de). (Chel.)

URINEUX. Sen.

2: SELON LE TEMPS ET LES CIRCONSTANCES.

Bu (après avoir). Coloc., nux, kal. hyd., phell.

- de l'eau. (Phell.)

DÉCEUTITION (pendant la). Nux, puls.

ERUPTION (pendant l'). Alum., nux, sab.

Goût.

Goût.

263

Lit (en quittant le). (Nic.)

MACHANT (en). Puls., (ran.).

machant (en). Puls., (ran.).

Mangeant du lait (en). Sabin., (ambr.).

Manger (avant le). Merc., valer.

\_\_ (pendant le). Hell., (ran.).

- (après le). Carb. veg., nux, phos., amm., ars., coce., rhs, sep., thuj., (kal. hyd.).

MANGER (après le ) amélioration. Sulph.

MATIN (le). Bar., carb. veg., calc., lyc., rhs, sep., sulph.

Réveil (au). (Nic.)

Soir (le). Oleand., thuj.

TABAC (en fumant du). (Sel.)

— — amélioration. (Diad.)

Toussant (en). Cocc.

# XIII. APPÉTIT ET SOIF.

SELON LA NATURE, LE TEMPS ET LES CIRCONSTANCES.

Augmentation de l'appétit. Bryon., tart., teucr.

– — avec insipidité des aliments. Staph.

- avec désir du coît. (Cinn.)

— immodéré. Sulph., arn., natr., sep.

- a midi. Natr. mur.

- le soir. Natr., natr. mur., arn.

version pour les acides. Bell.

- les aliments cuits. Graph., sil., cupr., lyc., zinc.

- le beurre. Carb. veg., puls.

- la bière. Nux, asa, bell.

- les boissons. Cocc., canth., chin., ign., mgs aus., (guaj., rat., vit.).

- le café. Nux, sabad., spig.

- les choses salées. (Sel.)

 les corps gras. Natr. mur., petr., rhm. Aversion pour l'eau. Calad., nux, phell.

le lait. Bell., bryon., ign., puls., sep., sil., tart.

— le manger. Bell., bryon., chin., cocc., merc., nux, op., rhs, ant., arn., canth., colch., dulc., hell., ign., mang., mgs aus., merc., natr. mur., plat., sab., sep., sil., (cycl., grat., guaj., kal. hyd., cinn., prun., rat., rut.).

- le poisson. Zinc.

— le sein de la mère. Sil.

— la fumée de tabac. Calc., ign., nux, arn., mgs aus., puls., spig., (lach.).

- le tabac à priser. Spig.

— la viande. Calc., carb. veg., petr., sil., arn., daph., lyc., nitr. ac., plat., rhs, sep., sulph., zinc., (ol. an., tereb.).

Decour des aliments. Bell., op., colch., natr. mur., petr., rhm, sep., sil., (cast., cinn., guaj., prun., rat.).

Dasia d'acides. Hep., veratr., bryon., kal., sec., sulph.

- d'aliments amers. Dig.
- d'aliments herbacés, Magn.
- de bière. Cocc., petr., phos. ac., spig., spong., stront., sulph., (phell.).
- de hoissons acides. Dig.
- de café. Ang., bryon.
- de charbon. Cic.
- des choses douces. Kal., lyc.
- des choses froides. Bryon., merc., sabad., veratr., ars., bov., calc., cocc., cupr., magn., oleand., phos. ac., plumb., sep., tart., thuj., (ang., bism., euph., rut.).
- de quelque chose indéterminé.
- de quelque chose de piquant. Chin., mur. magn., puls., rhm.
- des choses rafraîchissantes. Calc., phos.
- de craie. Nitr. ac.
- chin., magn., oleand., plumb., phos., tart., rut.
- d'eau-de-vie. (Ars., sel.)
- de friandises. Chin., rhs.
- de friture. Plumb.
- de fruits. Magn., sulph. ac., tart., veratr.
- de lait. Phos. ac., (phell.).
- de pain. Plumb., staph.
- de piquant. Hep.
- de sucre. Kal., lye.
- de tabac. Coff., (eug.).
- de vin. Acon., (bov., calc., lach.).

Désin de vinaigre. (Arn.)

Diminution p'Appétit. Ant., con., lyc., sulph., acon., canth., cic., dig., natr. mur., op., petr., rhs, squill., zinc.,

(cinn., eyel., guaj., nic., rut., sen., tab.)

- avec sensation de plénitude après avoir mangé. Croc.
- en mangeant. Lyc., plat.
- pendant le manger.
- en pensant au manger. (Arg.)
- le matin. Cycl., amm., (lach., sel. sen.).
- avec pureté de la langue. Dig.
- avec soif. Amm., calc., coloc., sil. spig., tart.
- le soir. Cycl.

FAIM. Aur., puls., daph., dulc., mur magn., petr., plumb., spong., zinc. (guaj.).

- continuelle. Tab.
- avec dégoût pour les aliment Dulc., hell., nux, sab., (eug., grat verb.).
- immodérée. Carb. veg., graph., nat mur., coff., iod., lyc., merc., sep squill., stann., staph., veratr., (sec therm.).
- après avoir mangé. Cin., calc., phosphumb., stront.
- à midi. Daph., stront.
- avec nausée. Hell., veratr.
- la nuit. (Sel.)
- rongeante. (Sen.)
- avec soif et urine abondante. Vera
- le soir. Daph.
- avec vomissement et diarrhée. Vera
- violente. Calc.; cin.; iod., lyc

Appetit et soif.

merc., nux, veratr., con., kal., mgs

aus., mur. magn., op., squill., staph., (therm.).

FAIM violente avec manque d'appétit. Oleand.

- après avoir mangé. Con., merc.,

- - le matin. Calc., sabad.

- - a midi. Mgs aus.

— avec nausée. Spig.

- avec satiété prompte. Natr. mur.

- - avec soif. Hyosc., veratr.

— — le soir. Agar., mgs aus., sabad.

Indifférence pour les aliments et les boissons. Chin., mgs aus.

— pour le tabac. Mgs aus.

Nausée. Ant., op., acon., canth., colch., natr. mur., petr., rhm, sass., (arg., cast., cinn., prun., rat.).

- en mangeant. Rhm, sass., (ol. an.).

SATIÉTÉ prompte. Natr. mur., thuj., bar., cic., tart., (cycl., mgs, rhod., rut.).

(sensation de). Mang., rhs.

Soir. Acon., ant., ars., aur., bell., chin., dat., diad., dulc., hep., merc., mur. magn., natr., nic., sabad., sen., stront., thuj., cin., dig., dros., iod., magn., nitr., plumb., rhs, sep., stann., (cinn., eug., lam., natr. sul., rhod., rut.).

- avec manque d'appétit. Amm., calc.

- avec aversion pour les boissons. Bell., dat., arn., canth., hyosc., nux.

continuelle. Ars.

- avant le froid. Puls.

- après le froid. Puls.

Appetit et soif. Soir immodérée. Carb. veg., ars., sec.

265

- en mangeant. Cocc., amm.

- après avoir mangé. Graph.

- ( manque de ). Mang., mur, ac., plat., puls., lyc., sep., (vit.).

- avec manque d'appétit. Sep.

- avec envie de boire. Ars., cocc.

- avec sécheresse de la bouche. Cann., calad.

- le matin. Graph., thuj.

- après midi. Bov., (ran., rut.).

- la nuit. Thuj., calc., natr. mur., rhs, (cinn.).

- le soir. Bov., (natr. sul., nic.).

- avec somnolence. Tart.

- avec suppuration des poumons. Nitr. ac.

- violente. Acon., bell., calc., cast., laur., ars., bryon.

- avec envie d'uriner. Caust., veratr.

Souffrances par les aliments. Chin. merc., nux, sulph., agar., alum., amm., ambr., bar., caust., con., kal., lyc., nitr. ac., phos., phos. ac., rhs, sep., tar., thuj., veratr., zinc.

- par la bière. Fer.

- par les boissons. Chin., nux, tar., sulph. ac., veratr.

- par les corps gras. Puls., thuj.

- par le lait. Chel., nitr. ac., ars., lyc.

- par les ognons. Thui.

- par le pain. Caust., natr. mur.

- par les pommes de terre. Alum.

- par la fumée du tabac. Nux, spong.

Voracité. Calc., lyc., oleand., plat., sep., stann.

### XIV. RAPPORTS.

#### 1. SELON LA NATURE.

- Accumulation d'eau dans la bouche.

  Carb. veg., dig., staph., sabad., bryon.,
  chin., daph., hell., hep., ipec., led.,
  lyc., mur. magn., rhs, tart., (asar.,
  grat.).
- acerbe. (Par.)
- \_ \_ acide. Amm., tart.
- \_ avec mal de ventre. Led.
- avec nausée. Daph.
- — douceâtre. Dig., sabad., amm., plumb.
- HOQUET. Bryon., euph., hyosc., ign., mur. magn., nux, rat., agar., cic., cupr., dros., staph., sulph. ac., veratr.
- douloureux. Mur. magn., (rat., teucr.).
- spasmodique. Nux, rat., (teucr.).
- violent. Lyc., nic., nux, stront., veratr.
- Pyrosis. Ambr., caps., con., mgs arc., natr. mur., sulph. ac., bar., calc., iod., lyc., petr., sulph., (cast., tab.).
- depuis la gorge. Con., lyc., mang., natr. mur., ( tab. ).
- du ventre à la poitrine. (Arg.)
- RAPPORTS en général. Ant., ars., bryon., carb. an., carb. veg., con., daph., graph., lyc., natr. mur., nux, phos., puls., sabin., sep., staph., sulph., sulph. ac., veratr., agar., bar., calc., camph., canth., caust., chin., cocc., dros., euph., ipec., kal., merc., plumb.,

- phos. ac., rhs, sil., spig., spong., stann., thuj., valer., zinc., (calad., grat., guaj., men., nic., ol. an., sel., sen., t ab., tart., verb.).
- RAPPORTS acides. Lyc., natr. mur., nux, phos., sulph., sulph. ac., ambr., dig., kal., magn., phos. ac., puls., spig., (tab.).
- amers. Arn., bryon., thuj., calc., carb. veg., dros., merc., nux, puls., spong., stann., tart., (verb.).
- âcres. Ars., daph., merc.
- brûlants. Canth., hep., phos. ac., (nic., ol. an.).
- bruyants. Con., petr., plat., (tab.).
- désagréables. Natr. mur.
- douceâtres. Plumb.
- douloureux. Carb. an., ars., bryon., nux, sabad., sep., (par.).
- d'une eau douceâtre. Acon.
- empêchés. Acon., bell., con., plat.
- avec pression à l'estomac et vomissement. Sil., (rhod.).
- avec torsion de l'estomac. Natr. mur.
- fétides. Sulph., cocc.
- de goût d'encre. ( Ind. )
- de goût de corne. ( Mgs. )
- gras. Lyc.
- avec horripilation. Sabad., sil.
- incomplets. Carb. an., ambr., arn., con., phos. ac., (grat., magn.).
- d'un liquide désagréable. Bar., caib. veg., dros., euph., kal. hyd., natr. mur., nitr. ac., petr., sil., sulph., ars., calc., lyc., sep., staph., (rhod.).

Rapports avec odeur des matières ingérées. Ant., bryon., puls., thuj., caust., con., sil.

- — des corps gras. Carb. veg.
- pressifs. (Par.)
- putrides. Arn., cocc., nux, sep., sulph., thuj.
- rances. Alum., thuj., valer.
- qui coupent la respiration. (Grat.)
- spasmodiques. Nux, phos.
- d'odeur de soufre. Stann., valer.
- a vide. Con., daph., guaj., sabin., veratr., agar., ambr., arn., bar., bryon., camph., cann., carb. veg., caust., cocc., colch., ipec., mgs arc., natr. mur., plat., plumb., rhs, sabad., spig., tart., valer., (calad., euph., euphr., ind., men., rhod., tartr., verb.).
- REGULATION. Cann., carb. veg., cic., canth., con., fer., ign., mang., phos., plumb., sulph., tart., veratr., (grat.).
- acide. Con., mgs arc., phos., plumb.
- âcre. Tart.
- desaliments. Bryon., sulph., thuj., arn., canth., carb. veg., fer., ign., phos.
- amère. Arn., cic., ign., (grat.).
- - acide. Cann.
- chaude. Veratr.
- douceâtre. Veratr.
- d'eau. Tart., grat.
- avec grattement. Cann.
- muqueuse. Veratr.
- La salée. Veratr.
- de sang. Sep.
- de substances jaunes. Cic.

2. SELON L'HEURE ET LES CIRCONSTANCES.

ALIMENTS (après avoir pris des) lourds...
Iod.

- (après le bon goût des). Bryon., nic.

BAISSANT (en se). Cic., (mgs).

Bu (après avoir). Canth., ign., rhs, staph., tar.

- vite. Nitr. ac.

Coucué (étant) amélioration. Rhs.

Diner (avant le). Bov.

- (pendant le). Mur. magn., teucr.
- (après le). Bryon., ars., bov., camph., chin., dig., fer., ign., mgs arc., mur. magn., natr. mur., phos., sil., staph., veratr., (cycl., nic., par., tab.).

Douces (par les choses). Zinc.

LAIT (après avoir bu du). Natr. mur., sulph., (chel.).

Lit (en sortant du). Valer.

Mancé (après avoir) quelque chose de gras. Carb. veg., natr. mur., thuj.

MATIN (le). Arg., valer.

Midi (à). Bov., mur. magn.

NUIT (la). Canth., sulph.

Ocnons (après avoir mangé des). Thuj.

REDRESSANT (en se). Rhs.

Soir (le). Natr. mur., thuj., (nic.).

Sommert (pendant le). Sulph.

TABAC (par la fumée du). Ign., puls., staph., (rut., sel., tar.).

## XV. NAUSEE ET VOMISSEMENT.

#### I. SELON LA NATURE.

#### A. Nausée.

- Nausée en général. Alum., ant., arn., ars., bov., cocc., cupr., dig., euph., hell., ipec., merc., natr., nux, plat., ran., sil., sulph., tart., veratr., vit., amm., bryon., carb. an., carb. veg., con., colch., daph., dulc., graph., hep., hyosc., ign., kal., led., lyc., magn., mang., mur. magn., mosch., natr., natr. mur., petr., phos., phos. ac., puls., rhs, sabad., sep., sen., squill., stann., valer., (ang., asar., bism., bor., lam., ol. an., tab., tar., therm.).
- avec anxiété. Dig., euph., ign., kal., plat., tart., (bor.).
- avec assourdissement. Tart., therm.
- avec malaise dans la bouche. Stann.
- avec céphalalgie. Cocc., sil., (ran.).
- avec chaleur. (Euph.)
- continuelle. Ars., lyc., sec., sil., tart., carb. veg., natr., nux, (prun., tab.).
- avec crampe de la mâchoire. Veratr.
- avec diarrhée alternative. Squill.
- avec douleur des yeux. Sil.
- avec écume devant la bouche. Veratr.
- dans l'estomac. Hell., ipec., sulph. ac., thuj., (bism., cast., grat., sen., tab.).
- avec douleur d'estomac. Ars., mang., natr. mur., tart., veratr., (ol. an., rhod.).
- avec disposition à s'évanouir. Caust.,

- cocc., colch., mur. magn., phos., valer., veratr., (ang., tab.).
- NAUSÉE avec sensation de faim. Hell., mur. magn., phos.
- des femmes enceintes. Con., ipec., nux, natr. mur., petr.
- avec frisson. Bov.
- avec froid. Valer.
- comme par un fil à la gorge. Valer.
- avec horripilation. Daph., euph., sabad.
- avec lassitude. Plat.
- avec malaise. Natr., caust.
- avec malaise à la gorge. Stann.
- au palais. Cupr., cycl.
- dans la poitrine. Merc., (ol. an.).
- dans la région précordiale. Vit., cupr., mosch., squill., (teucr.).
- quotidienne. Sil., staph.
- avec rougeur de la face. Veratr.
- avec soif. Veratr.
- avec écoulement d'urine. Veratr.
- avec mal de ventre. Ars., arn., cocc., colch., mang., nux, rhm, stann., tart., (cycl., ol. an.).
- à vomir. Alum., ant., crn., caps., cocc., con., kal., led., nux, puls., sil., sulph., tart., valer., veratr., acon., bell., bryon., cham., colch., dig., cuph., mang., natr. mur., petr., rhs, sabad., sabin., sen., squill., stann., staph., stront., (cop., grat., rhod., rut., tab.).

#### Nausée et vomissement.

#### B. Vomissement.

- Vomissement en général. Ant., ars., asar., bryon., cham., cupr., dulc., ipec., natr. mur., nux, oleand., phos., plumb., puls., sabin., sec., sil., sulph. ac., tart., valer., veratr., arn., bell., calc., chin., cocc., daph., dig., euph., fer., hell., hyosc., merc., stann., (bism., grat., lam., rat., tab.).
  - acide. Ars., bell., calc., fer., hep., ipec., nux, oleand., phos., sulph., thuj., veratr.
- âcre. Ipec.
- des aliments. Bryon., natr. mur., nux, plumb., puls., veratr., ars., calc., coloc., chin., dig., fer., ign., mur. ac., oleand., phos., sabin., sulph., sulph. ac., tart., thuj., (rat.).
- chronique. Nux, puls., ars.
- amer. Oleand., acon., bryon., cupr., daph., ipec., magn., merc., petr., stann., sep., sil., sulph.
- suivi d'amertume à la bouche. Puls.
- aqueux. Sulph. ac., ars., bell., bryon., chin., con., dat., magn., stann., sulph., tart.
- bilieux. Bryon., cham., nux, sabin., sec., acon., ars., bell., 'cann., con., dig., dulc., dros., ign., ipec., natr. mur., phos., sep., valer.
- des hoissons. Ipec.
- avec céphalalgie. Daph., (asar.).
- avec chaleur. Ipec., veratr., (lam.).
- avec diarrhée. Ars., asar., cupr., ipec., phos., tart., veratr., ant., bell., (sen.).
- écumeux. Veratr.

269 Vomissement des enfants. Calc., cham., ipec., merc.

Nausée et vomissement.

- avec mal d'estomac. Sil., ars., cupr., ipec., (asar.).
- avec pâleur de la face. Tart.
- avec faiblesse. Ars., ipec., tart., veratr., (lam.).
- des femmes enceintes. Con., ipec., nux, natr. mur., petr.
- avec frisson. Tart., valer.
- avec horripilation. Veratr.
- jaunâtre. Iod.
- jaune verdâtre. Dulc.
- des ivrognes. Nux, op.
- de lombries. Sabad., veratr., acon., cin., sec., zinc.
- de matières crues. Sec.
- - salées. Magn.
- — fécales. Op., plumb.
- de mucosités. Con., dig., dulc., veratr., acon., ars., bell., chin., cupr., daph., ign., ipec., iod., nux, sec., valer., (tab., tereb.).
- avec obturation du nez. (Grat.)
- noir. Ars., veratr., hell., laur., plumb.
- avec obscurcissement des yeux. Lam., puls.
- périodique. Nux.
- putride. Tab.
- de sang. Acon., arn., bryon., hyosc., nux, stann., ars., calc., carb. veg., dros., lyc., phos., plumb., sulph.
- avec somnolence. Tart.
- avec sueur froide de la face. Sulph.
- avec mal de ventre. Ars., asar., cupr., hell., hyosc., nux.

270 Nausée et vomissement.

Vomissement verdatre. Ars., nux, veratr., cann., cupr., daph., hell., ipec., petr., plumb.

- avec tremblement. Tart., (bism.).

VOMITURITION. Arn., bell., bryon., nux, slann., sec., tart., acon., ars., cann., chin., graph., hyosc., ign., sil., (asar., magn., rat., sen., tereb.).

2. SELON L'HEURE ET LES CIRCONSTANCES.

Air ( au grand ). Lyc., ( ang. ).

- - amélioration. Tar.

— — ( après avoir marché au ). Alum.

Affections morales (par). Kal.

ALIMENTS (en pensant aux). Sass.

Baissant (en se). Ipec.

Bière ( par la boisson de la ). Ars., fer.

Boisson (par la). Ars., veratr., arn., ipec., nux, puls., rhs, sil.

Bouche ( en se rinçant la ). Sep.

Couché (étant) amélioration. Rhs.

COUCHER ( qui force à se ). Cocc., phos. ac.

CRACHANT (en). Led.

CRAMPES d'estomac (après). Puls.

DINER (avant). Acon., lyc., sabad., sep., sulph., (tab.).

- ( pendant le ). Cocc., coloc., kal., lyc., magn., (ang., bor., cycl., ol. an.).
- amélioration. Tab.
- (après le). Graph., puls., sec., sil., stann., sulph., ars., bryon., calc., cann., chin., dros., fer., kal., natr.

Nausee et vomissement.

mur., nux, petr., phos., rhs, sep thuj., (bism., teucr., tab.).

Diner (après le) amélioration. Sabad. sep., veratr.

EAU (par la boisson d'). Teuer.

ÉCHAUFFEMENT (après). Sil.

Femmes (chez les) enceintes. Con., ipec nux, natr. mur., petr.

FROID (quand on devient). Cocc.

Gout (par le bon) des aliments. Bryon cann., (nic.).

Ivrognes (chez les). Nux.

LAIT (après la boisson du ). Sil.

LISANT (en ). Arn.

MATIN (le). Arn., carb. veg., graph. lyc., sulph., calc., dros., hep., natimur., nux, phos., rhs, sep., sil staph.

Midi (a). Nux, (ang.).

- (avant). Bov.

- (après). Ran., sulph.

Mouvement (pendant le ). Ars., (tab.)

Nuit (la). Ars., carb. an., merc., puls. veratr., arn., amm., dros., fer., mur

magn., sulph., valer., (rat.).

Odeva (par l') des viandes. Colch.

OEur (d'odeur d'). Colch.

PAROLE (après la), Atum., bism.

Périodique. Nux.

Paession (par la) sur la région précordiale Hell.

Quotidien. Sil., staph.

REDRESSANT (en se). Cocc., sulph.

- - de son lit. Rhs.

REFROIDISSEMENT (après). Bel., cocc., (dulc.).

RENVOIS (par) amélioration. (Rhod.)

Salive ( en avalant la ). ( Rhod. )

Soin ( le ). Puls., phos.

Succion (après la ). Sil.

Vin (après avoir bu du). Ant.

Voiture (par le mouvement de la). Cocc., petr., sep.

Nausée et vomissement.

271

# XVI. SYMPTOMES DE L'ESTOMAC, DE LA RÉGION PRÉCORDIALE ET DES HYPOCHONDRES.

#### 1. SELON LA NATURE.

#### A. Dans l'estomac.

nxiété. Canth., guaj.

mang., ran., sabad., tereb., zinc., vanth., carb. veg., daph., hell., ign., laur., mosch., nux, sass., sec., sep., sil., sulph., (ambr., kal. hyd., merc. subl., ol. an., sen.).

ALLONNEMENT. Bell., natr., rat., sabin.

NULURE. Daph., mang., (cinn.).

ANCER. Ars., lyc.

MALEUR. Zinc., (ol. an.).

CONTRACTION. Euph., nitr., nux, acon., con., magn., natr., sulph., (men.). ONSTRUCTION. Calc., lyc., (guaj., nic., ol. an., rat.).

weg., caust., cham:, cocc., con., euph., graph., natri mur., stann., ant., coff., cupr., fer., hyosc., lyc., magn., natr., ecc., sep., sil., sulph., thuj., (ambr., mgs, sen.).

( douleur de ). Caust., natr. mur., nitr., niux, puls., arn., natr., nitr. ac.

Déchirement. Therm.

DEMANGEAISON. Mosch.

Digestion (faiblesse de). Bar., catc.. carb. an., dig., graph., natr., mere., nux, petr., squill., valer.

Douleur de brisement. Mur. magn., (asar.).

- de coup. (Euph.)
- d'excoriation. Bar., ran., colch., con., mosch., (ang.).
- de plénitude. Arn., asa, lyc., phos., rhs, bar., canth., cocc., croc., kal., mosch., natr. mur., plumb., rhm, sabin., (asar., cast.).
- de refroidissement. Sulph. ac.
- sécante. Ang., calc.
- de surcharge. Ant., coff., nux, puls., tart.
- d'ulcération. Cann., mur. magn.

Eau (sensation comme plein d'). (Grat.)

ÉBRANLEMENT. Mur. magn.

ÉLANCEMENTS. Calc., bryon., coff., lyc

ENDOLORISSEMENT. Acon., amm., bar., cupr., dulc., ipec., lyc., nitr. ac., sep.

Encourdissement (sensation d'). Cast.

FAIBLESSE (sensation de). Dig., natr.,

ipec., laur., lyc., mosch., merc., veratr., (euph., kal. hyd.).

FAIM (sensation de). Aur., plat., stann., (asar., sen.).

FOUILLEMENT. Stann., grat.

FOURMILLEMENT. Colch., natr., rhs.

FRÉMISSEMENT. Croc.

FROID. Ars., bov., laur.

— (sensation de). Colch., (chel., grat., ol. an., tab.).

GANGRÈNE. Sec.

Gastriques (symptômes). Ant., bryon., cham., cocc., ipec., nux, puls., rhs, acon., ars., bell., calc., coff., dig., ign., lyc., merc., staph., sulph., tartr., veratr., (cupr., cor.).

GRATTEMENT. Carb. veg.

GROULLEMENT. Amm., bov., kal. hyd., mur. magn., phos.

Inflammation. Canth., dig., acon., ant., ars., daph., ipec., nux, puls., veratr., (euph., sec., tereb.).

Inquiétude. Canth.

Insensibilité. Bell.

MOUVEMENT. Grat.

— comme quelque chose de vivant.

Pesanteur. Phos. ac., bar., dig., plumb., stapb., spig., cast.

PINCEMENT. Arn., (asar.).

PRESSION. Acon., amm., bar., bell., bism., bryon., calc., carb. an., caust., cic., lyc., merc., natr. mur., nux, petr., plat., ran., rhod., rhs, sil., anac., asa, canth., carb. veg., coff., con., daph., fer., graph., magn., mosch., phos., phos. ac., sabin., sec., sil., stann., stront., sulph., sulph. ac., (ambr., grat.,

Symptômes de l'estomac.

Paession comme par une pierre. Acon. bar., calc., chin., par., arn., bryon. dig., fer., kal. hyd., merc., sep., sil. staph., squill.

Rétraction (sensation de ). Dig.

Rétrécissement du cardia. Phos., bryon

Rongement. Calc., sil., (chel., sen.).

Sensibilité. Colch., mur. magn., nus sulph., (ol. an.).

SERREMENT. Cocc., fer.

- de griffe. Stann., caust., euph., pho

TENSION. Acon., dulc., kal., mur. magn sil., stann.

TIRAILLEMENT. Mang., merc.

Tonsion (sensation de). Natr. mur.

TRACTION vers en-bas. Merc.

TREMBLEMENT. Carb. yeg.

Vide (sensation de). Mur. ac., nic., ipec sep., veratr., (calad., ind., kal. hyd sen., teucr.).

## B. Dans la région précordiale.

Anxieté. Ars., cic., coff., dat., puls., set clem., cocc., fer., lyc., sulph., thuj (chel.).

ARDEUR. Ars., euph., phos., ran., sec veratr., bryon., dulc., laur., merc mosch., nux. plat., sulph., (ambr.).

BALLONNEMENT. Bell., hep., nux, bryon cic., dulc., hell., mang., natr.

BATTEMENT. Asa, sep., cic., fer., oleand plat., puls., rhs, thuj., (calad chel.)

CHALEUR. Bryon.

Constriction. Plat.

CONTRACTION. Plat., sulph. ac., (cast rhod.).

Symptômes de l'estomac.

Cours. Plat., teucr.

COUPURE (douleur de). Ang., sulph., (calad., nic.).

CRAMPES. Hyosc.

DARTRES. Ars.

DÉCHIREMENT. Zinc.

(sensation de). Petr.

ENDOLORISSEMENT. Ars., lyc., natr., nux, sil., sec., aur., cupr., hell., hyosc., ipec., phos., puls., sep., thuj., (lach., ran.).

EBRANLEMENT. Anac.

ELANCEMENTS. Arn., bryon., kal., puls., plat., sen., spig., sulph., zinc., (calad., rat., rhod.).

ÉLÉVATION. Valer.

Exconiation (douleur d'). Ran., bryon., chin., mang., mosch., sabad.

FAIBLESSE (sensation de). Ign., kal., lyc., mosch., (diad., teucr.).

FOUTLEMENT. Sulph., arn., phos., sabad. Gonflement. Lyc., natr. mur., bell., bryon., calc., cic., dulc., hell., hep., mang., natr.

GRIFFEMENT. Natr. mur., sit., stann.

Oppression. Mosch., sec., bell., bryon., cocc., coff., rhs, thuj., (cinn.).

PESANTEUR. Dig.

PLÉNITUDE. Arn., cham., mosch.

PINCEMENT. Cocc., ipec., plat.

PRESSION. Acon., arn., bryon., cham., nat. mur., phos., puls., ran., rhod., sec., valer., alum., ars., bell., calc., catb. veg., caust., chin., dig., ign., kul., mgs aus., mang., mosch., nux, plat., rhs, spig., stann., sulph., sulph. ac., thuj., veratr., zinc., (arg., asar., ol. an., rut., tereb., feuer.).

Pression comine par une pierre. Acon., cham., cupr., arn., dig., natr. mur., (grat.).

Symptomes de l'estomac. 273

Pulsation. Asa (voy. Battement).

Pustules. Natr. mur.

Rétraction. Dulc., hell., (calad.).

RONGEMENT. (Rut.)

Sensibilité. Carb. veg., stann., veratr.

SERREMENT. Mosch., zinc., (ang., chel., teucr.).

-- dans le diaphragme. Natr. mur.

Suppuration (douleur de) intérieure. Con., natr. mur.

TACHES rouges. Natr. mur.

Tension. Bryon., cham., merc., stann.

TIBAILLEMENTS. Mang.

ULCÉRATION (douleur d'). Hell., (cast.).

VêTEMENTS (gêne par les). Amm., nux, coff., con., hep., spong.

Vide (sensation de). Ign., stann.

# C. Dans les hypochondres.

## AA. Dans l'hypochondre droit.

ARDEUR. Acon.

BATTEMENT. Nux.

Brisement. Clem.

DÉCHIREMENT. Con.

Douleur de coupure. Carb. an., ang.

- d'excoriation. Acon., carb. an.
- de foulure. Kal.
  - obtuse. Hyosc.
- d'ulcère. Nux.

Dureté. Ars., graph., merc., mur. magn.

ÉLANGEMENTS. Bryon., con., nux, natr., acon., agar., asa, calc., caust., cocc., merc., zinc.

274 Symptomes de l'estomac.

Endolorissement. Sel., alum., chin., kal., lyc., sep., valer.

GONFLEMENT. Merc.

HÉPATITE. Acon., bryon., cham., merc., mur. magn., natr., nux, bell., sec., sulph.

- chronique. Mur. magn., natr., nux, sec., sulph.

INDURATION. Ars., graph., merc., mur. magn.

Pression. Acon., ambr., amm., asa, carb. an., graph., kal., mur. magn., nux, arn., chin., con., merc., sabin., stann., sulph., thuj., (rut., vit.).

RONGEMENT. Rut.

Secousses. Valer.

Symptômes bilieux. Acon., ant., arn., bryon., cham., chin., ign., merc., mur. magn., nux, ars., aur., bell., cocc., dig., puls., rhs, sec., staph., sulph., tar., veratr., (asar.).

## BB. Région de la rate.

DURETÉ. Iod.

DOULEUR. Rhod.

ELANGEMENTS. Arn., rhod., zinc., hep., sil., sulph., (sel.).

— du dedans en dehors. Asa.

FOUILLEMENT. Asa.

GONFLEMENT, Ind.

Insensibilité. Ars.

Tension. Rhod.

CC. Dans les deux hypochondres.

Anxiété. Staph.

BRISEMENT. Ran.

Symptômes de l'estomac.

CHALEUR brûlante. Ars., laur., tereb.

Coliques. Sen.

Constriction. Acon., con.

- dans le diaphragme. Asar.

Contraction. Nux, con.

Douleur incisive. Nic.

DURETÉ. Bor.

ELANCEMENTS. Sil., carb. veg., chin., kal., merc., (natr. sul., rhod.).

Endolorissement. Bell., dros., puls., (tab.).

FOUILLEMENT. Sen.

GONFLEMENT. Rhod.

PINCEMENT. Ipec.

Pression. Acon., cocc., con., mang., mur. ac., veratr., zinc., (tab., tereb., rhod.).

Sensation d'un cercle. Con., nux, lyc.

SERREMENT. Zinc, mur. ac., (rhod.).

— dans le diaphragme. Stann., mur. ac., natr. mur., spig.

TENSION. Acon., con., nux, lyc., mur. ac., staph., veratr.

TÉRÉBRATION. Sen., sep.

VêTEMENTS (les) sont insupportables.

Amm., con., nux, coff., hep., spong.

2. SELON L'HEURE ET LES CIRCONSTANCES.

Air (à l') libre. Lyc.

ALIMENTS gras (après avoir mangé des).

Pals.

APPUYANT (en). Bryon., anac., hell., mur.

Assis (étant). Hep.

AVALANT (en). Bar., nitr. ac., sep.

BAISSANT (en se). Alum., cocc., kal., natr. mur., spig., (clem., rhod.).

Boisson (par la). Nux.

- - froide. Natr., rhod.

BUVANT (en). Sil.

- de l'eau. Ol. an.

CAFÉ (après avoir bu du). Cham., nux.

CHAGBIN (avec). Bryon.

Cochon (après avoir mangé de la chair de). Colch., puls.

Covcнé (étant). Ars., carb. an.

- sur le côté. Bryon.

- - droit. Mur. magn.

amélioration. Sulph.

ÉCHAUFFEMENT (par l'). Thuj.

ESTOMAC (par surcharge d'). Coff.

ÉTERNUANT (en). Grat.

Femmes (chez les) enceintes. Calc., phos., puls., sep.

FLEXION (par la) en avant, amélioration. Carb. veg., cham.

Horripilation (avec). Caust.

Jeun (à). Bar., carb. an., nux, staph.

Jour et nuit. Acon.

Inspirant (en). Sel.

Lit (au). Staph.

— (dans la chaleur du) amélioration.

Mangeant (en). Bar., ang., arn.

Mance (après avoir). Anac., ars., bar., brion., calc., carb. an., carb. veg., cham., chin., fer., kal., lyc., merc., natr., natr. mur., nux, phos., phos. ac., plat., rhs, sil., sulph., asa, bell., bism.,

cocc., dulc., hep., mosch., petr., plumb., sass., sep., tart., thuj., (croc., grat., teucr.).

MARCHANT (en). Arn., bell., calc., mur. magn., sel., sep., sil., sulph.

- - vite. Rhod.

MATIN (le). Chin., lyc., phos., staph., (sen.).

Midi (a). Mosch., tart.

MONTANT ( en ). Merc.

Mouvement (pendant le). Bryon., nux, calc., caust., (ang.).

Nourrices (chez les). Carb. veg.

Nuit (la). Ars., calc., ign., rhs, sulph., tart., (rhod., sen.).

PAIN (en mangeant du ). Caust., phos., sass.

Pas (en faisant un faux). Bryon., puls.

Périodique. Hyosc., ign.

Pression ( par la ) sur. Ign., merc., natr. mur., nux, puls., sil., stann., ( sel., tab. ).

Redressant (en se) amélioration. Cinn.

REFROIDISSEMENT (par). Ars., dulc., lyc., puls.

- de l'estomac. Ars., puls.

Renvois (après ) amélioration. Rat.

Repos (dans le) amélioration. Cham.

RESPIRANT (en). Bryon.

RESPIRATION (avec) entrecoupée. Arn., cocc., rhod., cham., hell., rhs, sabad., staph., (guaj.).

Soir (le). Sulph. ac., alum., carb. an., sep., thuj.

Sommell (avec ). Phos. ac., tart.

Souper (après ). Sep.

Jo simpromes at t estomat.

Sucant (en ). Carb. veg.

Toucher (au). Amm., bryon., cann., colch., natr., nux, ant., arn., carb. an., carb. veg., chin., clem., cupr., dros., hyosc., lyc., mur. magn., natr. mur., phos., sabad., thuj., valer., (lach., ran., vit.).

Symptômes de l'estomac. Toussant (en ). Bryon., calc., cocc.

dros., merc.

Vêtements (en lâchant les). Hep.

Voiture (en allant en ). Cocc., sep., phos.

Vomissement (après le ). Ars., sulph.

# XVII. SYMPTOMES DU VENTRE ET DES AINES.

I. SELON LA NATURE.

#### A. Dans le ventre.

AGITATION. Asa, bell., kal.

Angoisse. Ars., cupr., teucr.

ASCITE. Ars., colch., dig., kal., sulph., bryon., canth., hell., dulc., led., lyc.

BALLONNEMENT. Ant., arg., arn., bell., caps., caust., cham., croc., dat., lyc., mur. magn., natr., natr. mur., valer., aur., bov., carb. veg., chin., cocc., colch., coloc., con., dulc., euph., graph., hep., hyosc., kal., mgs arc., mgs aus., merc., nitr. ac., nux, op., petr., phos., puls., rhm, sec., sep., sil., sulph., thuj., (arg., cast., grat., kal. hyd., lam., merc. sub., mgs, rhod.).

- des côtes. Caust., natr. mur.
- de l'épigastre. Hell., rhod.
- de l'hypogastre. Bell.

BATTEMENT. Ign., calad., cann.

- dans la région des reins. Canth.

Boule hystérique. Mur. magn., acon., plumb.

Brisure. Cann., coloc., hep., valer., (ang.).

BRULURE. Ars., camph., daph., euph., laur., canth., coloc., lyc., ran., sep., sil.

CHALEUR. Camph., daph., iod., lyc., mang., rut., sen., sulph. ac.

Coliques. Asar., coloc., cupr., kal., nux, plumb., ran., sen., sulph., bar., bov., colch., hyosc., led., sec., spig., valer., veratr., (croc., euph., laur.).

- diarrhéiques. Dig., led., nux, oleand., plat., sabin., (ang.).
- hémorrhoïdales. Sulph., valer.

Congestion. Merc.

Constriction. Coloc., plat., (euph., lam., verb.).

CONTRACTION. Plumb., coloc., lyc., con., mang., nux, phos. ac., rhs, sabin., sulph., thuj., (ol. an.).

- dans les reins. Clem.

CRAMPES. Cham., coac., con., cupr., mur. magn., nux, plumb., puts., stann., staph., valer., coff., hyosc., ign., sec., spong., tart., veratr., (euph.).

Cours. Plat., mgs arc., stann.

Déchirement (douleur de). Cham., merc., phos., coleh., coloc., dig., nux, therix

Douleur. Ars., nitr., sulph., valer., bell.,

Symptomes du ventre.

coloc., chin., merc., phos., plat., rhm, (cast.).

Douleur dyssentérique. Arn., merc., led., rhs, sulph.

- dans les côtés. Nitr., sel., valer.
- dans l'épigastre. Valer.
- dans l'hypogastre. Bell., sulph.
- au nombril. Dulc., rhod., stront., veratr.
- de côté. Arn., ign., tart., asa, mur. ac., oleand., zinc.
- \_ \_ droit. Mur. magn., nitr., ang.
- gauche. Sulph., agar., bryon., valer.
- d'excoriation. Con., arn., bel colch., mang., ran.
- - dans les reins. Zinc.
- comme celle de l'enfantement. Cin., kal., puls.
- qui force à se fléchir. Coloc., rhm, rhs, (grat.).
- -- de fouillement. Arn., bell., coloc., con., led., phos., phos. ac., rhs, sabad., sen., spong., stann.
- de torsion. Ars., cin., con., rhs, sabin., (cop., ran.).
- d'ulcération. Nitr. ac., cocc., cupr., hell.
- Dureté. Arn., ars., calce, coloc., daph., dat., graph., mur/magn., op., puls., sep., sil., sulph., valer.
- \_ dans les côtés. Mur. magn.
- dins l'hypogastre. Graph., sep.
- du nombril. Spig.
- EBRANLEMENT. Merc.

ELANCEMENT. Agar., alum., calc., cupr., dig., merc., nitr. ac., spig.

ÉLANCEMENT dans les côtés. Sulph., agar., ars., bryon., ign., tart.

Dynipiones au volures 2/

- dans l'épigastre. Carb. veg., rat.,
- dans l'hypogastre. Sil., chel., chin.,
- dans le nombril. Sep., sulph., anac., asa, dulc.
- dans la région des reins. Canth., chin., zinc.
- du dedans en dehors. Asa.

ÉTRANGLEMENT. Spong.

Exostose dans le bassin. Aur.

Frémissement, Iod.

FROID. Ars., kal., asa, laur., rut., sec., (men., oleand., phell., tereb.).

GONFLEMENT. Acon., ars., chin., coloc., natr. mur., op., sulph.

- (sensation de). Laur., spig.
- mésentérique. Calc.

GRATTEMENT. Acon., coloc., hep., mosch.

GROUILLEMENT. Hell., lyc., phos. ac., (diad.).

Hernie au nombril. Nux.

HYPOGASTRE (souffrances dans I'). Camph., cham., colch., hell., nux, sen., calc., cann., caps., caust., lyc., mang., mosch., rhod., sulph. ac., zinc., (ambr., asar., calad., mgs, rat., rut., tereb.).

INDURATION. Lyc.

INERTIE. Kal.

INFLAMMATION. Acon., bell., bryon., canth., cham., daph., nux, puls., rhs, ant., arn., ars., hyosc., ipec., merc., plat., sabin., squill., veratr., (tereb.).

INFLAMMATION des reins. Canth., (bell., cann., cocc., coloc., hep., merc., sulph., thuj.).

Insensibilité, Ars.

LIENTERIE. Phos.

MALAISE dans le ventre. Mur. ac., asa, aur., (cycl., teucr.).

MEURTRISSURE (douleur de). Arn.

Miserere. Op., plumb.

Mouvement dans le ventre. Croc., cann., dulc., thuj., (kal. hyd.).

Nombrie (douleurs de). Acon., anac., con., dulc., plumb., stann., asa, bar., bov., carb. veg., chin., hep., ipec., merc., phos. ac., plat., rhod., spig., stront., sulph., sulph. ac., veratr., (chel., kal. hyd., ol. an.).

OBESITE. Calc., caust., coloc., sep., staph.

PESANTEUR. Graph., op., sep., ars., asa, hell., magn., nux, rhs, (diad., tereb.).

PINCEMENTS. Asa, cin., coloc., lam., merc., plumb., ran., plat., anac., aur., bell., calc., carb. veg., dig., hell., ign., kal., lyc., magn., mgs aus., oleand., puls., rhs, rhm, sabin., samb., sassa., sil., spig., tart., valer., (croc., euphr., guaj., men., rut., far.).

- dans les côtés. Ign., mur. ac.
- dans l'hypogastre. Aur.
- dans le nombril. Acon., carb. veg., dule., mur. ac., plat., stann.

PLENITUDE. Croc., nux, puls., aur., colch., con., rhod., sil., stront., (asar., diad., mgs, rut., tereb.).

PRESSION. Ambr., arg., cupr., nux, plat., ars., calc., cocc., dig., fer., lye., merc., op., plumb., rhs, sil., staph., tart., (grat., par., rut.).

Symptomes du ventre. Pression dans les côtés. Carb. veg., asa,

merc., tart., zinc.

- dans l'épigastre. Nux, caust., mang., zinc., (ambr., mgs).
- dans l'hypogastre. Sep., plat., aur., chin., valer., (ambr., arg.).
- dans le nombril. Anac., chin.
- de dedans en dehors. Colch. RAIDEUR dans les côtés. Natr. mur.

Refroidissement (douleur de). Dulc. merc., natr., dig., nux, sabin., samb., valer.

REINS (douleur dans les). Canth., bell., cana., con., coloc., chin., hep., merc., nitr., sulph., zinc., (clem., sel.).

RÉTRACTION. Plumb.

- du nombril. Plumb., acon., bar., chel.

RONGEMENT. Sen.

SENSATION de dilatation. Bell., euph.

- de déchirement. Coloc., mgs arc., plumb.
- de faiblesse. Mur. magn., ol. an.
- de grosseur. Rhs, tart. parte la contraction de la contraction d
- de quelque chose de vivant. Croe., cann., dulc., merc., thuj., (kal. hyd.).
- de pincement. Coloc.
- comme si les règles devaient venir. Cin., croc., mgs, stann., (lam.).
- de torsion. Dig.
- de vide. Mur. ac., sassa., ant., coloc., merc., oleand., sep., stann.

Sensibilité. Coff., acon., bell., bov., canth., coloc., dulc., (tab.).

SERREMENT. Mosch., con., sen.

- de griffe. Coloc., sil., stann.
- pressif. Plat., sulph., zinc., (euph.).

Symptômes du ventre			
---------------------	--	--	--

SERREMENT pressif dans le bas - ventre.

Thuj., stann.

- spasmodique. Ang., coloc., natr. mur., phos. ac.

Secovsses. Cann., mgs arc., mosch., (chel.).

TENSION. Puls., sit., ars., aur., caps., carb. veg., coloc., daph., dat., graph., hyosc., lyc., staph., thuj., zinc.

Ге́ве́вватіом. Rut., sabad., sec., sen., sep.

Inaction. Caps., valer.

TRESSAILLEMENT. Ars., sulph. ac.

- dans les reins. Canth.

TRANCHEES. Ant., ars., bov., coloc., hyosc., merc., natr. mur., nitr. ac., petr., plumb., puls., rhm, staph., stront., sulph., veratr., viol. tric., acon., cic., con., dig., dros., hep., led., lyc., magn., mgs aus., natr., natr. mur., nitr., nux, phos. ac., sep., sil., spong., tart., valer., (arg., chel., kal. hyd., laur., merc. sub., ol. an., nic., tereb., teucr.).

- dans les côtés. Arn.

dans l'épigastre. Calc., cham., lyc., petr., phos.

dans l'hypogastre. Ang., bell.

dans le nombril. Bov., dulc., ipec., spig., sulph., (ol. an.).

- dans la région des reins. Clem.

de dedans en dehors dans les lombes.

TYMPA SITE. Coloc., op.

VENT (abondance de). Graph., oleand., a ar., con., kal., natr., puls., petr., samb., spig., squill., staph., stront., sulph., tart., veratr., zinc., (guaj.).

VENTS (accumulation de). Graph., nitr. ac., bor., cic., natr., nux, spig., squill., stront., tart., zinc., (natr. sul., teucr.).

Symptômes du ventre.

- (bruit par des). Ant., natr. mur., oleand., phos., phos. ac., puls., sass., acon., anac., ars., aur., calc., con., cupr., hell., ign., laur., mgs aus., mur. ac., nitr. ac., petr., plumb., sil., spig., squill., tart., thuj., veratr., (ang., arg., cast., cycl., kal. hyd., mgs, ol. an., tereb., teucr., therm., vit.).
- chauds. Staph., teucr.
- (coliques de). Ant., caps., carb. veg., cham., daph., zinc., acon., arn., aur., cocc., laur., mgs arc., mgs aus., nux, phos., puls., rhod., sulph. ac., (ambr., euph., natr. sul.).
- (déplacement des). Calc., carb. an., iod., natr. mur., nux, phos., stann., caust., chin., con., graph., mgs arc., natr., nitr. ac., plumb., phos. ac., sep., staph., sulph., (guaj., mgs, rhod.).
- difficiles à sortir. Plumb., veratr.
- (douleur de) en général. Phos., rhod.
- (douleur tensive par des). Graph., rhod.
- (douleur de tranchée par des). Con.
- fétides. Chin., arn., bov., carb. an., rhs, sil., spig., staph., (natr. sul., teucr.).
- (pression par les). Nux, zinc., mgs arc., mgs aus., merc., puls., rhm.
- - serrante. Carb. veg.
- (pincement de). Asa, lam., aur., carb. veg., cic., mgs aus., natr., rhod., squill., tart., (guaj.).
- (production de beaucoup de). Ant., kal., nux, phos., mgs arc., natr., nitr.

ac., plumb., sep., staph., stront., tart., (mgs, men., ol. an., teucr.).

VENTS putrides. Arn., calad., oleand.

- qui remontent. Graph., lyc., rhm.
- (souffrances par des). Ant., asa, calc., carb. veg., caps., cham., daph., graph., iod., kal., nitr. ac., nux, phos., stann., zinc., acon., arn., aur., bar., caust., cic., cocc., con., chin., euph., laur., mgs arc., mgs aus., merc., natr., plumb., puls., rhm, sep., sen., spig., squill., staph., stront., sulph., sulph. ac., tart., veratr., (grat., guaj., men., natr. sul., ol. an., rhod., teucr.).
- (souffrance pressive par des). Plumb., sen.
- (rétention des). Kal., lyc., natr., sil.
- Vens. Cic., cin., fer., sabad., sil., spig., sulph., teuer., acon., anac., calc., carb. veg., fil., ign., merc., natr. mur., nux, petr., spong., squill., stann., valer., veratr., (asar., tereb.).
- ascarides. Cic., cin., sabad., anac., natr. mur., (tereb.).
- tœnia. Fil., graph., sabad., calc., carb. veg., petr., stann.

## B. Dans l'aîne et dans l'anneau inguinal.

Constriction. Sulph.

COURBATURE. Valer.

Cuisson. Sulph. ac.

DURETÉ. Ant.

ÉLANCEMENTS. Bell., stront.

FOULURE (douleur de). (Euph.)

GLANDES (douleur des). Merc., thuj., ars.

- (gonflement des). Clem., dulc., merc.,

Symptômes du ventre.
nitr. ac., thuj., ars., spong., staph.
sulph., (tereb.).

GLANDES (induration des). Clem.

- (inflammation des). Hep., merc.
- (suppuration des). Hep., merc., nitrac.
- (tiraillements dans les). Thuj. (clem.).

GONFLEMENT. Sil.

HERNIE. Nux, sulph.

- (douleur de). Cham., rhs, spongsulph. ac., veratr., clem., (guaj.).
- crurale. Nux, sulph.
- inguinale. Aur., carb. an., cocc., lyc. nux, mgs arc., sulph. ac., thuj., zinc. magn., sulph.
- sortie de la hernie inguinale. Aur. magn., nux.
- - (douleur de la). Sil.

PESANTEUR. Croc.

PRESSION. Ign., plat., sulph., valer., arg. (kal. hyd.).

- de dedans en dehors. Rhs, (clem.).
- de dehors en dedans. Thuj.

RELACHEMENT. Mgs arc.

SENSATION de brûlure. Lyc.

- de déchirement. (Euph.)
- de dilatation. Mgs aus.
- de gonflement. Ant.
- de quelque chose de vivant. (Kal.
- comme pour l'apparition des règles. Magn., mosch., mur. ac.

SERREMENT. Dig., ign.

- de griffe. (Kal. hyd.)

Tension. Dig.

Tension vers en bas. Merc., nux, cham., coloc., magn., mgs arc., mosch., mur. ac., (kal. hyd.).

TÉRÉBRATION. Mgs arc.

TRACTION. Plat., lyc., mosch., thuj., valer., (kal. hyd.).

TRANCHÉE. Thuj.

ULCÉBATION (douleur d'.). Cic.

C. A l'extérieur du ventre.

CONTRACTION. Arg., rhs.

Douleur en général. Bell., coloc., valer.

- de brisure. Valer.
- de brûlure. Sel.
- d'excoriation. Men.

· Éruption de nodosités. Staph.

Frémissement. Guaj.

MILIAIRE. Sel.

PRESSION. Valer.

PULSATIONS. Coloc.

SENSATION de froid. Ambr., tereb.

SENSIBILITÉ. Acon., bell., bov., canth., puls.

TACHES jaunes. Phos., sep.

- rouges. Bell., sep.

TIRAILLEMENTS. Sel., veratr.

TRESSAILLEMENT des pauscles, Ambr., guaj.

Zona. Ars., graph., sulph.

2. SELON LE TEMPS ET LES CIRCONSTANCES.

AIR (au grand). (Merc. subl.)

— (par un courant d'). Mgs arc.

Anxieré (avec). Ars., cic., mosch., (mgs).

APPUYANT (en) amélioration. Euph.

Assis (étant). Rut.

- courbé. Tart.

- amélioration. Coloc., merc.

Baissant (en se). Natr. mur.

Boisson (après). Sulph., asa, staph., (ambr., ol. an., teucr.).

- d'eau. Croc., teucr.

CAFÉ (par le) amélioration. Coloc.

CHALEUR (par la) amélioration. Coloc., (cast.).

Compainant (en). Anac., ant., bell., stann., (men., ran., sel.)

Convulsion (avec). Cic.

DEBOUT (étant). Rhm, thuj.

Déjeuner (après le). Phos.

DINER (après le). Ant., cic., graph., nux, puls., zinc., bov., carb. veg., dulc., fer., iod., kal., petr., phos., rhm, sep., sil., spong., staph., (cycl., ol. an., sel.).

Enfants (chez les). Calc., cic., aur., lyc., sil., staph.

Expiration (pendant l'). Dig.

Femmes (chez les) enceintes. Arn., puls., hyosc.

- en couches. Hyosc.

Fléchissant (en) le corps. Chin.

Humeur (avec mauvaise). Asa, cic.

HYPOCHONDRIAQUES (chez les). Aur., con.

HYSTERIQUES (chez les). Con., mosch., mur. magn., stann.

Inquiétude (avec). Coloc., mosch., tart.

Inspiration (pendant l'). Agar., anac., arg., sel., sen.

36

JAUNISSEMENT (avec) des mains. Sil.

LAIT (par le). Con., arg., chel.

LEVANT (en se) amélioration. Arg.

Lit (au). Acon., ambr., chin., phos., valer.

MALAISE (avec). Ars., arn., cocc., colch., mang., nux, rhm, stann., tart., (cycl., ol. an.).

MANGEANT (en). Arg.

Mangé (après avoir) chaud. Kal.

MARCHANT (en). Sulph., ars., chin., merc., thuj.

- - sur le pavé. Con.

MATIN (le). Acon., caust., nitr. ac., phos., (ambr., rhod.).

Midi (à). Hep., phos.

- (avant). Arn.

- (après). Carb. veg., spig., valer.

MINUIT (avant). Valer.

- (après). Ambr., puls.

MOUVEMENT (par le). Caps., dig., cocc., merc., sep., sil., (merc. sub.).

- - amélioration. Coloc.

Nourrices (chez les). Sep.

Nuit (la). Ars., merc., veratr., acon., aur., cocc., coloc.

Ongles (avec les) bleus. Sil.

PENSANT (en). Magn.

Périodique. Nux, ign.

QUOTIDIEN. Natr. mur., diad.

REFROIDISSEMENT (par). Dulc., merc., natr.

Rècles (avec désordre dans les). Puls., cocc., nux.

Renvois (par) amélioration. Mur. magn.

Repos (dans le). Bov.

— — amélioration. Coloc.

RESPIRATION (avec gêne de la). Caps., cham., daph., hell., mosch.

RESPIRANT (en) profondément. Hell.

RIANT (en). Ars.

Rétraction (pendant la) du ventre. Valer.

Soir (le). Puls., valer., ambr., chin., led., nitr. ac., rhod., zinc.

- - amélioration, Nitr.

Somnolence (avec). Arn., cic., tart.

TOUCHER (au). Cham., cupr., acon., ant., bell., bov., cann., cin., colch., coloc., nitr. ac., valer., veratr., (tab.).

Toussant (en). Ars., nux, coloc., puls.

Unine (avec écoulement d'). Spig., veratr.

Veau (après avoir mangé du). Nitr.

Vents (avant la sortie des). Graph., lye.

- (pendant la sortie des). Con., puls.
- (après la sortie des) amélioration. Arn., mur. magn.

VERS (par les). Cic., cin., sil., sabad., spig., sulph., a on., bell., cham., dig., fer., ign., merc., nex, stann., valer., veratr., (asar., teuer.).

Vomissement (avec). Ars., asar., dat., dig., grat., nux.

- (pendant le). Bryon.

# XVIII. ÉVACUATIONS ALVINES.

#### 1. SELON LA NATURE.

Abondante. Ang., aur.

AFFAIBLISSANTE. Ars., con., sec., sep., ipec., phos. ac., veratr.

AQUBUSE. Phos., rhs, sec., acon., ars., chin., fer., mur. ac., nux, phos. ac., puls., stront., sulph., sulph. ac., tart.

BLANCHATRE. Acon., dig., phos. ac., puls., cham., chin., iod., spig., spong., sulph., (asar.).

BLANCHE striée. Rhs.

BILIEUSE. Dulc., ipec., puls.

BOUILLIE (de consistance de). Arn., phos. ac., rhm, rhod., sil., sulph., agar., ant., chin., cin., phos., sulph. ac., tart., valer., zinc., (calad., eug., euph., lam., ol. an., tab., tereb.).

Brulante. Ars., caps., bar., carb. veg., cocc., coloc., laur., merc., natr. mur., phos., sulph., veratr., (ang., cast., euph., grat., nic., tab.).

Constitution. Bell., bryon., calc., cocc., con., dat., graph., lyc., mang., nux, op., plat., plumb., sulph., thuj., veratr., zinc., agar., alum., ambr., amm., arn., aur., bar., bov., carb. veg., cic., colch., cupr., coloc., hep., kal., laur., magn., mosch., natr. mur., sil., (cor., grat., guaj., men., ol. an., tab., therm., viol. od.).

- alternant avec la diarrhée chez les

- chaque troisième jour. Sulph., kal., natr. mur., sabad., (verb.).

Constitution qui dure plusieurs jours.

Con., sulph., thuj.

- chronique. Bryon., caust., graph., nux, op., plumb., sulph., veratr., mgs arc., natr. mur., thuj.
- chez les femmes enceintes. Lyc., nux, sep.
- comme par rétrécissement. Plumb., (lach., magn.).

Couleur (de) d'argile. Hep.

- brune. Camph., magn., sabad.,squill., tart., (tereb.).
- cendrée. Dig., asar.
- foncée. Agar.
- grise. Asar., dig., phos. ac., rhm.
- jaune. Ars., chin., cocc., coloc., merc., petr., phos., rhs, stront., tart., (ambr., tereb.).
- noire. Ars., veratr., camph., sulph. ac.
- pâle. Carb. veg.
- verdâtre. Ars., cham., merc., puls., sep., sulph., canth., coloc., dulc., hep., laur., magn., phos., phos. ac., stann., valer., (tereb.).

CROTTES (comme des) de mouton. Merc., plumb., (verb.).

DIABRHÉE. Ant., ars., carb. veg., cham., chin., coff., dulc., ipec., merc., nitr. ac., puls., phos., phos. ac., sec., sulph., tart., veratr., acon., aur., bar., bell., bryon., calc., camph., cann., cauth., cin., colch., coloc., con., cupr., dig., fer.,

graph., hell., hyosc., iod., laur., led., mgs aus., mur. ac., natr. mur., nitr., petr., sulph. ac., rhm, zinc., (asar., cast., clem., cop., eug., euph., ind., nic., tab., rat.).

Diarrhée âcre. Puls., ars., merc., veratr.

- alternant avec constipation. Ant.
- chronique. Dulc., ipec., mero., nitr. ac., phos., phos., ac., magn.
- avec cuisson. Puls.
- pendant la dentition. Calc., cham., coff., merc.
- dyssentérique. Caps., colch., hep., merc., merc. sub., rhs, sulph., ars., carb. veg., coloc., ipec., nux, staph.
- douloureuse. Merc., petr.
- non douloureuse. Sulph.
- -- chez les enfants. Ipec.; cham., magn., merc., sep., rhm.
- qui tettent. Cham., coff., merc.
- rhs.
- avec faiblesse. Ars., con., sec., sep., veratr., ipec.
- chez les femmes enceintes. Dulc., lyc., petr., phos., sep., sulph.
- chez les femmes en couches. Ant., dulc., hyosc., rhm.
- par le fruit. Rhod.
- quand il fait humide. Rhod.
- jour et nuit, Sulph.
- par le lait. Lyc., sep., (chel.).
- -- la nuit. Caps., merc., puls., rhs, sulph., aur., chin., dulc., phos., veratr., (chel., cin.).
- après refroidissement, Bryon., dulc., sulph., camph., natr., nux.

Diarrhée le soir. Lach.

- avec mal de ventre. Ant., arg., ars., bryon., merc., rhs, agar., asa, bov., carb. veg., cham., con., cupr., dros., hell., hep., magn., petr., puls., sulph., veratr., (cin., diad., eug., euph., ind., nic., nux, ol. an.).
- violente. Ars., cupr., veratr.
- avec vomissement. Ars., asar., cupr., ipec., phos., tart., veratr., ant., bell., sen.
- DIFFICILE (evacuation). Alum., camph., chin., cocc., mur. magn., natr. mur., nux, rut., thuj., ant., colch., daph., graph., hep., kal., lyc., mang., merc., mgs arc., nitr., phos. ac., plat., puls., sassa., sep., spig., stront., (kal. hyd.).
- et molle. Anac., chin., rhod., carb. veg., hep.
- Digérée (non). Chin., merc., oleand., arn., ars., bryon., con., nitr. ac., phos. ac.
- --- la nuit ou après avoir mangé.
- dure. Cocc., von., graph., tyc., mur. magn., sil., sulph., agar., ant., ars., aur., bell., bov., calc., canth., carb. an., carb. veg., caust., hep., ign., iod., kal., magn., nitr., nux, petr., plumb., sassa., spig., squill., stann., staph., thuj., veratr., zinc., (chel., guaj., rut., sel., sen., tereb., verit., vit.).
- et chronique. Cocc., graph. lyc., mgs arc., nuw, sil., sulph.
- éclaboussante. Eug.
- envie pressante d'aller à la selle. Arg., ars., colch., hep., merc., merc. sub petr., phos., rhod., rhm, sil., sulph., ant., bar., carb. veg., daph., hyosc.,

Evacuations alvines.

sabad., spig., stann., staph., (cast., euph., lach., of. an., viol. tric.).

ENVIE inutile. Con., natr. mur., staph., stann., sulph., sulph. ac., anac., arn., carb. an., caust., ign., plumb., rat., sil., spig., thuj., (ambr., bism., tereb.).

FERMENTÉE. Ipec., sabad.

FLOCONNEUSE blanche. Ipec., squill.

FRÉQUENTE. Arg., cic., natr. mur., petr., arn., bell., chin., coff., coloc., daph., dros., dulc., phos., phos. ac., sil., (ang., clem., cin., ran., sen., tar.).

GÉLATINEUSE. Colch., hell., rhs.

GLOBULEUSE. Plumb.

Goudson (comme du). Merc.

HACHÉE. Merc., sulph., sulph. ac., (viol. tric.).

Insuffisante. Mur. magn., natr., sen., sulph., bell., colch., plat., sabad., sassa., sep., squill., stann., zinc., (lach., therm.).

INVOLONTAIRE. Arn., bell., chin., natr. mur., phos. ac., sec., sulph., acon., ars., dig., hyose., mur. ac., oleand., op., phos.

avec des vents. Ars., colch., mgs aus., phos. ac., staph., veratr.

Liquide. Ars., phos., sec., veratr., nitr., (diad., phell., rat.)

MATIÈRE (de) 3500 mucosité. Dig., merc.

MEMBEANEUSE, Colch.

Molyk (trop). Anac., calc., graph., nitr.
ac., phos., rhod., viol. tric., vit., acon.,
ar., carb. veg., cocc., coff., con.,
daph., iod., natr. mur., phos. ac.,
sabin., sep., zinc., (ambr., arg., cin.,

guaj., natr. sulf., oleand., ran., rat., tab.).

Evacuations alvines.

Molle chronique. Calc., graph., phos., natr. mur.

Morceaux (en). Merc., mur. magn., phos. ac., (guaj.).

MUQUEUSE. Ang., graph., merc., phos., phos. ac., sec., sulph., arn., ars., aur., bell., canth., cham., chin., colch., coloc., dros., dulc., hell., ipec., kal., laur., led., mur. magn., nitr. ac., puls., rhm, sep., sil., spig., squill., stann., (chel., rhod., sel.).

Novevse. Mur. magn., sulph., carb. an., caust., graph., led., stann., stront., sulph. ac., thuj., viol. od.

ODEUR (d') acide. Arn., merc., calc., coloc., magn., rhm, sulph.

 fétide. Ars., nitr. ac., phos. ac., rhm, sulph., sulph. ac., (eug., par.).

- de moisi. Coloc.

— putride. Nitr. ac., sulph., coloc., dat., (par.).

PURULENTE. Arn.

QUANTITÉ (en petite). Acon., alum., arn., bell., caps., chin., daph., hyosc., mur. magn., natr., plat., stann., staph., sulph., (arg., eug., sen., tereb.).

RETARDÉE. Colch., mar. magn., rhod., sil., amm., bar., bell., calc., chin., con., dulc., graph., lyc., magn., phos., sassa., sep., stront., sulph., (nic., therm.).

Rongeante. Fer.

SABLONNEUSE. Arg.

SANGUINOLENTE. Cupr., dulc., merc., phos., rat., alum., arn., ars., canth., colch., coloc., dros., graph., led., mur. magn., natr., rhs, tart., thuj., valer., veratr.,

(lam., rut., merc. subl., sel., therm.).

SANGUINOLENTE et muqueuse. Merc., merc. subl., nux, petr., arn., caps., led., mur. magn., puls., sabin., sulph., sulph. ac., (bor.).

- mêlée de stries. Con., mur. magn., squill.
- seche. Hep., arg., mang., stann., zinc., (tereb.).

Tenesme. Caps., merc., rhm, rhs, sep., spong.

- la nuit. Merc.

Vers (avec des). Cic., cin., fer., sabad., sil., spig., sulph., teucr.. anac., ars., calc., carb. veg., fil., graph., ign., natr. mur., nux, petr., spong., squill., stann., (tereb.).

- ascarides. Fer., teucr., acon., asar.,
   calc., ign., nux, spong., squill., sulph.,
   valer.
- lombrics. Cic., cin., sabad., anac., natr. mur., (tereb.).
- tænia. Fil., sabad., calc., carb. veg., graph., petr., stann.

Visqueuse. Merc.

Volume trop considérable. Kal., mgs arc., thuj., veratr.

- ténue. Arn., carb. veg., cin., caust., chin., mgs aus., mur. ac., rhm, squill., staph., (ang., clem., diad., euph., tereb.).
- - chronique. Phos.

2. D'APRÈS LES SYMPTÔMES ACCESSOIRES.

eseucuations alvines.

#### A. Avant la selle.

Anxieté. Bar., canth., kal., (ambr.).

Anus (douleur à l'). Carb. an., carb veg., phos., spong.

- brûlante. Ars.

BAILLEMENTS. Cast.

ÉRECTION. Thuj.

FACE rouge. Caust.

FROID. Bar., cast., dig.

Horripitation. Daph.

IRRITATION. Calc.

MALAISE (avec). Rhs.

MISANTHROPIE. Ambr.

RECTUM (douleur au). Nux.

TENESME. Merc.

TREMBLEMENT. Merc.

VENTRE (mal de ). Bryon., merc., tart., veratr., ars., dig., dulc., hell., mgs arc., mgs aus., petr., puls., rhs, stann., staph., sulph., thuj., (nic., ol. an., rat., tab., viol. tric.).

VENTS (souffrances de). Caps., carb. an., spong., tart., (therm., viol. tric.).

Vomissement. Tart.

# B. Pendant l'évacuation.

Aine (contraction dans l'). Laur.

Anus (brûlure à l'). Ars., caps., bar., carb. veg., cocc., coloc., laur., meronatr. mur., phos., sulph., veratr., (ang., euph., grat., nic., tab.).

Loucuations atomes.

- AINE (constriction à l'). Ang., staph.

   (contraction à l'). Coloc., thuj.
- ( démangeaison à l' ). Dulc., merc.
- (douleur incisive à l'). Caust., laur., staph.
- ( douleur de déchirure à l' ). Calc.
- ( d'excoriation à l' ). Ars.
- (élancements à l'). Natr. mur.
- (grattement à l'). Phell.
- (pression à l'). Bar., merc., merc. sub., rhod., sulph., sulph. ac., acon., ant., lyc., nitr., spig., stront., (ang., chel., diad., lach., ol. an., phell., rat., rut., tar., verb.).
- (rongement à l'). Ang.
- (tenesme à l'). Calc., hep., ipec., merc., merc. sub., rhs, sulph., acon., hell., laur., nux, (euph., nic., ind., tab.).

### Anxiété. Veratr.

Colique. Ang., ars., bryon., dulc., merc., merc. sub., rhm, agar., bov., cann., carb. veg., cham., con., dros., hell., magn., nux, sulph., veratr., zinc., (diad., eug., euph., ind., ol. an., tereb.).

Dos (douleur au). Puls.

Effort. Hep., merc.

ERECTION. Ign.

Estomac (douleur à l'). Agar.

Faiblesse. Ars., spec., veratr.

FROID. Veratr.

Hémokahoides sortant. Calc.

- (saignement des ). Nitr. ac.

Hoppipilation. Rhm, yeratr.

MALAISE. Hell.

PALBUR de la face. Veratr.

PALPITATION. Tart.

PROSTATE ( évacuation d'humeur de la ). Sil., ( sel., vit. ).

RECTUM (chute du ). Sep., daph., ign., mur. magn., rut.

- (douleur dans le). Natr. mur., caust., coloc., grat.

REINS (douleur aux). (Kal. hyd., rat.)

Sang (évacuation de). Phos., alum., lyc., merc., (ambr., lam., rut., sel.).

Vents ( sortie de ). Sabin.

Vomissement. Ars., asar., cupr., ipec., phos., tart., veratr., ant., bell., sen., (arg., eug.).

# C. Après l'évacuation.

ABATTEMENT. Calc.

Anus (brulûre à l'). Cast., petr., stront., tart., (grat., oleand., ol. an., rut., tab.).

- (contraction à l'). Daph., sulph., (magn.).
- (cuisson à l'). Magn.
- ( douleur à l' ). Lyc., sassa., stront.
- (douleur d'écorchure à l'). Ign., (phell.).
- ( mucosités sortie de ). Phos.
- (paralysie du sphincter de l'). Coloc.
  - ( pulsations à l'). ( Lach., sen. )
- (tenesme à l'). Caps., merc., sulph., rhm, (tab., phell.).

CÉPHALALGIE. (Rat.)

Comques (avec). Rhm, arg., staph., zinc., (ambr., ol. an.).

Envie pour aller. Rhm, staph.

FAIBLESSE. Coloc.

FAIBLESSE dans le ventre. Plat.

Hémorrhoides (douleur aux). Ign.

HORRIPHLATION. Daph., plat.

Prostate (évacuation de l'humeur de la). Nîtr. ac. REINS (douleur aux). (Tab.)

RECTUM (douleur au). Nux, petr., (sen

- (chute du). Merc.

Sanc (sortie de ). Alum., lyc. Unine (écoulement d'). (Lach., se

# XIX. ANUS, RECTUM ET PÉRINÉE.

## 1. ANUS ET RECTUM.

CHALLUR brûlante. Ars., merc., alum., ant., caps., colch., coloc., natr. mur., oleand., sulph., thuj., (ind., tereb.).

CONDYLOMES. Nitr. ac., thuj.

Contraction de l'anus. Ign., sulph.

- du rectum. Calc. sep.

CRAMPE à l'anus. Colch.

Cuisson. Ant., grat.

- au rectum. Natr. mur.

Déchirement à l'anus. Colch., kal.

- au rectum. Thuj., ( rut. ).

Douleur à l'anus après le repas. Lyc.

au rectum. Aur., merc. wellt ab )

incisive à l'anus. Kal.

- au rectum. Caust., lyc.

ECOULEMENT ( sensation d' ). Cann.

ELANCEMENT. Acon., ars., croc., ign., kal., natr. mur.

- au rectum. Ign., plat., sulph.

ETRANGLEMENT. Mgs aus., plumb. Exconiation. Sulph., ars., graph., merc.

- (douleur d'). Ars., graph., ign., merc., sulph., zinc.

FOURMILLEMENT à l'anus. Croc., plat., zinc., colch., teucr., (tereb.).

FOURMILLEMENT au rectum. Calc., sabat sep., spong.

Hémorrhoides. Graph., kal., mur. a phos., amm., ars., calc., carb. ve caust., coloc., fer., lyc., natr. mu sep., sulph, therm., (bov.).

- aveugles. Ant., arn., ars., color magn., nux.
- bleues. Mur. ac.
- brûlantes. Ant., ars., calc., grapl mur. ac.
- cuisantes. Puls.
- douloureuses. Graph., bar., car veg., coloc., stront.
- elançantes. Ars., bar.
- extérieures. Calc., graph., sep.
- fluentes. Acon., amm., mur. ac., and carb. veg., cupr., nitr. ac., sep sulph.
- gonflées. Coloc., mur. ac., nitr. ac.
- humides. Bar.
- muqueuses. Colch., hell., merc. merc. sub., spig., caps., duic., graph nux, phos., rhs, sulph.
- pruriantes. Ant., bar., caust., graph

Humidité. Bar., carb. veg., sep.

INACTIVITÉ. Alum., anac., camph., kan veratr., (rut.).

Anus, rectum et perinee.

PARALYSIE. Acon., coloc.

- du rectum. Phos.

PRESSION à l'anus. Acon., ant., bar., merc., phos., sulph., sulph. ac.

- au rectum. Chin., kal.

Prunt à l'anus. Ant., bar., colch., ign., kal., merc., plat., sep., staph., zinc., (ambr.).

au rectum. Sulph., (ambr., euph.).

Pulsation. Natr. mur., rhod., (grat.).

RECTUM (chute du). Merc., sep., sulph., ars., colch., dulc., (mgs, rut.).

RETRACTION. Plumb.

Rétrécissement. Ign., plumb., (lach., mgs).

Sang (évacuation de). Merc., mur. ac., phos., amm., ant., coloc., lyc., merc. sab., zinc.

- (afflux de). Sep.

- coagulé. Merc. sub., dat.

foncé. Ant., merc. sub.

SANG vermeil. Merc., zinc.

Sécheresse (sensation de). Carb. veg.

Anus, rectum et périnée.

289

TENESME. Calc., caps., merc., plat.

Térébration. Valer., zinc.

TIRAILLEMENT. Rhod.

2. AU PÉRINÉE.

Contraction. Sep.

CRAMPR. Sulph.

DARTRE. Petr.

Exconiation. Carb. veg., rhod.

FURONCLE. Ant.

Humidité. Carb. an., carb. veg.

Pression en dehors. Asa.

PRURIT. Petr., tart., vit.

Tension. Tart.

TIRAILLEMENT. Sulph.

# XX. EXCRÉTION DE L'URINE.

# 1. SELON LA NATURE.

DIABETES. Carb. veg., natr. mur., arg., led., kal., magn., sep., squill.

caust., cocc., coloc., dig., dulc., lyc., natr., puls., sabad., sep., squill., stann., sulph...(arg., asar.).

- - Paxicuse. Acon., carb. veg., dig.

- avec peu d'urine. Ant., bell., crust., cupr., dig., dros., hell., hyosc., kal:, merc., mur. magn., nitr. ac., nux, petr., phos., phos. ac., staph., tart., (ang., euph., lam., men., ol. an., rat., rut.).

Envie d'uriner avec grande quantité d'urine. Alum., arg., mur. ac., rhs, spig., squill., tart., thuj., valer., colch., cic., kal., samb., (guaj., kal. hyd., verb., viol. tric.).

— — douloureuse. Acon.

— fréquente. Arg., carb. veg., cic., mang., merc., rhs, sep., valer., viol. tric., acon., bell., bov., caps., caust., chin., dros., lyc., natr., nitr. ac., petr., puls., samb., sassa., spig., stann., staph., tart., thuj., (par., rat., verb.).

— — chez les femmes enceintes. Puls.

- la nuit. Rhs, samb., spig., tart., thuj.

o Excretion de l'urine.

Envir d'uriner pressante jour et nuit. Carb. veg.

- — et inutile. Cop., dig., merc., nux, petr., caps., chin., coloc., sassa., sep.
- le soir. Sabad.
- -- vite. Merc., nitr. ac., rhs, (ambr., rut.).
- ISCHURIE. Arn., dig., nuw, op., puls., aur., camph., canth., cic., coloc., dulc., plumb., sec., sulph., (lam., tereb.).
- JET d'urine mince. Camph., merc., spong., staph.
- (par) intermittent. Clem., con., dulc.
- qu'on ne peut arrêter. Nitr. ac., rhs.
- SEDIMENT d'urine. Acon., arn., ars., calc., coloc., con., daph., graph., merc., natr., sep., zinc.
- blanc. Calc., graph., phos. ac., rhs, sep., spig., spong., zinc., (therm.).
- brun. Ambr.
- couleur d'argile. Zinc.
- épais. Merc., phos. ac., (tereb.).
- floconneux. Daph., merc., zinc., (sen.).
- de gravelle. Lyc., sassa., zinc.
- de graviers. Sassa., zinc.
- rouges. Phos.
- jaunâtre. Lyc., phos., spong., natr.
- muqueux. Dulc., natr. mur., sulph. ac., (sen., tereb.).
- nuageux. Phos. ac., sen., thuj., (ambr.).
- rouge. Coloc., daph., graph., lyc., natr. mur., puls., sep., natr. sul.

Excretion de l'urine.
Sédiment sanguinolent. Acon., dulc.

- transparent. Coloc.
- trouble. Con., rhs. dilign ! i december
- STRANGURIE. Canth., dulc., euph., nux, staph., elem., colch., dros., (ol. an., therm.).
- Suppression. Acon., bell., dat., op., tereb., ars., sec., sulph.
- Unine abondante. Arg., merc., mur. ac., thuj., ant., coff., dros., ign., iod., led., natr. mur., nitr., (ang., bism., chel., clem., eug.).
- acre. Caust., hep., tart.
- ammoniacale. Stront.
- aqueuse. Alum., squill., arn., cocc., ign., mur. ac., phos. ac., puls., rhs, thuj., (bism., teuer.).
- (augmentation d'). Magn., rhod., rhs, thuj., veratr., alum., ambr., bar., carb. an., led., mgs arc., nitr., rhm, sabad., sabin., samb., spong., sulph., zinc., (chel., clem., cop., oleand., sec., sen., tab., teucr., therm., viol. od., vit.).
- brûlante. Acon., ars., camph., cann., caps., phos., (nic.).
- brune. Acon., ant., arn., bell.,bryon., merc., puls., tart., (ambr.).
- -- foncée. Tart., colch., dig., nitr. ac., petr., puls.
- chaude. Ars., cham., hep.
- couleur d'argile. Sassa.
- (diminution d'). Acon., colch., dig., sassa., sulph. ac., agar., amm., ambr., ars., bell., bryon., calc., coloc., daph., dulc., graph., merc., petr., phys., phos. ac., stront., sulph., (chel., ol. an., phell., sel., sen., tereb.).

Unine qui sort avec difficulté. Dig., (camph., cuph., sec.).

— qui sort avec douleur. Colch., nitr.

- (écoulement continuel d'). Acon., veratr.

- épaisse. Con., dulc., phos. ac.
- qui s'épaissit. Coloc., sen.
- fétide. Dutc., nitr. ac., phos., rhod., viol. tric., calc., coloc., cupr., merc., natr., petr.
- foncée. Bell., carb. veg., colch., veratr., dig., graph., hep., lyc., mgs arc., merc., nitr. ac., rhs, sep., staph., (eug., sil.).
- fréquente. Bar., calc., lyc., sulph., ant., arn., bell., caps., caust., coff., con., cop., cupr., ign., iod., kal., led., mgs aus., natr. mur., nitr., phos., (ang., bism., clem., euph., ind., natr. sul., nic., oleand.).
- qui sort avec force. Sulph.
- jaune clair. Agar., ant., bell., cham., colch., dulc., natr. mur., nitr., puls., zinc., (lach., tab.).
  - froide. Nitr. ac.
- involontaire. Bell., caust., dulc., mgs aus., natr. mur., acon., arn., ars., carb. an., carb. veg., cic., colch., con., hyosc., led., magn., merc., petr., phos. ac., puls.. sep., sulph.
- en éternuant. Caust., natr. mur.
- goutte à goutte. Petr.
- - 'jour et nuit. Caust.
- - la nuit (pissement au lit d'). Carb. veg., cin., puls., sen., sep., sulph., caust., con., hep.
  - dans le premier sommeil. Sep.

Unine involontaire en toussant. Ant., caust., natr. mur., spong.

Exercion de l'arme. 291

- mousseuse. (Lach., sen.)
- muqueuse. Natr. mur., sen.
- noire. Colch.
- qui coule la nuit. Natr. mur., sulph, ambr., coff., con., dig., hep., graph., iod., mgs aus., natr., puls., samb., sabin., sep., spig., thuj., (nic., eug.).
- (.odeur de l') comme celle des chats. Viol. tric.
- — de violette. (Tereb.)
- pâle. Magn., rhs, stront., (chel., phell.).
- avec pellicule iridée. Iod.
- purulente. Canth., clem., sabin.
- en petite quantité. Acon., bell., bryon., chel., colch., (voy. Diminution).
- rare. Agar., bell., bryon., stann., stront.
- retardée. (Therm.)
- rouge. Acon., bell., bryon., hep., merc., calc., carb. veg., colch., coloc., petr., puls., rhs, sil., sulph., (sel., tab.).
- - foncé. Ant., merc., sulph. ac.,
- trouble. Bell., sep., ars., colch., con., merc., natr., rhs, sassa., tart., (ambr.).
- qui devient trouble. Ang., caust., cocc., dulc., graph., merc., rhs, sulph., sulph. ac.
- verdâtre. Rhm.
- visqueuse. Coloc.
- sanguinolente. Calc., canth., daph., ars., coloc., con., lyc., tart., thuj., zinc., (ambr., tereb).

292 Excretion at tursing.

2. SYMPTÔMES ACCESSOIRES.

#### A. Avant d'uriner.

BRULURE dans les hanches. Dulc.

Démangeaison dans l'urètre. Cop.

MALAISE. Dig.

Pression sur la vessie. Ang., chin., con.

#### B. Pendant qu'on urine.

Corpons (tiraillements dans les) spermatiques. Clem.

EVACUATION alvine involontaire. Mur. ac.

Lèvres ( déchirement dans les grandes ).
Thuj.

REINS (ardeur dans les). Rhm.

- Unerre (ardeur dans l'). Colch., thuj., acon., ars., canth., caust., cupr., dig., kal., magn., merc., phos., phos. ac., rhm, sassa., spig., sulph., tart., (clem., natr. sul., nic., par., sen., tereb.).
- (constriction dans l'). Dig.
- (cuisson dans l'). Magn., phos., sep.
- (démangeaison dans l'). Canth., clem., merc. sub.
- (douleur incisive dans l'). Con., canth.
- (douleur de plaie dans l'). Bov., cinn.

Unitre (élancement dans l'), Cupri, merc., merc. sub., thuj.

- (prurit dans l'). Lyc., thuj.
- (serrement dans l'). Arn., colch. (ang.).

Vessie (ardeur dans la). Rhm.

- (crampe dans la). Asa.
- (douleur simple dans la). Tart.
- (douleur incisive dans la). Canth.
- (pression dans la). Asar.

### C. Après avoir uriné.

Écoulement goutte à goutte. Thuj.

Envie d'uriner. Staph., zinc., (rut.).

Horripilation, Eug., plat.

Lucidité de la vue. Eug.

MALAISE. Dig.

URÈTRE (chaleur brûlante dans l'). Merc. natr., thuj., con., (natr. sul.).

- (démangeaison dans l'). Cop.
- (douleur incisive dans l'). Canth.
- (écoulement muqueux dans l'). Natr
- (élancement dans l'). Merc.
- (prurit dans l'). Cop., lyc.
- (sortie de sang dans l'). Hep., zinc.
- (tenesme dans l'). Ang.

Vessie (crampe de la). Asa.

- (pression de la). Asar.

# XXI. ORGANES URINAIRES.

1. VESSIE.

ARDEUR. Colch.

CATARBHE, Dulc.

CONTRACTION. Sassa.

Douleun simple. Sassa.

- incisive. Lyc., (tereb.).

ELANCEMENTS. Tart.

ÉPAISSISSEMENT des parois. Dulc.

FAIBLESSE, Rhm.

Hémorrhoides. Calc., sulph., ant.

- muqueuses. Dulc.

INFLAMMATION. Canth., dig.

PARALYSIE. Acon., dulc., laur.

- du sphincter. Mgs aus.

POLYPE. Calc.

PRESSION. Arn., acon., chin., coloc., sep.

RELACHEMENT. Mur. ac.

### 2. URÈTRE.

ARDEUR. Colch., phos., thuj., ars., calc., cann., cupr., merc., natr., petr., phos. ac., sulph., (ambr., clem., par.).

Blénorrhagierécente. Cann., canth., cop., petr., dhuj., cinn., merc.

petr., lyc., merc., nitr. ac., sep., thuj.

Blénorrhagie avec sycose. Nitr. ac., thuj., lyc.

CONTRACTION. (Clem.)

Cuisson. Phos., sep.

Déchirement. Colch., rut.

Douleur simple. Sabin.

- incisive. Con., colch., lyc.

- de pus. Canth., clem., sabin.
- de sang. Calc., canth., lyc., puls., sulph., ant., con., daph., merc., phos., tart., zinc.
- avec ardeur. Puls.
- de mucosité. Natr. mur., calc., dulc., sassa., sulph.

ELANCEMENT. Cann., cupr., mang., merc., tart., thuj., (par.).

Exconiation (douleur d'). Daph.

Inflammation. Canth., clem., sabin., sulph.

OBTURATION. Op.

- par gonflement. Led., rhs.

PRURIT. Lyc., sulph., thuj.

Rétrécissement. Clem., dulc., petr.

- (sensation de). Dig.

ROUGEUR. Sulph.

Tension. Phos.

TIRAILLEMENT. Golch., zinc.

TRESSAILLEMENT. Phos.

# XXII. PARTIES GÉNITALES DE L'HOMME.

#### 1. SELON LES SENSATIONS.

## A. Parties génitales en général.

ARDRUR. Calc., natr., petr., phos., sulph.

Blenorrhagierécente. Cann., canth., cop., petr., thuj., cinn., merc.

- chronique. Sulph., canth., dulc., hep., petr., lyc., merc., nitr. ac., sep., thuj.
- douloureuse, sèche. Canth.
- qui coule la nuit. Merc.

CHANCRES. Merc., hep.

CONDYLOMES. Nitr. ac., thuj., cinn., lye., phos. ac., staph.

DARTRES. Dulc.

EJACULATION (besoin d'). Mgs aus., rhs, stann., (men., mgs).

ERUPTION. Dulc., rhs.

Exconiation (douleur d'). Rhod.

FAIBLESSE. Sulph., vit., mang., sep.

FOURMILLEMENT. Plat., acon.

FROID. Vit.

GANGRÈNE. Ars.

GONFLEMENT. Ars., lyc., plumb.

Inflammation. Ars., canth., merc., plumb.

IRRITABILITÉ (grande). Phos., plat., aur., carb. veg., cocc., coff., graph., lyc., natr. mur., sil., sulph., (men.).

Pression et serrement. Plat.

PRURIT. Ign., sep. ;; sil.; (ambr., ang. euphr., natr. sul.).

RELACHEMENT. Vit.

RÉTRACTION. (Euphr.)

Sensibilité. Cocc., plat., veratr.

SENSATION de volupté. Graph., plat. (ambr., ang., euphr.).

Sugur. Thuj., (cor.).

Syphilis. Merc.

- invétérée. Bell., hep., nitr. ac.

## B. Dans le cordon spermatique.

CHALEUR brûlante. Ambr., mgs.

Déchirement. Colch., puls.

ELANCEMENTS. Arn., thuj.

ETRANGLEMENT. NUX.

GONFLEMENT. Nitr. ac., puls.

PRURIT. Mang.

Tension. Cann.

TIRAILLEMENTS. Mang., nitr. ac., puls. zinc., (clem., tereb.).

### C. Aux testicules.

Constriction. Nux.

DÉCHIREMENT (douleur de). Euph., mgs

DOULEUR. Clem., puls., arn., canth. natr., sep., zinc., (mgs).

- de brisure. Cocc.
- de meurtrissure. Dig., rhod., arg.

ÉLANCEMENTS. Arn., bell., nux, rhod.

Parties genitates.

ETRANGLEMENT. Amm., mgs aus.

GONFLEMENT. Arn., aur., nitr. ac., nux, rhod., canth., clem., daph., mgs aus., puls., zinc., (ol. an).

INDUBATION. Aur., clem., iod., rhod., arn., nux.

Inflammation. Nitr. ac., nux, puls., clem., staph.

PESANTEUR. Amm., natr.

PRESSION. Bism., cann., puls., zinc.

Réтвастіон. Bell., mgs aus., nux, rhod., thuj., zinc.

TIRAILLEMENT. Rhod., thuj., zinc., elem., cocc., puls., (tereb.).

#### D. Au scrotum.

BRULURE ( douleur de ). ( Euph. )

CORRUGATION. Rhod., zinc.

Couleur bleue. Arn.

DARTRES. Dulc.

ELANCEMENTS. Merc., sulph., thuj.

EPAISSISSEMENT. Clem.

ERUPTION. Phos. ac., rhs.

Excoriation. Sulph., natr.

FOURMILLEMENT. Plat.

FROID. Caps.

GONFLEMENT. Arn.

Horripilation. Zinc.

Humidité. Petr., sulph.

HYDROCELE. Arn., graph., nux, puls., sulph., sil.

INFLAMMATION. Ars.

MEURTRISSURE (douleur de). Arn., (kal.).

Paurit. Cocc., petr., rhod., staph.

ROUGEUR. Arn.

SENSATION de volupté. Plat., staph.

Larties gonnanes.

Sveur. Rhod., thuj., (natr. sul.).

TENSION. Arn.

E. A la verge (comparés aux symptômes de l'urètre).

COULEUR bleue. Arn.

Déchirement. Mgs aus. 2411

Douleur de brisure et d'écorchure. Arn.

ELANCEMENTS. Sulph.

ECOULEMENTS. Merc., thuj.

Gonflement. Arn., cupr., (cinn.).

Inflammation. Sulph.

- lymphatique. Merc.

PRURIT. Sulph.

ROUGEUR. Arn.

Tension. Arn.

TIRAILLEMENTS. Iod.

### F. Au gland.

BATTEMENT. Rhod.

Couleur bleue. Ars.

Cuisson. Ars.

Douleur. Merc.

- incisive. (Euph.)

ÉLANCEMENTS. Daph., phos. ac., rhod., (euph.).

ERUPTION. Cinn.

Excoriation. Merc.

FOURMILLEMENT. Phos. ac.

GERÇURES. Ars.

GONFLEMENT. Ars., merc., rhs.

296 Parties génitales.

Gonorrhee bâtarde. Daph., cinn., merc., natr. mur., sulph., thuj., sep., (cor.).

Inflammation. Ars., cupr., merc.

PRURIT. Mang.

ROUGEUR. Ars.

TACHES. Arn., carb. veg.

TITILLATION. Daph.

Vésicules. Phos. ac.

Ulceres. Nitr. ac., merc.

#### G. Au prépuce.

CHANCRES. (Thuj.)

Dovleur d'ulcération. Ign.

ETROITESSE. Merc.

Excoriation. Ign., ( calad. ).

GONFLEMENT. Cann., cinn., merc., rhs, thuj., ( calad., viol. tric. ).

INFLAMMATION. Merc., cann., sulph.

PRURIT. Nitr. ac., sulph., (euph.).

RÉTRACTION. Coloc., ( calad., mgs ).

Rougeur. Cinn., merc.

SENSATION de volupté. (Euph.)

#### 2. SELON LES FONCTIONS.

- Appetit vénérien ( excitation de l').

  Ant., canth., chin., mosch., nux, op.,
  phos., puls., plat., sil., stann., staph.,
  agar., arn., aur., bov., calc., carb.
  veg., cocc., coff., graph., iod., ign.,
  lyc., mgs arc., natr. mur., nitr., nitr.
  ac., sep., sulph., zinc., ( cinn., lach.,
  men., natr. sul., rut., sen.).
- ( defaut d' ). Camph., kal., lyc., sulph., vit., acon., alum., bar., bell.,

Parties génitales.
graph., hell., ign., mang., mur. ac., phos. ac., sabad., ( mgs, teuer. ).

Appetrit vénérien trop facile. Lyc., nux, phos.

- immodéré. Zinc., natr. mur., plat.
- irrepressible. Graph., natr. mur., phos., plat., sil., lye., natr.
  - - avec lascivité. Chin., merc.

Coir (aversion pour le). Amm., kal., lyc., rhod.. (clem., mgs.).

Ecoulement de liqueur prostatique. Bell., dig., nitr. ac., sil., staph., thuj., ( euph., sel. ).

EJACULATION. Con., nux, op., phos. ac., puls., sep., stann., staph., sulph., thuj., alum., amm., ant., bell., caust., fer., led., (ang., cor., ol. an., rut., tar., viol. od.).

- ( défaut d' ). Kal., lyc.
- douloureuse. Clem., thuj.
- sans érection. Bell., sabad., sel.
- sans force. Con., phos.
- trop lente. Lyc., zinc.
- trop vite. Carb. veg., con., lyc., phos., (sel.).
- sanguinolente. Led., merc.

Emission trop fréquente de sperme. Con., mgs arc., phos., bov., carb. veg., caust., petr., sep.

- involontaire. Arn., graph.

ERECTION. Mgs arc., nux, op., arn., fer., led., merc., phos., rhs, spig., (ol. an.).

- --- trop courte. Con., mgs aus.
- ( défaut d' ). Con., caust., graph., kal., lyc., magn., rhod., teucr.
- douloureuse. Merc., thuj., cann., canth., nux, sabad., sen.

Parties genitales.
Enection très facile. Lyc., nux, phos.,

- trop faible. Agar., bar., lyc., sulph., ( sel. ).

trop forte. Canth., phos., sabad., (tar.).

- insuffisante. Con., ings aus.

- le matin. Ambr., nux, thui.

- la nuit. Merc., thuj., rhs, staph.

- le soir. Phos.

sabin.

- sans sensation de volupté. Phos. ac. sabad., (ambr., euph., mgs).

ÉROTISME (accès d'). Acon.

EROTIQUE ( effets d'une imagination ). Carb. veg., chin.

FAIBLESSE des fonctions. Bar., ign., sep., sulph.

IMPUISSANCE. Camph., con., lyc., mgs aus., mur. ac., vit., sulph., bar., caps., coloc., natr. mur., ( calad., eug. ).

- avec lascivité. ( Sel. )

Pollutions avec rêves voluptueux. Arn.,

Parties génitales. 297
Pollutions sans rêves voluptueux. (Bism.)
— pendant le sommeil de midi. Staph.

3. SOUFFRANCES PENDANT LES

A. Après le coît.

FATIGUE. Agar., (sel.).

MAUVAISE humeur. (Sel.)

OPPRESSION. Staph.

Soir. (Eug.)

Sommer. Lyc., bar.

Sueur. (Eug.)

- nocturne. Agar.

Têre embarrassée. Bov., calc.

TITUBATION. BOY.

B. Après la pollution.

Constination. Thuj.

EMBARRAS de la tête. Bov., calc.

# XXIII. PARTIES GÉNITALES DE LA FEMME.

1. SELON LES SENSATIONS.

Boutons. Sep.

- purulents. Sep.

Brulune Bryon, carb veg., colch., nux, thuj., (ambr.).

CHALEUR, NUX.

CONTRACTION. Ign., sabin., sep., thuj.

CRANPE (douleur de). Thuj.

DARTRES. Dulc.

Démangeaison. Thuj.

Dépression. Bell., croc., nux, plat., chin., con., mosch., mur. ac., sep., sulph.

Douleur. Staph.

ELANCEMENT. Phos., con., sep., thuj.

ERUPTION. Sep.

Excoriation. Carb. veg., thuj.

(douleur d'). Ambr., rhs, thuj.

Parties génitales.

Fièvre puerpérale. Bett., bryon., cham., nux, puls., rhs, acon., arn., ars., hyosc., ipec., merc., plat.

FOUILLEMENT au-dessous du vagin. Con.

FOURMILLEMENT. Plat.

298

GONFLEMENT. Canth., sec., sep., thuj.

Ovaires (inflammation des). Merc., staph.

PESANTEUR. Nux.

PLÉNITUDE (sensation de). Chin.

Pression. Sabin.

- vers en has. Bell., croc., nux, plat., chin., con., mosch., mur. ac., sep., sulph.

PRURIT. Ambr., natr. mur., sep., calc., coff., con., sulph., (ang.).

- dans l'urêtre. Sep.
- dans le vagin. Con., sil., thuj.

Sang (afflux du). Sec.

SÉCHERESSE. Bell.

SENSATION de volupté. Plat., coff.

SENSIBILITÉ. Coff., sec., staph.

TIRAILLEMENTS. Mosch.

Utérus ( cancer de l' ). ( Ars., sec. )

- (chute de l'). Aur., bell., nux, sep., stann., (merc.).
- (crampe de l'). Con., mur. magn., cocc., ign., stann.
- (gonflement de l'). Phos.
- (induration de l'). Bell., aur., chin., sep.
- (inflammation de l'). Bell., sec.
- (ulcère de l'). Sep.
- (verrues à l'orifice de l'). Thuj., sec.

# 2. SELON LES FONCTIONS GÉNITALES.

Parties genuaies.

- Appérit vénérien (excitation de l'). Plat., veratr., coff., zinc.
- — chez les femmes en couche. Plat., veratr., zinc., (grat.).

Avortement. Asar., calc., croc., ipec., nux, sabin., sec., sep., zinc., chin., fer., sil.

ENFANTEMENT (douleurs d') qui durent trop long-temps. Puls.

- douleurs trop faibles. Puls.
- fausses. Puls.
- douleurs qui manquent. Sec., op., puls.

LEUCORBHÉE âcre. Amm., bov., con., ars., ign., iod., merc., puls., (ran.).

- affaiblisante. Stann.
- aqueuse. Amm., chin., daph., sep., (merc. subl.).
- blanche. Sulph. ac., graph., magn., nitr.
- comme du blanc d'œuf. Daph., petr.
- brûlante. Calc., amm., con., kal., puls., (cast.).
- après crampes hystériques, Mur. magn.
- cuisante. Alum.
- avec excoriation des cuisses. Chin.
- qui coule étant debout. Therm.
- démangeante. Phos., sil., cham., magn., merc., nitr. ac., (lam.).
- épaisse. Puls.
- fétide. Nitr. ac.

Parties genitales. Parties génitales.

Leuconnuée jaune. Sep., acon., cham., kal., lye., (merc. subl.).

- ( qui tache en ). Carb. an.
- avec visage jaune. Natr. mur.
- laiteuse. Calc., fer., puls., sil.
- qui durcit le linge. Nitr.
- pendant le mal de ventre. Lyc., sil.
- après le mal de ventre. Con., kal., lyc., merc., mur. magn., natr., natr. mur., rat., sil.
- muqueuse. Magn., nitr. ac., sassa., sulph.
- d'odeur douceâtre. Sassa.
- pruriante. Calc., sabin., alum., chin., kal., merc.
- purulente. Chin., cocc., ign., merc.
- avant les règles. Calc., alum., chin.
- après les règles. Alum., merc., phos. ac.
- avec suppression des règles. Sabin.
- rongeante. Bov., alum., ars., cham., con., fer., ign., lyc., merc., sep., (kal. hyd., ran.).
- rougeâtre. Alum., cocc., lyc., phos.
- sanguinolente. Chin., cocc.
- avec douleur au sacrum. Kal., nitr.
- comme le serum, Alum., cocc., lyc., nitr. ac.
- ténue: Graph., nitr., therm.
- transparente. Stann.
- qui coule en urinant. Sil.
- qui produit des vésicules. Phos.
- Lochies faibles. Bell.
- fétides. Bell., carb. an.

LOGHIES trop fortes. Con., croc., bryon., calc., plat.

299

- qui durent trop long-temps. Sec.
- supprimées. Hyosc., veratr., zinc.
- trop ténues. Carb. an.
- METROBRHAGIE. Bell., calc., cham., croc., diad., ipec., plat., puls., rat., sabin., sec., sil., acon., ant., coff., cin., fer., hyosc., iod., lyc., mgs aus., sep., squill., sulph.
- après l'accouchement. Croc., sabin., plat., bell., cham., nux, ipec.
- après avortement. Plat.

PLACENTA trop adhérent. Sec.

RECLES de trop courte durée. Amm., merc., phos., (alum., nic.).

- de trop longue durée. Acon., lyc., natr. mur., nux, plat., rat., rhs, sec., sil., chin., (mgs).
- trop faibles. Con., graph., lyc., mgs arc., natr. mur., amm., bar., magn., merc., phos., sassa., sil., sulph., (alum., nic., tereb.).
- trop fortes. Calc., caust., cin., croc., lyc., mgs aus., merc., mosch., mur. magn., phos., plat., rat., sabin., sec., sulph., sulph. ac., veratr., ars., bell., bov., carb. veg., dulc., led., nitr., rhs, sep., sil., spong., stann.
- qui ne coulent que la nuit. Bov.
- précoces. Calc., carb. veg., cin., nux, phos., plat., rat., sep., sulph., arn., ars., bell., bov., con., coloc., eroc., kal., led., lyc., mgs aus., mang., mur. ac., mur. magn., natr. mur., petr., rhs, sulph. ac., veratr.
- retardées. Caust., graph., puls., amm., cic., con., dulc., kal., lyc.,

Parties genuales. magn., natr. mur., sassa., sil., stront.,

sulph., zinc., (chel., iod., tereb.).

Rècles supprimées. Con., graph., lyc., natr. mur., nitr. ac., puls., sep., sil., sulph., veratr., zinc., ars., bryon., calc., kal., magn., mgs arc.; merc., mur. magn., rhod., sabin.

qui tardent à paraître chez les vierges. Kal., puls., caust., graph., natr. mur., petr.

Sang (évacuation de) hors le temps des règles. Bell., bor., calc., cham., ambr., arn., bryon., chin., coff.

- pendant l'allaitement. Sil.
- chez les femmes enceintes. Phos., cocc., kal.

STÉRILITÉ. Amm., camph., con., graph., natr. mur., phos., plat., sulph., sulph. ac., calc., caust., dulc., merc., sep.

- par lascivité grande. Phos.
- par règles trop faibles. Amm.
- trop fortes. Merc.
- trop fortes et trop tôt. Calc., natr. mur., sulph., sulph. ac.
- retardées. Graph., caust.
- \_\_ \_ supprimées. Con.

TRANCHÉES douloureuses. Cham., coff.

- trop violentes. Nux.
- 3. SYMPTÔMES DE LA MENSTRUATION.

## A. Avant les règles.

Anxiété. Stann.

BAS-VENTRE (crampes dans le). Carb. veg.

CÉPHALALGIE. Sulph., carb. veg., cupr., natr. mur., veratr.

CHALEUR. Merc, ... oneni minumon radi

COEUR (palpitations de). Cupr., spong.

Parties genuiues.

CONTRACTION. Chin, an adopt in-

Diarrhée, Sil.

Enfantement (douleur d'). Plat.

GENCIVES (gonflement des). Bar.

GÉNITALES (pression vers les parties). Plat.

HUMEUR chagrine. Natr. mu

Jambes lourdes. Bar.

Leucorrnée. Calc., alum., chin.

ODONTALGIE. Bar.

OREILLES (bourdonnement d'). Veratr.

Reins (douleur de). Bar,, nitr.

SANG (fermentation du). Cupri, merc.

SEIN (douleur au). Calc., con.

- (gonflement du). Calc.

Tête (congestion de sang vers la). Merc.

TRISTESSE. Natr. mur., stann.

ULCERE. Phos.

VENTRE (mal de). Plat., bar.

VERTICES. Veratr. 271....

Vomir (envie de). Veratr.

# B. A l'apparition des règles

CRAMPE. Plat.

TRANCHÉE. Graph., lyc.

TRISTESSE. Natr. mur.

## G. Pendant les règles.

Anus (saignement par l'). Graph. Anxiété. Merc.

BAS-VENTRE ( pression sur le ). Con.

LALGIE Lyc., carb. veg., natr.

CEPHALALGIE Lyc., carb. veg., natr. mur., veratr., (cast.).

Congestion (avec). Chin.

CONNAISSANCE (perte de). Sep.

CRAMPE en général. Cocc., nux.

- dans le bas-ventre. Cocc., con., graph., chin., nux, puls.

Cusses (douleurs aux). Con., dat.

- ( excoriation dans les plis des ). Bov.

Douleur en général. Natr.

- au dos. Caust., lyc.

FACE (bouffissure de la). Chin.

FAIBLESSE. Graph.

GÉNITALES (douleur dans les parties).
Canth., magn., natr.

- (pression sur les parties). Bell.

Jambes bleues, Ambr.

(faiblesse des). Sulph.

- (éruption aux). Kal.

- (excoriation aux). Kal.

- (pression aux). Ambr.

- (prurit aux). Kal.

Jambes (tiraillements des). Spong.

Parties genitales.

301

Membres (douleurs des). Graph.

Odontalgie. Carb. veg.

OREILLES (bourdonnement d'). Veratr.

POITRINE (crampe de la). Chin.

- (douleur de la). Graph.

SACRUM (douleur au). Calc., carb. veg., mur. magn., nitr., phos., (cast.).

TIRAILLEMENTS. Dat.

Ulches (aggravation des). Graph.

VARICES. Ambr.

VENTRE (mal de). Calc., bar., bell., carb. veg., cocc., con., graph., lyc., merc., nux, phos., plat., puls., sil.

VERTIGES. Veratr.

Vomissement. Lyc.

YEUX (convulsion des). Chin.

D. D'après les règles.

CÉPHALALGIE. Natr. mur.

FAIBLESSE. Plat.

Leucorrhée. Alum., merc., phos. ac.

### XXIV. CORIZA.

# 1. SELON LA NATURE.

Air (par &ourant d'). Natr.

(à l') libre. Thuj.

alternant d'un jour à l'autre. Nair.

alternant avec coriza sec. Nux, par.

- chronique. Canth., colch., puls.

Air continuel. Calc., natr., sil.

- d'un seul côté. Hep.

— fluent. Cin., merc., natr., puls., sulph., arg., ars., aur., bar., bryon., calc., cinn., cupr., dros., graph., lyc., mgs aus., natr. mur., petr., sep., sil., squill., staph., zinc., (clem., cycl., euphr., par., sel., tart.).

Ain fréquent. Sil. Égoulement épais. Bov., cant

- par l'humidité. Sep.
- le jour et le soir coriza sec. Nux.
- le matin, Dig.
- qui fait cesser l'obturation des narines. Sil.
- quotidien. Graph.
- par le refroidissement. Graph.
- le soir. Sel.
- en suant amélioration. Natr.
- Coniza en général. Sulph., chin., cocc., dig., graph., lyc., mang., natr. mur., petr., (cor., diad., ol. an., tereb.).
- CORIZA sec. Amm., ant., bryon., calc., carb. an., graph., natr. mur., nux, phos., aur., caps., carb. veg., kal., lyc., magn., mang., nitr. ac., sep., sil., sulph., sulph. ac., thuj., (chel., par., rat.).
- - chronique. Ipec.
- - dans le froid. Dulc.
- — le matin. Natr. mur.
- -- semi-latéral. Alum., stann.
- le soir avec coriza fluent pendant le jour. Nux.

ECOVLEMENT par les narines sans coriza.

Phos., rhs, sabad., spig., sulph. ac.

- âcre. Ars., merc., nux, squill., (cast., kal. hyd.).
- augmenté. Phos.
- aqueux. Ars., merc., sulph. ac., (cast., tereb.).
- brûlant. Ars., cinn.
- démangeant. Ars.
- qui durcit. Sil., bryon., natr., sep.

ÉGOULEMENT épais. Bov., canth., puls., (ol. an., sel.).

- fétide. Puls,, calc., mur. magn., natr.
- gélatineux. Sel.
- jaunatre. Bov., mur. magn., phos.,
- jaune-verdâtre. Aur., puls., phos.
- purulent. Calc., aur., con., cic., cin., (phos. ac.).
  - — jaune. Calc., con., cic.
- rongeant. Merc., sil., squill., (cast., kal. hyd.).
- rougeâtre. Par.
- semi-épais. Sabad.
- sanguinolent. Phos., thuj., (par.).
- transparent. Sabad.verdåtre. Par., phos.
- ETERNUEMENT. Calc., natr. mur., sulph., carb. veg., kal., merc., rhs, squill., staph., tart., (agar., ambr., arg., croc., euph., nic., tab., tar., teucr.).
- qui avorte. Acon., natr. mur., sîl.
- pendant le coriza. Chin., natr. mur.
- douloureux. Acon., cin.
- avec élancements dans les côtés Acon.
  - — dans la rate. (Grat.)
- (envie inutile d'). Plat.
- immodéré. Sil.
- violent. Sabad., (therm.).

Fièvre de coriza. Ars., camph., dulc. merc., nux.

OBTURATION du nez. Ant., calc., caust., con., grat., lyc., natr., nitr. ac., sil. arg., aur., bryon., carb. an., carb veg., graph., ipec., kal., magn.

mang., nux, op., petr., phos., puls., sabad., spig., sulph., zinc., (ambr., cast., chel., nic., ol. an., par., phell., tab., teuer.).

OBTURATION du nez chronique. Sil.

- en lisant à haute voix. Verb.
- le matin. Con., rhod., ( par. ).
- la nuit. Phell.
- semi-latéral. Rhod., alum., staph., sulph. ac.
- le soir. Carb. veg.
- par suppuration des narines la nuit.
- SECHERESSE des narines. Bell., calc., cann., graph., natr. mar., phos., sil., sulph., bov., bryon., cic., con., ign., merc., nitr. ac., petr., sep., spig., zinc., (ambr., sen., tab.).
- ( sensation de ). Sil., con., daph., veratr., ( sen. ).
  - 2. SELON LES SYMPTÔMES ACCESSOIRES.

Bouche (sécheresse de la ). Nux.

BRULURE dans les narines. Ars., cin.

EPHALALGIE. Acon., ars., cin., graph., spig., thuj.

HALEUR: Spig.

RACHOTTEMENT de mucus. Colch.

NROUEMENT. Dig., sep., thuj., ars., kal., natr., spig., zinc., (phell.).

Fièvre. Merc., spig.

FOURMILLEMENT. Caps.

FROID. Natr., tart.

GONFLEMENT. Bryon., phell.

Gorge (mal de). Phos. ac.

- (grattement à la). Hep.

Gour ( perte du ). Puls., mur magn., natr. mur., rhod., tart.

Inflammation des narines. Phell.

INSOMNIE. Ars.

LARMOIEMENT, Euphr., staph.

MALAISE. Graph.

ODORAT (perte de l'). Puls., sulph. ac., mur. magn., natr. mur., rhod., tart.

PLEURER (disposition à ). Spig.

POITRINE (douleur de ). Bell., phos. ac., zinc.

RESPIRATION (gêne de la ). Bov.

SAIGNEMENT. Ars.

Soir. Diad.

Souncies (pression sur les ). Ars.

Tête (chaleur de la ). Lyc.

— (embarras de la ). Euphr., lyc.

Toux. Thuj., bar., bell., canth., lyc., mgs aus., spong., (euphr.).

Ulcération des narines. Cocc., squill., staph., tart.

Unine (écoulement d'). Veratr.

YEUX (proéminence des). Spig.

# XXV. RESPIRATION.

# 1. SELON LA NATURE.

- ASTHME. Ambr., amm., calc., colch., con., dig., dulc., kal., lyc., natr. mur., nux, puls., sass., sil., stann., sulph., agar., ars., bar., bell., bryon., caps., carb. an., chin., cic., cin., cocc., coloc., cupr., daph., dros., euph., graph., ipec., laur., led., natr., nitr. ac., petr., phos., plat., rhm, sec., sen., sep., squill., sulph. ac., thuj., veratr., (grat., viol. od., viol. tric.).
- de millar. Samb., ipec., (ars., op.).
- spasmodique. Ambr., cupr., kal., sass. caust., led., zinc.
- Gene de la respiration. Aur., ars., bell., bryon., caust., cin., con., fer., led., merc., natr. mur., rhod., sabad., samb., sec., sil., staph., thuj.
- avec anxiété. Thuj.
- OPPRESSION de poitrine. Arn., bell., bryon., carb. veg., colch., lyc., phos., plat., rhod., sep., spig., thuj., zinc., anac., ant., asa, cann., croc., graph., hep., mgs aus., merc., petr., phos. ac., puls., sabad., samb., sec., sep., sil., stann., sulph., (ang., cycl., cinn., nitr., phell., sen., tab., viol. od.).
  - weratr., arn., cin., nux, phos., plat., rhs, stann., staph., thuj., valer., (tab.).
  - intermittente. Plumb.
  - RESPIRATION anxieuse. Acon., bell., hep., plat., arn., bryon., squill.
  - chaude. Mang., natr. mur.

- RESPIRATION courte. Con., lyc., natr. mur., sil., sulph., veratr., agar., amin., carb. veg., ipec., phos., plat., puls., rhs, sen., sep., stann., zinc., (asar., bov., cast., cycl., euph., phell., rat., tart., viol. od.).
- difficile. Bell., colch., phos., sen., sulph., arn., aur., calc., hep., hyoso., kal., lyc., merc., natr., op., plat., plumb., sec., stann., tart., valer., (croc., euphr., tereb., therm., viol. od.).
  - douloureuse. Led., viol. od.
  - enrouée. Hep., kal.
  - faible. Phos.
  - froide. (Cor., mgs aus.)
  - gémissante. Bell., cupr.
  - haletante. Cin., nitr. ac., sil.
  - avec hoquet. Ang., led., sec.
  - intermittente, Bell., cin., op., (ang.
  - irrégulière. Bell., cin., op., (ang.
  - légère. (Viol. od.)
  - lente. Spong.
  - (manque de). Ars., chin., cic., lyc stann., (lam.).
  - avec odeur. Acon., arn., sulph ars., aur., carb. veg., merc., nitr. ac zinc., (ambr., croc.).
  - fétide. Acon., sulph., aur., car veg., merc., zinc.
    - — putride. Arn., ars., aur., nitr. a
  - petite. Acon., bell., bryon., canr cin., hep.

Respiration.

RESPIRATION profonde. Plat., ant., aur., cupr., ings aus., (croc., lach., ran., sel.).

- râlante. Hep., cupr., laur.

- ronflante. Cupr., hyosc., laur., lyc., op., spong., stann.

- sifflante. Hep., samb., chin., kal., phos., spong., sulph., therm.

sterioreuse. Hep., sulph., cham., natr. mur., op, stann.

soupirante. Dat., mgs aus., sec.

vite. Bell., cupr.

# 2. SELON L'HEURE ET LES CIRCONSTANCES.

Arr (par l') froid. Ars.

- (au grand). Ars., sen.

Assis (étant). Samb., dig., phos., veratr., (lach.).

amélioration. Calch., hep., chin.,

AUTOMNE ( pendant l' ). Aur.

AVALANT (en). Bell.

Baissant (en se). Calc.

Cou (en tournant le ). Bell.

Couché (étant), Hep., dig., phos. ars., asa, samb., tart., (phell.).

sur le côté. Puls. drivo

amélioration. Phos.

- sur le dos. Phos.

- tête basse. Colch., hep., chin.

COURANT (en.). Sil.

CRACHATS (avec augmentation des). Sep.

- (suppression des ). Sep.

Respiration. 305
Douleurs (pendant les). Puls., ars., sil.

Enfants ( chez les ). Ambr., calc., lyc.

ESTONAC (qui sort de l'). Caps.

- (avec contraction del'). Phos.

Expectoration (après) amélioration. Tart.

Flatuosites (par ). Zinc.

LIT (au). Ars., con., tart.

Mangeant (en). Mur. magn.

Mancé (après avoir). Sulph., zinc., asa, carb. an., chin., puls., (viol. tric.).

MARCHANT (en). Con., carb. veg., stann., stront., (agar., phell., sen.).

- au grand air. Aur.

vite. Natr. mar., aur., cupr.,

MATIN (le). Con., kal., ambr., carb. an., tart.

Midi (a). Mur. magn., puls.

MINUIT (après). Nux.

Montant (en). Ars., aur., cupr., merc., stann., zinc.

sen.).

MOUVEMENT (pendant le). Con, phos., stann., ars., veratr., (therm.)

bryon, chin, coloc. dig., fer., plumb., puls., rhs, sep., (sel.).

ODEURS fortes (par les ). Phosi . aguas.)

PARLANT (en). Dros., lam.

PRINTEMPS (au). Aur.

REFROIDISSEMENT ( par ). Ipec.

Repos ( dans le ). Sit.

SALIVE ( par accumulation de ). Sen.

Schofuleux ( chez les ). Ambr.

306 Respiration.

Selle (pendant la). Rhs.

Soir (le). Ars., phos., stann., sulph., chin., con., cycl., tart.

TOUCHER (au) de la gorge. Bell., (lach.).

Respiration.

Toussant (en ). Alum., sil.

— (par le) manuel. Natr. mur., sil., bov.

TRAVAIL (pendant le). Bov., lyc., sil.

# XXVI. TRACHÉE-ARTÈRE ET LARYNX.

#### 1. SELON LES SENSATIONS.

APHONIE. Ant., merc., phos., bell., cann., carb. veg., caust., dros., hep., natr. mur., plat., (dat., hyosc., lach., laur., oleand., rut., tart., veratr.).

ARDEUR. Merc., sen., spong.

Apreté. Caust., phos., puls., sen., stann., sulph., zinc., dros., fer., mang., merc., plumb., sabad., stront., (kal. hyd., men., ol. an.).

CATABBHE. Cham., nux, cann., canth., carb. veg., dulc., hyosc., rhod., verb.

- invétéré. Dulc.

CHALEUR. Ant.

CHATOUILLEMENT. Carb. veg., chain., fer., merc., nux, zinc.

CONTRACTION. Nux, laur., thuj., (calad., ol. an.).

Construction. Puls., mosch., veratr., hell., nux, rhs, spong., sil., (asar., ol. an.).

CRAMPE. Veratr., laur., men.

GROUP. Acon., bell., hep., samb., spong., dros., phos.

- muqueux. Sen: 10m ) mamapaner in all

Douleur simple. Hep.

- incisive. Canth., nitr.

ELANCEMENTS. Phos., canth., dros., thuj.

Engourdissement (sensation d'). Acon.

Enhouement. Carb. veg., dig., dros., hep., merc., natr. mur., nux, phos., puls., sep., spong., stann., sulph., thuj., zinc., alum., bov., calc., canth., caps., caust., cham., cic., cupr., graph., fer., iod., laur., mang., mur. ac., petr., phos. ac., rhs, sabad., samb., sil., stront., (ambr., ang., men., lach., ol. an., par., sen., sel., verb.).

- chronique. Phos., carb. veg., cupr., plumb.

— après la miliaire. Carb. veg., dros.

EPIGLOTTE (paralysie de l'). Acon.

Facilité à avaler de travers. Acon., bell.

FOURMILLEMENT. Arn., carb. veg., stann., sulph., thuj., colch., dros., iod.

GRATTEMENT. Nux, hep., dros.

INFLAMMATION. Ars.

Mucosité (accumulation de ). Ambr., arg., lyc., phos., sen., stann., aur., calc., carb. an., carb. veg., caust., cham., cin., hyosc., natr. mur., mur. magn., nux, petr., plat., plumb., puls., rhs, samb., spig., zinc., (ang., mgs).

— (expuition de). Hep., kal., lyc., phos., plat., calc., carb. an., caust., natr., sep., stann., sulph., thuj., (bism., lam., sel.).

Trachée-artère et larynx.

PHTHISIE. Carb. veg., hep., dros., spong., stann., ars., calc., caust., coloc., con., mang., nitr. ac., sen., sulph., (iod., lyc., merc., nitr., phos.).

PRESSION. Zinc.

PRURIT. Nux.

Sécheresse. Ars., phos., dros., mang., spong., zinc., (par.).

- (sensation de). Caust., natr. mur., stann.

Sensibilité. Bell., lach., sulph.

Sensation de clôture. Mang., verb.

- d'un corps qui ferme. Spong.
- d'écorchure. Arg., caust., sen.
- de faiblesse. Canth.

TENSION. Nitr.

Voix creuse. Dros., bar., cham., laur., sec.

- faible. Ang., phos., puls., ant., canth., ign., laur., op., spong., (par., tab.).
- haute. Stann.
- indocile. Alum., dros., spong.
- timide. Canth., ang.
- tremblante. Canth.
- voilée. Caust., graph., merc., chin., croc., hyosc., sabad., spong.

2. SELON LE TEMPS ET LES CIRCONSTANCES.

Trachée-artère et larynx. 507

Air (au grand). Mang.

BAISSANT ( en se ). Arg.

Couché (étant) sur le dos. Puls.

- horizontalement. Puls.

DINER (après le ). Puls.

Enfants (chez les). Cham.

MATIN (le). Carb. veg., iod., bov., caust., ein., mang., natr. mur., (ol. an., par., sen.).

MILIAIRE (après la ). Carb. veg., dros.

Montant (en ) un escalier. Arg.

Nuit (la). Puls., ol. an.

Parole (par la ). Carb. veg.

Périodique. Nux.

RIANT (en). Arg.

Som (le). Alum., carb. veg., caust., puls.

Toucher (au). Bell., spong., lach.

TOURNANT (en) le cou. Spong.

## XXVII. TOUX.

#### 1. SELON LA NATURE.

- En cénéral. Ars., phos., sil., sep., sulph., amm., bell., cham., con., graph., kal., led., lyc., nux, petr.
- ABOYANTE. Bell., hep., dros., phos., spong.
- Charoullement (avec ). Merc., mur. magn., natr. mur., nux, phos., rhs, sabin., stann., tab.
- CREUSE. Spong., veratr., verb., caust., op., samb., sil., spig., stann., (euph., merc. subl.).
- CHRONIQUE. Bell., dros., iod., ly spong., ign., natr. mur., phos., sep., sulph.
- Consomption (de). Puls., nux.
- COQUELUCHE. Bell., cin., dros., sulph., veratr., ambr., arn., ars., con., dulc., hep., ipec., kal., sep.
- chronique, Sulph., sep.
- nocturne. Con.
- -- pleurs (avec). Arn., bell.
- sanguine. Con.
- COURTE. Acon., bell., caust., coff., rhs, aur., colch., merc., natr. mur., phos., plat., sabad., sulph. ac., (arg., oleand.).
- CRAMPOIDE. Ambr., bell., bryon., con., hyosc., mgs arc., carb. veg., ipec., mur. magn., phos.
- CRACHOTEMENT (avec). Acon., asa, cin., cupr., nitr. ac.
- EBRANLANTE. Croc., phos., puls., rhs, stann., ant., cocc., colch., ipec., mgs arc.,

- merc., nux, sen., oleand., (merc. subl.)
- Enrouée. Hep., asa, cin., samb., yeratr.
- EXPECTORATION ( avec ). Calc., kal., lyc., phos., puls., sil., stann., sulph., tart., ars., bryon., cann., carb. an., caust., kal., led., natr., phos. ac., sabad., sep., sulph. ac., thuj., veratr., zinc., (ambr., ang., arg., bism., mgs).
- amère. Ars., chain.
- aquense. Arg., magn.
- blanche. Arg., phos. ac.
- difficile. Caust., chin., kal., sep., stann., zinc., (euphr.).
- douceatre. Stann., calc., phos.
- épaisse. Ars., par., stann., cann., cham., chin., phos., zinc.
- fétide. Calc., ars., led., mgs aus., stann.
- fréquente. Sen., sep., lyc., laur., stann., asar., euphr.
- globuleuse. Agar., thuj.
- en globules bruns. Phos. maid. goal
- de goût désagréable. Ars., stann.
- granuleuse. Phos.
- grise. Lyc., thuj.
- jaune. Calc., puls., staph., thuj., ars., bryon., lyc., magn., mang., stann., (ang., eug.).
- muqueuse. Sen., sil., stann., thuj., ars., bell., chin., mgs aus., mang., merc., phos., plumb., sep., squill., staph., zinc., (ambr.).
- de mucus transparent. Ars., laur., sil.

Expectoration (avec) sanguinolente, Bryon., arn., fer., phos., sabin., zinc.

- d'odeur de coriza vieux. Sulph.
- purulente. Kal., tyc., natr., sil., stann., staph., calc., carb. veg., dulc., fer., graph., led., magn., natr., phos., phos. ac., sep., (con., sen.).
- putride. Carb. veg., cupr., fer., sep., stann.
- salee. Natr., sep., phos., lyc., magn,, stann., (ambr.).
- sanguinolente (crachats de sang) (hémoptysie). Acon., arn., bryon., dig., hep., merc., phos., puls., amm., ars., bell., carb. veg., chin., con., cupr., daph., dulc., fer., led., lyc., mang., mur. ac., nitr., nitr. ac., pluinb., sep., sil., sulph., zinc.
- chronique. Rhs, sulph. ac., arn.,
- - nocturne. Ars.
- - de sang coagulé. Rhs, arn., nitr. ac.
- de sang vermeil. Rhs, arm, dulc., led., nitr.
- verdatre. Par., stann., thuj., cann., fer., led., mgs aus., mang., puls.
- de sang noir. Nitr. ac.
- Humide sans expectoration. Sep., (eug.).
- Paofonde. Veratr., ars., hep., samb., sil., verb.
- hyose., lyc., mgs arc., merc., nux, phos., plat., rhs, spong., sil., sulph., sulph. ac., acon., alum., amm., ant., aro., ars., hov., caust., chin., coff., colch., con., coloc., croc., daph., ipec., mang.,

mur. magn., nitr., op., petr., phos. ac., rhod., sabad., sabin., sep., sil., spig., stann., tart., yeratr., (euph., guaj., mgs, merc. subl., phell., sen., tab.).

SECHE avec expectoration le matin. Nux, phos. ac.

SUFFOCANTE. Com., hep., ipec., led., mgs arc., op., sil., spig., (ind., phell., tab.).

Toussomement. Ars., coloc., cupr., phos., stront.

- sec. Calc., colch., phos.

# 2. SELON LE TEMPS ET LES CIRCONSTANCES.

Air (par 18) froid. Phos.

ALIMENTS (par des) irritants. Stann.

Apreté (par) à la gorge. Graph., mang., rhod., stront.

- a la poitrine. Nitr.

Ardeur brûlante dans la poitrine. Euph., phos.

BARBE ( comme par une ) de plume dans la gorge. Amm., calc.

Buvant (en). Acon., ars., hep., lyc.

- CHATOUILLEMENT (par) dans la gorge.
  Bryon., calc., con., magn., nux, phos.
  ac., thuj., zinc., (cuph.).
- dans la fossette du cou. Bell., cham.
- dans le larynx. Ang., colch., oleand., sen.
- dans la poitrine. Phos., squill., stann., (euph.).
- dans la région précordiale. Natr. mur., phos. ac.

Jio Toux.

CHEVEU (comme par un) sur la langue. Sil.

Couché (étant). Merc., nux, petr.

— — sur le côté. Par.

CRIS (par). Arn.

DINER (après ). Bell., bryon., op., zinc.

ECHAUFFEMENT (après). Thuj.

ENDORMANT ( en s' ). Mgs arc., merc., vit.

Enfants (chez les). Arn., bell., cham.

FEMMES (chez les) enceintes. Calc., con., phos., sep.

GORGE (comme par de l'eau dans la ). Spig.

HIVER (l'). Cham.

Jev (par le) du piano. Calc.

Journée (pendant la). Calc., stann.

Jour et nuit. Stann., bell., dulc., lyc., natr. mur., spong., sulph.

Inspirant (en). Men.

Inditation ( par ) dans le bas-ventre.

Veratr.

- dans l'épigastre. Guaj.

dans l'estomaci. Bell., sep.

- dans la fossette du cou. Bell.

- à la gorge. Ambr., calc., men., zinc.

- au larynx. Coff., hep., merc., sen., sulph.

- à la poitrine. Bell.; merc., petr.,

— à la trachée-artère. Ars., calc., euph., stann., thuj., arn., bryon., ipec., mgs arc., stront., (arg., asar., kal. hyd.).

LARYNX ( par douleur au ). Calad., hep.

LECTURE (par la ). Nux.

- ( par la ) à haute voix. Mang., phos.

Lir (au). Calc., mgs arc., sep., stain., (par., vit.).

Toux.

MARCHANT (en). Fer., natr. mur.

Marcué ( après avoir ) au grand air. Bryon., mgs arc.

MATIN (le). Iod., lyc., natr. mur., puts., rhs, ant., arn., carb. an., calc., cham., chin., kal., led., magn., nitr., nux, phos., phos. ac., sep., stann., sulph., thuj., veratr.

MÉDITATION (pendant la). Nux.

MIDI (après). Nux, sulph., thuj.

MILIAIRE (après la). Dros.

MINUIT. Bell.

- (avant). Rhs, stann.

— (après). Acon., merc., tart., (mgs).

Mouvement (par le). Nux, fer.

Mucosités ( par ) dans la poitrine. Ars., stann.

Nuit (la). Amm., bar., bell., calc., hyosc., kal., mur. magn., nuw, phos., petr., sulph., arn., ars., caps., fer., graph., ign., ipec., led., mgs arc., mgs aus., merc., puls., sabad., sep., sil., stann., staph., veratr., (ambr., calad., con., daph., eug., mgs).

PAROLE (par la). Cham., mang., phos., stann.

Périodique. Ars.

Pleurs (par les). Arn.

Pression sur l'épigastre. Calad.

PRUNIT ( par ) à la gorge. Con.

Refroidissement (par) de quelques parties. Hep.

- (après). Cham., dulc., sep.

Rècles (pendant la suppression des).

Phos.

Toux.

RESPIRANT (en). Natr. mur.

— — profondément. Cin., dulc., natr. mur., squill.

RESPIRATION ( par manque de ). Cocc., cupr., hep., led., tart., ( guaj. ).

Rire (par le ). Stann.

Rougeole (après la ). Nux.

SCROFULEUX (chez les). Bell., con.

Sécheresse ( par ). Carb. an., mang., petr.

SERREMENT de poitrine ( par ). Cocc.

Sommeil (dans le). Arn., calc., mgs aus.

Soin (le). Calc., hep., mgs arc., nux, rhs, sep., veratr., ars., caps., carb. veg., cham., chin., daph., kal., merc., mur. magn., petr., phos., phos. ac., stann., sulph., (ambr., eug., ind., vit.).

TABAC ( par la fumée du ). Acon., coloc.

TRACHÉE ( par douleur dans la ). Ang., euph., ipec.

Typique. Croc.

VAPEURS (comme des) dans le larynx. Bryon.

# 3. SYMPTÔMES ACCESSOIRES.

AGITATION. Coff., acon., samb.

Anxiete. Acon., coff., hep., cin., rhs.

Apreté à la gorge. Phos., rhod., sen.

Andrew dans la poitrine. Ant., carb. veg., spong?

BATTEMENT dans les artères. Calc.

Bras (douleur au). Dig.

CÉPHALALGIE étourdissante. Nitr.

CHATOUILLEMENT à la gorge. Bryon.

Congestion vers la poitrine. Bell.

CONNAISSANCE (perte de ). Cin.

Consonption. Puls., nux.

Coniza. Ambr., bar., bell., lyc., mgs aus., spong., thuj.

Toux.

311

CRAMPE à la poitrine. Kal.

Cuisson à la poitrine. Phos.

Déchirement à la poitrine. Bell.

Douleur (en général). Ambr., ars., bell., dros., natr. mur., nitr., phos. ac., sulph.

— de coups dans le bas-ventre. Natr. mur., squill.

- de côté. Veratr.

- d'éclatement dans la poitrine. Zinc.

- d'excoriation au cou. Nitr. ac.

— — à la poitrine. Caust., stann., nitr. ac., phos., sil., spong.

- simple au cou. Nitr. ac., phos.

- dans les hypochondres. Ambr., bryon., dros.

— de meurtrissuré à la poitrine. Arn., zinc. I : (no so inché acolibre d'internation)

— — dans le bas-ventre. Nux.

- dans la région précordiale. Thuj.

- sciatique. Bell., caust.

- d'ulcération dans la poitrine. Rat., staph.

- vive a la poitrine. Phos.

Etancements dans la poitrine. Acon., bryon., phos., squill., bell., merc., natr. mur., natr., sabad., zinc.

- sous le sternum. Bell.

- dans l'épigastre. Bryon.

- dans le dos. Merc.

- dans les omoplates. Merc.

312 Toux.

ELANCEMENTS dans les côtés. Acon., bryon., squill., phos.

Ennouement de poitrine. Ambr., phos., sen., thuj.

Epistaxis. Merc. 7 and that at A sure of A

ESTOMAC (coups à l'). Ipec. Il a mozero

- (douleur à l'). Bell., phos.

- comme s'il se tournait. Puls.

ETERNUEMENT. Bell. men .dog .....

ETHANGLEMENT. Carb. veg., hep.

FACE bleue. Veratr.

- pâle. Cin.

- rouge (chaleur). Bell., con.

Faiblesse. Veratr. annh inoccotal d'b -

FERMENTATION du sang. Arn.

FRAYEUR facile. Acon.

From dans la poitrine. Zinc.

Govi douceâtre à la gorge. Amm.

HOQUET. Tab.

Insonnie. Mgs arc., nitr.

LARYNX (picotements au). Phos.

- (douleur d'excoriation au). Bryon.

MALAISE. Rhs.

- avec nausée. Sep.

Mal de ventre. Ars., con., coloc., phos., stann., veratr.

Nausées. Ipec.

PALPITATIONS de cœur. Arn., calc.

PLEURS. Arn., bell., cin., hep.

POITRINE chargée. Bar., natr. mur.

- opprimée. Rhs, rhod.

Pression sur la poitrine. Cor.

RESSION SUT IA POUTTHE. Cor.

RALE. Arg., bell., caust.

RENVOIS. Ambr.

verat.

RESPIRATION difficile. Arn., ars., bell., cin., fer., led., mgs aus., phell., rhs,

Toux.

- entrecoupée. Acon., cupr., amm., calc., cin., ipec., spig., (calad., euphr.).

SALIVATION. Veratr.

SANG (goût de). Amm.

Soir. Samb.

Soubresauts dans le sommeil. Hep., cin.

SUEUR. Ars.

Sufficient (accès de). Mgs arc., op., cou., hep., ipec., led., sil., spig., (ind., phell., tab.).

TREMBLEMENT, Phos. Treple to any parcel

Têre (sensation de coups à la). Ars., ipec., natr. mur., rhs.

- (douleur en général à la). Bell., nitr., phos. ac.
- (douleur d'éclatement à la). Natr. mur., nux, bryon., caps.
- (pression à la). Bryon.
- (sueur à la). Tart.

Vomir (envie de). Puls., dros., hep., ipec., merc., phos. ac.

Vomissement. Bryon., calc., daph., hep., ipec., sep.

- des aliments. Tart.
- bilieux. Chin.

# XXVIII. POITRINE ET RÉGION PRÉCORDIALE.

#### 1. SELON LA SENSATION.

## A. Dans la poitrine.

Angine pectorale. Samb.

Anxiete. Acon., nux, anac., phos., sen., spig., spong., stann., (ol. an.).

Apreté. Ambr., arn., natr. mur.

BATTEMENT. Asa, bell., phos., sil., zinc., caps., mang., (cinn.).

BOULLONNEMENT. Nux, sen., sep., cocc., oleand., puls., plumb., rhod., spong., thuj.

BRULURE. Calc., lyc., merc., sulph., canth., colch., mang., phos., sabad., sen., zinc., (bism., cast., euph., lam., ran., tab.).

CATABRHE. Cann., dulc., verb.

CHALEUR. Nux, cic., puls., (casti, rut.).

CHATOUILLEMENT. Stann.

Compression. Arn., acon., agar., coloc., men., rut.

Concestion. Amm., aur., bell., carb. veg., merc., nitr. ac., phos., puls., rat., rhod., sen., sulph.

Contraction. Cupr., puls., acon., ars., bryon., cocc., dig., fer., samb., spig., stront., staph., (bism.).

Cours. Plat., ang., calc., clem., croc., dulc., mang., mgs arc., mur. ac.

Champe. Ambr., colch., cupr., kal., lyc., sass., caust., dat., fer., hyosc., led., mosch., puls., zinc., (ang., euph.).

CRÉPITATION. Sabin.

Cuisson. Carb. veg.

Déchirement. Colch,, spig., zinc.

DOULEUR de crampe. Plat., veratr., (bism., sen., teucr.).

- d'excoriation. Carb. veg., cic., phos., sen., sep., stann., colch., nitr. ac., sil., staph., tart., (nic., tab.).
- de foulure. Arn.
- incisive. Ang., arg., aur., mur. ac., spig.
- de meurfrissure. Arn., ambr., ang.,
- simple. Phos., coloc., dulc., sep.
- d'ulcération. Puls.

ELANCEMENT. Acon., ant., bryon., calc., cann., dulc., laur., mang., merc., nitr., phos., rhs, spig., squill., stann., sulph., thuj., zinc., arn., asa, aur., bell., bov., camph., cham., chin., colch., daph., graph., hep., led., lyc., natr. mur., petr., plat., sen., sep., sil., spong., valer., (asar., cin., clem., croc., cycl., guaj., natr. sul., nic., rat., rut., tab., verb., viol. tric.).

- dans les côtes. Acon., arn., bryon., calo., phos., sabad., squill., ang., arg., dulc., men., petr., phos. ac., plat., samb.
- dans le côté droit. Merc., ran.
- stann., zinc., (clem., euph., grat.).
- Fer., sit. do , mand . M. A. recessor

ELANCEMENT sous le sternum. Chin., con., arg., ars., euph., mang.

- de dedans en dehors. Asa, chin.

FAIBLESSE. Stann.

- ( sensation de ). Carb. veg., stann., rhs, spong., ( lam. ).

FERMENTATION. Phos.

FOUILLEMENT. Dulc., chin.

FRISSON. Ars., natr.

Froid. Carb. an., sulph., zinc., (rut.).

GROUILLEMENT. (Ind., kal., natr. mur.)
HYDRO-THORAX. Ars., carb. veg., colch.,
dig., sen., amm., dulc., hell., kal.,
lyc., stann., (bryon., chin., op.).

Inquiétude. Bell., sen., staph., thuj.

MARTELLEMENT. Phos.

Pesanteur (sensation de). Acon., bryon., ign., mur. magn., plat., rhm, staph., (cast., tab., therm.).

PHTHISIE. Calc., kal., lyc., nitr., nitr. ac., sil., stann., carb. veg., chin., graph., led., merc., phos., sep., sulph.

- aiguë. Laur., (fer., puls.).
- muqueuse. Sen., stann., dulc., phos.

PLEVRITE. Acon., bryon., squill., phos.

- rhumatismale. Arn., bryon., sabad.

PLÉNITUDE. Lyc., puls., phos., sulph., veratr., (rut., tereb.).

PNEUMONIE. Acon., bryon., squill., phos., bell., cann., merc., phos. ac., rhs, sen., sep., sulph., tart., (cop., dat., nux, op., puls., veratr.).

- nerveuse. Bryon., hyosc., lyc., rhs, bell., chin., con., (dat., op., tart., veratr.).

Poitrine chargée. Bar., bell., natr. mur. Pression. Bell., bryon., colch., lyc., nux, phos., plat., sen., sil., stann., zinc., alum., ambr., anac., ang., cic., cocc., cupr., dig., grat., mgs aus., mur. ac., merc., nitr., phos. ac., plumb., sabad., sabin., squill., staph., stront., thuj., veratr., (asar., cast., lam., ol. an., ran., rat., rhod., rut., teucr., viol.

Pourine.

Pression au côté. Arg., aur., sulph. ac.

- de dedans en dehors. Valer.

od. ).

- dans la région du diaphragme. Bism.
- sous le sternum. Arg., ars., asa, bryon., euph., samb., sulph., vit.

Pulsations. Sen., (cinn.).

Sensation d'adhérence. Euph., thuj., daph., sen.

- d'ascension de quelq. chose de chaud. Phos., plat., (ol. an.).
- de chaleur. Rhod.
- d'écartement. Euph.
- de dilatation. Oleand., stann., thuj.
- comme si quelque chose était fixe. Bar., bell., natr. mur., sep.
- de creux. (Calad.)
- comme si quelque chose remontait. Croc.
- de suppuration intérieure. Phos., ran., staph.
- de vide. Stann., calad., oleand.

Secousses. Con., valer.

Sensibilité. Arg., sen.

Serrement comme par un lien. Stann.

SIFFLEMENT. Ambr.

Tension. Bell., natr. mur., nux, rhod., stann., sulph., colch., fer., lyc., mur. ac., nitr., puls., rhs, spig., verb.

Térébration. Bism., mur. ac., sen.

Poitrine.

Tiralllements. Camph., mgs aus., puls., oleand., sen.

TRESSAILLEMENTS. Squill., valer.

VÊTEMENTS (impossibilité de supporter les).
Sass., stann.

## B. Extérieur de la poitrine.

Andeun brûlante. Bell., iod., mgs, sel.

CRAMPE. Dat., veratr.

CRÉPITATION. Rhm.

DARTRES. Ars., petr.

Démangeaison. Led.

Douleur simple. Dulc., sil.

- de brisure. Arn., phos., ambr., ang.,

- de coup. Cic., ant.

- de foulure. Arn.

- de rhumatisme. Ambr., ran.

ELANCEMENT. Iod., mgs.

Engoundissement. Graph.

ERUPTION. Lyc.

FRISSONNEMENT. Par.

GONFLEMENT. Dulc., sil., sulph.

MILIAIRE. Led.

Peau bleue autour des clavicules. Thuj.

Pression. Ambr., euph., sulph.

PRURIT. Daph., led.

SERREMENT. Plat.

SUEUR. Agar., calc., lyc., nitr., sel.

- rouge. Arn. Man and analysis and a

Tacnes brunâtres. Carb. veg.

- hépatiques. Lyc.

Tension. Euph., iod., phos., stann.

TIRAILLEMENTS. Stront.

TRESSAILLEMENTS des muscles antérieurs des clavicules. Asar.

Poitrine.

ULCERES. Ars., hep., sulph.

## C. Aux mamelles.

CANCEB. Ars., bell., sil., sulph., clem.

CHALEUR brûlante. Phos.

Douleur simple. Clem., coloc., sil.

Dureté. Bell., cham., clem., con., phos., sil., sulph.

ELANCEMENT. Phos., con., natr. mur., (ind.).

ERYSIPÈLE. Carb. an., phos.

Excoriation. Cham.

FLACCIDITÉ. Con., iod.

GONFLEMENT. Bell., calc., con., graph., phos., puls., sabin., sil., sulph., (merc. sub.).

HORRIPILATION. Dig.

INDURATION. Bell., cham., clem., con., graph. (Voy. Dureté.)

Inflammation. Carb. an., carb. veg., con., phos., sil., sulph.

LAIT (écoulement de). Calc.

- (perte du). Calc., cham., dulc., rhs, sulph., zinc.

Nodosités. Carb. an., coloc., graph., lyc., phos., sulph.

PRURIT. Con.

Sensibilité. Graph.

Suppuration. Phos., sil., merc.

Tension. Puls.

ULCERES. Phos., sil., sulph.

310 Pourine.

Brulure. Sulph., cic., graph.

Douleur simple. Graph., sulph.

EXCORIATION. Arn., cham., sep., sulph., calc., graph., lyc.

D. Aux mamelons.

FOURMILLEMENT. Sabin.

Gençunes. Graph., sulph.

GONFLEMENT. Lyc.

Humidité. Lyc.

Inflammation. Phos., sil., sulph.

PRURIT. Agar.

SANG (suintement de). Lyc.

Sensibilité. Graph.

SUPPURATION. Sil., merc.

Vésicules. Graph.

## E. Au cœur et dans la région précordiale.

Anxiete. Ars., veratr., acon., aur., calc., croc., lyc., viol. trio.

Ascension de quelque chose. Croc., tart.

BATTEMENTS augmentés. Dig., dulc., grat.

- intermittents. Natr. mur.
- ondulatoires. Viol. od.
- tremblants. Calc., natr. mur.
- tressaillants. Arn.

BRULURE. Carb. veg., puls.

Congestion. Puls., sulph., (cycl.).

Compression. Arn.

CONTRACTION. Ang., kal.

Cour. Ang.

Douleus simple. Thuj.

ÉLANCEMENT. Caust., zinc., acon., anac., arn., chin., spig., (verb., viol. tric.).

Postrine.

cann., cocc., puls.

Maladies du cœur. Puls., spig., acon., aur., hyosc.

OPPRESSION. Spig., viol. tric.

Palpitations. Acon., caust., colch., dig., kal., mgs aus., nux, phos., plat., puls., sep., staph., sulph., tart., thuj., aur., bell., calc., carb. veg., chin., ipec., iod., lyc., merc., natr., natr. mur.,

- sabad., stront., sulph. ac., zinc., (ang., bism., bov., cop., grat., sec.).
- anxieuses. Acon., ars., natr. mur., plat., puls., calc., dig., lyc., mosch., mang., natr., nitr. ac., nux, oleand., phos., plumb., spig., (viol. od., viol. tric.)
- sans anxiété. Sulph. ac., zinc.
- augmentées par des efforts. Iod.
- après affections morales. Phos.
- étant assis. Ang., phos., mur. magn., par., rhs.
- avec céphalalgie. Bov.
- avec chaleur. Acon., nitr. ac.
- étant couché sur le côté gauche. Ang., natr., natr. mur., puls., tab.
- 'crampoïdes. Staph.
- pendant la digestion. Lyc., camph., nitr. ac., thuj.
- qui ébranlent. Rhs, sass., sen.
- qu'on peut entendre. Camph., spig.
- en montant un escalier. Thuj.
- qu'on sent à l'extérieur. Cycl., dulc.
- en marchant au grand air. Ambr.

Poitrine.

PALPITATIONS pendant le mouvement.
Nitr. ac., par., staph.

par la musique. Staph,

la nuit. Ars., agar., dulc., mur. ac., natr., puls.

- avec oppression. Amm., puls.

avec pâleur de la face. Ambr.

- avant les règles. Spong.

- après les règles. Con.

- sensibles. Sulph., tart., spig.

- après le sommeil de midi. Staph.

- le soir. Ang., nux.

– qui résonnent dans la tête. Bell.

Sensation de chaleur. Croc., phos.

- de faiblesse. Rhs.

- de mouvement. Natr. mur.

— de pesanteur. Cocc., puls.

Térébration. Sen.

TREMBLEMENT. Calc., rhs.

#### F. Dans le creux de l'aisselle.

Déchirement. Bell.

ÉLANCEMENT. Arn.

GLANDES (douleur des). Rhs, sulph. ac.

— (gonflement des). Clem., sulph., hep., lyc., nitr. ac., phos., rhs, sep., staph., sulph. ac.

- (induration des). Carb. an., iod.

- (suppuration des). Hep., nitr. ac., sit., calc., coloc., merc., petr., sulph.

Humidité. Carb. an.

PRESSION. Vit.

Sueur, Sulph., thuj., sel., sep., squill.

Sueur fétide. Phos.

- d'odeur d'ognon. Bov.

# 2. SELON L'HEURE ET LES CIRCONSTANCES.

Poitrine.

017

Air (à l') chaud amélioration. Carb. veg.

- (par l') froid. Bryon., carb. veg., petr.

- (au grand). Lyc.

- - amélioration. Natr. mur.

- (en marchant au grand). Rhs.

ASPIRANT (en). Chin., colch., daph., dulc., plat., squill., (arg., asar., clem., guaj., ind.).

Assis (étant). Phos., spig.

— — fléchi. Dig., rhod., rhs.

BAISSANT (en se). Arg., dig., merc., oleand., sen., sil., spig.

Bras (en levant le). Ant., led.

Bu (après avoir). Con., cupr., veratr., (lam.).

- froid. Thuj.

CHAMBRE (dans la). Anac., rhod., sen.

CHANTANT (en). Stann.

Contusion (après). Con.

CORIZA (pendant le). Phos. ac.

Couché (étant). Asa, bryon., dig., nux, (sec., tart., verb.).

- dessus. Calc., phos.

- sur le dos. Sep.

- - sur le côté. Sabad., sen., stann.

- - sur le côté droit. Sen., stann.

- sur le côté gauche. Lyc., phos.,

sep.

Courant (en). Sil.

Courbant (en se) de côté. Calc.

CRACHATS (par la suppression des). Sep.

DEBOUT (étant). (Euph., phell.)

ÉCHAUFFANTES (par les choses). Stann.

Écrit (après avoir). Amm.

EFFORTS (pendant les). Spong.

Esprit (par contention d'). Sep.

ÉTERNUANT (en). Acon., sen., sil.

EXPECTORATION (après l'). Stann., sep., zinc., (calad.).

EXPIRANT (en). Colch., dulc., oleand.

FEMMES (chez les) en couches. Calc., carb. an., cham., dulc., graph., phos., sep., sil., sulph.

LISANT (en). Chin.

Lit (en se tournant au). Bryon.

MANGEANT (en). Mur. magn.

Mancé (après avoir). Asa, lyc., nux, puls., thuj., veratr., (cinn., lam.).

MARCHANT (en) en général. Nux, fer., hep., led., (cinn.).

- vite. Ang.

- - amélioration. Staph., teucr.

MATIN (le). Carb. veg., dig., lyc., nitr., nux, sen.

Midi (à). Mur. magn.

MONTANT (en). Nitr., sep., zinc.

- un escalier. Acon., nux, ang., rat., ant., sen.

MOUVEMENT (pendant le). Calc., ran. acon., arn., bryon., cann., colch., fer.

acon., arn., bryon., cann., colch., fer. graph., led., nux, phos., sen., sep. spong.

- des bras. Ang., camph., led.

Nausée (avec). Spong.

Nuir (la). Puls., agar., alum., ars., calc., dulc., lyc., nux, petr., rhs, sen., (mgs, merc. subl.).

Parole (par la). Carb. veg., stann., cann., dros., rhs, (lam.).

Pression (par la) dessus. Ang., ant., sen.

Refroidissement (après ). Carb. veg., dulc.

Repos (dans le). Euph., sen.

RESPIRANT (en). Acon., squill., ant., bryon., calc., cann., colch., hep., natr. mur., puls., sabad., sep., spig., stann.

 profondément. Bryon., ealc., natr. mur., plumb., rhs, sil., stann., (phell.).

RIRE (par le). Stann., plumb., nic.

Soir (le). Puls., ars., carb. veg., nux, stann., sulph., (verb.).

Sourre (par la vapeur du). Puls.

TEMPS (par le) humide. Carb. veg.

Toucher (au). Colch., phos., ran.

Toussant (en). Ars., calc., cocc., dros., kal., merc., natr. mur., phos. ac., sabad., sen., sep., sil., stann.

# XXIX. EXTERIEUR DU COU ET DE LA NUQUE.

# 1. EXTÉRIEUR DU COU.

CONTRACTION. Amm., asar.

CRAMPE. Amm., ant., asar.

douleur de). Arn., asar., mgs arc., squill.

CRAQUEMENT. Mgs arc., stann., (nic.).

Déchirement. Carb. veg., merc., zinc.

Douleur simple. Bell.

ÉLANCEMENTS. Hep., spong., tart.

ENFLURE. Iod., phos.

ERUPTION. Lyc., squill.

Excortation (douleur d'). Cic.

- des vertèbres. Con.

EXOSTOSE. Calc.

FOULURE (douleur de). Cinn.

GLANDES (douleur des ). Alum., arn., calc., caust., lyc., merc., nitr. ac., phos. ac., spig.

- (dureté des). Bar., spig.

- (élancements dans les). Merc., bell.,

- (gonflement des). Bell., cham., dulc., graph., lyc., merc., sulph., amm., arn., bar., bov., calc., caust., natr. mur., nitr. ac., petr., phos. ac., puls., sil., spig., staph., thuj. (Voy. Glandes sous-maxillaires.)

- (inflammation des). Bar., bell., kal., nitr. ac.

- (pression sur les). Bell., merc.

- (suppuration des). Bell., sil.

- (tension des). Graph.

- Thyroïde gonflée. Calc., caust., iod.,

spong., carb. an., natr. mur., (kal., lyc., natr.).

GLANDE tyroïde gonflée, dure. Natr.

— — avec étranglement. Iod.

- - fourmillante. Plat., spong.

- - pressive. Spong.

Inquiétube. Thuj.

Muscles (faiblesse des). Arn., kal., par., veratr.

- (gonflement des). Arn.

- (tressaillement des). Ang.

PESANTEUR. Men.

Pression. Calc., cycl., fer., guaj.

RAIDEUR. Bell., croc., cycl., dig., merc., rhs, spong., squill., thuj., veratr., zinc., (men.).

- d'un seul côté. Lyc.

RHUMATISME. Rhod., acon., cycl., merc., squill.

Sueur. Clem., euph.

Tension. Bar., cic., rhod., dig., coloc., rhs, spong., (par.).

TIRAILLEMENT. Rhod., ant., cycl., squill.

TRESSAILLEMENT. Tar.

Ulcère. Ars., lyc.

Veines (battement des). Hep.

- (gonflement des). Thuj.

## 2. A LA NUQUE.

BRISURE. Acon., thuj., veratr.

BRULURE. Bar., merc.

Contraction. Lyc., mosch., puls.

CRAMPES. Ant., nitr.

CRAQUEMENT. Mgs arc., nic., stann.

DARTRES. Caust.

Déchirement. Nux.

Douleur simple. Amm., graph.

Elancements. Bar., stann., tar.

Encourdissement. Plat., spig.

ERUPTION. Hep., petr., staph.

Excornation (douleur d'). Cycl., phos. ac.

FAIBLESSE. Acon., kal., plat., stann., verair., (par.).

FOULURE (douleur de). Sep., (nic. therm.).

GONFLEMENT. Bell., merc. , puls.

LIPOME. Bar., calc.

Lourdeur. Men., nux, par.

OSTÉOCOPE (douleur). Bar.

Pression. Bar., cupr., natr. mur., staph. (ambr., laur., ol. an., tar.).

PRURIT. Staph.

RAIDEUR. Bell., calc., kal., lyc., magn., nitr. ac., plat., rhod., ang., bar., dulc. ign., mang., merc., nux, phos., puls. rhs, sep., sil., spig., spong., squill. staph., thuj., veratr., (cor., guaj., men.).

RHUMATISME. Ant., puls., rhod., staph. (ambr., cycl., men., ol. an.).

STÉATOME. Bar.

TACHES hépatiques. Lyc.

Tension. Mosch., plat., puls., thuj., bar. con., laur., rhs, spong., staph., (ol an., par.).

TRACTION. Mosch., puts., lyc., merc. nitr., nux, rhod., staph., (ambr., ant. cast., cycl., tereb.).

TRESSAILLEMENT. Tar.

Ulcère. Sil.

- (douleur d'). Puls.

# XXX. RÉGION DORSALE ET LOMBES.

1. SELON LES SENSATIONS.

A. Aux omoplates.

Brisure (douleur de). Arn., asa.

BRULURE. Sen., sep.

Contusion (douleur de). Arn.

CONTRACTION. (Guaj.)

DARTRES entre les omoplates. Ars.

Déchirement. Caust., phos., sep., (anac., guaj.).

ELANCEMENTS. Anac., bryon., calc., colch., merc., nitr. ac., phos., stann.

ERUPTION. Phos.

miliaire. Ant., caust.

Exconiation (douleur d'). Coloc., plat.

Lourdeur. Anac.

Pression. Anac., plat., sen., zinc.

PRURIT. Sen.

RAIDEUR entre les omoplates. Ang., kal

Tension, Bar., cie., colch., coloc., zinc

Térébration, Men.

TIRAILLEMENT. Caust., nitr., (sen.).

Ulceration (douleur d'). Cic.

Region aursuie et combes.

B. Dans le dos même.

AMAIGRISSEMENT. (Tab.)

Anxiété. Ars.

Brisume (douleur de). Arn., plat., alum., magn., mgs arc., mgs aus., nux, stront., thuj., veratr., (alum., asar., ran., rut.).

Brulure. Ars., merc., nux, (sel., sen., tereb.).

CRAMPE. Euph., lyc., sep., (viol., tric.).

Contusion (douleur de). Arn.

Constriction. (Guaj., viol. tric.)

DARTRES. Ars.

DECHIREMENT. Ars., aur., caps., cin., colch., lyc., mang., mur. magn., nux, plumb., rhs, sep., sil.

- d'un seul côté. Cin., guaj.

Déviation de la colonne vertébrale. Sulphe, calc., puls., sil.

Douleur simple. Ars., aur., bov., calc., caust., led., lyc., nitr., nitr. ac., petr., phos., puls., sil.

ELANCEMENTS. Acon., bryon., calc., carb. an., colch., dulc., hep., sil., spig., sulph. ac., (alum., asa, cycl., grat., tar.).

Enfantement (douleur d'). Sep.

ERUPTION. Squill.

FAIBLESSE. Agar., petr.

FLEXION. Sulph.

FOUILLEMENT. Acon., dulc., rat.

FOULURE (douleur de). Calc., mgs aus., mur. ac., valer.

FOURMILLEMENT. Arn., sec., acon., natr.

FRISSONNEMENT: Sep., spong., stann., staph., (guaj.).

FROID. Laur., sec.

FURONCLE. Thuj.

Insensibilité. Sec.

Lumbago. Calc., dulc., led., puls.

- comprimant, Con.

-- élançant. Dulc., sil., sulph. ac.

- déchirant. Chel.

- fouillant. Dulc., rut.

- pressif. Chel., con., nitr.

- tiraillant. Puls., stront.

Muscles (faiblesse des). Agar., petr.

OPISTHOTONOS. Ang., bell., cham., cic., dat., ign., stann.

PESANTEUR. Ambr.

PINCEMENT. (Viol. tric.)

Pression. Dulc., con., mur. ac., nitr., thuj., veratr., (ambr., aur., chel., euphr., sen.).

PRURIT. Daph., (sen.).

RAIDEUR. Caust., sep., bov., kal., led., nux, puls., sulph., thuj., (ang.).

- d'un seul côté. (Guaj.)

RHUMATISME. Ambr., puls., ran., rhs, tart., veratr., zinc., (ol. an.).

REFROIDISSEMENT (douleur de). Dig.

Reins (chaleur dans les). Tereb.

- (élancements dans les). Canth., chin., zinc., (cycl.).
- (douleur d'écorchure dans les). Zinc.
- (douleur incisive dans les). Clem.
- (inflammation des). Canth., (bell., cann., cocc., coloc., chin., hep., merc., sulph., thuj.
- (mal de). Calc., canth., bell., cann.,

cocc., coloc., chin., hep., merc., nitr., sulph., thuj., (clem., cycl., sel., tereb.).

REINS (palpitation dans les). Canth.

- (pression dans les). Thuj.
- (tiraillements dans les). Tereb.
- (tressaillement dans les). Canth.

Sensation d'une cheville enfoncée. Arn., (lach., plat.).

Sueur. Lyc., sep.

TACHE dartreuse rougeâtre. Sep.

Térébration. Acon., thuj.

Tiralllement. Carb. veg., lyc., merc., sulph., (ars., caps., cham., cin., dat., dig., kal., mosch., sil., stront., sulph., thuj., (ambr., rat., sen., tereb.).

TRESSAILLEMENT. (Mgs.)

VERTÈBRES (gonflement des). Sil.

#### C. Dans le sacrum.

Brismment. Acon., ang., arn., hep., nux, alum., arg., cin., dig., magn., plat., stront., thuj., veratr., (men.).

BRULURE. Bor., mgs aus., phos., sep.

CRAMPE (douleur de). Plat.

- (tiraillement de). Sil.

CONTUSION (douleur de). Arn.

DÉCHIREMENT. Ars., sep.

DOULEUR simple. Bar., bor., kal., nitr., petr., phos., puls., sulph., bryon., calc., caust., cham., daph., lyc., merc., nitr. ac., rhod., sep., staph., zinc.

Enfantement (douleur d'). Croc., kal., (kal. hyd.).

Excortation (douleur d'). Colch.

Faiblesse. Merc., petr.

FOURMILLEMENT. Phos. ac.

Froid. Laur.

Incisive (douleur). Natr. mur.

PARALYSIE. Natr. mur.

Pression. Caust., mgs aus., sabin., veratr.

megion aorsale el lomoes.

Pulsation. Natr. mur.

RAIDEUR. Bryon., acon., petr., puls., rhm, rhs, staph., thuj.

- (douleur de). Acon., sel.

RHUMATISME. Veratr.

Tension. Puls.

Térébration. Acon.

#### D. Au coccix.

BRULURE. Carb. an.

Douleur simple. Ign.

Engourdissement. Plat.

PRURIT. Bor.

Unine (douleur pendant l'émission de l'). Graph.

# 2. SELON L'HEURE ET LES CIRCONSTANCES.

Air (au grand). Sabad.

Assis (étant). Bar., caust., natr., sil., (men., tart.).

- (après avoir été long-temps). Led., phos.

BAISSANT (en se). Lyc., nitr., veratr., (chel., mgs, men.).

CHALEUR (pendant la). Rhs.

Сните (après une). Kal.

Couché (étant). Sil.

Région dorsale et lombes.

Couché (étant) dans le lit. Staph., (mgs).

- sur le dos. Euph., ign.

- - sur le côté. (Mgs.)

Debout (étant). Agar., petr.

Feu (près du) amélioration. Cinn.

FROID (par le). Rhs, sabad., (mgs).

Humidité (par l'). Rhod.

Lir (en se levant de son). Natr. mur., thuj.

- - amélioration. Ang.

- (en se tournant dans le). Nux, hep.

MATIN (le). Ign., natr., natr. mur., nitr., sulph. ac., thuj., (ang., euph., mgs, sel.).

MARCHE (pendant la). Sulph., agar., rhm.

MOUCHANT (en se). Dig.

Region dorsale et lombes. 323
Mouvement (pendant le). Caust., cinn.,
mang., mgs aus., rhs.

mang., mgs aus., rhs. Nuir (la). Calc., cham., cinn., dulc.,

hep., lyc., magn., nux, (ang.).

REDRESSANT (en se). Lyc., veratr.

REFROIDISSEMENT (par le). Nitr. ac.

Repos (dans le). Dulc., mang., mgs aus., nitr., staph.

RESPIRANT (en). Acon., spig.

— — profondément. Carb. an.

RENVERSANT (en se). Con., mgs arc., plat., (chel.).

Soir (le). Natr., sep.

Séant (en se levant de son). Caust., led., sil., staph., sulph.

Toucher (au). Carb. an., colch., sil.

Toussant (en). Nitr., nitr. ac.

Voiture (en allant en). Calc.

# XXXI. EXTRÉMITÉS.

(Comparées aux rubriques XXXII et XXXIII.)

# 1. SELON LA SENSATION.

## A. Membres supérieurs.

Boutons suppurants. Thuj., sep., sil.

Brisement à l'avant-bras. Arn., croc., ang.

- à l'humérus. Guaj.

CHALEUR aux mains. Carb. veg., fer., led., lyc., phos., stann., staph.

- aux doigts. Magn.

- brûlante dans les bras. Agar., alum., led., phos., puls., rhs, sep., (mgs).

CHALEUR brûlante dans les aisselles. Rhs, tab.

- dans les coudes. Alum.

— — à la main. Phos., rhs, sec., sep., stann.

- au métacarpe. Natr.

— dans les paumes des mains. Stann., lyc., petr., phos., sep.

- dans les doigts. Croc., sil., sulph., alum., kal., mosch., rhs.

Convulsions. Bell., mosch., op., sec., bryon., cham., cupr., nux, plumb., sabad., squill.

Contraction des bras. Lyc.

- des doigts. Graph., lyc., caust., chin., cin., colch., nux, merc., phos., (ambr., kal. hyd., men.).
- CRAMPES aux bras. Dat., lyc., mosch., nitr., plumb., ran., sec., (men.).
- à la main. Coloc., mosch., (ambr., cin., euphr., men., therm.),
- aux doigts. Lyc., arn., cocc., coff., coloc., nux, phos., sabad., stann., tart., (euphr., men.).
- aux pouces. Agar., cann., mur. ac.
- (douleur de). Oleand., plat., aur., sil., (anac., ang., euphr., rut.).
- CRAQUEMENT dans les articulations du bras. Merc., tart., thuj.
- DECHIREMENT du bras. Chin., cinn., colch., sil., sulph., thuj., agar., bell., calc., cocc., dig., kal., lyc., phos., tart., (ind., mang., mgs, men., ran.).
- dans l'aisselle. Bell., kal., magn., rhs, therm., thuj., lyc., mang., merc., (cast.).
- dans l'humérus. Ars., merc., sab., tart., (cast.).
- dans l'avant-bras. Carb. veg., dig., sabad., zinc., (ambr., bism., guaj., ind.).
- dans les os du bras. Chin., (rhod., teucr.).
- dans les mains. Lyc., petr., zinc., (men., sel.).
- dans les doigts. Chin., colch., lyc., staph., sulph., zinc., (ambr., lam., men., teucr.).
- au-dessous des ongles. Bism.

Extremites.

DÉCHIREMENT dans les articulations des bras. Amm., lyc., nitr., teucr.

- de l'épaule. (Ambr.)
- - du coude. Lyc., ambr.
- du métacarpe. Aur., carb. an., zinc., (bism.).
- des doigts. Chin., amm., aur., lyc., nitr.

DARTRES au bras. Bov., con., graph., mang., merc., natr. mur., phos., sil.

- à l'avant-bras. Alum., con., mang., merc.
- aux mains. Bov., dulc., merc., ran., staph.
- aux doigts. Ran.

Douleus simple au bras. Bar., calc.

- à l'articulation du bras. Amm., ign.
- a l'os brachial. Lyc., ign., diad.
- aux fléchisseurs. Asa.
- au métacarpe. Amm., (lach.).
- de contusion, de coup. Arn., plat., oleand.
- de foulure au bras. Ign., therm.
- a l'épaule. Ign., thuj., (ambr., asar., mgs).
- — à l'humérus. Thuj.
- a la main. Amm., arn., bov., bryon., caust., hep., sulph., (mgs).
- \_ aux doigts. Natr. mur.
- incisive au bras. Anac.
- aux mains. Natr.
- paralytique au bras. Calc., chin., colch., natr. mur., plat., sil., veratr., zinc., bell., dig., dulc., ign., natr., puls., rhs, rhod., sass., stann., staph.,

(ang., cylc., ol. an., par., tab.).

- Douleur paralytique à l'humérus. Nux.
  - - al'avant-bras. Acon., bov., (bism.).
- aux mains. Acon., merc., (ang., tab.).
- aux doigts. Chin., (asar.. cycl.).
- à l'articulation des épaules. Nux, stann., valer., (ambr., euph.).
- - du coude. Valer., (ang.).
- - des mains. Bov., kal., merc., (asar., bism., cycl.).
- des doigts. Aur., par.
- — du bras en général. Boy.
- ELANCEMENTS dans les bras. Cocc., dros., dulc., phos., sabad., sep., thuj., (guaj., viol. tric.).
- dans l'épaule. Led.
- dans l'humérus. Cocc., led., phos., ran.
- dans l'avant-bras. Ant., caust., sil.
- dans les mains. (Lach.)
- dans les doigts. Bryon., caust., thuj.
- dans l'os brachial. Dros.
- dans les articulations du bras. Dros., nitr., thuj.
  - — de l'épaule. Cocc.
- — du métacarpe. Natr. mur., sep., sil., squill.
- ENGELURES. Agar., carb. an., croc., petr., puls., sulph., mgs aus., nux, nitr. ac., phos., rhs, stann., staph., sulph. ac.
- Encourdissement des bras. Croc., graph., mur. magn., nux, petr., sep., sil., thuj., ambr., bar., cham., kal., led., lyc., plat., phos. ac., sulph., veratr.
- de l'humérus, Kal.

- ENGOURDISSEMENT des mains. Croc., cocc., carb. an., lyc., nux, puls., (ambr., lam.).
  - des doigts. Natr. mur., bar., calc., caust., phos., spong., staph., sulph.
- Envies. Natr. mur., rhs, stann., sulph.
- Exurtion aux mains. Hep., carb. veg., dulc., mur. ac., natr., rhs.
- aux métacarpes. Hep.
- aux doigts. Mur. ac., rhs, (lach.).
- miliaire. Merc., (calad., cinn., sel.).
- vésiculaire au bras. Ant., spong.
- aux doigts. Ran., sep., kal., sil.
- aux mains. Sep., (mgs).

ÉRYSIPÈLE aux bras. Rhs.

- à l'humérus. Bell.
- à l'avant-bras, Ant., merc.
- -- aux mains. Graph., hep., rhs.
- aux doigts. Lyc., magn., rhod., spong., thuj.

Exconiation entre les doigts. Graph.

Exostose. Daph., dulc., rhs, sil., sulph.

FAIBLESSE des bras. Calc., kal., natr. mur., nux, petr., plat., rhod., sep., sulph., (anac., ol. an., par., sec.).

- et des mains. Ars., bov., calc., natr. mur., kal., lyc., sulph., acon., anac., arn., cic., colch., kal., nux, nitr., rhs, rhod., sep., sil., (natr., sulph., rut., tab., therm.).
- de l'articulation du coude. Sulph.

FATIGUE (douleur de). Veratr.

FOULLEMENT. Diad., natr. mur., rhod., thuj.

- dans les os du bras. Diad., thuj.

FOURMILLEMENT aux bras. Arn., bell.,

326Extremités. caps., mgs aus., rhod., sabad., sec.,

( mgs, ol. an. ).

FOURMILLEMENT des doigts. Acon., croc., natr. mur., calc., colch., magn., mgs aus., rhod., sil., spig.

- des mains. Arn., bar., mur. ac., (lam.).

FRÉMISSEMENT. Asa.

FROID aux bras. Bell., dulc., led., op., plumb., rhs, sec., ipec., thuj.

aux mains. Acon., bar., bell., daph., dig., mgs arc., nitr., nitr. ac., nux, petr., phos., ran., squill., tart.

- aux doigts. Mosch., tart., (chel., tar.).

FURONCLES aux bras. Zinc.

GANGLION. Sil., (amm., phos. ac.).

GANGRÈNE des doigts. (Sec.)

GERCURE aux mains et aux doigts. Sulph., alum., aur., calc., hep., natr. mur., nitr. ac., petr., sass., (merc.).

GONFLEMENT de l'aisselle. Acon.

- des bras. Bell., ars., dulc., Tyc., merc., rhs.

- de l'humérus. Sep.

- des avant-bras. Ant., merc.

- de l'os brachial. Daph., dulc., rhs, sil., sulph.

- du périoste. Aur., dig., bryon.

- des mains. Bell., hep., sec., stann., bryon., calc., phos., rhs, spong.

- des doigts. Lyc., magn., thuj., merc., nitr., spong., sulph.

- de l'articulation du coude. Bryon.

- des doigts. Lyc., merc.

- (sensation de). Bell.

Extrémités. GOUTTE. Bryon., hep. . lyc., merc., petr.,

rhod., sass., rhs, sabad., spig.

- à l'avant-bras. Merc.

- à la main. Hep., lyc., sabad.

- aux articulations des doigts. Petr., rhod., ant., bryon., hep., lyc., rhs, sass., spig.

- noueuse au bras, Calc., dig.

- aux doigts. Graph., lyc.

- aux articulations des mains. Calc., rhod., cic.

- des doigts. Calc., dig., rhod.

Inflammation du bras. Sep.

- du dos de la main. Mgs arc. - des doigts. Magn., puls., nitr. ac.,

(con., kal., lyc., natr. mur.).

Insensibilité. Bell., lyc., rhs, sec. - du bout des doigts. Colch., spong.,

staph., tart. Mont des doigts. Calc., cic., phos. ac., tart., thuj., (chel.).

- des mains. Calc., con., lyc., thuj., zinc.

Muscles ( relachement des ). Carb. veg.

- (tressaillement des). Asa, tart., (tar., teucr.).

Nodosités.Magn. 🛴

ONGLES bleus. Dig., chel.

- ( difformités des ). Graph.

- douloureux. Ant.

- (lenteur de croissance des). Aut.

- jaunes. Con.

- raboteux. Merc.

PARALYSIE des bras. Calc., nux, sil., stann., cocc., dulc., op., plumb., rhs, sec., veratr., (arg.).

- de l'humérus. Agar., chel.

Extrémités.

Paralysie de l'avant-bras. Sil.

- des mains. Sil., zinc., arg., cann.
- du métacarpe. Kal.
- des doigts. Calc.
- Peau (desquammation de la) des mains. Amm., bar., phos., sep., sulph.
- des doigts. Phos., phos. ac., sep.,sulph.
- bleue des mains. Amm.
- ( sécheresse de la ) des mains. Lyc., bar., bell., natr. mur., sabad.
- Pendiculations. Amm., bell., sabad., (verb.).
- Périostose. Aur., dig.
- ( douleur de ). Asa, staph., ( phos. ac. ).
- PESANTEUR des bras. Natr. mur., puls., cic., mgs arc., mgs aus., rhod., stann., tart., (ang., par.).
- des épaules. Thuj.
- de l'articulation des épaules. Puls.
- des avant-bras. Croc.
- des mains. Mgs arc., nitr., therm.
- Pouces fléchis. Bell., cham., hyosc., ign., viol. tric.
- Pression dans les bras. Puls., stann., veratr., aur., bell., dulc., led., natr. mur., staph., sulph., (anac., arg., cycl., rut.).
- dans les épaules. Bell.
- dans l'humérus. Aur., staph., caust., (vit.).
- dans l'avant-bras. Aur., camph., plat., (bism.).

Extremites. 327
Pression dans l'os brachial. Anac., kal.

- dans les doigts. Cycl.
- dans l'articulation de l'épaule. Led.
- - du coude. Camph.
- — de la main. Cycl., bism.
- PRURIT aux bras. (Sel.).
- aux doigts. Puls., ran.
- dans la paume des mains. Anac., mur. ac.
- Pulsation. Sep., thuj., (bor., tar.).
- aux doigts. Teucr.
- RAIDEUR arthritique des articulations des doigts. Carb. an., graph., lyc.
- des bras. Caps., cham., lyc., nux, rhs, sass., (men.).
- des doigts. Carb. an., graph., lyc., natr. mur., petr., sil., spong.
- de l'articulation de l'épaule. Staph., thuj.
- - du coude. Kal., (ang.).
- de la main. Kal., lyc., puls., rhm, sabad., sep., staph., therm.
- - des doigts. Lyc.
- RHUMATISME douloureux. Ant., ign., merc., rhod., rhs, sulph., tart., valer., veratr., bell., bryon., dulc., nux, puls., squill., thuj.
- Rides aux bouts des doigts. Ambr., phos. ac.
- RONGEMENT. Dros.
- aux bras. Plat.
- aux mains. Bar., plat.
- au-dessous des ongles. Alum.

SECOUSSES. Cic., op.

Extremites. extremues. 328Sensation d'augmentation de volume. TENSION dans l'articulation du métacarpe. Carb. veg. Diad., nitr. - des doigts. Magn., puls. - de décollement des chairs. Rhs. sulph., thuj.

- de gonflement de l'épaule. Bell.

- de plénitude dans la main. Caust. - deraideur. Caust., petr., plat., (arg.).

- de la main. Asa.

Striesscarlatineuses à l'avant-bras. Euph.

Sueun dans les aisselles. Sulph., thuj., phos., sep., squill., (bov.).

- aux mains. Natr. mur., nux, petr., thuj.

- à la paume des mains. Con., dulc., acon., merc., mgs arc.

Taches bleues à l'avant-bras. Sulph. ac.

\_ \_ à la main. Bar.

- brûlantes. Phos. ac.

- brunes sous le bras. Thuj.

- au coude. Sep.

\_ \_ au métacarpe. Petr.

- hépatiques. Lyc.

- jaunes aux doigts. Tart.

- rougeâtres aux doigts. Cor.

- rouges. Phos. ac., sab.

- - aux aisselles. (Tab.)

\_ aux mains. Sabad., stann., (mgs).

Tension. Mang., nux, rhs.

\_ à l'avant-bras. Ant.

- dans l'articulation de l'épaule. Boy., euph.

- du coude. Puls.

Térébration dans les articulations du bras. (Rhod.) TIRAILLEMENT dans les bras. Nux, calc.,

caust., clem., lyc., magn., mang., merc., puls., sil., staph., sulph., (cinn., lam., men., plat.).

- dans l'épaule. Mang., nitr.

- dans l'humérus. Ars.

- dans l'avant-bras. Ant., croc., rhod., (ang., cycl.).

- dans les mains. Magn., rhod., (ang., euph., men.). - dans l'os brachial. Rhod., thuj.,

valer., (tereb., teucr.). - dans le périoste. Thuj.

- dans les articulations des bras. Rhod. (clem., mgs).

- - du coude. Sulph.

- des mains. Sulph., mosch. (asar., cycl.).

- des doigts. Sulph., caust. mgs aus.

TREMBLEMENT des bras. Sil., rhs.

- des mains. Phos., amm., bell., cocc. colch., iod., kal., laur., led., sadad. samb., sass., spig., sulph., thuj., zinc. (bism., natr. sul., tab., therm.).

- des doigts. Rhs.

TRESSAILLEMENT des bras. Chin., cic. thuj., arn., bryon., mgs aus., (men. ran.).

- des mains. Bell., stann.

- des doigts. Chin., cic., cham., cin., cocc., plat., staph., (men.).

#### Extremites.

— aux mains. Ars., sep., sil.

Ulcere aux bras. Rhs.

- sur le dos des mains. Sep.
- aux doigts. Ran., sep., carb. veg., sil.
- aux articulations des doigts. Sep.
- aux ongles. Caust., hep., mgs arc., mgs aus., sil., sulph., con., merc., puls., sep.
- (douleur d') au bras. Rhs.

VARIOLES. Ars., rhs, sec.

- Veines (gonflement des). Puls., thuj., amm., arn., (ind.).
- Verrues aux bras. Calc., sep., ars., caust., dulc., natr., nitr. ac., sil., sulph.
- aux doigts. Lyc., petr.
- à la main. Calc., dulc., natr. mur.
- à l'avant-bras. Sil.
- Vésicules rongeantes aux mains et aux doigts. Nitr. ac., magn., sil.

## B. Membres inférieurs.

- Andeun brûlante aux extrémités inférieures. Kal, led., phos.
- à l'articulation coxo fémorale. Bell.,
   rhs.
- aux cuisses. Euph.
- aux genoux. Tab., tar.
- aux jambes. Lyc., tar., (agar.).
- à l'articulation du pied. Euph., natr.
- aux pieds. Ars., calc., cocc., dulc., graph., lyc., sec., sep., squill.
- au dos du pied. Puls.
- à la plante du pied. Puls., calc., croc., lyc., (ambr., tab.).

Extrémités.

329

Andeur aux orteils. Ant., arn., dulc., (tar.)

- ARTHRITIQUES (affections). Puls., rhs, rhod., ambr., arn., led., sabin.
- à la hanche. Bell., coloc., rhs, puls., canth., dig., euph.
- aux jambes. Rhod.
- aux pieds. Ambr., rhod.
- aux orteils. Arn., led., ( ambr., sabin.).

BATTEMENT dans les jambes. Sep.

- dans les pieds. Mgs aus.
- Boutons aux cuisses. Clem., kal., thuj., (sel.).
- aux articulations du genou. Thuj.
- qui suppurent. Nitr. ac., sep., sil., thuj.
- CARTE. Asa, sil., calc., con., daph., merc., nitr. ac., sep., sulph.
- CHALEUR aux pieds. Puls., acon., petr., phos., staph.
- CHATOUILLEMENT dans la plante des pieds. Sit.
- CLAUDICATION spontanée. Coloc., rhs, bell., lyc., puls., zinc.
- Convulsions. Mosch., op., plumb., sec., squill., cupr., hyosc., nux.
- Contraction des extrémités. Hyosc., sec., sil., mgs aus.
- des pieds et des orteils. Con., lyc., tart., (euph.).
- ( douleur de ). Caust., lyc., rat.
- - dans les mollets. Lyc.
- Cors. Ant., lyc., sep., calc., petr., phos., sil., staph., sulph.
- douloureux en général. Cale., caust., natr. mur., sulph.

30	Extremites.				
OBS	enisants.	Calc.	lvc.	mgs	arc.,

Coas cuisants. Calc., lyc., mgs arc., rhs, (ambr.).

- brûlants. Rhs, (mgs).
- enflammés. Sep.
- -- douloureux comme par compression. Sulph., ant.
- élançants. Bov., hep., lyc., sil., sulph., (mg3).
- Courbatures des membres inférieurs.

  Arn., tart., veratr., carb. veg., sil.,
  spig., spong., valer., (rut.).
- des cuisses. Hep., men., acon., camph., caust., merc., staph., (guaj.).
- des jambes. Caust., merc., (croc.).des pieds. Arn., (arg.).
- de l'articulation coxo-fémorale. Acon., mgs arc.
- du genou. Ars., staph.
- CRAMPES des extrémités inférieures. Calc., graph., sil.
- aux fesses. Graph., rhs.
- aux cuisses. Rhs, (cycl., ran.).
- au genou. Led.
- aux mollets. Graph., hyosc., nitr. ac., nux, sel., sil., alum.. ambr., anac., ars., bov., carb. veg., cham., coff., led., lyc., natr., rhod., rhs, sec., sep., staph., (euphr.).
- aux pieds. Lyc., amm., caust., graph., sulph., (ran.).
- aux talons. Amm., calc., coff., plumb., staph., sulph., (chel., eug., sel.).
- CRAQUEMENT à l'articulation du genou. Bryon., camph., cocc., nux, petr., thuj., (ran.).
- \_\_ i du pied. Camph., petr., thuj.

CREVASSES. Alum., aur., cale., petr., sulph., zinc.

Extremues.

- DARTRES aux extrémités inférieures. Bov., graph., lyc., merc., petr., staph., zinc.
- à la hanche. Sep., (nic.).
- aux cuisses. Clem., graph., merc., zinc.
- aux jambes. Lyc., zinc.
- aux jarrets. Ars., natr., natr. mur., petr., sulph.
- aux chevilles. Natr., natr. mur., petr., sulph.
- entre les orteils. Alum., graph.
- DÉCHIREMENT dans les extrémités inférieures. Agar., chin., colch., kal., lyc., zinc., ambr., ars., calc., canth., nitr. ac., sil., therm.
- dans la hanche. Merc.
- aux cuisses. Aur., chin., rhs, zinc., alum., camph., cham., dulc., merc., (clem., euph.).
- aux genoux. Arn., bell., led., lyc., sil., zinc., chin., mgs aus., merc.
- aux jambes. Croc., lyc., spong., staph., zinc.
- aux pieds. Chin., colch., lyc., sulph., zinc., (bism., vit.).
- aux articulations du pied. Arn., zinc.
- au calcanéum. Arn.
- aux talons. Coloc., cupr.
- aux orteils. Aur., chin., colch., kal., (ind., vit.).
- au-dessous des ongles. Camph.
- dans les os. Agar., chin., merc., rhod.
- Douleur incisive dans les extrémités inférieures. Graph., natr.

Douleun incisive dans les pieds. Natr.

- paralytique. Carb. veg., sep., stann.
- - aux cuisses. Ars., carb. veg., colch., dros.
- — aux jambes. Nitr., (eug.).
- aux pieds. Oleand., (ang., ol. an., tab.)
- aux orteils. Aur.
- — aux articulations coxo-fémorales.

  Dros.
- — du genou. Mosch., valer.
- simple aux extrémités inférieures. Calc., lyc., nitr. ac., sulph.
- aux cuisses. Nitr. ac., merc.
- aux genoux. Cann., nitr. ac., therm., zinc.
- aux jambes. Acon., bell.
- au calcanéum. Agar., calc., diad.
- aux talons. Ars., lyc.
- aux fesses. Sulph.
- aux os. Merc., oleand., sulph., (diad.).
- — à l'articulation coxo-fémorale.

  Rhs, lyc., phos.
- - du pied. Acon., phos., ran.
- - en général. Phos., sulph.
- Enfants (les) apprennent tard a courir.

  Calc.
- ENGELURES. Agar., carb. an., croc., nitr. ac., petr., puls., sulph., thuj., mgs aus., nux, phos., stann., staph., zinc.
- ENGOURDISSEMENT des extrémités inférieures. Ambr., graph., lyc., nux, petr., bov., cocc., calc., carb. veg., graph., kal., led., merc., rhm, rhs, sec., sep., sil., spong., thuj.
  - des cuisses. Graph., plat.

Engoundissement des jambes. Sil.

- des pieds. Arn., cocc., nux, oleand., plat., sep., sil.
- des plantes des pieds. Sep., oleand.
- des orteils. Graph., phos.
- ELANCEMENTS aux extrémités inférieures. Merc., sulph., thuj., bryon., coloc., dros., led., (grat.).
- aux hanches. Bell., rhs, sil., (kal. hyd., merc. subl.).
- aux cuisses. Bryon., cale., mang., rhs, (arg., tar.).
- aux genoux. Puls., ant., bryon., bov., sil., staph.
- aux jambes. Ant., chin.
- aux pieds. Calc., carb. veg., natr., nitr. ac., sulph., (grat.).
- au dos du pied. Puls.
- aux plantes des pieds. Puls., natr., tar.
- aux orteils. Carb. veg., sil., zinc., (ran.).
- aux articulations. Sil., thuj.
- - du pied. Arn., bov., rhs, sil.

Enysieere aux jambes. Sulph., zinc.

- aux pieds. Arn.

ERUPTION. Euph.

- vésiculaire. Ant., clem.
- - sur le dos du pied. Ars.

Excontation entre les cuisses. Sulph., caust., cinn., graph., kal., rhod.

- entre les orteils. Graph., lyc.
- (douleur d') entre les cuisses. Sulpha
- — entre les orteils. Ars., mgs arc., (cycl., ran.),
- au calcanéum. (Ran.)

Extremités.

FAIBLESSE des extrémités inférieures.

Anac., chin., nux, sec., oleand., rhod.,
thuj., (ol. an.).

- aux cuisses. Chin., acon., ars., croc., merc., mur. ac., oleand.
- aux genoux. Chin., plat., led., nitr. ac., nux, sulph.
- aux jambes. Merc., nitr., oleand., (euph.).
- aux pieds. Oleand., ot. an., puls., tab. (comp. Lassitude.)
- FATIGUE. Arn., graph., lyc., nitr. ac., phos., puls., sulph., verb.
- aux genoux. Puls., con.
- aux plantes des pieds. Croc.
- FOUILLEMENT. Rhod., diad.
- FOULURE (facilité à éprouver une). Natr., natr. mur.
- (douleur de) aux extrémités inférieures. Arn., carb. veg., caust., natr. mur., oleand., rhs, (mgs).
- - aux hanches. Caust., natr. mur., (ang.).
- aux pieds et aux articulations des pieds. Rhs, zinc., bar., bryon., carb. veg., caust., dros., sulph.
- - à l'articulation du genou. Caust.
- — aux orteils. Zinc.

FOURMILLEMENTAUX extrémités inférieures.

Plat., rhod., sec., bov., sabad.

- aux jambes. Kal.
- aux pieds. Arn., caps., croc., sep.
- aux orteils. Colch.
- From aux extrémités inférieures. Bell., nitr. ac., sep., ipec., led., nux, op., plumb., rhod., sec.
- aux pieds. Caust., con., dig., graph., sep., sil., sulph., acon., bell., ipec.,

Extrémités.

kal., laur., lyc., merc., natr., nitr. ac., phos., plumb., sass., squill., stann., stront., zinc., (ambr., merc. subl.).

Froid (sensation de). Merc.

Fungus au genou. Sil., ant.

FURONCLES aux cuisses. Clem., magn., sep.

- aux fesses. Hep.
- aux jambes. Mang., nitr. ac.
- aux jarrets. Sep.

Gonflement des extrémités inférieures. Sil., sulph., ars., calc., carb. veg., dulc., led., lyc., merc., sep.

- des cuisses. Merc.
- des genoux. Calc., sil., cocc., hep., iod., lyc., led., puls., sulph.
- des jambes. Acon., colch., merc., puls., arn., dolc., graph., natr.
- du tibia. Phos.
- du tendon d'Achille. Zinc.
- des articulations. Arn., asa, calc., lyc., sulph.
- autour des malléoles. Arn., asa, calc., hep., lyc., mang., stann.
- des pieds. Acon., ars., caust., lyc., puls., sil., arn., bryon., calc., carb. an., chin., cocc., con., fer., graph., led., natr., natr. mur., merc., phos., sep.
- du métatarse. Merc.
- du calcanéum. Merc.
- du dos du pied. Merc., puls., staph., thuj.
- des plantes des pieds. Calc., lyc., natr., petr., puls.
- des orteils. Carb. veg., thuj., arn.,

carb. an., led., sulph., zinc., (amm.).

GONFLEMENT des os. Daph., dulc., rhs, sil., sulph.

GOUTTE. Arn., led., sab., veratr.

HORRIPILATION aux jambes. Kal.

Inflammation aux cuisses. Natr., sil.

- au genou. Puls.
- aux jambes. Acon., colch.
- aux tendons d'Achille. Zinc.
- aux pieds. Acon., arn., carb. an.
- au dos du pied. Puls.
- aux orteils. Puls., thuj., carb. an., zinc.

Insensibilité. Arn., lyc., nux, phos.

Anac., ars., carb. veg., caust., croc., merc., plat., sep., sil.

graph., lyc., mgs arc., natr., phos., rut., sass., sep., stann., thuj., valer., (ang., cast., ind.).

- aux cuisses. Ars., bryon., sass.
- au genou. Cann., con., merc., natr. mur., nitr. ac., sass., staph., sulph., (asar.).
- aux jambes. Asa, bryon., fer., natr. mur.
- aux pieds. Bell., lyc., merc., plumb.
  DURDEUR. Calc., nux, sec., sulph., merc.,
  natr. mur., op., puls., sep., spig.,
  stann., staph.
- aux cuisses. Nux, thuj.
- aux jambes. Natr. mur., coloc., fer., puls.
- aux pieds. Acon., natr. mar., ign.,

plumb., puls., tart., ( natr., sulph., therm., vit.).

MARCHE mal assurée. Caust., magn., phos.

- difficile. Tereb.
- vacillante. Acon., nux, sulph.

Mort des pieds. Calc., nux.

— des orteils. Chel., cycl.

Muscles (raccourcissement des) du jarret. Natr. mur., ars., natr.

- du tendon d'Achille. Graph.
- du dos du pied. Caust.
- (tressaillement des). Asa, asar., mang., teucr.

Nodosités. Ant., staph.

Ongles (ulcères autour des). Sil., caust., sep.

- bleus. Dig.
- qui entrent dans les chairs. Mgs aus.
- d'une couleur sale. Ars.
- (difformités des). Graph.
- douloureux (douleur d'écorchure). Mgs aus.

ORTEILS (battements des). Asa, zinc.

- rouges. Carb. veg., amm.

PARALYSIE des extrémités. Cocc., natr. mur., nux, op., plumb., sil., stann., sulph., anac., ang., oleand., sec., stront., zinc.

- des pieds. Cocc., nux, sulph., therm., zinc.

PEAU bleue. Arn.

- marbrée. Caust., thuj.

Périoste (rongement au). Dros.

PÉRIOSTOSE. Aur.

- (douleur de). Phos. ac.

334 Extrémités.

PIEDS (fétidité des). Bar., sil., (graph., sep., zinc.).

- (facilité à refroidir les). Sil., con.

Pression. Ang., led., oleand., stann., veratr., natr. mur., rut., staph., (ang., cycl.).

- dans les hanches. Stann., (asar.).

- dans les cuisses. Agar., anac., led., sil.

- dans le genou. Led., mgs aus.

- dans les mollets. Anac.

- dans le métatarse. Bism.

PRURIT entre les cuisses. Kal., ran., thuj.

— entre les jambes. Calc., caust., (bism.).

- à la plante des pieds. Sil., (ambr.).

- aux chevilles. Daph.

aux orteils. Staph., zinc., (natr. sul.).

RAIDEUR des extrémités inférieures. Anac., rhs, sep., bell., calc., cic., dig., lyc., natr. mur., nux, spong., tereb., thuj.

aux cuisses. Ars., natr. mur., thuj.

- aux hanches. Fer., zinc.

- aux orteils. Graph., sulph.

- à l'articulation coxo-fémorale. Bell.

— — du genou. Lyc., sep., sulph., ars., bryon., coloc., graph., led., natr. mur., nux, petr., stann., (ol. an.).

— — du pied. Caps., dros., graph., kal., led., petr., sep., sulph., (ran.).

RHUMATISME. Arn., bryon., rhod., rhs, tart., veratr., arn., calc., cham., iod., merc., nux, sil., squill.

RONGEMENT. Bism., plat.

SCIATIQUE. Coloc., rhs, bell., canth., dig., lyc., puls., zinc., (euph.).

Secousses dans les extrémités. Op., phos., sulph.

- dans les pieds. Phos.

Extrémités.

Secousses dans l'articul. coxo-fém. Bell Sécheresse dans l'articulation du genou Nux.

- des pieds. Phos., sep., sil.

Sensation de raideur. Arg., plat., rhod.

— aux pieds. Asa.
— comme si les chairs étaient détachée

des os. Rhs, sulph.

Sensibilité des orteils. Calc.

Serrement comme par un lien. Anac aur., plat.

Surur des pieds. Mur. magn., sil., acon bar., calc., carb. veg., cocc., graph kal., lyc., sabad., sep., sulph., thuj.

\_\_ \_ froide. Cocc., ipec., lyc., merc.

— fétide. Bar., graph., sil., kal phos., sep., zinc.

\_\_\_ supprimée. Kal., sep., sil.

- qui excorie. Lyc., zinc.

des orteils. Acon., kal., sil., squill thuj., (fer.).

SUINTEMENT. Sulph.

TACHES brûlantes. Phos. ac.

- d'abord rouges, ensuite jaunes. Co

- rouges aux extrém. Magn., phos. a

— aux jambes. Acon., calc., col sulph. ac.

— marbrées sur le dos du pio Thuj.

TENSION. Coloc., nux, plat., rhs, (ang.

- aux cuisses. Arn., cham., sabin.

- aux hanches. Coloc., con.

— aux mollets. Bov., alum., calc., ig led., nux, puls., sabad.

- aux genoux. Arn., led., bryon., cap nux, puls., (euphr.). extremues.

Tension au dos du pied. Caust., thuj.

Térébration. Canth., merc., ran.

- au calcanéum. Led.

TIRAILLEMENT aux extrémités. Ant., graph., merc., bar., carb. veg., con., iod., kal., led., lyc., magn., natr. mur., sil.,

- dans les os. Chin., rhod., con., kal., valer.

- dans les articulations. Rhod.

sulph., thuj., (ang., cinn.).

- dans la hanche. Con., natr. mur., rhs, stann.

- aux cuisses. Arn., ran., anac., cham., colch., dat., dulc., iod., squill., zinc., (tereb.).

aux genoux. Anac., asa, iod., (asar.).

- aux jambes. Calc., kal., rhod., sep., sil., zinc., (anac.).

- aux pieds. Magn., puls., rhod.

- aux articulations du pied. Mgs arc.

- aux orteils. Aur., sep., sil.

Comber (facilité à). Caust., magn., phos. REMBLEMENT des extrémités. Calc., carb. veg., cic., natr., puls., sen.

- aux cuisses. Anac., plat.

= au genou. Anac., laur., led., nux, puls.

- aux jambes. Cic., coloc., puls.

- aux pieds. Plat., coff., sass., (ol. an., tab.).

RESSAILLEMENT dans les extrémités inférieures. Ambr., bar., carb. veg., cic., kal., plat., sil., sulph.

- dans les cuisses. Cinn.

- dans les genoux. Anac., chin., mgs

- dans les jambes. Cinn.

Extremites. TRESSAILLEMENTS dans les pieds. Sep., ipec.

335

- dans les os. Chin., valer.

TRANSPIRATION (défaut de) des pieds. Sep., sil.

Tumeur blanche des cuisses. Ars., calc., graph., merc., sulph.

- des hanches. Sep.

Ulceration (douleur d') dans l'articulation du pied. Natr. mur., nitr.

Ulcères aux extrémités inférieures. Sil.. ars., calc., carb. veg., graph., mur. ac., natr., sabin., thuj., (sel.).

- aux fesses. Sil., staph., sulph.

- aux cuisses. Thui.

aux jambes. Calc., graph., lyc., murac., natr., sel., sil., sulph.

- au tibia. Sabin.

- aux chevilles. Sil.

- aux orteils. Ars., graph., sep.

- aux articulations des orteils. Sep.

VARICES. Ars., calc., carb. veg., lyc., mgs aus., puls., sulph.

Verrues aux orteils. Spig.

Vésicules. Thuj., sec.

- rongeantes. Graph., sep., sulph.

SELON LE TEMPS ET LES CIRCONSTANCES.

Air (au grand). Rhs, spig.

APPUYANT (en) un membre. Sil.

- - le pied. Bryon., caust., alum., cale., mang., natr., natr. mur. nitr. ac., ran., rhs, sil., sulph., thuj., (asar., chel., kal. hyd.).

536 Extremités.

Asseyant (en s'). Thuj., tart.

Assis (étant). Bell., cham., led., mang., mosch., plat., plumb., rhs, squill., tart., (agar., rut.).

— (après avoir été). Puls., sep., dig., magn., nitr. ac., nux.

Automne (dans l'). Veratr.

BAILLANT (en). Nux.

Blénorrhagie (après). Sass.

CHAGRIN (après). Sep.

CHALEUR (dans la). Calc., thuj.

— amélioration. Ars.

— (dans la) du lit. Led., rhs, merc., veratr.

Compression (par la) amélioration. Bell., merc.

Couché. (étant). Rhs, sil.

— au lit. Graph., nux, amm., bell., bov., caic., caust., kal., led., lyc., magn., merc., rhod., sep., sil., stront.

-- sur le côté malade. Sil.

sur la partie malade. Sil., ambr.,
 bar., ign., rhm.

**Девоит** (étant). Agar., bryon., plat.

Découvrant (en se). Con., sil.

ÉCHAUFFEMENT (après). Zinc.

ECRIVANT (en ). Kal., acon., bryon., cann., mur. ac., sabin., thuj., zinc., (agar., cinn., euph.).

Efforts (par) physiques. Lyc., phos., rhs, sep., sil.

Endormant (en s'). Phos.

Enfants (chez les). Calc., caust.

Extension (par l'). Mang., thuj.

- amélioration. Sec.

Extremités.

Fièvne intermittente (après suppression de). Puls.

FROID (dans le). Caust, kal.

amélioration. Thuj.

HIVER (l'). Petr.

LEVANT (en) la partie. Bar., led., lyc. puls.

Lit (en sortant du). Carb. veg.

— — amélioration. Veratr.

- (après être sorti du). Graph., valer.

Lotion (après) de la partie malade Amm., sass., calc.

Mancé (après avoir). Phos., (bism.)

MARCHANT (en). Arn., led., lyc., bell. bryon., chin., con., dros., graph., nitr. ac., nux, oleand., rhs, squill. sulph., thuj., zinc., (alum., ang., asar., cylc., guaj., vit.).

— amélioration. Dig., rhs, (euph.).

MARCHE (après la ). Lyc., mgs aus. mosch., nitr., rhs, valer., (cycl. rut.).

- (pendant la) au grand air. Con. graph., sulph.

— (après la) au grand air. Lyc., (croc.)

MATIN (le). Aur., bov., calc., carb. veg. caust., graph., kal., mur. magn. phos. ac., natr., nitr. ac., valer. veratr., (mgs, natr. sul.).

Мю (à). Sep., staph.

- (avant). Sabad.

MINUIT (avant). Led.

MONTANT (en). Bryon.

- un escalier. Rhs, thuj., plumb.

Mouillé (étant). Sass.

MOUVEMENT (pendant le ) en général Acon., arn., bell., bryon., led., mgs aus., merc., natr. mur., puls., staph.,

(natr. sul., ran.).

MOUVEMENT (pend. le) amélioration. Lyc., agar., mur. ac., plumb., thuj., valer.

- (pendant le) de la partie. Arn., bell., cocc., croc., led., magn., mgs aus., nux, rhs, sep., staph., thuj., (kal. hyd., lam., ran., sel.)

(après le ) de la partie. Agar., spig., valer., croc., kal., zinc.

Nuit (la). Bell., calc., cham., croc., hep., lyc., merc., nux, plumb., puls., sep., sil., thuj., ambr., anac., ars., carb. veg., kal., magn., mang., nitr. ac., phos., rhs, staph., stront., zinc., (bor., diad., euph., sec., sel.).

ORAGE (pendant l'). Phos., sil.

Pas (en faisant un faux). Sep.

Pendre (en laissant) la partie. Thuj.

Périodique. Lyc.

PLACE (qui change de). Plumb.

PRINTEMPS (au). Veratr.

REFROIDISSEMENT (après ). Calc., dulc., phos., lyc., sass.

Repos (dans le). Mur. ac., rhs, valer., agar., cocc., coloc., dros., dulc., lyc., plat., plumb., rhod., (euph., merc. subl.).

- amélioration. Merc., sabad.

Réveil (au). Mur. magn., staph., thuj., (mgs, natr., sul.).

Révert (au) de midi. Staph.

RIANT (en ). Carb. veg.

Saisissant (en) quelque chose. Arn., calc., caust, cham., cocc., led., plat, sil., spig.

Date Giller

Siège (en se levant de son). Nitr. ac., puls., tart., bell., nux, sulph.

- (après avoir quitté son). Rhs.

Som (le). Graph., led., phos., puls., sil., stann., amm., aur., calc., cocc., fer., kal., magn., merc., natr., rhs, stront., (ambr., cinn., ind.).

Sommett (pendant le). Groc., sep., (cinn.).

Sueur (après) amélioration. Thuj.

Temps (dans le) froid et humide. Rhod., veratr.

- (pendant le) humide. Rhod., veratr., sep.

Température (après changement de). Phos., sil., sulph.

TOUCHER (au). Bell., chin., puls., ran., acon., bryon., led., lyc., natr. mur., sep., staph., sulph., (kal. hyd., lam., tab., vit.).

Tournant (en) le membre. Calc.

TRAVAILLANT (en). Lyc., phos., sil.

TRAVAIL (après un) manuel. Sep.

VIN (après avoir bu du ). Zinc., carb. veg.

# XXXII. AFFECTIONS GÉNÉRALES.

( Comp. aux rubr. XXXIV et XXXV.)

- ABATTEMENT physique. Alum., coloc., cham., cupr., sen., spong., stront., (diad.).
- après des efforts. Natr. mur.
- — le matin. Nitr., stront.
- — à midi. Carb. veg.
- le soir. Stront.
- - subit en marchant. Con.
- AFFAISSEMENT. Calc., coff., fer., graph., natr., sil., stann., sulph.
- par l'écriture. Cann., sil.
- en entendant parler. Ars., alum.
- par la marche au grand air. Coff., fer., kal., veratr.
- après midi. Nux.
- pendant l'orage. Sil.
- par la parole. Sulph., ambr., alum., calc., cann., fer., stann.
- AMAIGRISSEMENT. Ars., dulc., graph., iod., natr. mur., nitr. ac., sass., stann., sulph., ant., chin., clem., fer., merc., nux, op., sil., (sel., tab.).
- chez les enfants. Ars., chin., nux.
- Anasarque. Ars., con., lyc., sen., sulph., ant., aur., bell., chin., dig., dulc., hell., iod., kal., led., nitr., op., prun., sep., tereb.
- Apoplexie. Anac., arn., bell., ant., bar., coff., hyosc., ipec., laur., nux.
- BALLONNEMENT (sensation de). Cinn.
- Bilieuses (affections). Acon., ant., arn.,

- bryon., cham., chin., ign., merc., mur. magn., natr., nux, ars., aur., bell., cocc., dig., puls., rhs, staph., sulph., tar., verb., (asar., sec.).
- BATTEMENTS dans le corps. Sep., zinc.
- Beson de se coucher. Bar., nux, acon., alum., canth., coff., cycl., fer., grat., led., lyc., (chel., clem., sel., tart.).
- CATALEPSIE. Dat., acon., cic.
- CHALEUR ( défaut de ) vitale. Led., lyc., natr. mur., sep., (euph.).
- de la partie supérieure et fraîcheur à la partie inférieure. Arn.
- CHLOROSE. Cocc., puls., con., natr. mur., sep., sulph., (ars., chin., graph., lyc., nitr. ac., nux, phos.).
- CHOLERA de l'Inde. Ars., phos., sec., veratr., camph., cupr., ipec.
- sporadique. Ipec., phos., phos. ac., sec., veratr.
- CHONÉE. Asa, croc., cupr., dat., bell., calc., hyosc., ign., iod., puls., sulph., (chin.).
- Chute avec perte de connaissance. Calc., bell., hyosc.
- avec connaissance. Dat., magn., phos., plat., cin.
- CIRCULATION (sensation de suspension de la). Lyc., acon.
- Coloration noire du corps. Acon., sec.
- Consonption. Ars., kal., lyc., phos., sil., stann., bar., calc., chin., con., cupr.,

# Assections generales.

- dule., graph., natr. mur., nitr. ac., nux, sep., staph., sulph.
- Consomption chez les enfants. Ars., bov., chin., nux, sulph.
- Convulsions. Bell., cham., cic., con., cupr., dat., mosch., nux, op., sec., camph., cocc., hyosc., ign., merc., stann.
- après la déglutition d'un liquide. Hyosc.
- pendant la dentition. Cham., ign., stann.
- chez les enfants. Bell., cham., ign., cic., stann.
- au toucher. Bell., dat., (ang., cocc.).
- en regardant les objets luisants. Dat.
- pendant le vomissement et les coliques. Cupr.
- par les vers. Cic., merc., hyosc.
- Convulsions générales. Cham., con., op., plat., sulph., tart., arn., bar., bell., carb. veg., cocc., cupr., natr. mur., sil., thuj., (tab.).
- CRAMPES dans le corps. Plat., caps., sil.
- en général. Alum., ang., bell., camph., cham., cic., cocc., dat., ign., ipec., nux, plumb., sec., ars., aur., calc., cupr., hyosc., laur., mosch., op., plat.
- par cocculus. Camph.
- pendant la dentition. Cham., ign., stann.
- par l'eau tiède. Ang.
- des enfants. Bell., cham., ign., ipec., stann.
- des femmes en couches. Cham., cic., hyosc.
- - enceintes. Hyosc.
- par frayeur. Dat.

- Affections générales. 339 GRAMPES hystériques. Mur. magn., con., ign.
- la nuit. Sec.
- par panaris. Cocc.
- périodiques. Sec.
- avec rire. Ign.
- et pleurs. Alum., aur.
- toniques. Ars.
- au toucher. Ang., cocc., (bell., dat.)
- par vapeur mercurielle. Dat.
- Coupure (douleur de). Hyosc.

CYANOSE. Dig.

- Disposition a se refroidir. Bar., bett., calc., carb. veg., coff., dulc., kal., nux, natr., nitr. ac., sep., sil., camph., con., graph., hep., mgs aus., merc., merc. subl., natr. mur., petr., phos., plat.
- DYSSENTERIE. Merc., merc. sub., sulph., caps., colch., hep., rhs, (ars., carb. veg., coloc., ipec., nux, staph.).
- avec affection gastrique. Colch.
- ÉBRANLEMENT convulsif. Nux, (ang., bell., mgs).
- ECLAMPSIE. Cin., dat., magn., phos., plat.
- ENDOLORISSEMENT général. Acon., ein., cocc., coff., colch., kal., magn., sep., spig., staph.
- petr., agar., arg., ars., camph., cupr., hyosc., nux, plumb., sec., sep., stann., sulph.
- après chagrin et frayeur. Ign.
- pendant la dentition. Ign., stann.
- chez les enfants. Ign., bell., stann.
- le soir. Stann.

340 Affections générales.

FAIBLESSE. Calc, chin., fer., merc., natr., mur., nitr. ac., phos., phos. ac., plat., sep., sulph., bar., canth., con., croc., dig., dros., dulc., hyosc., lyc., natr., oleand., op., petr., plat., rhod., sil., (men., ol. an.).

- en allant en voiture. Cocc., petr., sep.
- chronique. Phos. ac., natr., nitr. ac., veratr.
- par effort. Cocc.
- intérieure. Lyc.
- en marchant au grand air. Kal.
- le matin. Phos.

FATIGUE universelle. Veratr.

- prompte. Anac., calc., magn.
- FRAPPE (on) autour de soi. Bell., hyosc., dat.
- GASTRICISME. Ant., bryon., cham., cocc., ipec., nux, puls., rhs, zinc., acon., ars., bell., calc., coff., dig., ign., lyc., merc., staph., sulph., tar., veratr., (cor., cop.).

GRIPPE. Nux, ars., caust., dulc., (camph.).

Hydropнoвів. Bell., canth., dat., hyosc.

- Hypochondrie. Con., mosch., nux, phos., stann., staph., daph., grat., hell., natr., plumb., puls., valer., viol. od.
- qui naît des organes génitaux. Con., mosch, staph.
- Hystérie. Con., mosch., mur. magn., stann., anac., aur., cic., cocc., grat., hyosc., nux, plumb., valer., viol. od.
- par abus du coît. Anac.
- ICTERE. Dig., merc., nux, plumb., sulph., acon., calc., carb. veg., chin., con., sec.

# Affections générales.

Insensibilité. Bell., dat., lyc., phos., phos.

- veg., nitr. ac., sulph.
- INQUIÉTUDE générale. Ars., bell., mgs arc., nux, op., puls., sep., sil., sulph., asar., bryon., calc., cham., chin., ign., phos. ac., teucr., valer.
- après être resté assis. Sil., magn., sulph.
- après la conversation et la promenade.
   Ambr.
- au lit. Mur. magn.
- le soir. Alum., caust., merc., magn., mur. magn., natr.
- LASSITUDE. Alum., ars., calc., carb. veg., chin., dig., merc., mur. ac., natr. mur., nitr. ac., oleand., phos. ac., stann., staph., aur., bar., bell., canth., cann., caust., cocc., coloc., con., cupr., dulc., fer., hep., lyc., magn., phos., plat., rhm, rhs, sabad., sass., sep., sil., spig., stann., stront., sulph., sulph. ac., (ran., rut., sec., sen., tab.).
- au grand air. Mgs arc.
- étant assis. Natr. mur., nitr., magn., plumb.
- étant couché. Alum.
- dans le lit. Natr. mur., carb. veg., con., (ambr.).
- après avoir mangé. Chin., nitr. ac., ant., thuj., (asar., clem.).
- en marchant. Carb. veg., con., hep., zinc.
- — au grand air. Coloc., hep., mgs aus., spig.
- après la marche. Natr.

# Affections generales.

- LASSITUDE le matin. Natr. mur., nitr. ac., bryon., carb. veg., con., eroc., mgs arc., staph., stront., (ambr.).
- produite par le mouvement. Spig., stann., staph., plumb.
- la nuit. Ambr.
- pendant l'orage. Sil.
- au réveil. Con., zinc., chel.
- le soir. Caust., stront., (ind.).
- subite. Con., mgs aus.
- après vomissements. Tart.
- Légèreté (sensation de). Asar.. coff., dat., thuj.
- Mal de mer. Cocc., mgs arc., colch.
- MALADIE par abus d'arsenic. Ipec., chin., verair.
- de mercure. Nitr. ac., hep., sulph., arg., asa, aur., bell., chin., daph., op., sass., staph., (euph.).
- de soufre. Merc., puls.
- de quinquina. Ars., ipec., veratr., fer., sulph.
- MALAISE (accès de). Ars., con., cupr., acon., bell., calc., caust., cham., dat., hyosc., kal., natr. mur., sep., sil., sulph., valer.
- MARCHE courbée. Sulph., daph., (tereb.).
- vacillante. Salph., acon., agar., caust., natr. mur., nux, phos. ac.
- mal assurée. Caust., magn., phos., sulph.
- MEMBRES (courbature des). Agar., aur., carb. veg., guaj., sil., veratr., arn., bryon., daph., dros., dulc., ipec., mgs arc., mgs aus, merc., mur. magn., natr.mur., nux, phos., phos. ac., ran., spig., spong., tart., (arg., cor., natr. sul.).

Affections générales. 341
Membres (courbature des) au grand air.
Cor., mgs arc.

- en se découvrant. Aur.
- au lit. Nux, mosch.
- — en quittant le lit. Carb. veg.
- le matin. Nux, carb. veg., mgs arc., mosch.
- pend. le mouvement. Agar., aur.
- dans le repos. Aur.
- (dechirement dans les). Agar., chin., colch., dulc., mang., merc., mur. ac., plumb.puls.,rhs,rhod.,tart.,valer.,zinc., arg., cham., cupr., hell., hyosc., ign., iod., lam., led., lyc., mur. magn., nitr. ac., nux, phos., phos. ac., sass., sil., spig., stront., sulph. ac., (lam., nic., ol. an., rat., rut., sec., teuer., therm.).
- (élancements dans les). Bryon., dig., guaj., nic., par., nux, sulph., thuj., aur., bell., camph., fer., hell., ind., men., spig., viol. tric.
- (engourdissement des). Carb. veg., graph., petr., plat., sec., sulph., thuj., veratr., calc., carb. an., chin., cocc., croc., hyosc., ign., kal., led., lyc., merc., phos. ac., rhod., rhs, sep., sil., spong.
- (froid des). Camph., hell., led., lyc., natr. mur., op., plumb., sec., bell., coloc., dat., hyosc., (mgs).
- ( goutte dans les ). Bryon., colch., guaj., merc., sass., caust., fer., nux.
- (paralysie des). Caust., cocc., natr. mur., op., plumb., sil., sulph., ang., arg., colch., dulc., hyosc., laur., kal., phos., stann, zinc.
  - (paralysie des) semi-latérales. Cocc., stront., zinc.

342 Affections générales.

MEMBRES (pesanteur des). Arn., bell., daph., ign., puls., thuj., (ant., par., rhm, tereh.

- (pression dans les). Oleand., stann., veratr., anac., arg., bell., carb. an., cycl., dros., led., natr. mur., rut., staph.
- (raideur des). Bell., cocc., plat., puls., rhod., sil., thuj., acon., arn., chin., cin., caps., cham., daph., dros., lyc., natr., nux, rhs, sass., (ang., tereb., therm.).
- (rhumatisme des ). Acon., arn., bell., bryon., cham., colch., merc., puls., rhod., rhs, tart., valer., camph., carb. veg., caust., daph., cupr., ign., nux, ol. an., squill.
- (tiraillements dans les). Ang., ant., bryon., cocc., graph., mur. ac., plat., plumb., rhod., rhs, sec., stann., tart., hell., hyosc., lyc., magn., mosch., natr. mur., nitr. ac., phos. ac., sulph. ac.
- après midi chaque deuxième jour.

  Lyc.
- — pendant le mouvement. Caps.
- dans le repos. Mur. ac., rhod., rhs.
- par refroidissement. Nitr. ac.
- --- comme dans la fièvre intermittente. Puls., calc., mgs aus., nux, (merc. subl.).
- (tremblement des). Cocc.

Mouvement difficile. Bell., natr. mur., calc., camph., sep., spong.

Muscles (laxité des). Caps., clem., con., merc., sen., veratr.

— ( raccourcissement universel des ). Coloc., (caust.). Affections générales.

Muscles (raideur des). Acon., nitr. ac., plat.

— ( tressaillement nocturne des ). Bar.

OBESITÉ. Ant., calc.

Opisthotonos. Ang., bell., cham., cic., ign., dat., stann.

- Paresse. Mur. magn., sec., sep., tart., zinc., (chel., guaj.).
- étant assis. Mgs are.
- après le dîner. Asar., bar., phos., thuj.
- le matin au réveil. Natr. mur.

Pendiculations. Amm., canth., caust., graph., mur. ac., nux, oleand., petr., puls., plat., sabad., staph., (guaj.,

natr., sulph., ol. an., rut., sen., verb.).
Phthisie. Ars., kal., phos., sil., stann.,
bar., calc., chin., con., cupr., dulc.,
graph., natr. mur., nitr. ac., nux, sep.,
spong., staph., sulph.

PLÉTRORE. Acon., bell., calc., sen.

- chez les femmes enceintes. Acon.

Pours accéléré. Acon., ars., bell., bar., hep., merc., nux, phos., phos. ac., sil., sulph., stann.

- dur. Acon., bell., bryon., dulc., phos. ac., op., plat., sil., veratr.
- faible. Merc., plat., phos. ac., rhs, bar., cann.
- intermittent. Acon., hep., natr. mur., op., phos. ac., sulph.
- irrégulier. Dig., merc., natr. mur.
- lent. Dig., bell., cann.
- mou. Bell.
- plein. Bell., acon., arn., dig., hep., merc., phos. ac., sil., sulph.

Assections générales.

Ports petit et vite. Acon., aur., bell., phos., sil., stann.

- supprimé. Ars., sil.
- tendu. Bell.
- tremblant. Ars.

Pulsations dans tout le corps. Graph., natr. mur., plumb., puls., sabad., sabin., sep., tart., (ambr., clem., sel., tab.).

Résonnement dans tout le corps. Arn., (clem.).

- après s'être couché. Clem.
- SANG (fermentation du). Aur., kal., phos., sep., sulph., thuj., carb. veg., croc., fer., lyc., merc., natr. mur., petr., phos. ac., sil., staph.
- - par chagrin. Petr.
- - diminuée par des efforts. Merc.
  - — après la marche à l'air libre. Petr.
- par le mouvement. Natr. mur., thuj.
- la nuit. Rhs, sil., sep., amm., asar., merc., puls., sabin.
- — après la boisson du vin. Sil.
- Sécrétions et excrétions supprimées.

  Dat.
- Secousses. Sulph., cic., cocc., colch., zinc.
- Susceptibilité au toucher. Acon., bell., bryon., tart., camph.

- Affections generales. 343 Susceptibilité aux douleurs. Cham., coff., agar., arn., aur., cin.
- extraordinaire physique. Asar., bar., chin., coff., mgs arc., merc., nux.
- merveuse. Mgs arc., merc., nux, puls., asar., cham., chin., ign., teucr., valer.

Soubresauts. Bell., hep.

TENSION. Bryon., rhs, mang., nux.

- en marchant. Ang.

TETANOS. Ang., bell., camph., ipec., mosch., op., plat., bryon., cann., cham., cic., ign., dat., sec.

- hystérique. Bryon.
- avec vomissements. Camph.

Toxication de plomb. Op., plat., bell., dat., hyosc., (alum.).

TREMBLEMENT. Bell., cic., mgs arc., natr., op., phos., plumb., zinc., agar., carb. veg., cocc., croc., dat., fer., graph., hyosc., kal., lyc., oleand., petr., plat., sep., stann., sulph., veratr., (natr. sul., nic., ran., sen.).

Uterus (crampes de l'). Mur. magn., con., ign.

Veines (battements des). Bell., merc.

- (gonflement des). Chin., puls., sulph., thuj.
- (sensation de froid des). Acon.

VIDE (sensation de). Kal.

# XXXIII. SYMPTOMES PRÉDOMINANTS.

(Comp. aux rubr. XXXIV et XXXV.)

# i. SYMPTÔMES GÉNÉRAUX ESSENTIELS.

CHALEUR des parties malades. Acon.

- Changement en état opposé. Croc., ign., plat., puls., bryon., mang., rhs, sep., sulph.
- alternatif d'affection physique en affection morale. Plat.
- Congestion dans les parties isolées.

  Acon., bell., arn., cham., chin., merc.,
  nux, puls.
- Contraction des parties isolées. Graph., lyc., hyosc., merc., phos., sec., sil., ambr., caust., chin., cin., colch., con., mgs aus., tart., (euph., kal. hyd., men.).
- Convulsions. Asa, bell., cham., cic., con., croc., cupr., dal., ign., mosch., nux, op., sec., sulph., tart., arn., bar., calc., camph., carb. veg., cin., cocc., hyosc., ipec., iod., laur., natr., natr. mur., plat., sil., stann., tab., thuj.
- dans les parties isolées. Ambr., asa, cham., con., croc., dat., sec., squill., sulph., tab., tart., arn., bar., bell., bryon., carb. veg., cic., cin., cocc., cupr., iod., laur., natr., natr. mur., sil., thuj.
- Crampes dans les parties isolées. Graph., hyosc., lyc., nux, plat., sil., sulph., ambr., amm., calc., cocc., coff., nitr. ac., phos., rhs, staph.

- CRAMPES dans les organes intér. Cham. cocc., con., cupr., hyosc., ign., ipec. mur. magn., mosch., stann., bell. bism., calc., carb. an., carb. veg. caust., coff., croc., euph., graph. natr. mur., nux, plumb., puls., staph. valer.
- dans les muscles. Alum., ang., bell. camph., cham., cic., cocc., dat., ign. ipec., mosch., nux, plumb., sec., ambr. ars., aur., calc., caust., coloc., croc. cupr., hyosc., kal., laur., nitr., op. plat., sabad., sep., stann., sulph. tart.
- avec tristesse. Cocc.
- Douleurs des articulations (comp. à la rubr. XXXIV, 2).
- arthritiques. Bryon., caust., colch. guaj., led., lyc., merc., puls., rhod. sass., sulph., ant., arn., ars., calc. cic., chin., con., dig., dulc., fer. graph., hep., ign., mang., men., rhs sabin., spig., spong., stann., staph. thuj., (chel.).
- brûlantes. Ars., carb. veg., daph. euph., sec., phos., plumb.
- élançantes. Plat., bar., cin., dig. mgs aus., puls.
- dans les organes internes. Ars. canth., daph., euph.
- - picotantes. Plat.
  - - au toucher. Sabin.
- de brisure. Ang., arn., cic., nux,

oleand., plat., rhs, sulph., tart., veratr., mgs arc., mgs aus., natr. mur., rut.

DOULEURS d'un seul côté. Daph., puls., bell., cocc., rhs, sabad., stront., zinc.

de préférence du côté gauche. Sulph.
 ac., bar., thuj.

- du côté droit. Canth., alum.

constringentes. Ign., plat.

- de contusion. Cic., oleand., plat., rut.

— de crampe. Ang., asa, graph., oleand., plat., cin., rut.

- déchirante. Rut.

- - pressive. Oleand., plat.

- tressaillante. Mosch.

- qui se montrent en croix. Agar.

déchirantes. Agar., bar., bryon., calc., cham., carb. veg., caust., chin., colch., coloc., dulc., euph., merc., nitr. ac., plumb., rhod., rhs., sec., zinc., ambr., arg., bell., cham., cin., con., cupr., daph., fer., hell., hep., hyosc., ign., kal., lyc., mang., mur. ac., mur. magn., nux, petr., phos., puls., sass., sil., spig., thuj., (kal. hyd., ol. an.).

— — de dedans en dehors. Asa.

 et élançantes. Coloc., euph., dig., merc., thuj., zinc.

- et incisives. Hyosc.

- et paralytiques. Cham., chin., colch.

- — et pressives. Bell., bism., cann., cupr., led., stann.

— — et serrantes. Rut.

- et tiraillantes. Cham., merc., plumb., rhod., rhs, sec., hell., staph., (lam.).

 et tressaillantes. Chin., cupr., puls., mgs. Symptômes prédominants. 345 Douleurs de dehors en dedans. Oleand., plat., canth.

- ébranlantes. Valer.

- d'écartement. Ign.

- élancantes. Acon., asa, bell., bryon., dig., euph., guaj., men., merc., nic., par., sep., sulph., thuj., arn., aur., camph., colch., graph., hell., mosch., mur. ac., rhod., rhs, spig., (ind., rat., viol. tric.).

brûlantes. Plat., bar., cin., dig., puls.

— dechirantes. Coloc., euph., dig., merc., thuj., zinc.

du dehors en dedans. Canth.

et fouillantes. Mgs arc.

et pressives. Asa, canth., cin., dros., euph., mur. ac., thuj.

et tiraillantes. Colch., merc.

- qui se levent à un certain degré et descendent de la même manière. Plat., stann., stront.

- qui s'éteignent subitement. Sulph. ac.

- d'excoriation. Cic., plut. acon., colch., hep., rat., rhs.

— — au toucher. Hep., puls.

- dans les parties malades. Canth.

— — dans les membranes muqueuses.

Daph.

— de foulure. Amm., arn., bryon., carb. veg., caust., natr. mur., rhs, sulph., zinc., bar., dros., oleand., thuj.

- incisives. Ang., arg., hyosc.

- comme par un instrument obtus enfoncé. Sulph. ac., anac., ign.

- Douleurs insupportables. Cham., coff.
- qui paraissent entre cuir et chair. Zinc.
- paralytiques. Ars., cham., chin., cin., cocc., colch., natr. mur., op., plumb., arn., daph., dros., hep., rhs, sass., sil., veratr.
- des parties isolées. Chin., cocc., plat., puls., rhod., sil., cin., daph., dros., natr.
- qui passent d'une partie à l'autre. Puls., asa, plumb.
- pinçantes. Cann., mgs aus., men.
- pressives. Ang., ars., bism., chin., lyc., oleand., phos., plat., stann., valer., veratr., arg., arn., anac., bell., cann., carb. an., daph., dros., euph., led., magn., mur. ac., natr. mur., petr., rut., sulph., thuj., zinc.
- déchirantes. Bell., bism., cann., cupr., led.
- — de dehors en dedans. Plat.
- — élançantes. Ars., cin., canth., dros., euph., mur. ac., thuj.
- et serrantes. Oleand., plat.
- et tiraillantes. Stann., ang., arg., cann., cycl., natr. mur.
- par secousses et rémittentes. Asa, plat., rhod.
- tiraillantes. Arg., ant., bell., bryon., cham., cocc., graph., mang., merc., mur. ac., plat., plumb., puls., rhod., rhs, sec., stann., arg., bar., caps., carb. veg., caust., clem., dulc., hyosc., iod., lyc., mosch., natr. mur., nitr. ac., nux, ol. an., petr., phos. ac., sabad., samb., sil., sulph., sulph. ac., valer.
- et déchirantes Cham., merc.,

- Symptômes prédominants.
  plumb., rhs, rhod., sec., hell., staph.
  (lam.).
- Douleurs tiraillantes et élanç. Colch. merc.
- et fouillantes. Colch., puls., ind.
- et paralytiques. Cham., cocc., arn.
- dans les parties malades. Bryon.
- eann., cycl., natr. mur.
- tressaillantes. Chin., cin., colch., cupr., plat., puls., valer., ind., magn., mang., mosch., rat.
- et déchirantes. Chin., cupr., puls.,
- et élançantes. Mang.
- et paralytiques. Chin., cin., colch.
- et tiraillantes. Colch., puls., ind.
- d'ulcération. Puls., merc., sil.
- vagues. Puls., mang., rhod.

ac., sep., sil., rhs, (spong.).

- Engourdissement des parties isolées Asa, carb. veg., cham., graph., ign., petr., plat., sec., sulph., thuj., veratr., calc., carb. an., chin., cocc., croc., hyosc., kal., led., lyc., merc., phos.
- étant couché sur une partie quelconque. Chin., sil.
- sur une partie la nuit. Croc., thuj.
- FOULURES faciles. Natr., natr. mur., rhs, sep.
- FOURMILLEMENT. Acon., ran., colch., plumb., phos. ac., plat., rhod., sec., carb. veg., ign., mur. magn., natr., ol. an., par., sabad., spig.
- dans les parties malades. Arn.

GANGLIONS. Ars., ipec., lyc., amm., chin., diad., sil., veratr.

GONFLEMENT (comp. à la rubr. XXXV, 5).

- Hemorrhagie. Arn., asa, bell., croc., ipec., phos., carb. veg., diad., merc., rat., sabin., sulph.
- Hypochondrik (symptômes d'). Con., mosch., natr., nux, phos., stann., staph., sulph., aur., bell., daph., grat., hell., mur. magn., plumb., puls., valer., viol. od., zinc.
- Hysteric (symptômes d'). Con., mosch., mur. magn., stann., anac., aur., cic., cocc., grat., hyosc., nux, plumb., sep., sulph., valer., viol. od.
- Inflammations (comp. à la rubr. XXXV).
- avec chaleur sèche. Acon., bell., bryon.
- avec douleur brûlante. Ars., canth., daph., euph.
- des glandes, des articulations, des os (comp. à la rubr. XXXIV).
- intérieure. Acon., bell., bryon., merc., rhs, ars., cann., canth., cop., daph., dig., dros., hep., hyosc., lyc., nux, phos., puls., sen., sep., spong., squill., sulph.
- avec sueur. Merc., phos. ac.
- avectendance à suppurer. Bell., merc., puls., asa, daph., hep., lyc., sil., sulph.
- LEPRE. Alum., ars., carb. an., carb. veg., caust., graph., natr., petr., phos., sep., sil., sulph., coloc., iod., kal., magn., natr. mur., zinc.
- Lésions mécaniques. Arn., sulph. ac., con., hep., iod., kal., sulph., phos.
- Luxations spontanées. Calc., lyc., rhs,

- Symptômes prédominants. 547 amm., arn., nitr. ac., petr., phos., sulph.
- Maladies des membranes muqueuses.

  Bell., daph., dulc., hep., ipec., merc.,
  puls., sen., stann., sulph., tart., ars.,
  asa, bryon., chin., fer., mgs, nitr. ac.,
  nux, plumb., rhm.
- des organes digestifs. Dulc., ipec., merc., puls., rhm, tart., ant., ars., bryon., cin., dig., fer., grat., hell., spig., stann.
- Morr des parties isolées. Calc., chel., thuj., con., cic., lyc.. nux, phos. ac., tart., zinc.
- Muscles (raccourcissement des). Coloc., graph., natr. mur., ars., caust., natr.
- (tressaillement des). Asa, bar., clem., kal., mang., men., natr. mur., ran.
- Nodosités arthritiques. Calc., dig., rhod., aur., cic., graph., led., lyc.
- PARALYSIE. Caust., cocc., kal., natr. mur., op., plumb., sec., sil., sulph., ang., arg., colch., dulc., hyosc., laur., phos., stann., zinc.
- après l'apoplexie. Anac., bell., laur., nux.
- Périodiciré des symptômes. Ars., canth., cupr., ign., nux, valer., alum., anac., arn., aur., bell., carb. veg., fer., hyosc., lyc., merc., plumb., rhod., sec., sil., sulph.

Pression qui écarte. Ign.

Psore. Ars., calc., carb. veg., caust., con., graph., hep., kal., lyc., natr. mur., phos., sep., sil., sulph., thuj., acon., agar., alum., amm., anac., aur., bar., bell., hov., carb. án., clem., coloc., daph., dig., dulc., euph., guaj., iod., magn., mang., mur. ae, mur. magu.,

natr., nitr., nitr. ac., petr., phos. ac., plat., rhod., sass., sen., stann., stront., sulph. ac., zinc., (ambr., ant., arn., arg., asa, bor., cic., cinn., cupr., hell., kal. hyd., led., merc., natr. sulf., oleand., ol. an., plumb., ran., rhs, sabad., spig., staph., tart., valer.,

RACHITISME. Asa, bell., merc., sil., sulph., calc., lyc., staph.

Rhumatisme. Acon., ant., arn., ars., bell., bryon., cham., chin., colch., dulc., ign., merc., nux, puls., rhs, tart., thuj., valer., calc., camph., cann., carb. veg., caust., colch., cupr., daph., euph., ol. an., rhod., sil., squill., stann., veratr.

Reins (facilité à se donner des tours de).

Calc., graph., natr., rhs, arn., carb.
an., carb. veg., kal., lyc., merc.,
natr. mur., rhs, sep., sil.

Rongement dans les membranes muqueuses. Daph.

SANG âcre. Natr., amm., sass.

- aqueux. Tart.

veratr.).

- chaud. Dulc.
- -- cailloté. Bell., caust., dat., fer., plat., puls., stront.
- clair. Bell., dulc., merc., rhs, arn., led., sabin., zinc.
- coagulé. Merc. subl., rhs, arn., hell., dat., nitr. ac., puls., sabin.
- epais. Croc., plat.
- fétide. Bell.
- noir. Croc., nitr., amm., ant., merc. subl., nitr. ac., plat.
- pâle. Graph., bell.

Scorbut. Caust., merc., mur. ac., nux,

Symptômes prédominants.

staph., sulph., canth., carb. veg., hep.,
natr. mur., nitr. ac.

SCROFULE. Ars., asa, bar., bell., calc., cocc., con., dulc., hep., lyc., magn., merc., nux, rhs, sil., staph., sulph., ambr., bryon., chin., cin., fer., mur. ac., natr. mur., phos., puls., rhm, sep.

Sens d'augmentation de volume. Alum., diad., bov., merc., nitr.

Sensation de décollement de la chair des os. Sulph., nitr. ac., rhs.

- de raideur. Plat., rhod.
- comme si quelque chose remuait.
   Croc.

Sycosis. Thuj., cinn., nitr. ac., (lyc., phos., staph.).

SYPHILIS. Merc., (aur., daph., hep., sass.).

Tension douloureuse. Arn., bryon., plat., rhs, euph., mang., nux.

Typiques (symptômes). Ars., ipec., tyc., chin., diad., veratr.

Ulceres de différents genres (comp. à la rubr. XXXV, 5).

Varices. Ars., calc., carb. veg., lyc., mgs aus., puls., sulph.

Veines (gonflement des). Puls., chin., thuj.

2. SYMPTÔMES GÉNÉRAUX ACCESSOIRES.

### A. En général.

Anxiete. Ars., cham., petr., bell., coff., rhod., tab., veratr.

AGITATION et jactation. Cham., coff., mgs arc., magn., mang., tab.

CHALEUR (défaut de ). Led., lyc., natr.

 pendant les souffrances des organes internes. Euph.

Coeun (palpitation de ). Aur., plat., tab.

Connaissance (perte de). Natr. mur., op.

DÉCUBITUS. Ars., nux, phos. ac., bryon., calc., con., fer., ipec., lyc., mosch., natr. mur., oleand., petr., sep., veratr.

Délire par la douleur. Veratr.

DÉSESPOIR. Acon., cham., colch.

FACE (pâleur de la). Puls.

FAIBLESSE. Ars., phos. ac., ipec., veratr., chin., inerc., natr. mur.

- subite. Ars., ipev., veratr., cham., croc., sabad.

Frissonnement subit. Daph., puls., ars., lyc., led., mgs arc., natr. mur.

Hémiplégie. Natr. mur.

HOBRIPILATION. Daph., ran.

 pendant l'affection des organes intérieurs. Euph.

Humeur chagrinée pendant les soufranées. Coff., nux, phos., chin.

Insomnie. Coff., cham.

Joves (rougeur des). Cham.

LARMOIEMENT. Sabad.

MANIE. Veratr.

Mort (peur de la). Acon., nitr. ac., plat.

OPHTALMIE pendant l'accès de manie. Cupr.

Os (douleurs des). Cupr.

PARLER (disposition à). Phos. ac.

Pleurs. Cham., coff., puls.

RESPIRATION entrecoupée. Puls., natr. mur.

Symptômes prédominants. 349

- gênée. Puls., natr. mur.

Sensibilité. Cham., coff., nux.

Soir. Cham., diad.

- (défaut de). Puls., lyc.

Sueur. Merc., natr., plat.

- pendant l'accès de manie. Cupr.

Tête (sueur chaude à la). Cham.

TRISTESSE. Cocc.

TREMBLEMENT. Mgs arc., natr., plat.

Uninaires (affection des organes) pendant les douleurs arthritiques. Canth., sass.

Vomir (envie de). Puls., ant., merc.

### B. Aux parties malades.

CHALEUR. Acon., bryon., sulph.

Engoundissement (sensation d'). Asa.

EXCORDATION (douleur d') au toucher. Hep., puls.

FAIBLESSE. Cham., chin., arn.

FOURMILLEMENT. Arn.

FROID (sensation de). Merc.

GONFLEMENT. Merc., puls., bryon., kal., rhs.

- des parties paralytiques. Plumb.

HORRIPILATION. Ars.

INQUIÉTUDE. Chin., fer.

Movvoir (envie de se). Fer., chin.

PARALYSIE. Plumb., colch., natr. mur.

RAIDEUR. Chin., colch., cham., plumb. Sueur. Stront., merc.

# 3. HEURES DE LA JOURNÉE.

LE MATIN (principalement). Arn., bar., bov., bryon., calc., carb. veg., caust., cin., clem., coff., con., croc., cupr., dig., euph., graph., guaj., ign., iod., mur. magn., natr., natr. mur., nitr. ac., nux, op., phos., phos. ac., plumb., ran., rhod., sass., sep., staph., thuj., valer., veratr., viol. od., acon., amm., ant., aur., bell., carb. an., chin., daph., dat., dros., dulc., fer., hell., kal., nitr., petr., rhm, sen., spig., stann., staph., sulph., phos. ac.

AVANT MIDI. Natr., sabad., sulph. ac., cann., grat., guaj., phos., phos. ac., sass., staph., viol. tric.

MIDI. Arg., cic., dat., zinc., (phos.).

Après midi. Agar., alum., amm., ant., asa, canth., chel., laur., lyc., mosch., mur. ac., nitr. ac., sass., thuj., camph., coff., colch., con., dulc., grat., iod., natr., nux, phos., plumb., sen., spong., staph., stront., ziuc.

LE SOIR. Acon., ambr., ant., asa, bell., coloc., daph., dulc., ign., kal., tyc., mang., merc., plat., puls., rhs, sen., sep., stann., stront., sulph., sulph. ac., zinc., alum., amm., anac., ars., caps., carb. an., carb. veg., caust., cycl., guaj., hep., hyosc., ign., ipec., kal., magn., mgs arc., mgs aus., mur. magn., natr., natr. mur., nitr. ac., ol. an., petr., phos. ac., ran., rhod., sabin., samb., spig., teucr., thuj., vit.

Avant minuit. Lyc., mur. ac., puls., spong., tart., ang., arn., bryon., carb. veg., hep., merc., petr., rhs, stann.

LA NUIT. Ars., aur., caust., cham., chin., colch., con., hep., kal., led., lyc., mang., merc., sec., sil., spong., sulph., sulph. ac., tart., ant., bar., bism., calc., camph., cann., carb. veg., cin., cinn., clem., dig., dulc., eug., fer., graph., grat., guaj., hyosc., led., mur. ac., natr., vic., nitr. ac., oleand., op., par., plat., plumb., ran., sab.

Après minuit. Ars., cann., magn., thuj., acon., amm., aur., cale., canth., caps., caust., coff., croc., dulc., graph., hep., iod., kal., merc., natr., plat., sil., sulph. ac., tart.

# 4. CONDITIONS ET CAUSES ESSENTIELLES.

Actors (par les choses). Natr. mur., ars.

Air chaud (par l'). Aur., calc., carb. veg., ign., sil., sep.

- froid. (par l'). Camph., merc., phos., rhs, sep., veratr., alum., amm., aur., bryon., calc., carb. veg., caust., daph., rhod., sabad., sep.
- (par un courant d'). Calc., bell., caust., kal., natr., sep., sil., sulph., (phos., rat., sel.).
- (au grand). Bryon., calc., caust., cocc., coff., con., ign., kal., lyc., mgs aus., merc., nux, petr., sen., valer., veratr., amm., arn., ars., camph., cann., caps., carb. veg., cham., chin., cic., fer., graph., mang., mosch., natr., nitr. ac., sabad., sabin., sep., spig., staph., sulph., sulph. ac., thuj., viol. tric., zinc.
- amélioration. Ambr., asa, aur.,

eroc., graph., mgs arc., mur. magn., op., puls., rhod., acon., alum., arg., kal., magn., nic., nux, ol. an., phell., plat., sass.

ALIMENTS gras (par les). Puls., carb. veg., natr. mur., thuj.

Amoun (par un ) malheureux. Hyosc., ign., phos. ac.

Asseyant (en s'). Tart., puls.

- Assis (étant). Acon., anac., ang., ars., chin., cin., guaj., natr. mur., plat., puls., sep., sulph., tart., agar., alum., ambr., asa, bell., calc., caust., cic., cycl., dig., grat., graph., men., mur. magn., natr., op., phell., sil., sulph. ac., zinc.
- amélioration. Calc., veratr., aur., carb. an., mang., nux, petr., phos. ac., staph.
- ang., nux, sep., sil.
- ATTENTION ( en dirigeant son ) amélioraition. Camph.
- Autonne. Rhs, veratr., aur., colch., merc.
- Baissant (en se). Acon., bell., calc., led., lyc., mang., natr. mur., puls., rhs, alum., bar., cic., cocc., graph., ipec., kal., merc., petr., phos., plumb., sen., sep., spig., sulph., thuj.
- Boisson (par la) de la bière. Ars., asa, bell., fer., sep., (coloc., daph., euph., stann., sulph.).
- (par la) chaude. Cham., merc., dros., hell., mgs aus., puls.
- amélioration. Alum., (lyc., sulph.).
- froide. Natr., nuw, cale., cio., graph., staph., thuj., (spig.).

Symptômes prédominants. 35 1 Boisson (par la) du thé. Chin., fer., thuj.

Bu (après avoir) vite. Sil.

BRUIT. Arn., plat., zinc., calc., lyc., mang., natr., sil.

CAFÉ (par le). Cham., ign., nux, ars., cocc., merc., sulph.

CAMPHRE (par le). Nitr., cocc.

- CHACRIN (après). Bryon., cham., coloc., ign., phos., sep., staph., sulph., nair. mur., nux, petr., plat., (chin., ran.).
- CHALEUR (dans la). Ambr., arn., ant., aur., calç., cann., dros., kal., laur., led., lyc., mgs arc., phos., puls., sen., sep., thuj.
- amélioration. Ars., bar., rhs, stront., sulph., caust., coloc., lyc., merc.
- CHAMBRE (dans la). Alum., asa, aur., croc., magn., mur. magn., op., phos., rhod., acon., ambr., dig., mgs arc., phos. ac., plat., puls., sep., sulph.
- amélioration. Arn., bryon., caust., coff., con., mgs arc., mang., mosch., sass., stann.
- CHEVAL (par l'exercice du). Sep.
- CHUTE (après une ). Arn., kal. (Voy. Coup, Contusion.)
- COCHON ( par la chair de ). Colch., puls., sep., natr.
- Coïr (après l'abus du). Con., mosch., phos. ac., anac., calc., chin., natr. mur., nux, phos., sep., staph., sulph.
- Colère (par la). Staph., phos., plat.
- Commotion ( par une ). Arn., bell., cic., hyose., phos. ac.
- Couché (étant). Ars., rhs, sil., asa, bell., bryon., calc., carb. veg., caust.,

- dig., hyosc., mosch., nux, sec., sep., sulph., verb.
- Couché (étant) amélioration. Canth., merc., natr. mur., alum., cupr., magn., nitr. ac., phell., staph.
- - sur le dos. Phos., puls.
- — amélioration. Ign., puls.
- sur le côté. Ign., puls., sil., ars., bar., graph., hep., sabad.
- - amélioration. Phos.
- sur le côté droit. Mur. magn., merc., stann.
- sur le côté gauche. Phos., lyc., sep.
- au lit. Ars., calc., graph., ign., kal., led., lyc., magn., nux, puls., rhod., sep., ambr., caust., mgs arc., merc., phos., rhs, sil., staph.
- amélioration. Bryon., squill., lyc.

Course (par la). Sil.

CRÉPUSCULE (dans le). Calc.

- DEBOUT (étant). Agar., bryon., cocc., con., magn., mang., petr., phos. ac., plat., sabad., stann., sulph., zinc.
- amélioration. Ars., calc., mur. ac.
- DECOUVRANT (en se). Sil., aur., con., merc., stront.
- DENTITION (pendant la). Cham., ign., bell., calc., cin., rhm, stann., sulph.
- Diète (par de légers écarts de ). Natr.
- Digestion (pendant la). Bar., calc., lyc., natr.
- Eav (par l'action de l'). Calc., sass., sulph., amm., carb. veg., sep.
- (par l') froide. Spig., sulph.

- Symptômes prédominants.
- (par P) chaude. Ang. ÉCHAUFFEMENT (après). Carb. veg., sil.
- Ecrivant (en). Kal., bryon., cann., natr mur., sabin., sil., zinc.
- EFFORTS (après) intellectuels. Colch. nux, aur., calc., natr., plat., puls. sep., sil.
- (après des) physiques. Cocc., croc. lyc., sil., sulph., veratr., ambr., merc. natr., natr. mur., phos., rhs, sep.
- — amélioration. Sep.

thuj.; zinc.

- Emotions (par des). Coff., bryon., kallyc., natr. mur., phos., zinc. (comp à la rubr. XXXVIII).
- Enfants (chez les). Bell., cham., ign. ipec., nux, rhm, ambr., bar., calc. chin., lyc., magn., merc., rhs, sil. stann., staph., sulph.
- Enveloppant (en s'en) chaudement, amé lioration. Ars., aur.
  - Estomac dérangé. Ant., bryon., coff. puls., carb. veg., euph., ipec., natr. nux, tart.
  - Éré (pendant l'). Carb. veg., lyc., natr. natr. mur., sel.
  - Femmes (qui convient surtout aux). Bell. plat., puls., sep., valer., bryon., calc. con., croc., ign., mang., sabin., sec.
  - (chez les) en couche. Bett., puts., sec. cham., cic., coff., croc., hyosc., ign. nux, sabin.
  - (chez les) accouchées. Arn., bell. bryon., cham., coff., hyosc., ipec., nux puls., veratr., calc., carb. an., croc. dulc., grat., natr. mur., op., phos. phos. ac., plat., rhm, rhs, sabin. samb., sil., zinc.

FEMMES (chez les) enceintes. Calc., coff., con., ipec., nux, petr., puls., sulph., acon., alum., bar., bryon., croc., dulc., graph., hyosc., lyc., magn., natr. mur., phos., plat., sabin., sep.

FIÈVRE (par) intermittente supprimée.

Arn., ars., calc., caps., ipec., natr.

mur., puls., veratr., bell., carb. veg.,
cin., fer., merc., sep., sulph.

FOULURE ( par une ). Rhs, arn.

FRAYEUR (par). Acon., ign., op., bell., dat., (merc., phos., plat., stann.).

FROID (par le). Agar., amm., asar., bar., calc., camph., canth., caps., hep., merc., nitr. ac., phos., sabad., sep., sulph.

- amélioration. Thuj.

- (pendant le) nocturne. Hep.

FROTTEMENT (par). Con.

amélioration. Indi, natr., ol. an.

FRUIT (par l'usage du ). Natr., puls., rhod.

Funds (par la) du tabac. Cocc., natr. mur., nux, calc., clem., coloc., ign., petr., puls., rut., sel., sep., spong., tar., (sass., sil., stann., sulph. ac., thuj.).

amélioration. Diad., coloc., merc.,
 natr.

Gonorruée (après suppression de ).
Sass.

HABITUDES ( par ) sédentaires. Nux, sulph.

HIVER (pendant l'). Petr., sulph.

Hommes (convenables aux). Nux, phos.

Humburs (par perte d'). Chin., phos. ac., sulph.

Ivnesse (après l'). Carb. veg., nux, coff., op.

JEU du violon ( par le ). Viol. od., kal., calc.

JEUN (à). Calc., bar., plat., sep.

Joie (par une grande). Coff.

Jour (par la clarté du ). Colch., dat., lyc., merc.

Last (par l'usage du). Chel., nitr. ac., ars., lyc., sulph., (calc., natr. mur., nux, sep.).

LECTURE (par la). Calc., croc., natr. mur., sil., chin., graph., lyc, nux, phos., puls., rut.

Lir (en sortant du ). Carb. reg., ign., graph., guaj., natr. mur., valer.

amélioration. Veratr., aur.

Lésions (par des) mécaniques. Arn., rhs, sulph. ac., hep., (con., liod., kal., phos.).

Lune (à la nouvelle). Sil., amm.

Manceant (en). Cocc., natr. mur., phos., arn., arg., bov., bryon., graph., kal., merc., mur. magn., natr., sabin., teucr.

- amélioration. Anac., aur.

— quelque chose de chaud. Calc., merc., bar., hell., mgs aus., phos. ac., puls., sep., sil., sulph. ac.

— quelque chose de froid. Calc., con., merc., hell., graph., kal., mang., plumb., sulph., thuj., (cast., kal. hyd., par.).

Mance (après avoir). Anac., ant., ars., bryon., calc., carb. veg., cham., chin., cocc., con., graph., ign., kal., lyc., merc., natr. mur., nux, petr., puls.,

alum., asar., bar., bell., bism., bov., cann., caps., carb. an., fer., hell., mgs arc., natr., nitr. ac., phos., ran., staph., tart., veratr.

Mangé (après avoir) amélioration. Natr., phos.

- du pain. Caust., natr. mur., phos., sass.
- MARCHANT (en). Arn., bell., calc., carb. veg., chin., con., led., sep., sulph., bryon., dig., dros., mur. magn., natr. mur., nitr. ac., nux, ol. an., squill., sulph. ac.
- amelioration. Dulc., mosch., mur. ac., plat., puls., raler., alum., ambr., amm., fer., graph., magn., nitr., rhs, sep., stann., sulph., tar., veratr.
- au grand air. Camph., coff., con., dat., ipec., led., mgs aus., nux, sulph., veratr., ars., calc., caust., fer., hep., kal., merc., spig., sulph. ac.
- \_ amélioration. Asa, op., ambr., graph., nux, sep.
- vite. Aur., natr. mur., sen., sil.
- Marché (après avoir). Amb., anac., natr., plat., rhs, valer.
- au grand air. Ambr., calc., lyc., petr., stann., (caust., croc., phos.).
- MERCURE (par l'abus du). Hep., nitr. ac., sulph., arg., asa, aur., bell., calc., chin., clem., daph., sass., sep., staph., (carb. veg., dulc., euph., phos. ac., stront.).

MERCURIELLES (par les vapeurs). Dat.

MEURTRISSURE (après). Arn., sulph. ac., con., iod., kal., petr., phos.

Montant (en). Zinc., aur., bryon., stann.

- très haut. Calc.
- un escalier. Acon., nux, rhs, thuj., alum., ang., calc., carb. weg., plat., plumb., rat., stann., sulph.

Moucher (par le). Arn., aur.

- MOUVEMENT (pendant le). Acon., arn., bell., bryon., calc., chin., cupr., daph., dat., graph., ipec., kal., led., mgs aus., merc., natr. mur., nux, phos., sil., spig., stann., staph., zinc., ars., camph., caps., coloc., con., dig., hell., ign., laur., nitr. ac., ol. an., plumb., ran., veratr., vit.
- amélioration. Asa, dulc., mosch., mur. ac., natr., puls., rhod., rhs, sen., sep., agar., ambr., ars., calc., cycl., fer., kal., kal. hyd., lyc., magn., mur. magn., op., phell., plat., rut., tart., thuj., valer.
- (après le). Puls., stann., valer., agar., anac., caust., croc., kal., nitr. ac., phos., sep., spig., zinc.
- Musique (par la). Natr., sep., calc., coff., kal., phos. ac., stann., tab., viol. od., zinc.
- Nourrices (chez les). Bett., bryon., calc., graph., ipec., nux, puls., sulph., carb. an., lyc., phos., sep., zinc.
- Nouveau-nés (chez les). Bell., calc., cham., cin., ign., lyc., nux, rhm, sil., sulph., arn., bov., bryon., merc., rhs, sulph. ac.

OEUFS frais (par les). Colch.

OGNONS (par les). Thuj.

Onanisme (après l'). Calc., chin., phos.

Symptomes predominants. ac., sulph., con., mosch., natr. mur.,

nux, phos., sep., staph.

OBAGE (pendant l'). Rhod., sil., natr., phos., (caust., nitr. ac., petr.).

PAROLE ( par la ), Colch., stann., sulph., alum., ambr., amm., arn., bell., calc., cann., carb. veg., dulc., fer., natr. mur., phos., plat., sil., (anac., ars., aur., daph., kal., magn., mur. magn., natr., nux).

PARLER ( en entendant ). Ars.

Pas (en faisant un faux). Bryon.

Personnes (chez les) brunes. Acon., nitr. ac., plat., anac.

- blondes. Clem., con., merc., thuj., caps., dig., lyc.

- maigres. Nux, ambr., phos.

Piano (par le jeu du ). Natr., sep., calc., kal., zinc.

PIED (en appuyant le) fortement. Bryon., sil., calc., natr., natr. mur., nitr. ac., ran., rhs, sulph.

Pléthoriques (chez les). Bell., calc., sen., acon., hep., merc.

Pleure ( après avoir ). Arn., bell., hep.,

Pommes (par les) de terre. Alum.

Position (en changeant de). Ign., puls. nitr. ac.

- amélioration. Valer.

RESSION (par la) extérieure. Bryon., sil., bell., calc., daph., merc., nux, zinc.

- amélioration. Mur. magn., puls., stann., alum., amm., ind., kal., mang., mur. ac., natr., phos.

PRINTEMPS (au). Aur., veratr., carb. veg., natr. mur., rhs.

Symptomes predominants. 353

Ouinquina et sulfate de quinine ( par l'abus du). Ars., ipec., puls., veratr., fer., sulph., (arn., bell., calc., caps., carb. veg., cin., merc., natr. mur., sep.).

RÉCHAUFFANT (en se) dans le lit. Led., merc., rhs, puls., veratr., caust., graph., kal., phos. ac, sabin., thuj.

amélioration. Lyc., bar.

REDRESSANT (en se). Bell., sulph.

- amélioration. Puls.

REFROIDISSEMENT (après ). Acon., bell., coff., dulc., ipec., nitr. ac., nux, phos., puls., sass., sil., bar., calc., carb. veg., cham., coloc., con., graph., lyc., natr., natr. mur., sulph. (Comp. à la rubr. XXXII.)

- (après) d'estomac. Ars., puls.

Repos (dans le). Asa, dulc., lyc., mosch., mur. ac., op., plat., rhod., rhs, sen., sep., sil., viol. od., agar., amm., aur., caps., coloc., con., euph., grat., kal., kal. hyd., nitr., phell., puls., rut., samb., stann., sulph., thuj., valer., zinc.

- amélioration. Acon., bar., bryon., camph., coloc., ipec., kal., merc., nux, squill., veratr., arn., bell., coff., colch., cupr., dat., hell., ign., laur., led., nitr., nitr. ac., ol. an., phos.,

RIRE (par le). Ars., bell., stann., carb. veg.

SALÉES (par les choses). Carb. veg.

Serein (au). Merc.

Siege (en quittant son). Puls., tart.,

356 Symptômes prédominants. caust., con., natr. mur., nitr. ac., sulph., veratr.

Sièce (après avoir quitté son). Rhs, alum., carb. veg. Addition 1

Société (en). Bar., lyc., plumb.

Soleil (au). Agar., graph., natr., sulph.

- amélioration. Plat., stront.

- ( par la lumière du ). Agar., natr., sulph.

Solitude (par la). Ars., lyc., phos.

Sommer (dans le). Ars., cocc., sulph., bar., bell., calc., carb. veg., con., cycl., diad., dulc., graph., hyosc., kal., merc., mosch., op., phos., puls., rhm, sil., staph., sulph. ac.

- (après le). Cocc., con., anac., calc., carb. veg., graph., stann., thuj.

- \_ amélioration. Calad.

Sourre (par l'abus du). Merc., puls.

- (par la vapeur du). Puls.

Spiritueux (par les boissons des). Nux, op., bov., carb. veg., con., sel., sil.

Sueur (après la) amélioration. Cham., natr., thuj., (calad.).

TEMPS (par le changement de). Phos., rhs, sil. , sulph., veratr., colch., graph., merc.

- (pendant le) humide. Amm., rhod., rhs, veratr., calc., carb. veg., dulc., lyc., sep.

Symptômes prédominants. Température (par changement de). Ran., carb. veg.

Toucher (par le ). Acon., ang., bryon., chin., cocc., colch., cupr., lyc., mgs arc., mgs aus., merc., nux, phos. ac., ran., rhs, sep., sulph., arg., arn., ars., cann., caps., coloc., daph., ign., natr., natr.

mur., nitr. ac., rhod., spig., squill.,

- amélioration. Asa, calc., grat., men., mur. ac., ol. an., mang., natr., plumb.

TRAVAIL (pendant le) manuel. Natr. mur.

VEAU (en mangeant du). Nitr.

staph.

VENT (dans le). Lyc., phos., (aur., carb. veg., con., graph., plat., thuj.).

- (par le) d'est. Carb. veg., hep.,

- (par le) du nord. Sep.

VIEILLARDS (propres aux). Bar., con., op., aur.

Veilles (par des). Colch., nux, cocc. puls.

VIN (après avoir bu du). Calc., carb. veg., nux, op., zinc., carb. an., coff., con. natr. mur., rhod., (bell., bov., natr. petr., sil., stront.

VOITURE (en allant en ). Cocc., graph. petr., phos., sep., sil.

amélioration. Nitr. ac.

# XXXIV. AFFECTIONS DES GLANDES, DES OS ET DES ARTICULATIONS.

(Comp. avec les organes isolés.)

#### 1. GLANDES.

DÉCHIREMENT. Bell.

Douleur simple. Carb. an., coloc., lyc., merc., thuj., alum., arn., calc., caust., con., nitr. ac., phos. ac., rhs, sil., spig., staph.

ELANCEMENTS. Bell., merc., con., cocc., natr. mur.

FOURMILLEMENT. Con.

Général (en). Bar., bell., con., iod., kal., petr., phos., spong., staph., sulph.

par contusion. Con., iod., kal., petr.,phos.

GONFLEMENT. Bell., clem., cocc., con., dulc., graph., hep., lyc., merc., nitr. ac., phos., sil., staph., sulph., thuj., amm., arn., bar., bov., calc., caust., carb. an., carb. veg., cham., iod., natr., natr. mur., petr., phos. ac., puls., rhs, sep., spong., sulph. ac.

INDURATION. Bar., carb. an., dig., carb. veg., con., iod., phos., sil., spig., sulph.

- après contusion. Con., iod.

bell., con., dulc., kal., nitr. ac., phos., sil.

dollesse. Con., iod.

Nodosités. Carb. an., clem., coloc., graph., lyc., phos., sulph.

Pression. Merc., bell.

PRURIT. Con.

Suppuration. Merc., sulph., bell., calc., coloc., hep., nitr. ac., petr., sil.

Tension. Graph.

TIRAILLEMENT. Bell., sen.

Ulceration. Phos., sil.

2. os.

### A. Au périoste.

Douleur simple. Camph., mur. ac.,

ELANCEMENTS. Colch., hell.

GONFLEMENT. Aur., sabin.

Pression. Bryon., staph., (cycl.),

RACLEMENT. Asa, phos. ac., rhs, sabad.

RHUMATISME. Cann.

Sensation comme si les chairs étaient détachées des os. Rhs, sulph.

TÉRÉBRATION. Asa, hell.

TIRAILLEMENT. Chin., rhod., sabad., sabin., zinc.

TRESSAILLEMENT. Chin, colch.

#### B. Aux os même.

ARTHRITE. Aur., bryon., led., rhod.

CARIE. Asa, sil., calc., daph., lyc., merc., nitr. ac., sep., staph., sulph., (euph.).

Cuisson dans les plaies des os. Phos.

DÉCHIBEMENT. Chin., bell., stront., zine., (bism.).

DÉVIATION. Merc., sulph., sil., staph.

Douleur simple. Asa, bar., cupr., lyc., merc., phos. ac., rhod.

- pendant les accès de manie. Cupr.
- mercurielle. Asa, aur., nitr. ac.
- de meurtrissure. Veratr., bell.
- nocturne. Bar., lyc., mang., merc.

Exostose. Asa, phos., aur., calc., daph., dulc., lyc., phos. ac., rhs, sil., staph., sulph., (sabin.).

FOUILLEMENT. Diad.

Général (en). Asa, phos. ac., sil., sulph., calc., daph., merc., nitr. ac., rhs, staph., (euph.).

INFLAMMATION. Merc., aur., bell., chin., hep., lyc., (asa, daph., mang., phos. ac., sil., staph., sulph.).

RAMOLLISSEMENT. Asa.

TIRAILLEMENT. Chin., rhod., sabad., sabin., zinc.

TRESSAILLEMENT. Chin.

5. ARTICULATIONS.

Andeur brûlante. Natr.; (mgs).

CRAQUEMENT. Caps., cocc., petr., cham., thuj., (ang., lyc., merc.).

CRAMPES. Plat., par.

Déchirement. Caust., kal., merc., phos., sabin., sec., stront., amm., aur., bov., calc., hyosc., led., natr., natr. mur., nitr., sass., sep., (teucr.).

Dovleurs arthritiques. Dig., led., sulph., aur., bryon., caust., chin., cocc., lyc., mang., puls., rhod., sabin.

- de courbature. Aur., arn., bell., con., dig., mgs aus., mur. ac., nux, phos., phos. ac., puls., (ang., mgs, viol. od.).
- de foulure. Caps., ign., rhs, (mgs).
- incisives. Hyosc.
- pendant le mouvement. Led.
- la nuit après refroidissement. Mang.
- rhumatismales. Guaj.
- paralytiques. Aur., arn., sass., staph., (euph.).
- simples. Ign., led., mang., puls., bar., cocc., nux, rhm.
- d'écorchure. Sep.
- d'élancement. Bell., hep., merc., rhs, sabin., sil., sulph., thuj., colch., hell., led., nitr., puls., sulph. ac.

ERUPTION. Sep.

FAIBLESSE. Acon., arn., mang., rhod., rhs, sulph., (hor.).

FOUILLEMENT. Mang., rhod.

FOURMILLEMENT. Ipec., sec.

FROID. Petr., cinn.

GÉNÉRAL (en). Caps.

GONFLEMENT. Rhod , sulph., mang.

Articulations.

PALPITATIONS. Led.

RAIDBUR. Caps., cocc., coloc., kal., lyc., nux, petr., rhs, staph., therm.

ROUGEUR. Rhod.

Sensibilité. Arn.

Articulations. 359
Sensation d'engourdissement. Lyc., plat.

Tension. Mang., rhs.

TIRAILLEMENTS. Hyosc., rhod., sec., staph.

TREMBLEMENT. Mang.

TRESSAILLEMENT. Mang., plat.

### XXXV. PEAU.

1. SYMPTÔMES DE LA PEAU EN GÉNÉRAL.

ANTRAX. Ars., bell., sec., sep., sil., rhs.

Apreté. Bell., calc., graph., iod., merc., sep.

Bosses suppurantes. Kal.

CHALEUR brûlante. Ars., bell., sep., anac., bryon., dig., mang., nux, sabad., (ambr., calad.).

Condylomes. Thaj., cian., lyc., nitr. ac., phos. ac., staph.

Cons. Ant., lyc., sep., calc., petr., phos., sil., sulph.

Couleur bleue. Dig., amm., ars.

- jaune. Dig., merc., nux, plumb., sulph., acon., calc., carb. veg., chin., con., sec.

- pâle. cocc., puls., con., natr. mur., sep., sulph., (ars., chin., graph., nitr. ac., phos.).

- sale. Iod., merc.

Démangeaison. Daph., oleand., (euph., lach.).

DÉPILATION. Graph., sulph.

DESQUAMMATION. Aur., boy., coloc., daph., phos. ac., sec.

Econchunes des enfants. Cham., graph., sulph., calc., caust., ign., kal., lyc., merc., squill.

ÉLANCEMENTS. Thuj., bryon., dig., nitr., nux, plat., puls., spong., zinc.

ENGELURES. Agar., carb. an., croc., petr., puls., sulph., mgs aus., nux, nitr. ac., phos., rhs, stann., staph., sulph. ac., thuj.

Engourdissement. Plat., sec.

Envies. Sulph.

EPAISSISSEMENT partiel. (Lach.)

ÉPHÉLIDES. Lyc., natr., cale., phos., sulph.

ERYSIPÈLE. Arn., bell., camph., graph., hep., merc., rhs, sulph., amm., ant., ars., bryon., calc., lyc., nitr. ac., phos.

- scarlatineux. Bell., (croc., euph.).

Fongus hématode. Phos.

FOURMILLEMENT. Phos. ac., plat., rhod., sec., carb. veg., ol. an., magn., sabad.

FROID. Ars., veratr., nitr. ac., sec.

FURONCLES. Arn., bell., led., lyc., nitr. ac., phos., thuj., ant., calc., natr. mur., petr., sep., staph., (euph., magn., mgs, sec., sil., zinc.).

GANGLIONS. Amm., sil.

GANGRÈNE humide. Chin.

- sèche. Bell.

GERCURES. Hep., sulph., alum., aur., calc., lyc., nitr. ac., petr., puls., rhs, sass., zinc.

Hydropisie. Ars., con., lyc., sen., sulph., ant., aur., bell., chin., dig., dulc., hell., iod., kal., led., nitr., op., prun., sep., tereb.

après miliaire. Hell.

INFLAMMATION. Nitr. ac.

des parties extérieures. Arn., mgs arc., mang., lyc., merc., puls., sulph.

Incurabilité de la peau. Cham., hep., petr., bar., calc., croc., mang., staph., sulph.

LAXITÉ. Chin., iod., sec.

LEPRE. Sep., sil., sulph., alum., ars., carb. an., carb. veg., caust., graph., natr., petr., phos.

Lesions mécaniques. Arn., rhs, sulph.

Morsure. Arn., sulph. ac.

\_\_ vénéneuse. Sen.

Nodosités. Caust., daph., agar., alum., ant., dulc., magn., mang., mur. magn., natr. mur.

- arthritiques. Aur., calc., dig., rhod., cic., graph., lyc.

PIQURE d'abeilles. Arn.

PLAIE. Arn.

de morsure. Arn.

qui saigne facilement. Diad., phos., merc.

PLAIE qui suppure. Merc., puls., sil.

- vénéneuse. Sen.

PRURIT. Sil.

Réseau rouge. Plat.

Rongement à la peau. Plat., dig., spong., staph., (cycl., vit.).

Rougeur. Bell., lyc.

Rugosités. Phos. ac., sass., (sec.).

Sécheresse. Hell., sec.

Sensibilité. Sil., sep., thuj.

— a l'air chaud. Aur., calc., cocc., sep., ign.

Sensibilité à l'air froid. Camph., cocc., phos., sep., agar., amm., calc., caust., coff., daph., rhod., sabad.

— au grand air. Cocc., coff., natr., nux petr., calc., caust., cham., kal., lyc. mgs aus., merc. subl., mosch., rhs sulph., viol. tric.

— à l'air humide. Amm., calc., carb veg., dulc., rhod., sep.

au courant d'air. Calc., bell., caust. kal., natr., sil., (rat., sel.).

SPHACÈLE. Ars., sec., (euph.).

STÉATOME. Calc., graph.

SUCILLATION. Arn., con., dulc., sulph ac.

SUINTEMENT. Iod., sulph.

Suppuration. Sil., merc., puls.

- bienfaisante. Merc., puls., sil.

- maligne. Asa, sil.

- dans les parties membraneuses Sil.

TANNES noires. Natr., nitr. ac., sulph.

Tension. Stront.

Transpiration (défaut de). Kal., led., lyc., amm., bell., chin., dulc., graph., hyosc., iod., magn., merc., natr., phos. ac., sec., sep., sil.

ULCERE fistuleux. Lyc., calc., sil., sulph.

VARICES. Ars., calc., carb. veg., lyc., mgs aus., sulph.

- ulcérées. Sil., sulph.

VERRUES. Calc., caust., natr., natr. mur., rhs, sit., ars., dulc., euph., nitr. ac., petr., sep., sulph., thuj.

- enflammées. Bell., sulph., thuj., nitr. ac., sep., sil.

Vésicules de sang. Ars., sec., natr. mur., sulph.

- rongeantes. Graph., nitr. ac., sep., sil., caust., magn., petr., sulph.

#### 2. ÉRUPTIONS.

ERUPTION en général. Amm., ars., con., dulc., lyc., natr. mur., sep., sulph., bar., calc., carb. veg., caust., clem., kal., petr., rhs, sass., sil., cupr., (euph.).

BLANCHE. Agar,, valer.

Boutons (de). Ant., con., mur. ac., natr. mur., nitr. ac., phos., phos. ac., rhs, sass., squill., staph., stront., tart., veratr., zinc., (mgs).

Brulante. Ars., nitr., oleand., rhs, ant., calc., cic., merc., phos. ac., spig., staph., stront., veratr., (calad.).

COULEUR cuivrée. Ars., veratr., carb.

Couleur cuivrée jaune. Merc.

- rouge. Ant., aur., cham., cic., graph., sass., sep., thuj., valer.

CROUTEUSE. Ars., bar., calc., dulc., merc., rhs, sass., sulph., alum., bell., bov., graph., lyc., mur. ac., natr. mur., sep., sil., thuj., viol. tric.

DARTREUSE, Staph., clem., dulc., natr., rhs (voy. n° 3).

Démangeante. Merc., plat.

Douloureuse. Lyc., merc.

Écailleuse. Aur., clem., cic., oleand.

Écorchure (avec douleur d'). Phos. ac.

- au toucher. Hep., spig.

ELANÇANTE. Natr. mur., plat., squill., viol. tric.

GALE véritable. Sulph., carb. veg., caust., mang., phos. ac., sep.

- grasse. Merc.

GALEUSE. Carb. veg., cupr., grat., sep., squill., sulph., valer., (lach., therm.).

Humide. Calc., cic., graph., grat., oleand., rhs, staph., alum., merc., nitr. ac.

- âcre. Calc., graph.

- excoriante. Rhs, merc., squill.

- fetide. Staph.

- jaune. Clem.

- sanieuse. Rhs.

- verdâtre. Rhs.

MILIAIRE. Agar., bryon., cham., merc., staph., tart., acon., ant., bell., calc., caust., coff., natr. mur., nux, sass., spong., veratr., (calad., sel.).

- pourprée. Acon., bell., coff.

Nonosités (de). Led., spig., staph., thuj., valer.

ORTICAIRE. Con., dulc., rls, sulph., ars., calc., carb. veg., caust., hep., lyc., merc., natr. mur., nitr. ac., petr., phos., veratr.

- après un fort mouvement. Con., natr.

PETITE. Carb. veg.

PRURIANTE. Amm., merc., rhs, ant., agar., calc., canth., con., natr., oleand., sep., spig., spong., squill., staph., stront., sulph., thuj., veratr.

- dans la chaleur. Sass.

- pendant la nuit. Merc., rhs.

Rongeante. Grat., clem., squill., viol.

Rougeole. Puls., acon., coff.

SAIGNANTE (facilement). Merc.

SCARLATINE. Bell., (euph., tereb.).

SCROFULE (avec). Mur. ac.

SECHE. Bar., valer., merc., sass.

SUPPURANTE. Cic., lyc., merc., rhs, sep., sil., spig., staph., veratr. (comp. à humide).

TACHES rouges (de). Merc.

VARIOLE. Ars., puls., rhs, tart., arn., thuj., (clem.).

noire. Ars., sec., mur. ac., rhs, sep., sil.

VESICULAIRE. Ant., ars., bell., dulc., sulph., canth., clem., merc., nitr., plat., rhs, sep., sil., (mgs).

Vésicules de sang. Ars., sec., natr

### 3. DARTRES.

En GÉNÉRAL. Alum., ars., bov., graph., petr., sulph., zinc., calc., clem., con., dulc., hep., iod., kal., lyc., natr., natr. mur., nitr. ac., nux, phos., rhs, sil., sulph.

Brulantes. Ars., bov., carb. veg., con., led., mgs arc., merc., sep., (calad.).

CIRCULAIRES. Sep.

Couleur jaune brune. Natr., lyc.

CROUTEUSES. Con., graph., lyc.

Déchirantes. Mgs arc.

ECAILLEUSES. Clem., magn., dulc., led., merc., phos.

Humides. Bov., calc., clem., con., dulc., graph., lyc., hep., merc., natr., sep.

Insensibles. Lyc., magn.

PRURIANTES. Bov., clem., con., graph., mang., natr. mur., nitr. ac., sep., (ambr., kal. hyd., nic.).

- dans la chaleur. Clem.

- le soir. Alum., staph.

Rouges. Magn., clem.

Rugueuses. Lyc.

Sèche. Rhs, bov., calc., dulc., merc., (kal. hyd.).

SUPPURANTES. Merc., natr., sep., sil., zinc.

Syphilitiques. Merc.

4. TACHES.

BRULANTES. Phos. ac., tab.

- Couleun (de) blanche. Ars., alum., phos., sep., sil., sulph.
- bleue. Ars., bar., fer., op., sulph. ac.
- brune. Carb. veg., con., petr., phos., sep., thuj.
- jaune. Natr., phos., sep., fer., sabad., tart.
- qui devient jaune verdâtre. Con.
- rosées et noueuses. Sil.
- rouge. Bell., calc., con., sabad., iod., lyc., magn., phos. ac., sep., spong., squill., stann., sulph. ac., (tab.).
- brun. Nitr. ac.
- qui disparaît par le froid. Sabad.

DARTREUSES. Merc., natr. mur., sep.

ENVIE. Sulph.

- avec stries. Carb. veg., (euph.).
- EPHÉLIDES. Calc., lyc., natr., phos., sulph.
- FROID (qui sortent par le). Sabad.

HEPATIQUES. Merc., sulph., lyc.

Marbrées. Thuj.

- Péréchies. Bell., bryon., (ars., led., rhs, sec., sil., sulph. ac.).
- PRUMIANTES. Con., graph., iod., mero., natr. mur., spong., sulph. ac.
- Puces (comme des piqures de). Acon.
- SCARLATINES. Bell., (euph.).

### 5. ULCÈRES.

BATTEMENTS (avec). Bryon., chin., clem., sulph.

BATTEMENTS (avec) la nuit. Hep.

Bleus (qui deviennent). Asa, aur., con.

Bords (avec dureté des). Ars., asa, puls.

- Brulants. Ars., carb. veg., sil., hov., cham., clem., daph., lyc., merc., mur. ac., nitr. ac., nux, puls.
- la nuit. Hep., lyc.
- CHAIRS (avec ) luxuriantes. Petr., sep., sel.

CHARBON. Ars., bell., sil., (sec.).

CROUTEUX. Ars., bell.

Déchirement (avec douleur de). Canth., lyc., sep., staph.

Démangeants. Bryon., cham., graph., staph.

Douloureux. Lyc., merc., puls.

ELANCEMENTS (avec). Ars., nux, puls., chin., daph., hep., nitr. ac., sil., staph., (clem.).

Enflammés. Ars., daph., sil.

FÉTIDES. Ars., asa, carb. veg., sil., amm., con., lyc., merc., sep.

FISTULE. Ant., lyc., sulph., calc., lyc.

Fongueux. Merc., sil.

FROIDS. Bryon.

FURONCLE. Arn., bell., led., lyc., nitr. ac., phos., thuj., ant., calc., natr. mur., nitr., sep., staph., (euph., magn., mgs, sec., sil., zinc.).

GANGRÉNEUX (qui deviennent). Ars., chin., bell., sec., (euph.).

Guérissent (qui) lentement. Cham., hep., petr., bar., calc., croc., mang., staph., sulph.

Gonflés. Bell., con., lyc.

564 Peau.

Indoulouseux. Ars., carb. veg., sep.

Insensibles. Ars., euph.

LARDACÉS. Sabin.

MERCURIELS. Hep., nitr. ac., bell., sass., sil.

PANARIS. Caust., hep., mgs arc., mgs aus., sil., sulph., con., merc., puls., sep.

PRUBIANTS. Sil., alum., ars., bov., graph., sil., lyc., puls., staph., sulph.

Pus acre. Ars., merc., rhs, sil., squill.

- aqueux. Asa.

- épais. Con.

- fétide. Ars., asa, carb. veg., rhs, sil., staph., amm., con., merc., sep.

- gélatineux. Sil.

- jaune. Clem., sil.

- liquide. Asa.

- rongeant. Merc., sil.

- sanguinolent. Ars., con.

- sanieux. Ars., asa, carb. veg., rhs, sil., amm., con., lyc., merc., sep.

- verdâtre. Rhs, sil.

RONGEANTS. Sit., con., hep., sulph.

SAIGNENT (qui) facilement. Ars., carb. veg., hep., phos., puls., con., lyc., nitr. ac., sil.

TÉRÉBRATION ( avec douleur de ). Chin., sil., sulph.

Toucher (douloureux au). Hep.

Ulckre vieux. Croc., cupr., lyc., sep., sil.

6. GONFLEMENT.

ARTHRITIQUE. Ant., bryon., colch., hep.,

led,, lyc., mang., puls., sulph., acon., arn., ars., bell., cocc., merc., rhs,

BATTEMENT (avec). Sulph.

thuj.

BLANC. Ars., calc., graph., lyc., merc., sep., sulph., (euph.).

BRULANT. Ars., rhs, caust., puls.

CHAUD. Ant., bryon., sulph., arn., asa, bor., canth., cocc., hep., led., merc., petr., puls., rhs, sulph.

Déchirante (avec douleur). Ars.

Douloureux. Merc., con., hep., thuj.

Dun. Arn., ars., led., sep., thuj., (tab.).

ECORCHURE (avec douleur d'). Rhs.

ELANCEMENT (avec douleur d'). Puls., rhs., ant., caust., mang., sulph., (tab.).

ENFLAMMÉ. Acon., aur., bell., colch., puls., rhs, thuj., asa, carb. an., cocc., dulc., euph., lyc., merc., sil., sep., sulph., (sen.).

FOURMILLEMENT (avec). Rhs.

FROID. Asa, dulc.

HYDROPIQUE. Ars., con., lyc., sen., sulph., ant., aur., bell., chin., dig., dulc., hell., iod., kal., merc., mur. ac., nitr., op., prun., sep., tereb.

INDOLORE. Ars., rhs.

LUISANT. Arn., ars., mang., merc., rhs, sulph.

LYPOME. Bar., ant., sabin.

Mov. Ars.

NOCTURNE. Dig., phos.

PALE. Bryon., sulph., bov.

Peau.

Parties (des) malades. Merc., puls.,

Rouge. Asa, aur., bell., puls., ant., arn.,

canth., hep., mang., merc., rhs, sep., sulph., thuj.

- paralytiques. Plumb.

- tacheté. Sep.

bryon.

SCARLATINEUX. Bell.

Soir (le). Puls., rhs, stann., cocc., phos.

STÉATOME. Calc., graph.

SUPPURANT. Staph., sil.

TENDU. Bell., bryon., rhs, sulph., ant., led., thui.

TRANSPARENT. Merc.

#### PRURIT.

En général. Graph., lyc., magn., merc., sulph., amm., carb. an., bov., (ambr., lach., ran.).

BRULANT. Cic., dig., euph., hep., nux, plat., rhs, (arg.).

CHAUD (en devenant). Bov., merc., carb. veg., cocc.

DÉMANGEANT. Euph., daph., oleand., (lach.).

Déshabillant (en se). Cocc., oleand., ars., daph., sil., stann.

Éсн $_{f u}$ егна  $_{f r}$   $_{f r$ 

ELANÇANT. Thuj., dig., mgs arc., nux, plat., puls., spong., zinc.

Peau. FOURMILLANT. Rhod., acon., bar., sil., staph.

903

From (dans le). Spong.

GRATTER ( qui porte à ). Euph., plat., spong., (sel.).

- (après) il s'aggrave. Anac., daph.

- (après) éruption. Amm., hep., stront.

GRATTEMENT (par le) amélioration. Ign.

- - brûlure. Amm., merc., sil., sulph.

- - excoriation. Oleand.

- gonflement. Daph.

- miliaire. Spong.

- - peau qui s'épaissit. (Lach.).

- - saignement. Merc.

- sensation de volupté. Sil.

- - suintement. (Sel.)

LIT (au). Bov., merc., carb. an., carb. veg., cocc., coloc., lyc., sulph., zinc.

MALADES (aux parties). Acon.

MATIN (le). Staph., sulph.

Nuit (la). Sulph., bar., croc., thuj.

RONGEANT. Dig., plat., spong., (cycl., vit.).

Som (le). Carb. an., carb. veg., cocc., coloc., lyc., thuj., zinc., (cycl., sel.).

Toucher (au). Euph.

- amélioration. Thuj., zinc.

VOLUPTUEUX. Sil.

### XXXVI. SOMMEIL.

### 1. SOMNOLENCE ET SOMMEIL EN GÉNÉRAL.

- BAILLEMENT. Acon., bryon., rhs, viol. od., cin., laur., led., lyc., magn., mosch., sabad., sil., stann., zinc., (cor., euph., kal. hyd., rut., tar.).
- avec chair de poule. Laur., par.
- avec envie de se coucher. Grat.
- avec froid. Natr. sul.
- et tremblement. Mur. ac.
- avec frissonnement. Par., sil.
- avec horripilation. Cin., laur., oleand., (phos., plat., sass.).
- incomplet. Lyc.
- avec larmoiement. Staph., viol. od.
- en marchant au grand air. Euphr.
- le matin. Ign., viol. od.
- après midi. Ign., canth., plat.
- avec oppression. Stann.
- avec pendiculation. Canth., caust., chin., plat., sabad., staph., tart., (natr. sul., oleand., rut.).
- spasmodique. Hep., ign., mgs arc., mosch., plat., rhs.
- avec tremblement. Cin., oleand.
- COMA-VIGIL. Veratr., cocc., hyosc.
- Envie de dormir continuelle. Ant., croc., béll., aur., mgs arc., op., phos. ac., tart., veratr., caust., puls., sec., (con., dig., sep.).
- au grand air. Tart.

- Envir de dormir avec assoupissement. Op., led., (euph., mgs).
- jour et nuit. Bar.
- avant midi. Ant.
- avec ronflement. Dat., op.
- le soir. Ars., tart.
- Insomnie la nuit en général. Ars., bar., bell., carb. veg., caust., coff., hep., merc., mur. ac., sulph., bryon., cann., cic., cin., dig., bell., led., natr. mur., phos., plat., rhs, sil., spong., veratr., thuj., (ambr., cinn., ind., kal. hyd.).
- avant minuit. Alum., ang., mgs aus., mur. ac.. rhs, merc., mur. magn., phos., thuj.
- après minuit. (Alum., ars., bor., kal., mgs, rhod., sep., sil.).
- on s'endort tard. Chin., lyc., merc., mur. magn., natr., nux, phos., puls., ran., sil., sulph., thuj., con., fer., graph., hyosc., kal., nitr. ac., phos. ac., plumb., sabad., sep., spig., stann., staph., stront., sulph. ac., (chel., clem., cycl., euph., guaj., rat., sel., tereb., teucr., viol. tric.).
- quand on s'éveille on s'endort difficilement. Ars., fer., natr. mur., ran., rat.

RÉVEIL anxieux. Puls., rat., samb.

- avec perte de connaissance. Chin.
- difficile. Nux, natr., phell., tab.
- fréquent. Calc., canth., cic., graph. lyc., merc., nitr. ac., sil., sulph. zinc., (bar., bism., cast., chel., colch.,

dig., euph., euphr., guaj., mur. ac., nic., nitr., petr., ran., rut., sabin., samb., sass., sel., squill., stront., tar., tereb., teucr., viol. tric.).

Réveil par le froid. Mur. ac.

- à la même heure. Sel.
- pendant plusieurs heures. Natr. mur., (aur., dulc., ran., rat., sep., sil., sulph.).
- par secousses dans la tête. Mgs arc.
- avec soubresauts. Ant., colch., con., dig., samb., staph., sulph., (bism., euphr., guaj., kal. hyd., rut., vit.).
- par suffocation. Hep., samb., ipec.
- par la toux. Hep., stront.
- trop tôt. Dulc., natr., nux, aur., daph., graph., kal., merc., nitr. ac., phos. ac., sep., staph., sulph., (bor., guaj., sel., verb.).
- ommeil agité. Aur., chin., cocc., lyc., ars., bor., bell., calc., cann., coloc., con., dig., dulc., fer., graph., merc., nitr. ac., puls., rhs, sil., spig., squill., stann., staph., sulph., (natr. sul., nitr., ol. an., sabad., sabin., tereb., therm., viol. tric.).
- anxieux. Ars., bell., cocc., hep., kal., petr.
- cham., cic., cocc., graph., hep., mgs arc., merc., sabad., sil., (dig., euph., nitr., par., sel.).
- qui ne délasse pas. Chin., sulph., thuj., arn., cann., graph., lyc., magn., mur. magn., petr., sabad., sep., spig., clem., daph., guaj.).
- engourdissant. Bell., graph., hep., p., cocc., ign., led., (euph., mgs, ec., sen.).

Sommer interrompu. Dig., zinc., ars., cocc., (par.).

- léger. Acon., ars., ign., merc., sil.
- trop long. Merc., nux, phos., plat., sulph., (phell.).
- profond. Bell., cupr., tart., anac., ign., mgs arc., rhod., sec., (eug.).
- Somnolence. Acon., cham., mosch., veratr., hell., merc., phos. ac., (cycl., mgs).
- qui alterne d'un jour à l'autre. Lach.
- améliorée par le mouvement. Mur. ac.
- anxieuse. Acon.
- étant assis. Petr., tart., (sep., sulph.).
- avec chaleur aux yeux. Rhod.
- avec contraction des yeux. Con., croc., kal., tart., mgs aus.
- en écrivant. (Natr. sul., phos. ac.)
- par faiblesse. Nitr. ac.
- avec fièvre. Cham.
- pendant le jour. Bar, calc., caust., chin., croc., lyc., mgs arc., mosch., staph., sulph., arn., ars., asa, bell., cann., carb. veg., led., merc., rhs, (agar., clem., cor., daph., dig., dulc., graph., magn., mur. magn., natr., natr. mur., nitr., nitr. ac., ol. an., petr., phell., phos. ac., ran., sabad., sec., sep., stann., zinc.).
- en lisant. (Anac., aur., con., natr., natr. sul.)
- en marchant au grand air. Acon., mgs aus.
- le matin. Cocc., con., hep., led., mgs aus., natr., nux, phos. ac., rhs, zinc., (bism., clem.).

368 Sommeil.

Somnolence à midi. Chin., aur., (tab.).

— avant midi. Nux, led., ( natr. sul.).

— après midi. Sulph., acon., bov., canth.,

grat., phos., zinc.

- pendant l'orage. Sil.

- pendant le repas. Kal.

- après le repas. Acon., aur., chin., nux, rhs, sulph., phos., phos. ac., (ol. an., rut., tab., verb.).

- avec revasseries. Acon., arn.

- le soir. Arn., calc., con., croc., hep., kal., sulph., thuj., anac., hell., bov., chin., graph., lyc., mgs aus., phos. ac., plat., sil., (ang., ind., mang., petr., rut., sel., sen., spig., tab.).

- sans sommeil. Calad., coff., mgs

- pendant le travail. Sulph.

2. SYMPTÔMES DU SOMMEIL.

## A. En s'endormant.

Applux d'idées. Nux, lyc., puls., sabad., (kal., sil., sulph., viol. tric.).

ACITATION. Mur. magn., thuj., (guaj., merc., phos.).

Anxieté. Ars., carb. veg., sep.

CAUCHEMAR. Amm.

CHALEUR brûlante au-dessous de la peau.
Amm.

- dans la région précordiale. Ars.

- sèche. Thuj.

Désin de voir ses amis. Plumb.

Douleur dans les mollets. Staph.

- produite par des ulcères et des dartres. Staph.

FERMENTATION du sang. Amm., asar., puls.

FOURMILLEMENT. Carb. veg., lyc.

IMAGINATION exaltée. Bell., merc., led., phos.

Secousses dans la tête. Mgs arc.

- dans les pieds. Phos.

Soubresauts. Ars., bell., caust., led. lyc., rhs, stront., (ambr., chel., cor. euph., guaj., merc. subl., sass., sen.)

Sueur. Ars., tart., veratr.

TRESSAILLEMENT dans les membres. Ign. ars., bell., puls., ( mgs, merc. subl. )

## B. Pendant le sommeil.

ABERRATION de l'imagination. Bell., dat. cham., merc.

- de l'ouie. Cham., carb. veg.

Anxiete. Bell., cocc., hep., petr.

Bouche ouverte. Merc., (mgs).

CARPHOLOGIE. Op., ars., rhs.

CAUCHEMAR. Amm., nitr., nitr. ac., sulph acon., con., cinn., daph., kal., lyc mur. magn., phos., sil.

- étant couché sur le dos. (Guaj.)

après avoir été endormi. (Cycl

- après minuit. Cinn.

CHALEUR. Dulc., mgs arc., petr., sabin

CHANT. Bell., croc., mgs arc.

Contorsion des yeux. Op.

Convulsions. Bell., cupr., hep., rhm, sulph., thuj., ambr., ars., cham., dulc., kal., op., phos., sil., staph., tart., viol. tric., (cast.).

Coucher (on ne peut se) sur le côté. Ran.

- - sur le côté droit. Bryon.

Couché (on est) sur le dos. Coloc., mgs arc., mgs aus,, rat., plat.

 — les bras au-dessus de la tête. Plat., (calc., coloc.).

- - en croix sur le ventre. Puls.

— les jambes écartées. Cham., petr., puls.

-- - fléchies. Plat., (carb. veg.).

— les mains sous la tête. Δrs., coloc., nux, rat., puls., (mgs).

- la tête basse. Hep.

CRAMPES dans les mollets. Nitr. ac.

Découvre (on se). Mgs arc., plat.

DÉLIRE. Acon., bell., dat., hyosc., ars., bryon., calc., dulc., phos. ac., op., plat., samb., sulph.

Effrair (on s'). Puls., sulph., (tab.).

Enfoncement de la tête dans l'oreiller.

Bell.

EPISTAXIS. Merc.

FAIM vive. Chin.

FROID du corps. Ambr.

GÉMISSEMENTS. Bar., cham., chin., cin., mur. ac., arn., ars.. bell., rhm, veratr., (calad.).

GLISSE (on) vers le bas du lit. Mur. ac.

GRINCEMENT des dents. Ars.

JACTATION. Cham., rhm, ars., bell., cic.,

hep., mgs arc., nitr. ac., rhs, squill., (cast., clem., cor., euph., guaj., mgs, par., rut., tereb., teucr., therm.).

Sommer

Ouverture des yeux. Bell., op., bryon., veratr.

Parotes. Ars., bar., cham., sil., sulph., (camph., carb. an., kal., mgs, mur. ac., natr. mur., sep., stann.).

PLEURS. Cham., cin., hep., rhm, con., natr. mur.

PRURIT. Euphr.

RESPIRATION courte. Cham.

- entrecoupée. Hep.

- sifflante. Mgs aus., nux.

Ronflement. Chin., dat., op., camph., ign., nux, rhm, mgs.

Secousses dans le corps. Mgs aus., sulph., tart.

- dans les pieds. Phos.

Sorr. Cham.

Somnambulisme. Bryon., op., phos., alum., natr. mur., sil., sulph.

Soubresauts. Bell., cham., cocc., hep., rhm, tart., arn., ars., carb. veg., caust., croc., graph., hyosc., ipec., led., phos., puls., rhs, staph., stront., sulph., thuj., veratr., (alum., cast., tab., teucr.).

Sourire. Hyosc.

#### C. Au réveil.

Air (manque d'). Hep., samb.

AGITATION. Mgs.

Anxiété. Puls., rat., samb.

Brisfment des membres. Viol. od.

Donni (on n'a pas assez) le matin. Petr.,
agar., aur., phos., stann., sep., (clem.,

Envie d'uriner. Caust., dig., tar.

FATICUE le matin. Aur., cann., magn., spig., (bism., chel.).

PARESSE. Chel.

Souvient (on ne se) de rien. Chin.

SUEUR. Cic., (chel.).

TREMBLEMENT. Rat., samb.

# 3. SYMPTÔMES QUI EMPÊCHENT DE DORMIR.

Afflux d'idées. Nux, hep., lyc., puls., sabad., (bov., kal., sil., sulph., viol. tric.).

Anxiété. Ars., bell., calc., cocc., graph., veratr., cann., carb. veg., dig., merc., petr., plumb., sep.

CÉPHALALGIE. Sil. (Voy. Douleurs intérieures de la tête. n° 2.)

- pressive. Chin.
- par secousses. Mgs arc.

CHALEUR. Calc., carb. veg., dulc., mgs arc., merc., nitr. ac., petr., phos., sabin.

- sèche. Caust., thuj.

Concestion du sang vers la poitrine. Puls.

Coucher (le) sur le côté. Ran., sabad.

- droit. Bryon.

Douleur dans les membres. Rhod., caust., kal.

ÉLANCEMENTS à la peau. Cann.

ELANCEMENTS à la poitrine. Sabad., sen.

Excitation nerveuse. Colch., teucr., nux, puls.

FAIM vive. Chin.

FERMENTATION du sang. Sil., amm., merc., puls., rhs, sabin., sep., (ran.).

FOURMILLEMENT. Bar., carb. veg., lyc.

FROID. Mur. ac.

- du corps. Ambr., thuj.
- des pieds. Zinc.

Gêne de la respiration. Calc.

- dans le ventre. Magn.

HILARITÉ. Ambr., calc., coff., hyosc., mgs aus., nitr. ac., ran., sulph.

IMAGINATION exaltée. Bell., merc., led., phos.

INQUIÉTUDE. Ars., calc., carb. veg., mur. magn., ran., rhod., bryon., cin., con., hell., laur., led., merc., natr., phos., plat., spig., sulph., teucr., thuj., (clem., guaj.).

- dans les jambes. Agar.
- le matin. Rhod.

MALAISE. Amm. (Voy. Nausées, nº 2.)

Mal de ventre. Veratr. (Voy. Symptômes du ventre.)

Odontalgie. Bar., mur. magn. (Voy. Symptômes des dents.)

Oppression de poitrine. Acon., sen.

Palpitations de cœur. Ars., agar., calc., dulc., mur. ac., natr., puls.

Peur de fantômes. Carb. veg.

Pression à l'estomac. Sen.

Pulsations dans le cerveau. Lyc.

RÉGION précordiale (chaleur dans la ).

- (pression dans la). Calc.

Soir. Calc., bryon., cham., nitr. ac.

4. RÊVES.

ABONDANTS. Sep., sil., stann., sulph., arn., asa, bar., bell., bov., calc., caps., coloc., con., dat., graph., kal., lyc., magn., mgs arc., natr., petr., stront., thuj., (clem., par., tar.).

Anxieux. Arn., aur., chin., cocc., graph., lyc., natr. mur., sil., sulph., thuj., veratr., bar., bell., calc., carb. veg., dig., hell., iod., kal., magn., merc., puls., sep., spig., stann., staph., sulph. ac., (ambr., arg., cast., nic., natr. sul.).

CHAGRIN (de). Ars., bryon., caust., (asar.).

CHOSES ( de ) arrivées pendant le jour. Bryon., cic., rhs.

CHUTE (de). Dig., thuj.

CLAIRS. Magn., sulph., bryon., cic., dat., mosch., petr., teucr., (anac., ars., bell., carb. veg., clem., merc., mur. ac., natr. mur., sil., stann.).

Confus. Chin., bar., cic., hell., mgs aus., stann., (eug.).

- après minuit. Chin.

Désagréables. Ant., asar.

Dégoutants. Cast., zinc.

EAU (d'). Dig., ran.

Effravants. Mgs aus., merc., phos.,

sep., sulph., (aur., bell., dig., graph., natr., nic., sass.).

Effroyables. Arn., cocc., croc., graph., lyc., puls., spong.

EROTIQUES. Mgs arc., (lach.).

Espérance (d') trompée: Dig., mosch.

FANTASTIQUES. Calc., spong., (lach.).

Fantômes (de). Carb. veg., ign.

FEU (de). Anac., hep.

GAIS. Croc., asa.

Guerre (de). Plat.

Immoraux. Mosch.

Inquiers. Oleand., sulph., zinc.

LOURDS. Chin., nux, thuj., dulc., natr. mur., sass.

- le matin. Nux.

MALADIE (de). Calc., kal.

Morr (de). Ars., kal., phos. ac., plat., thuj.

Pense (dans lesquels on). Acon., ign., mgs aus., rhs, sabad., thuj., (carb. an., graph., lach., mgs).

Péril (de). Thuj., ran.

Querelles (pleins de). Ant., nic.

Rêvasseries. Natr. mur., sil., alum., bar., calc., carb. an., carb. veg., con., kal., graph., nitr., petr., spong., stront., sulph.

Soucis (pleins de). Ars.

Souvient (dont on se). Mang.

— (donton ne se) pas. Aur., bell., hell., men., merc.

TRISTES. Spong.

372 Sommeil.

VEILLE (où on). Cham., amm., ang., calc., merc.

- (qui se prolonge pendant la). Chin.

Sommeil.

Volution. Op., plat., thuj., bism., oleand., staph., viol. tric., (coloc., natr., rhod., sass.).

## XXXVII. SYMPTOMES DE FIÈVRE.

(Circulation et pouls. Voy. XXXII.)

#### 1. FROID. At the fact.

# A. Selon la nature, le temps et les circonstances.

En Général. Ars., camph., cann., canth., dig., hell., led., lyc., puls., sass., sec., tart., veratr., verb., caps., coloc., daph., dulc., plumb., (asar., chel., diad., ind., mgs, ol. an.).

Côté (d'un). Dig.

FROW (sensation de). Mgs arc., sulph.

- qui parcourt. Merc.
- intérieur, Natr. sul., par.

Ain (au grand). Laur.

Fru (près du). Dulc.

Mangé (après avoir). Ran.

Midi (avant). Cop.

- (à). Ran.
- (après). Ran., nitr.

Soir (le). Dulc.

B. Symptômes pendant le froid.

CÉPHALALGIE qui précède. Nitr.

CHALEUR dans le cerveau. Veratr., arn.

- dans le front. Chin.

CLAQUEMENT des dents. Tab.

Concestion du sang vers la tête. Chin.

FACE (chaleur à la). Chin., coloc.

— (rougeur à la). Chin.

Humeur (mauvaise). Caps.

Mains (les) sont bleues. Nux.

PENDICULATIONS. Natr. sul.

PIED (douleur au). Cop.

Pouls (absence du). Ars.

Soif. Chin., daph., nitr., (kal. hyd.).

- (manque de). Coloc., nitr., sulph.

## . 2. FRISSONS.

# A. Selon la nature, le temps et les circonstances.

En Général. Hep., led., merc., mur. ac., puls., sabad., staph., sulph., tart., anac., arn., calc., coloc., daph., mgs aus., mur. magn., natr., phos., sep., spong.,

veratr., (arg., asar., guaj., lam., mgs, merc. subl., phell., natr. sul.).

FRISSONS. Alum., bar., calc., cic., daph.,

## Symptômes de sièvre.

mgs arc., natr. mur., puls., rat., sil., sulph., agar., bryon., laur., lyc., men., mosch., petr., (cast., chel., grat., ol. an., tab., tar., viol. tric.).

Frisson extérieur. Merc., zinc.

- d'un seul côté. Lyc., (natr., thuj.).
- intérieur. Calc., merc., natr. mur., vit.
- qui parcourt. Cham.
- avec tremblement. Bryon., chin., acon., amm., bell., camph., canth., dat., fer., hell., ign., iod., laur., mgs aus., mur. ac., nux, rhs, samb., (agar., cast., phell.).

FRISSONNEMENT. Ganth., cocc., coff., dulc., phos., plat., stann., spig., thuj., zinc., (guaj., natr. sul., sen., teucr., vit.).

Air (au grand). Hep., agar., moseh., petr., plat., sep.

Bu (après avoir). Ars., caps., chin., nux, veratr.

CHAGRIN (après). Nux.

CHAMBRE (dans la). Ars.

DÉCOUVRANT (en se). Cor., bell.

DINER (après) amélioration. Ambr.

Dormi (après avoir). Bryon.

Douleurs (pendant les). Ars., graph.

FEU (près du). Alum., cin., dulc., anac., bov., guaj., iod., lam.

Humidité (par l'). Sep.

Jour (d'un) à l'autre. Lyc.

Lit (dans le). Alum., bov., carb. an., fer., láur.

Symptômes de sièvre.

Lit (dans le) amélioration. Mur. magn.

Marchant (en) au grand air. Merc. subl.

MARCHE (après la) au grand air. Nux.

MATIN (le). Graph., phos., spig., thuj.

MIDI (avant). Ambr., cop., staph., stront.

- (après). Arg., ars., bryon., dig.

MINUIT (après). Thuj.

MOUVEMENT (pendant le). Merc. subl., spig.

- (après le). Nux.

Nuir (la). Staph., alum., arg., bov., carb. veg., caust., fer., nux.

Refroidissement (après). Lyc., sep.

Soir (le). Arn., phos., acon., amm., ars., bov., carb. an., carb. veg., cham., dulc., graph., hep., kal., magn., mur. magn., nitr., nitr. ac., nux, phos. ac., samb., stann., stront., thuj.

#### B. Symptômes pendant le froid.

Anxiété: Chin., ars., caps., lam.

ARTICULATIONS (douleur des). Hell.

Assoupissement. Natr. mur.

BAILLEMENT. Caust., mur. ac., par., thuj.

Bouche (amertume à la). Ars., hep.

- (sécheresse à la). Thuj.

CÉPHALALGIE. Natr. mur., acon., ars., bryon., daph., graph, hell., mang., petr., sep., tar.

DENTS (claquement des). Camph., hep., plat., tab.

374 Symptômes de sièvre.

Diarrhée. Phos.

Dos (douleur au). Ars., bell., caust.

Estomac (douleur à l'). Lyc.

FACE (chaleur de la ). Acon., agar., anac., bell., calc., coloc., lyc., merc.

- (pâleur de la). Puls., canth., chin., tart.

— (rougeur de la). Aur., bryon., ars., lyc.

FAIM. Mgs aus.

Fore (douleur au). Chin., ars.

Jours (chaleur des). Cham., calc., merc., natr., (euph.).

- (rougeur des). Acon., cham.

LASSITUDE. Caust., sen., sep.

Mains (mort des). Lyc., sep.

MEMBRES (douleur des). Ars., bell., bryon., hell., lyc., nitr.

- (engourdissement des). Nux.

ODONTALGIE. Graph., kal.

Ongles bleus. Nux.

OREILLES (douleur aux). Graph.

Os (douleur dans les). Natr. mur.

Peau (élancements dans la). Samb.

- (endolorissement de la). Nux.

Pendiculations. Ipec., mur. ac.

Poitrine (douleur dans la). Ars.

Respiration (gêne de la). Ars.

Soir. Bov., bryon., calc., cann., chin., cin., daph., natr. mur., acon., carb. veg., hep., ign., kal., rhs, sep., stann., thuj., veratr., (kal. hyd., natr. sul.).

- (manque de). Ars., mur. ac., sabad.,

Symptômes de sièvre.

sulph., agar., aur., calc., coloc., hell., natr., natr. mur., oleand., phos., phos. ac., puls., thuj., (lam.).

Sonnolence. Tart., ambr., natr. mur.

Sueur froide au front. Bryon.

Tête embarrassée. Caps.

TITUBATION. Caps.

TREMBLEMENT. Anac., con., plat., tart., teucr., (vit.).

Tressaillement des membres. Dat.

VENTRE malade. Bov., chin.

Vomir (envie de). Sabad., ars.

Vomissement de bile. Chin., ars., ign.

— de mucosités ou d'aliments. Ign., puls.

#### 3. HORRIPILATION.

A. Selon la nature, le temps et les circonstances.

EN GÉNÉRAL. Arg., ign., kat., led., merc., verb., anac., bar., bell., cham., chin., cin., fer., hyosc., natr., natr. mur., oleand., plat., veratr., zinc., (asar., cast., chel., euph., guaj., phell., viol. od.).

Air (au grand). Hep., plat.

Bu (après avoir). Ars., caps., chin., nux, veratr.

CHAMBRE (dans la). Ars.

DINER (après). Rhs.

Feu (près du). Cin., rut., guaj.

FROID (dans le). Cham.

Journée (pendant la). Kal.

Dimpionies de fierre.

Lit (dans le). Aur.

Midi (avant). Ars., stann.

(après). Arg., dig.

Nuir (la). Staph., arg.

ORGANE (avec affection d'un) intérieur. Euph.

PARTIES (aux) malades. Ars.

SEMI-LATÉRAL. Verb.

Soir (le). Aur., acon., ars., bov., cham., diad., phos.

TOUCHER (au). Spig.

B. Souffrances pendant l'horripilation.

AGITATION. Ars.

Anxiété. Ars.

BAILLEMENT. Oleand.

BATTEMENTS dans tout le corps. Zinc.

- dans la tête. Sen.

CHAIR de poule. Laur., sabad.

CÉPHALALGIE. Acon.

CHEVEUX (hérissement des). Men.

Dos (douleur au). Bell.

Ace (chaleur à la). Acon., cham., dros., natr.

- (rougeur à la). Acon., cham., dros.

HALEINE chaude. Zinc.

- courte. Zinc.

oves (chaleur des). Cham., natr.

(rougeur des). Acon., cham.

IALAISE. Bell.

lembres (brisement des). Bell.

Membres (douleur des). Ars.

Symptômes de sièvre.

- (jactation des). Mgs aus.

PENDICULATIONS. Ars.

Picotements à la peau. Samb.

Poitrine (douleur à la). Sen.

RENVOIS. Rhs.

RESPIRATION difficile. Sen.

Soir. Cham., acon.

- (manque de). Ars., chin., dros., natr., oleand., phos.

Somnolence. Natr. mur.

TREMBLEMENT. Zinc., anac., cin., oleand.

VENTRE ( souffrances du ). Diad.

YEUX (douleur aux). Sen.

- (obscurcissement des). Bell., mgs aus.

4. CHALEUR.

A. Selon la nature, le temps et les circonstances.

En GENERAL. Acon., ars., cham., hep., hyosc., ign., mur. ac., phos., sulph., coff., graph., kal., lyc., magn., merc., mosch., phos. ac., rhod., sep., stann., zinc., (nic.).

Anxieuse. Acon., ars., bov., magn., op., phos., phos. ac., sep., spong., stann.

BRULANTE. Acon., ars., bell., dulc., op., bryon., hell., lyc., squill., staph.

Extérieure. Ign., bell., hell., merc., sil., staph.

Intérieure. Acon., ars., bryon., bell., nitr. ac., puls.

PARCOURT (qui). Lyc., phos., dig., graph.,

merc., oleand., sep., spong., stann., (ambr., bor., vit.).

Seche. Acon., ars., bell., bryon., dulc., hep., merc., phos., sulph., caust., magn., mang., nitr., nitr. ac., phos. ac., sil., squill., stront., (mgs).

Sensation de chaleur. Cham., mgs arc., oleand., sil., stann.

APPLICATION ( par l' ). Oleand.

Assis (étant). Sep.

CHAGRIN (après). Petr.

CHALEUR (par) artificielle amélior. Cor.

Lit (dans le). Mur. magn., hell., (mgs, vit.).

Mancé (après avoir). Calc., nitr. ac., phos., (viol. tric.).

MARCHE ( pendant la ) au grand air. Camph., mgs aus., sep.

MATIN (le). Sulph., kal., magn., (bor., mgs).

Midi (avant). Sass.

- (après). Cop., stann,

Mouvement (pendant le). Sep., stann.

Nuir (la). Caust., hep., mur. magn., ars., carb. an., merc., nitr. ac., sil., staph., stront., (mgs, nic.).

## B. Souffrances pendant la chaleur.

Anxiete. Acon., ars., bov., magn., op., phos., phos. ac., sep., spong., stann.

\_ au cœur. Ambr.

\_ mortelle. Rut.

Symptômes de fièvre.
Boissons (horreur des). Hell.

Bouche (amertume de la). Ars.

Céphalalgie. Bell., natr. mur., ars., kal.

Coeur (douleur au). Spong.

valer., (ang., rut.).

- (palpitations de). Merc., sass., sep. sulph.

Congestion vers la tête. Bell.

CONNAISSANCE (perte de). Phos. ac.

Découveir (envie de se). Mgs arc., mur ac., plat.

Délire. Chin., dulc.

Estomac (pression à l'). Sep.

EXCITATION. Teuer.

FACE (pâleur de la). Ipec., sep.

- (couleur jaune de la). Natr. mur.

- (rougeur de la). Ign., op., bell. camph., lyc., sep., sulph., veratr.

FAIBLESSE après la chaleur. Dig.

FAIM vive. Phos.

FERMENTATION du sang. Fer., phos. ac sass., staph.

Gorge (mal de) en avalant. Phos. ac.

INQUIÉTUDE. Bell., ars., bov., mur. ac mur. magn., op., rut.

LASSITUDE. Bryon., calc., dig., nat mur., phos.

MALAISE. Carb. veg., (bor.).

MEMBRES (élancements dans les). Chin.

Oppression de poitrine. Acon., bov carb. veg.

Oubli de toutes choses. Sep.

PLEURS. Spong.

Symptômes de fievre.

POITRINE douloureuse. Viol.

RESPIRATION gênée. Lyc., rut.

SACRUM (douleur au). Kal.

Soir. Acon., bell., bov., bryon., chin., hep., natr. mur., sulph., valer., calc., dat., dulc., mur. magn., petr., phos., puls., sep., spong., stann., staph.,

stront., (ang., cop., nic.).

- (manque de). Ign., mur. ac., sabad., ars., carb. veg., chin., hell., magn., nitr., nitr. ac., oleand., phos., phos. ac., samb., sep., (euph.).

Somnolenge. Hep.

Surur froide. Ipec.

- au front. Sass.

Tete (embarras de la). Valer., arg., bryon., veratr.

TREMBLEMENT. Magn.

Veines (chaleur brûlante dans les). Ars.

- (gonflement des). Chin., mgs arc.

VERTIGES. Bryon., merc.

VOMISSEMENT. Dat.

YEUX (faiblesse des). Natr. mur.

5. SUEUR.

A. Selon la nature, le temps et les circonstances.

En général. Dulc., graph., tart., valer., hep., therm., thuj.

AFFAIBLISSANTE. Carb. an., stann., chin., cocc., merc.

Anxieuse. Natr., calc., sep.

COLLANTE. Ars., lyc., phos., anac., fer., hep., merc., phos. ac.

Colle (qui) le linge. Merc. , sel.

DÉMANGEANTE. Cham., con.

FROIDE. Ars., natr., veratr., cupr., dig., dulc., hep., hyosc., ipec., lyc., merc., sec., sulph., sulph. ac., (mgs).

Symptomes ae pevre.

GRASSE. Magn., merc.

INSECTES (qui attire les). Calad.

ODEUR (d') acide. Cham., sep., sil., sulph., carb. veg., hep., iod., led., magn., merc.

- aromatique. Rhod.
- empyreumatique. Bell.
- fétide. Bar., graph., dulc., kal., lyc., magn., phos.
- de moisi. Stann.
- d'ognon. Bov.
- putride. Staph.
- d'urine. Coloc.

PRURIANTE. Mang., par.

Semi-latérale. Puls.

TACHE (qui) en jaune. Merc.

- le linge. Sel.

Air (à l') froid. Bryon., calc.

Assis (étant). Sep., staph.

Douleurs (pendant les). Natr., merc.

Fièvre (après la). Ars.

GARDE-ROBE (pendant la). Merc.

JOUR (le). Dulc., graph., tyc., natr., ambr., bell., led., lyc., nitr. ac., phos., sep., sil., staph.

Lit (dans le). Sulph.

Sympodines as poor c.

MANGBANT (en ). Carb. veg., natr. mur., ol. an.

Manger (après le). Nitr. ac., sep.

Mangé (après avoir) chaud. Sulph. ac.

Marchant (en). Ambr., kal., led., sel., sil.

- - au grand air. Caust., bryon.

MATIN (le). Bryon,, mosch., natr., phos., sep., amm., ant., aur., bov., calc., carb. veg., hell., hep., iod., merc., natr. mur., nitr., phos. ac., stann., sulph., sulph. ac., (eug., euph., par.).

Midi (après). Mur. magn.

Minuit (après). Ambr.

MOUVEMENT (par le). Cocc., graph., natr., stann., kal., led., lyc., nitr. ac., sep., sil., sulph., sulph. ac.

Nut (la). Bar., calc., carb. veg., coloc., dulc., hep., kal., magn., merc., nitr. ac., sil., stann., staph., sulph., amm., aur., caust., cupr., dig., graph., hell., lyc., mang., merc., mur. ac., natr., petr., phos., phos. ac., samb., sep., stront., zinc., (viol. od., viol. tric.).

PARLANT (en). Iod.

Soir (le). Sulph.

Sommeil (dans le). Carb. an., sel.

— (au commenc. du). Ats., con., thuj.

Toussant (en). Ars.

TRAVAIL (pendant le) d'esprit. Kal.

— ( pendant un ) modéré. Natr., sulph., kal., led., lyc.

#### B. Pendant la sueur.

Découvert (on ne peut supporter d'être). Chin. Disparition des symptômes. Calad.

FOURMILLEMENT. Rhod.

LASSITUDE. Ars.

Membres (douleurs aux). Nux.

PRURIT. Rhod.

Soir. Chin., eug., hep.

— (manque de). Ars., ign., carb. veg., euph., phos., sep.

Tête (lourdeur de la). Caust.

Unine abondante. Dulc., phos.

## 6. fièvre compliquée.

# A. Selon la nature, le temps et les circonstances.

Genre de fièvre.

BILIEUSE. Bryon., cham., cocc., nux. (Voy. Symptômes bilieux, rubrique XXXII.)

CATARRHALE. Châm., nux, bell., con., dulc., ign., mang., puls., spig.

Consomption (de). Ars., bar., chin., nux, puls., sulph.

FROID (avec prédominence du ). Ipec., sabad., staph., veratr., canth., caps., diad., puls., ran.

GASTRIQUE. Ant., cocc., ign., ipec., nux. (Voy. Symptômes gastriques, rubrique XXXII.)

Inflammatoire. Acon., bell., bryon., merc., rhs, ars., canth., cann., cham., daph., dig., dros., hep., hyosc., ign., ipec., lyc., nux, phos., phos. ac.,

Symptômes de fièvre.

puls., sen., sep., spong., squill., sulph., veratr.

veratr.

Intermittente en général. Ant., arn.,
ars., caps., carb. veg., chin., diad., ipec.,

INTERMITTENTE en général. Ant., arn., ars., caps., carb. veg., chin., diad., ipec., natr. mur., nux, sabad, , sep., staph., sulph., bov., calc., cin., dros., ign., men., petr., puls., rhs, samb., valer., veratr.

après abus de quinquina (quinine).

Arn., ars., fer., ipec., puls., veratr.,
bell., calc., carb. veg., cin., merc.,
natr. mur., sep., sulph.

- anticipant. Ars., chin., ign., natr. mur., nux.

- retardant. Chin., cin.

LAITEUSE. Arn., bell., bryon., rhs, acon., cham., coff., ign., (merc., op.).

MATIN (du). Arn., calc., natr. mur.

Midi (avant). Chin., sabad., calc., staph.

(après). Arn., natr. mur., alum., ant., caust., coff., nitr. ac., nux, phos., spong., staph., sulph.

Minuit (avant). Veratr.

Muqueuse. Dulc., ars., bell., bryon., dig., ipec., puls., merc., (cham., cin., rhm, rhs, spig., sulph. ac.).

Nerveuse. Bell., bryon., hell., hyosc., mur. ac., natr. mur., op., phos. ac., rhs, arn., ars., chin., coce., dat., nux, puls., sulph., (cham., merc., veratr.).

avec perte de connaissance. Bell., hell., mur. ac., natr. mur., op., phos., arn., cocc., dat., hyosc.

- avec délire. Bell., dat., hyosc., bryon., phos. ac., sulph.

- lente. Cocc., hell., ars., camph., chin., jign., phos. ac.

Nocturne. Cham., ars., carb. veg., caust.. hep., merc., phos., rhs, sulph.

Symptomes de pevre. 379

Puerpérale. Bell., bryon., cham., hyosc., nux, puls., rhs, acon., ipec., merc., plat., (arn., ars., sec.).

PUTRIDE. Ars., bell., chin., nux, op., phos. ac., rhs.

QUOTIDIENNE. Veratr., ars., chin., cop., diad., ipec., nux, sabad.

- double. Chin., dat., graph.

- quarte. Ars., anac., chin., clem., ign., natr. mur., nux.

Refroidissement (par). Acon., cham., dulc., nux. (Voy. Catarrhal.)

RHUMATISMALE. Acon., bell., cham., puls., bryon., chin., dulc., ign., tart. (Voy. Symptômes de rhumatisme, XXXII.)

Soir (le). Arn., bell., phos., rhs, staph., ant., calc., carb. veg., led., lyc., phos. ac., rhod., sulph., thuj., (ran.).

Tierce. Ant., ars., calc., lyc.

- double. Ars., rhs.

Typhus contagieux. Bryon., rhs, hyosc., nux, puls.

VERMINEUSE. Cic., nux, sil., spig., sulph., cin., merc., sabad., teuer. ( Voy. Symptômes de vers, XXXII.)

B. Selon l'intensité du froid, de la chaleur, de la sueur.

From qui prédomine (ou seulement froid). Ipec., sabad., staph., veratr., canth., caps., diad., puls., ran.

- avec chaleur. Nux, sabad., acon., ars., bell., cocc., coloc., lyc., nitr. ac., rhs, thuj.

Symptomes at peore.	Symptomes de fievre.
FROID avec chaleur au visage. Coloc., sabad.	Horripilation suivie de chaleur à la tête et à la face. Mgs aus.
— aux mains. Sabad., stann.	- de sueur. Dig., clem., natr. mur
- avec sensation de chaleur. Oleand.	
avec chaleur partielle. Bell.	
suivie de sueur. Graph alternant avec la chaleur. Bell.,	CHALEUR ( prédominence de ). Acon. bell., bryon., sabad., veratr.
discrimine area in charcar, bein,	

- - suivie de sueur. Kal.
- suivi de chaleur. Acon., arn., bar., bryon., carb. veg., cop., croc., hep., ign., natr. mur., phos., puls., rhs, sabad., sec., valer., veratr.

calc., coloc., lyc., natr. mur., merc., nux, phos., phos. ac., rhm., rhod.,

sabad., spig., sil., sulph., veratr., vit.

- - à la face. Petr.
- - avec sueur. Bell., bryon., cham., chin., hep., ign., phos.
- - etde sueur. Chin., arg., graph., hep., ign.
- avec sueur (sans chaleur). Euph., lyc., sulph.
- suivi de sueur. Carb. an., caps., caust., dig., lyc., petr., phos. ac., rhs, veratr.

HORRIPILATION avec chaleur. Bell., cham., ign., nux, rhm.

- - partielle. Nux.
- - qui parcourt. Zinc.
- alternant avec chaleur. Merc., mosch.
- avec les mains chaudes. Natr.
- suivie de chaleur. Laur., mgs arc.

- avec froid. Ign., nux, acon., hell.
- - à la face. Ipec., rhm.
- à la tête, avec extrémités froides.
   Arn., aur., mgs arc., rhod., squill.
- suivie de froid. Calc., nux.
- avec horripilation. Ign., bell., hell., merc., sep.
- à la face suivie de froid. Calc.
- suivie de froid, enfin de chaleur. Dat.
- avec sueur. Cham., con., dat., euph., op., phos.
- - suivie de froid. Phos., stann.
- de sueur. Chin., ign., ant., coff.

## C. Souffrances pendant la fièvre.

Anxiété. Ars., rhm.

Appetit (manque d'). Ant.

Artères (battement des). Bell.

ARTICULATIONS (douleurs aux). Hell.

BATTEMENTS dans tout le corps. Zinc.

BILIEUX (symptômes). Ant., cham., chin., nux, cocc., ign., puls.

Bouche amère. Ant., ars., chin., hep.

- sèche. Thuj.

Symptomes de peore.

Bouffissure de la face et des mains. Lyc.

CARPOLOGIE. Ars., iod., phos., phos. ac., rhs.

CEPHALALGIE. Bell., natr. mur., sep., ars., bryon., daph., graph., hell., kal., led., mang., petr., (ang., rut., tar.).

🚣 après la fièvre. Ars.

Coeur (palpitations de ). Merc., rhs, sass., sep., spig., sulph.

CONNAISSANCE (perte de ). Bell., hell., mur. ac., natr. mur.; op., phos. ac., arn., cocc., dat., hyosc.

Constipation. Nux, bell., cocc., veratr.

DÉGOUT pour les aliments. Ant., amm., kal.

pour tout aliment. Rhm, arn., kal.

DIARRHÉE. Phos., rhs, sulph., ars., con., puls.

DÉLIRE. Acon., bell., dat., hyosc., ars., bryon., calc., cham., chin., dulc., nux, op., phos. ac., plat., samb., sulph., veratr.

Dormin (envie continuelle de). Op., tart.

Dos (douleur au). Ars., bell., caust., chin., natr. mur., rhs.

Douleurs intolérables. Ars., cham., coff.

EPIGASTRE (souffrances à l'). Rhs.

EXCITATION. Teucr.

FACE (douleur de la). Spig.

- jaune. Natr. mur., rhs.

pâle. Puls., rhs.

- rouge. Op., veratr.

FAIBLESSE. Ars., natr. mur., ipec., veratr. |- pendant le froid. Carb. veg., sep., ign.

FAIM vive. Chin., cin., phos.

FERMENTATION du sang. Ars., bov., fer., phos., phos: ac., sass., sep., staph., sulph.

Symptomes as poores

Fore (douleur au). Chin., ars.

Gastriques (symptômes) en général. Ant., ipec., nux, cham., cocc., ign., puls., sabad.

Inquiétude. Ars.

Insomnie. Chin., rhod.

LANGUE chargée. Ant.

- sèche. Natr. mur.

MALAISE. Ant., ipec., sep., veratr.

Membres (brisement des). Rhod.

- (douleur des). Ars., chin., nux, rhs, bell., bryon., hell., lyc., nitr., phos., sep., sulph.

Nez (ardeur brûlante au). Rhod.

Oppression de poitrine. Ipec.

OREILLES (tintement d'). Ars.

Oubli. Natr. mur., phos. ac.

PENDICULATIONS. Nux.

PÉRIOSTE (tiraillements dans le). Arn., puls.

Poitrine douloureuse. Acon., bryon., chin., ipec., kal.

Pouls. (Voy. XXXII.)

Renvois. Ant.

RESPIRATION courte et chaude. Zinc.

Soir en général. Natr. mur., nux, veratr., ars., rut., tereb., thuj.

- avant le froid. Arn., puls.

Soir après le froid et horripilation. Bell., chin., cop., puls., sabad., thuj.

- avant la chaleur. Chin., puls., sabad.

- pendant la chaleur. (Voy. chaleur.)

- après la chaleur. Chin., coff., nux.

- avant la sueur. Coff., thuj.

- pendant la sueur. (Voy. sueur.)

- après la sueur. Lyc.

- après l'accès de fièvre. Ant., ars., chin., natr. mur., nux.

- (manque de). Puls., sabad., tart., ant., rhod.

— pendant le froid et la chaleur. Ars., chin.

— pendant la chaleur et la sueur. Carb. veg., ign., sep.

Sourins. Ipec.

Symptômes étrangers (compliquée avec des). Ars., chin., rhs.

— — au commencement de la fièvre.

Ars., chin.

Symptomes de pevre.

Symptômes étrangers (compliqués avec des pendant le froid de la fièvre. Ars., rhs.

Tête (embarras de la). Valer., veratr., ang., bryon., caps., rut.

Toux suffocante. Kal.

TREMBLEMENT. Ars., zinc.

Unine brune et fétide. Sep.

- foncée. Sep., veratr.

VENTRE (froid au). Men.

- (mal de). Bov., ran., rhs.

Vertices. Ars., nux, veratr.

Vomir (envie de). Dros., veratr.

Vomissement. Ant., cin., ars., chin., dat., hep., ign., ipec., lyc., puls.

- acide. Lyc.

- des aliments. Cin., ign.

— de bile. Ant., chin., nux, ars., cham., ign.

- muqueux. Ign., puls.

- après la fièvre. Chin.

YEUX (mal aux). Led., rhod.

## XXXVIII. MORAL.

1. SELON LA NATURE, LE TEMPS
ET LES CIRCONSTANCES.

Abnégation de soi-même. Vit.

ABOIEMENT. Bell., canth.

ACCABLEMENT. Calc., lyc.

- par le jeu du piano. Natr.

- par les récits tristes. Cic.

Activité dans les occupations. Bar., sep., veratr., (lach.).

Actions comiques. Cic., dat., veratr.

Affaissement moral. Sulph., thuj., ars., aur., bell., canth., coleh., coloc., dros., grat., laur., veratr.

AGITATION. Ars., bell., cham., coloc., dulc., merc., nux, plat., puls., rhs, sep., stann., thuj., amm., arn., aur., cin., dros., natr., phos. ac., sabad., sil., spig., staph., sulph., (ambr., iod., laur., mgs aus., mang., mur. ac., nic.).

Moral.

Moral.

383

AGITATION le soir. Nux, carb. veg.

- après avoir mangé. Viol. tric.

Amour malheureux. Ign., hyosc., phos. ac.

Anxieté. Acon., arn., ars., bell., calc., cham., con., caust., cin., cocc., coloc., dig., graph., hell., lyc., mgs arc., nux, puls., rhs, sen., sep., sil., alum., anac., aur., amm., arn., bryon., camph., canth., chin., cic., cupr., fer., hep., ign., ipec., kal., magn., merc., mosch., mur. magn., natr., natr. mur., nitr., nux, petr., phos., puls., sabad., spig., spong., squill., stann., staph., stront., sulph., (anac., arg., calad., euph., nic., tab.).

- à l'approche de quelqu'un. Lyc.
- après chagrin. Lyc.
- avec crainte. Acon., puls., alum., bar., calc., caust., coff., cycl., dat., dig., hep., mgs aus., merc., nitr. ac., sulph., veratr.
- du cœur. Ars., cham., coff., nux, plat., calc., lyc., merc., mosch.
- après avoir mangé. Thuj., viol. tric.
- en marchant au grand air. Cin.
- morale. Ars., dig., puls., cycl., dat., mgs aus., merc., rut., veratr.
- le matin au réveil. Ars.
- avant midi. Ran.
- la nuit. Ars., bell., calc., cocc., graph., veratr., cann., carb. veg., dig., merc., petr., plumb., sep.
- dans la poitrine. Acon., nux, amm., anac., phos., sen., spig., spong., stann.

- Anxiété le soir au crépuscule. Dig., nux, ambr., ars., calc., hep., sep., sulph.
- avant d'aller à la selle. Ambr., bar., caust., kal.
- en allant en voiture. Lach.

CHANT. Bell., croc., cupr., spong., teucr., veratr.

CHAGRIN. Caust., ign., phos. ac., staph.

CARACTÈRE caché. Ign.

- calme. Carb. an., euph., hell., mur.
- qui ne supporte pas la contradiction.
   Oleand.
- doux. Lyc., mgs arc., puls., sil., cupr.
- envieux. Lyc.
- grondeur. Bell., cycl., ign., phos. ac., staph.
- maussade. Arg., con., alum., ang., bell., cic., mur. magn., merc. subl., petr., sil., spig., thuj.
- méfiant. Bar., bell., puls., cic., dros., hell., hyosc., rhs.
- morose. Coloc., ipec., mgs aus., merc., spong., (bism., clem.).
- ouvert. Bov.
- pleureur. Aur., bell., calc., cham., con., dig., ign., lyc., natr. mur., plat., puls., sulph., amm., ars., cin., coloc., graph., hep., mgs aus., merc., mur. magn., rhm, rhs, stann., sulph. ac., veratr.
- rétif. Arn., nux, cupr., spong., (guaj., phell.).
- sauvage. Op.
- taciturne. Mur. ac., veratr., zinc.,

Moral.

hell., mang., staph., (euph., natr

hell., mang., staph., ( euph., natr. sul.).

CARACTÈRE violent. Mgs aus., nux, acon., bryon., carb. veg., coloc., dulc., hep., zinc.

- querelleur. Camph., merc., nux, rut., bell., dulc., fer., lyc., (kal. hyd., natr. sul., nic., rat., therm.).

Conversation (éloignement pour la).

Phos. ac., agar., arg., aur., bell.,
calc., coloc., ign., mgs aus., merc.,
phos., plat., plumb., rhm, stann.,
staph., zinc., (clem., cycl., natr.
sul., nic., viol. tric.).

Chainte. Bell., puls., ars., carb. veg., dat., lyc., phos., plat., rhs, spong., valer.

d'être empoisonné. Bell., dros.,
 hyosc., rhs.

— de la mort. Acon., ars., bell., plat., puls., calc., cocc., cupr., dat., graph., ipec., nitr. ac., rhs, squill.

- de fantômes. Carb. veg.

- de perdre la raison. Calc., merc.

Cais violents. Bell., cham., plat., canth., cic., veratr.

- des nouveau-nés. Cham., bell., coff., rhm, (sen., jal.).

DECOURAGEMENT. Bar., chin., con., natr., sulph., tart., bell., sec., sep., stann., veratr.

Delinium tremens des buveurs. Op., nux.

DESESPOIR. Ambr., aur., calc., tart., arn., ars., merc., stann., valer., veratr.

- par cause de santé. Calc.

Désir, Ant., aur.

tantôt pour une chose, tantôt pour

Moral.
une autre qu'on rejette. Cham., cin

Désobéissance. Chin., lyc.

DISTRACTION. Bov., oleand., amm., caust croc., merc., natr. mur., plat., sep. (ang., ol. an., verb., vit.).

Emportement facile. Aur., nux, petr. phos., bar., bell., natr. mur., oleand sen., stann.

Ennui. Plumb.

Enfuir (envie de s'). Bell., hyosc. veratr.

Entêtement. Bell., nux, calc., dat., lyc merc.

Espair (absence d'). Amm.

- consciencieux. Ign.

- de critique. Plat., acon., ars., lyc.

— de domination. Lyc.

- profond. Sep., cocc.

- satirique. Lach.

- soucieux. Caust., mur. ac., nux, ant. mgs arc., tart., (calad., chel., euph.)

de l'avenir. Petr., sulph., ant. dig., dros., phos. ac., spig., staph. thuj.

--- sur les choses domestiques. Puls sep.

-- pour cause de maladie. Calc.

Estime trop grande de soi. Plat.

EXALTATION. Agar., ant., lach., tab.

Excitation. Petr., ambr., ang., verb.

Faceries. Croc., plat., sulph. ac., tar.

FACILITÉ à se fâcher. Acon., bryon. cham., ign., lyc., natr. mur., nux, petr. phos., puls., sil., staph., sulph., veratr.

ars., bar., bell., calc., canth., carb.

veg., cocc., coloc., con., graph., hep., kal., led., merc., nitr. ac., plat., rhs,

sabad., sep., squill., stann., (cor.,

euph., kal. hyd., mgs, par., phell.,

camph., canth., cupr., hyosc., lyc., sec.

fer., iod., spong, tatt., (tab., verb.).

lucheries. Anac., calc., par.

ran., rat., teucr.).

ERTÉ. Phos., plat.

EMISSEMENTS. Acon., cham., coff., bar., bell., cic., colch., dat., graph., merc.

RIMACES. Cic., dat., veratr.

ILARITÉ. Carb. an., croc., men., plat., sass.

- le soir. Zinc.

orrection pour les affaires. Con., graph., oleand., phos., sep., agar., asa, bell., cupr., daph., nitr. ac., plumb., rhod., rhs, sabad., squill., staph., sulph., teucr., (cycl., rut., tar., viol. tric.).

- pour se laver. Sulph.

uneur changeante. Caps., croc., dat., ign., plat., zinc., aur., carb. an., cin., cupr., fer., grat., mgs arc., sass., sulph., (bism., euph.).

- qui porte à tout déchirer. Bell., veratr.
- désagréable. Merc., caps., samb., (nic., rut.).
- maussade. Con., daph., phos. ac., stront., sulph. ac., zinc., ant., aur., bell., carb. an., cupr., hep., ign., mgs aus., mang., merc., mur. magn.,

phos., puls., rhm, rhs, sabin., samb., sass., squill., staph., teucr., thuj., (guaj., natr. sul.).

Maurat.

Humeur maussade le matin. Amm.

- — le soir. Magn., zinc.
- mauvaise. Natr., sulph., therm.
- méprisante. Chin., plat., ipec., (guaj., par.).

Hypochondrie. Con., mosch., natr., nux, phos., puls., stann., staph., sulph., teratr., arn., asa, aur., bell., daph., grat., hell., mur. magn., plumb., puls., sen., valer., zinc.

Hystérie. Anac., asa, con., mosch., mur. magn., stann., viol. od., aur., cocc., cic., grat., hyosc., ign., merc., nux, plumb., sep., sulph., valer.

Idées désagréables. Bar,

- tristes. Caust.

IMPATIENCE. Dros., dulc., ign., ipec., natr. mur.

IMPUDEUR. Bell.

INADVERTANCE. Puls., phos. ac., mgs.

Inconsolable (on est). Acon., cham., natr. mur., nux, spong., veratr.

Inconstance. Anac., ang., bar., oleand.

Indécision. Aur., bar., nux, puls., chin., ign., mgs arc., tar., sen.

Indifférence. Rhod., ars., asa, cann., con., dig., lyc., merc., phos. ac., plat., rhm, staph., (clem., men., verb.).

- pour les siens. Sep.

Injures. Bell., ipec., petr., veratr., (cor.).

Inquierope morale. Alum., aur., graph.,

rhs, calc., canth., caust., cin., cocc.,

rhs, calc., canth., caust., cin., cocc., kal., merc., phos., plumb., sep., stront., tart., (euph., lach., men., nic., natr. sul., tab.).

Inquiétude morale le matin. Graph.

— — étant seul. Phos.

\_ le soir. Calad., kal. hyd.

— — en marchant au grand air. Cin.

- en allant en voiture. Lach.

Insensibilité. Phos., phos. ac.

IRRÉSOLUTION. Bar., ign., mgs arc., nux, petr., puls., tar.

Irritabilité. Bryon., carb. veg., lyc., natr. mur., nux, phos., sulph., teucr., ars., aur., calc., eon., graph., ran., sen.

- (excès d'). Coff., mgs arc., nux, puls., arn., asar., cham., chin., cocc., hep., ign., merc., nitr. ac., teucr., valer.

— après l'abus du mercure. Hep., nitr. ac.

JALOUSIE. Hyosc., (lach.).

Loquacité. Dat., eug., iod., lach., sel.,

MALADRESSE. Anac., bov, caps.

Manie. Bell., cic., cupr., dat., hyosc., ant., agar., ars., cocc., con., lyc., op., sec., tereb.

Méchanceté. Nux, bell., cupr., nic.

MECONTENTEMENT. Ang., caps., chin., coloc., plumb., sulph., (bism., merc. subl., par., rut.).

- de son sort. Ang., cic., plumb., sulph.

MÉLANCOLIE. Ars., aur., con., dig., hell., hyosc., ign., viol. od., anac., asar.,

bov., calc., caust., dat., laur., nic

Mélancolie religieuse. Ars., aur., pu

- dans la chambre. Laur.

MISANTHROPIE. Bar., mgs aus., natr., pul aur., carb. an., cic., led., stann sulph.

MORDRE (envie de ). Bell., sec., verat Nostalgie. Caps., aur., hell., (merc

mur. magn., petr., phos. ac.).

Offensé (facilité d'être). Puls., alum ang., bov., caps., cocc., croc., sen. Paresse. Hell., mgs arc., natr. mur nux, rhm, sep., teucr., zinc., (guaj

- après le dîner. Asar., bar., phos

PLAINTES. Acon., bism., nux.

ind.).

PLEURS. Caust., cham., viol. od., alum bell., cic., cupr., dat., hell., spong staph., veratr.

Précipitation. Nux, sulph., ars., bar bell., caps., hep., natr. mur., puls.

Présometion. Lyc., plat.

PRESSENTIMENTS. Acon., phos.

Prophétisation. Agar.

Pusillanimité. Bar., ang.

- le soir. Ran.

Rine. Aur., bell., cic., dat., hyosc., igr veratr., (tar., verb.).

Sérénité. Carb. an., croc., men., plat sass.

Solitude (amour de la). Natr., cupr mgs aus., rhs, (eug., nic.).

- (horreur de). Phos., ars., con., daph lyc., (bism., verb.). Soupirs. Ign.

Suicide ( entraînement au ). Ars., aur., puls., ant., hep., rhs, sil.

pour se noyer. Ars., puls., sec.

Susceptibilité. Lyc., sulph., iod., sep.

- (excès de). Coff., nux, arn., cocc.

pour le bruit. Natr., zinc., acon., lyc., magn., mur. magn., sil., calad.

- morale. Ign., cast.

- pour entendre parler. Ars., zinc.

CACITURNITÉ. Mur. ac., veratr., zinc., hell., mang., staph., (euph., natr. sul.).

Cémérité. Ign.

Empérament phlegmatique. Puls., caps., sen.

'endresse. Ign., phos.

dat., lyc., phos., plat., rhs, spong., valer.

RAVAIL (amour du). Cupr., dig., (cycl., euph., verb.).

TRAVAIL (horreur du). Con., graph., oleand., phos., agar., asa, bell., cupr., daph., nitr. ac., plumb., rhod., rhs, sabad., sep., squill., staph., sulph., teucr., (cycl., rut., tar., viol. tric.).

TRISTESSE. Aur., croc., lyc., mur. ac., natr. mur., plat., rhs, viol. od., amm., bell., bov., calc., cann., carb. an., dat., dig., fer., hep., nitr. ac., phos. ac., sil., staph., sulph., (cast., clem., lam., men., ol. an., phell.).

— augmentée par la consolation. Natr. mur.

— améliorée en pleurant. Tab.

— à midi. Zinc.


- étant seul. Bov.

- le soir. Plat.

VAGUE de l'esprit. Op.

Vie (dégoût de la). Ant., ars., aur., hep., puls., sil., merc., nux, plumb., rhs, sep., staph., thuj.

VIVACITÉ. Ign., nux, (lach.).



# MANUEL

DES

# MÉDICAMENTS

# HOMEOPATHIQUES

DANS LEUR ENSEMBLE

ET LEUR ACTION PRINCIPALE ET CARACTÉRISTIQUE,

D'APRÈS LES OBSERVATIONS

FAITES AU LIT DES MALADES;

SUIVE D'UN

RÉPERTOIRE PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.

PAR C. E. C. JAER.

TRADUIT DE L'ALLEMAND.

# PARIS.

CHEZ J.-B. BAILLIÈRE, LIBRAIRE, RUE DE L'ÉCOLE DE MÉDECINE, 13 BIS.

A LONDRES, MÊME MAISON, 219, REGENT STREET.

ET CHEZ LES PRINCIPAUX LIBRAIRES DE FRANCE ET DE L'ÉTRANGER.

ST 19 5 46

# MEDICAMENTS

HOLDER TANGETTE

HISTORICAL MEDICAL

THE BARY SEC. BRARY

SACOLOGO SANDARIO DE LA SOUCIO

DEPOSTOR PAR DROUG ASPRANCED

EEAV .E .E .V. BAE

30173

material and there are the

ATTORNEY DEED TRADER.

The Hart I was a second

12.11

्रे के हैं है है के क्षेत्र कर के <del>में इश्वासी</del> की अधिकार के कर का वाजा है।

treatment to the contract of the state of the contract of the

Quand l'homœopathie érige l'axiome similia similibus curantur en principe suprême de la médecine, et renvoie pour les moyens d'exécution à la matière médicale pure qu'elle-même a créée, rien ne semble plus facile au premier aperçu que de fonder sur cette règle une pratique heureuse et sûre. En trois heures on peut apprendre l'art tout entier, affirment ceux qui le rejettent sans prendre la peine de l'étudier; tant de temps même n'est point nécessaire au dire de certaines personnes qui s'imaginent qu'en consultant à chaque cas de maladie un répertoire des symptômes provoqués par les médicaments, on peut, dans le court espace de quelques minutes, reconnaître sans hésitation le remède qui guérira d'une manière certaine et presque miraculeuse. Il serait à désirer que la chose fût réellement ainsi; mais, pour peu qu'on ait essayé l'homœopathie au lit du malade, on s'en fait une idée plus vraie, et l'on sait quelles immenses difficultés présente l'application d'une théorie si simple en apparence.

Ce n'est point assez qu'à chaque pas on rencontre des séries entières de symptômes analogues, dont les masses confuses portent le trouble dans l'esprit et rendent incertain du choix qu'on doit faire; lorsqu'après de longues recherches on croit avoir trouvé enfin le médicament convenable, souvent encore on voit ses espérances déçues; le remède ne produit aucun résultat favorable, et il ne le pouvait point, parce que, malgré l'analogie frappante entre ceux de ses effets auxquels on a cu égard et les symptômes de la maladie, on s'était attaché uniquement à des phénomènes accidentels ou accessoires, au lieu de ne prendre en considération que ceux qui le caractérisent et tiennent à son essence même.

Car ce n'est point une agrégation des symptômes minutieusement recueillis, mais l'ensemble en quelque sorte organique des phénomènes inhérents à la nature et à l'individualité même du médicament, qui doit correspondre exactement à la nature et à l'individualité du trouble de l'organisme dont les symptômes morbides sont l'expression, pour que cette substance soit le remède qu'on recherche, le véritable spécifique similaire, le moyen qui doit guérir avec promptitude et sécurité.

Cette vérité, qu'il faudrait inscrire en lettres d'or au-dessus de notre matière médicale, j'en sentis toute l'importance peu après avoir commencé l'étude de l'homœopathie. Je ne tardai pas à entrevoir que, pour se flatter d'exercer ce bel art avec confiance et succès, il fallait avoir acquis une notion aussi exacte que possible des propriétés caractéristiques de chaque médicament, considéré comme être individuel, afin d'en apprécier tous les phénomènes particuliers et de pouvoir les ramener à l'unité fondamentale. Pour arriver à ce résultat, je cherchai à fixer l'impression générale que la masse des effets provoqués par chaque substance médicinale avait produite en moi, et je m'attachai à noter non-seulement les formes morbides bien déterminées dont ils offraient le tableau, mais encore les symptômes isolés qui reproduisaient en détail le caractère de l'ensemble.

Le nombre des médicaments dont je me suis efforcé ainsi de rendre l'application facile au débutant s'élève à cent quarante-trois. Les homœopathes exercés jugeront si j'ai réussi. Mon but était de concilier l'utilité pratique avec la concision et la clarté. C'est pourquoi je me suis attaché de préférence aux médicaments qui déjà ont été employés, et, à l'exemple de Hahnemann, je me suis placé sur le terrain de l'expérience, pour retracer les traits principaux de chacun, au moyen de signes peu nombreux, mais choisis avec soin. J'ai donc noté surtout les symptômes qui annoncent être des effets caractéristiques, soit parce qu'ils constituent des affections réclamant un traitement direct, soit parce qu'en cette qualité ils fournissent des indications précises au médecin, soit aussi parce qu'ils se représentent constamment chez toutes les personnes qui font usage de la substance, et ceux que leur singularité autorise à re-

garder comme des phénomènes dignes d'être pris en considération. Tous les autres, étrangers à mon plan, ont été laissés de côté.

Mais, dans la crainte que les débutants n'attachassent aucune valeur aux médicaments qui n'ont point encore été appliqués au traitement des maladies, j'ai cru devoir ne pas passer non plus ceux-ci sous silence. On les trouvera donc parmi les autres; seulement, il ne faudra pas perdre de vue à leur égard que les symptômes qui leur sont assignés, d'après les essais faits sur l'homme en santé, n'ont point été constatés comme indications par la pratique. Du reste, ici, comme partout, j'ai signalé les symptômes caractéristiques essentiels par l'emploi des caractères italiques, et les plus importants de tous par celui des petites capitales.

Je n'ai pu compléter également l'histoire de toutes les substances qui appartiennent à l'une et à l'autre catégorie; le motif en sera compris par ceux qui savent combien l'expérience d'une part et les essais de l'autre sont souvent insuffisants pour nous faire apprécier le caractère des médicaments. J'ai bien pu dans beaucoup de cas constater par la pratique l'importance des signes annoncés, ou rectifier le caractère général par des essais sur moi-même; mais il en est aussi un assez grand nombre où j'ai été obligé de m'en rapporter à l'expérience d'autrui et à des essais souvent fort incomplets. Cependant j'ai fait partout ce que je pouvais, et j'ai mis consciencieusement à profit les observations non-seulement de Hahnemann, mais encore de tous les autres homœopathes. Je ne doute donc pas que celui qui connaîtra les médicaments ne retrouve l'idée qu'il s'en forme dans l'esquisse que j'ai voulu en tracer.

Quant à l'exécution de mon travail, j'ai peu de chose à en dire. Les symptômes sont rangés suivant l'ordre adopté par Hahnemann, et les médicaments selon l'ordre alphabétique de leurs noms latins. A la fin du livre j'ai donné un répertoire, à la fois systématique et alphabétique, des indications qu'il renferme. Les médicaments propres à remplir les indications sont désignés de trois manières différentes: en caractères italiques, pour ceux que l'expérience enseigne être les plus efficaces; en caractères ordinaires, pour ceux auxquels elle assigne un rang inférieur; et entre deux parenthèses pour ceux qu'on ne connaît encore que par des essais purs.

PRÉFAGE.

Si j'ai omis d'indiquer les doses (1), c'est moins parce que Hahnemann a prescrit dans ces derniers temps d'employer partout la trentième dilution en respiration, que parce que la discussion n'est point encore close à cet égard. On ne sait même pas bien positivement lesquelles des premières ou des dernières dilutions sont les plus fortes ou les plus faibles. Cependant je ne peux laisser échapper l'occasion de faire connaître ce que je pense sur ce point.

Si je compare tout ce qu'on a dit, de part et d'autre, pour et contré l'une et l'autre opinion, en invoquant des deux côtés l'expérience, qui souvent semble être en contradiction manifeste avec les déductions qu'on en tire, je suis tenté de croire qu'aucun des partis n'a complètement tort. Il me paraît que les hautes dilutions, par l'emploi prolongé desquelles on peut altérer d'une manière durable la santé, même la plus robuste, ont une action plus pénétrante et plus opiniâtre, quoique moins sensible, que les premières dilutions, auxquelles il arrive souvent de produire des effets violens et de mettre la vie en danger, mais qui rarement s'insinuent d'une manière aussi tenace et aussi redoutable jusque dans les derniers replis, dont l'action est plus superficielle, plus passagère, quoique plus sensible ou plus frappante. On conçoit, d'après cela, qu'il pourrait souvent être avantageux de recourir, dans les maladies aiguës graves, aux premières dilutions, et, dans les affections chroniques opiniâtres, aux dernières. Car si, d'un côté, dans les maladies aiguës, l'action pénétrante et tenace des dernières dilutions a trop d'intensité et dure trop long-temps pour amener la rapide réaction de la force médicatrice dont on a besoin, d'un autre côté, souvent il arrive qu'elle est beaucoup trop faible pour la violence du mal que l'on combat, et que la répétition même des doses, parce qu'elle prolonge la durée de l'esset primitif, produit moins d'esset qu'une seule goutte des premières dilutions ou même de la teinture non étendue. De même, dans les maladies chroniques opiniâtres, les premières dilutions n'ont, la plupart du temps, quand on en continue l'emploi, d'autre résultat que d'accroître encore les souffrances, parce qu'il n'y a que l'action pénétrante et prolongée des dernières dilutions

(1) Les traducteurs ont cru être utiles en réparant cette omission.

qui puisse triompher de l'intensité du mal, sans affecter l'organisme assez violemment pour lui nuire, lorsqu'on procède avec circonspection. Aussi est-il à peu près prouvé que la dose qui convient le mieux, dans toutes les affections chroniques, est celle d'un à deux globules, imbibés de la plus haute dilution (X jusqu'à C), que le malade respire ou avale, soit en substance, soit, ce qui vaut peutêtre mieux encore, après qu'ils ont été dissous dans l'eau, suivant la méthode proposée par Aegidi. Mais c'est une autre question que celle de savoir si la respiration répétée ou l'administration fréquente des dernières dilutions dissoutes dans l'eau doit être préférée, dans les maladies aiguës, à l'ingestion des premières teintures. Les observations recueillies jusqu'à ce jour établissent du moins qu'en répétant les doses on obtient jusqu'à un certain point la diffusion d'action nécessaire dans ce dernier cas, et que l'action fugitive des médicaments donnés en respiration ou en dissolution aqueuse, nonseulement ne retarde en rien la guérison, mais même accélère de beaucoup l'effet total de la substance. Si nous interrogeons l'expérience, les essais de Gross, de Hering et d'une foule d'autres homœopathes, témoignent en faveur de l'efficacité curative des dissolutions aqueuses dans tous les cas. Il en est de même sous le rapport de la respiration des médicaments, dont il m'est souvent arrivé de voir une seule dose produire, dans des maladies chroniques, un esset pénétrant qui durait plusieurs semaines, et, dans des maladies suraiguës et fort dangereuses, une amélioration soudaine et durable. Aussi me suis-je décidé depuis long-temps à employer tous les médicaments presque uniquement sous cette forme, et je n'ai jamais eu lieu de m'en repentir. La trentième dilution est celle dont je me sers toujours et pour toutes les substances. J'ai vu, à ce degré de dilution, les moyens même les plus doux, comme la camomille, le sureau et le pissenlit, provoquer des accidents d'une violence extrême, quand la maladie n'indiquait pas d'y recourir, tandis que, surtout dans les premiers temps de ma pratique, j'ai rencontré beaucoup de cas où la 5°, la 6°, la 8° dilution, même des médicaments les plus forts, comme l'arsenic et le mercure, ne déterminait aucun mauvais esset, et loin de là même, surtout dans les maladies aiguës, amenait de suite une amélioration, quand la substance était

bien indiquée. Maintenant, si je compare tout ce que je viens de dire, surtout en dernier lieu, avec les résultats auxquels d'autres médecins sont arrivés par la voie de l'expérience, je ne puis m'empêcher de dire, avec Rummel, que la quotité de la dose paraît dépendre uniquement de l'homœopathicité plus ou moins grande du remède, que moins celui-ci est homœopathique, plus il importe d'employer une dilution qui corresponde à sa violence ou à l'opiniâtreté de la maladie, que plus il l'est, au contraire, moins cette considération a d'importance, et que, si nous pouvions toujours trouver le spécifique le plus similaire, dans chaque cas individuel, alors il serait indifférent d'employer telle ou telle dilution, depuis la quinze-centième jusqu'à la teinture première, et de la donner en substance ou seulement en respiration.

Il paraît en être de même, sous certains rapports, de la répétition des doses, point à l'égard duquel nous ne sommes pas encore autant fixés que certains homœopathes se le figurent peut-être. En effet, cette répétition elle-même doit être considérée, non pas comme règle fondamentale, mais comme exception à la règle; de sorte qu'il faut la rejeter partout où il n'y a point indication précise d'y recourir. C'est là une vérité qui saute d'elle-même aux yeux, et si nous révélions ici tout ce que l'expérience nous a enseigné, nous trouverions certainement plus d'un cas où, pour l'avoir méconnu, on a gravement nui aux malades, souvent même on leur a causé d'irréparables dommages. Des cas semblables se sont offerts aussi à moi, et, quand j'y regarde de près, je m'aperçois que, même chez les sujets les plus robustes et en apparence les moins impressionnables, ce résultat eut lieu presque toutes les fois que le remède n'avait pas été parfaitement homœopathique, et à un degré d'autant plus prononcé que l'homœopathicité du médicament était moins grande, tandis qu'au contraire j'ai vu beaucoup de malades fort impressionnables qui supportaient quatre, cinq, six et huit doses, de semaine en semaine, du remède parfaitement approprié à leur état, et qui même guérissaient, pour ainsi dire, en un clin d'œil, sous leur influence. C'est pourquoi je suis depuis longtemps convaincu que, plus un remède est spécifiquement approprié à un cas de maladie, plus il est avantageux de le répéter,

quand l'indication s'en présente, et peu dangereux de le faire, quand celle-ci n'a pas lieu; mais que moins il y a d'homœopathicité entre lui et la maladie, plus on doit redouter que sa répétition n'entraîne des inconvénients, et plus aussi ces inconvénients eux-mêmes sont graves. A la vérité, cette règle, comme toutes les autres, souffre quelques exceptions, mais sous ce rapport seulement qu'il existe des malades, doués d'une susceptibilité excessive, qui ne supportent pas la répétition du moyen le mieux approprié, tandis qu'on n'en trouve jamais qui, manquant de réceptivité, puissent sans danger prendré, à plusieurs doses répétées coup sur coup, des médicaments totalement ou même partiellement dénués d'homœopathicité avec leur état. J'ignore s'il faut attribuer ce phénomène à ce que la réceptivité, nulle dans les organes malades, s'accroît d'autant plus dans ceux qui sont en apparence sains, en sorte que tout moyen qui agit davantage sur ceux-ci que sur ceux-là doit aussi les attaquer avec plus de force, ou bien s'il faut s'en prendre, soit au réveil de la psore qui, jusque là, sommeillait encore d'une manière partielle, soit à la fausse direction qu'un traitement mal choisi imprime à la maladie elle-même; tout ce que je sais, c'est que le fait lui-même est hors de doute; je ne connais pas de maladies médicamenteuses pires que celles qui ont été provoquées par des doses trop souvent répétées de médicaments inconvenants, prescrits à peu de distance les uns des autres. L'homœopathe qui débute doit donc ne pas traiter légèrement la question des petites doses; car, lorsqu'il s'agit d'une chose aussi importante que la vie et la santé d'un homme, on ne doit rien négliger de ce qui peut conduire à la plus grande certitude possible, à l'égard, tant de l'homœopathicité parfaite du médicament, que de la nécessité ou de l'inconvenance d'en répéter la dose (1).

Afin de procurer aux débutants un point de repos général, sous

<sup>(1)</sup> Il ne suffirait pas pour cela de feuilleter souvent la matière médicale pure ou un répertoire, et, après avoir soumis le malade à un examen général, de procéder au traitement à l'aide des indications d'un manuel thérapeutique quel-conque; il faut une étude approfondie de chaque médicament et un examen rigoureux de chaque cas individuel, joints à l'attention d'observer sans cesse le malade et de comparer ce qu'il éprouve avec les signes du médicament.

PREFACE.

ce dernier rapport, on s'est accordé presque unanimement jusqu'ici à n'admettre que deux cas, comme étant les seuls où, par exception à la règle, il puisse être indiqué de répéter la dose. Ces deux cas sont:

- 1° Celui dans lequel une maladie persiste au même degré de violence ou renouvelle sans cesse ses attaques;
- 2° Celui où l'organisme manque de réceptivité pour le médicament qui convient.

J'approuve le principe en le considérant d'une manière générale; cependant je ne puis omettre de faire remarquer que le premier des deux cas, qu'on présente comme ayant beaucoup plus d'importance que l'autre, est aussi celui qui se rencontre le plus souvent, et qu'on l'observe surtout fréquemment dans les maladies aiguës. Ici, en effet, lorsque la violence du mal est grande, il peut devenir nécessaire de répéter la première dose toutes les trois ou deux heures, même toutes les demi-heures, tandis que la répétition n'est généralement indiquée que toutes les vingt-quatre heures dans les maladies aiguës moins violentes, et que la plupart du temps elle ne l'est que de huit en huit ou de quinze en quinze jours, dans les affections chroniques. Mais, pour acquérir pleine et entière certitude à l'égard de l'indication réelle d'y recourir, il faut examiner avec soin si la prétendue exaspération des accidents n'est pas plutôt le résultat d'une action pure exercée par le remède qu'on a fait prendre, car alors il ne pourrait, la plupart du temps, qu'y avoir inconvénient à le répéter. Or, voici quelles sont les circonstances auxquelles un observateur attentif peut reconnaître que l'aggravation est factice:

- 1° Elle a lieu sans amélioration préalable, presque toujours d'une manière subite, au bout d'une demi-heure, de trois-quarts d'heure, ou d'une heure, dans les maladies aiguës violentes, de six, huit ou douze heures dans celles qui sont moins graves, et de six, huit ou dix jours dans les affections chroniques.
- 2° Elle est ordinairement accompagnée de phénomènes accessoires caractéristiques, qui appartiennent exclusivement au remède administré.
  - 3º Il n'est pas rare que ces phénomènes offrent une continuelle

variation, disparaissent aussi soudainement qu'ils s'étaient manifestés, et au total ne durent qu'un laps de temps très court, c'est-àdire ne dépassent pas une, deux, trois ou six heures dans les maladies aiguës suivant leur violence, et trois ou quatre heures, à partir de leur apparition, dans les affections chroniques.

Au contraire, le réveil naturel de la maladie primitive s'annonce

presque toujours de la manière suivante :

1° Il succède à une amélioration qui ordinairement s'est prononcée de suite, et il a lieu, en général, avec lenteur, au bout d'une demi-heure ou d'une heure dans les maladies aiguës violentes, de vingt-quatre à trente-six heures dans celles qui sont moins graves, et de huit à quinze jours dans les affections chroniques;

2° Il est accompagné de phénomènes qui n'appartiennent qu'au caractère pathognomonique de la maladie et signalent assez sou-

vent une période déjà écoulée;

3° Non-seulement il persiste plus long-temps sans variation sensible des phénomènes, mais encore il s'accroît de jour en jour ou d'heure en heure.

Si ces dernières circonstances ont lieu, soit isolément, soit réunies ensemble, et que l'image complète de la maladie continue encore à indiquer le moyen dont on s'est servi en premier lieu, il faut sans hésiter en faire prendre une seconde dose, et même, au besoin, une troisième ou une quatrième, jusqu'à ce que la maladie ait été remplacée par la santé, ou qu'elle ait subi un changement qui oblige de recourir à une autre substance.

Mais si les occasions d'en agir ainsi se représentent souvent dans les maladies violentes ou périodiques, le second des cas dont j'ai parlé plus haut, celui où le défaut de réceptivité rend la répétition des doses nécessaires, est beaucoup plus rare. On a proposé alors de répéter la dose toutes les trois ou quatre heures dans les maladies aiguës, tous les trois, cinq ou huit jours dans les affections chroniques, jusqu'à ce qu'il se manifeste des traces sensibles de leur

action. Ce cas n'a presque jamais lieu dans les maladies aiguës, et dans les affections chroniques il est bien plus souvent apparent que réel. Je ne crois même pas m'avancer trop en disant qu'au grand

avantage de nos malades nous aurions certainement à signaler beau-

xiv Préface.

coup plus de circonstances où une seule dose d'un remède parfaitement homœopathique aurait accompli, en huit, dix ou douze semaines, tout ce qu'il lui était donné de faire, si nous étions toujours à même de trouver le véritable spécifique, si même quelquefois nous voulions observer avec un peu plus d'attention et de patience les changements qui surviennent chez nos malades. J'ai remarqué, du moins pour ma part, quand j'y apportais tous les soins nécessaires, que les médicaments à longue action ne produisaient jamais aucun phénomène sensible dans les premiers huit jours qui suivaient leur administration, mais que leurs effets ne manquaient jamais de se manifester dans le cours du second ou du troisième septenaire. En comparant alors les symptômes de la maladie avec ceux du remède, je ne manquais jamais de reconnaître positivement ces derniers, qui, lorsque la substance avait été bien choisie, commençaient à s'effacer vers la quatrième ou cinquième semaine, pour faire place à une amélioration générale et durable. Cette observation s'est si régulièrement reproduite jusqu'ici sous mes yeux, dans tous les cas où l'amélioration ne survenait pas sur-le-champ, dès la première semaine, que je serais surpris qu'elle n'eût pas été faite également par tous les praticiens de notre école. Lorsque je commençais à répéter les doses tous les trois, cinq ou sept jours, dans l'espoir d'obtenir une réaction plus prononcée et un effet curatif plus prompt, je remarquai qu'en général les phénomènes suivaient toujours la même marche, seulement, parfois, avec un redoublement de violence, et que souvent la guérison s'en trouvait retardée; de sorte que maintenant, soit dans les maladies chroniques, soit dans les affections aiguës, ce n'est plus jamais à la répétition des doses que j'ai recours pour activer la réaction de la force médicatrice, mais la plupart du temps à une dose préalable d'opium ou d'esprit de soufre. C'est en esfet là une précaution sans laquelle je n'aborde jamais le traitement d'une maladie chronique, l'expérience m'ayant appris nombre de fois que nul autre moyen n'est aussi puissant pour rendre l'organisme accessible à l'action des médicaments.

Mais indépendamment des deux cas qui viennent d'être examinés, il en est encore un troisième dont je ne sache pas qu'on ait PRÉFACE. XV

fait mention jusqu'ici, et où je me suis souvent trouvé très bien de répéter les doses, quoique dans un but tout particulier. Ce cas est celui des maladies pauvres en symptômes, qui, comme la stérilité, les engelures, le goître, certains exanthèmes chroniques et tous les maux locaux succédanés d'une affection interne réduite au silence, ne s'annoncent que par un seul symptôme saillant. C'est aussi celui de tous les désaccords généraux du corps et de l'esprit, qui ne s'expriment point assez clairement pour justifier le choix d'un médicament plutôt que d'un autre. Supposant ici que tous les moyens attaquent de préférence le côté le plus faible de l'organisme, et que les accidents qu'ils font naître sont toujours en même temps des signes de la maladie latente, je prescris soit l'esprit de soufre, soit un autre médicament mieux indiqué encore, à la dose d'un seul globule de la trentième dilution, tous les deux ou trois jours, jusqu'à ce qu'il y ait assez de signes de toute espèce; alors j'en fais prendre sur-lechamp un autre qui soit capable de couvrir, non-seulement le mal primitif, mais encore la totalité des nouveaux signes acquis, et je le laisse agir jusqu'à ce que l'amélioration déterminée par lui devienne stationnaire, ou bien je le répète, en suivant les règles précédentes, aussi souvent que l'état l'indique et n'en rend point un autre nécessaire. La la brading klatich a sol ous

Quand le moment est arrivé de penser qu'il n'y a plus lieu de répéter la dose ou qu'une dose d'un remède à longue action a cessé d'agir et qu'il faut recourir à un autre moyen, l'observateur attentif s'en apercevra bientôt au changement total de l'ensemble des symptômes. Je n'ai donc rien à dire sur ce point. Mais je dois signaler une circonstance qui s'est présentée plus d'une fois dans l'emploi de la chaux, du graphite, du lycopode, du phosphore, du sumac, de la sepia, de la silice, de la staphysaigre, du thuja et d'autres médicaments à longue action. Lorsque, dans une maladie chronique opiniâtre, les progrès de l'amélioration ont déterminé à laisser l'action d'une seule dose (ou de plusieurs qui n'en font réellement qu'une par la rapidité avec laquelle elles se succèdent) continuer pendant sept ou huit semaines, sans rien faire pour la troubler, il n'est pas rare qu'à l'expiration de ce terme et avant celle de la durée d'action assignée par Hahnemann au médicament, les maux

xvi PRÉFACE.

qui semblent déjà éteints reparaissent avec plus de violence et accompagnés de nouveaux accidents. Le médecin pourrait être alors induit à croire que son remède a cessé d'agir, et qu'il est temps d'en donner un autre. Mais en y regardant de près, et surtout en ayant égard aux nouveaux accidents qui sont survenus, on ne tarde pas à se convaincre que ceux-ci sont des symptômes caractéristiques du médicament, et que le tout est un dernier effort, je dirais presque un effort décisif de ce dernier, auquel on ne saurait par conséquent apporter trop d'attention et de surveillance. En effet, dans un assez grand nombre de cas, après que les accidents survenus ont duré trois à quatre jours, ou tout au plus cinq à six, l'état fait place à une santé presque parfaite, qui est d'autant plus complète qu'on lui permet ensuite plus long-temps de se consolider sans rien faire qui la trouble. Dans d'autres cas aussi, quand les symptômes, après avoir diminué d'intensité, demeurent stationnaires, ils annoncent d'une manière positive le remède auquel on doit maintenant recourir et que nul autre ne pourrait remplacer. Les homœopathes ne sauraient avoir trop d'égard à cette circonstance, non-seulement parce que c'est souvent un moyen de gagner du temps, mais encore parce qu'en multipliant les observations on parviendra peut-être à répandre plus de lumière sur les affinités encore si obscures des médicaments homœopathiques et sur l'ordre dans lequel il convient le mieux de les administrer les uns après les autres.

Du reste on conçoit sans peine que, pour qu'il y aitutilité véritable, et profit sous le rapport de la durée du traitement, à laisser une dose agir pendant long-temps, il faut aussi, comme lorsqu'on se propose de la répéter, que le médicament continue toujours à être indiqué. Mais celui qui débute doit cependant bien se garder de précipitation à cet égard, car rien n'est plus propre à compromettre le succès d'un traitement que l'impatience et le changement continuel des médicaments. C'est pourquoi, tout en ayant égard à la durée d'action assignée au remède, on attendra l'apparition des symptômes accessoires, et comme ils sont d'eux-mêmes sans danger, comme on peut démontrer qu'ils dépendent du médicament, une fois qu'ils se seront manifestés on laissera encore le malade tranquille pendant quelque temps avant de se décider à interrompre

PRÉFACE. XVII

l'action. Ce temps sera au moins d'une, deux, trois ou six heures dans les maladies aiguës, selon leur violence, et de quatre à cinq jours dans les affections aiguës. Si, passé ce terme, ils persistent sans changement, menacent même de se multiplier ou de s'accroître, il ne faut point hésiter à chercher un remède qui convienne mieux, un médicament qui corresponde aussi parfaitement que possible à l'ensemble de l'état naturel et de l'état artificiel. Dans la plupart des cas on sera conduit à mettre en usage le moyen qui a le plus d'affinité avec celui dont on s'est servi d'abord, et qui assez souvent aussi déploiera alors une grande efficacité.

Le mieux est sans contredit de pouvoir éviter ces interruptions et de tomber du premier coup sur un remède qui convienne parsaitement. On y réussira d'autant plus sûrement, dans la plupart des maladies ordinaires, qu'on apportera un soin plus minutieux à l'examen du malade, et qu'on aura l'attention de comparer par écrit tous les symptômes, grands, petits et accessoires, qu'il offre, avec ceux du médicament. L'homœopathe qui débute doit d'autant moins négliger cette dernière précasion qu'elle seule peut faire de lui un bon observateur et lui permettre dans la suite d'agir avec plus de liberté, de promptitude et d'assurance lorsqu'il sera question de maladies légères. On n'omettra jamais, dans les maladies aiguës, de signaler surtout l'état du moral et les circonstances accessoires caractéristiques; dans les affections chroniques on s'attachera de préférence aux particularités constitutionnelles, par exemple la disposition à se refroidir, l'appétit vénérien, la tendance à suer, l'habitude frileuse, etc., la sueur aux pieds, le tempérament, la couleur des cheveux et de la peau, la mollesse ou la rigidité de la fibre, l'embonpoint ou la sécheresse de la complexion, les verrues, les engelures. Ce sont là autant de points d'une haute importance, après les signes pathognomoniques de la maladie. Dès qu'on aura tracé l'image complète de cette dernière, en faisant ressortir ce qu'elle a de plus particulier, de plus caractéristique, on consultera, avec le secours de la mémoire, le répertoire placé à la fin de ce livre, pour apprendre sommairement quels sont les moyens qui couvrent également bien les deux ou trois symptômes principaux; alors on parcourra le texte pour reconnaître quel est celui d'entre ces moyens qui corxviii Préface.

respond le mieux aux symptômes moins essentiels, et enfin on feuilletera la matière médicale, qui décidera du choix en permettant de trouver les analogues des symptômes les plus minimes (1). On n'oubliera pas que le répertoire et le texte de cet ouvrage indiquent partout les symptômes les plus importants, et qu'un médicament ne peut être utile qu'autant que ceux des symptômes principaux qui lui sont assignés couvrent les symptômes principaux de la maladie. En procédant ainsi on réussira souvent à guérir le malade d'une manière certaine et durable, en peu de temps, et avec le secours d'un petit nombre de médicaments.

(1) L'ouvrage que je publie ne saurait remplacer la matière médicale pure; il n'est propre qu'à fournir les moyens de la consulter avec facilité et avec fruit. Il ne faudra jamais non plus s'en rapporter à lui seul dans les cas où le défaut de signes suffisamment constatés oblige d'en essayer qui sont encore problématiques ou qui ne présentent qu'une indication éloignée, comme il arrive souvent dans les grandes épidémies et les maladies chroniques rares. En pareille circonstance, c'est à un répertoire général de tous les signes qu'il faut s'adresser.

### AFFINITÉ DE QUELQUES MÉDICAMENTS.

#### On donnera:

#### Après Aconitum : Bell., bryon.

- Antim. crudum : Puls.
- Arnica: Ars., ipec., rhs.
- Arsenicum: Chin., ipec., veratr.
- Asa (causti): Puls.
- Belladonna: Hep., merc., nitr. ac.
- Calcarea: Lyc., sil.
- China: Ars., puls., veratr.
- Hepar sulphuris calc. : Bell., merc., nitr. ac.
- Ipecacuanha: Arn., chin., ign., cocc.
- Kali: Nitr. ac., phos.
- Lycopodium: Graph., led.
- Mercurius: Bell., chin., dulc., nitr. ac., sulph.
- Nitri acidum: Calc., petr., puls.
- Phosphor: Petr., rhs.
- Phosphoricum acidum: Chin., rhs, veratr.
- Pulsatilla: Asa, nitr. ac., sep., thuj.
- Rhus toxicodendron: Bryon., phos., phos. ac.
- Sepia: Carb. veg., puls.
- Sulphur: Bell., calc., merc., nux, puls.
- Thuja (asa): Nitr. ac., puls., staph.
- Veratrum : Arn., ars., chin., ipec.

Committee of the Committee of

Burgaran Carana and Ca

A Maria Maria

## **MÉDICAMENTS**

# HOMOEOPATIQUES.

#### 1. ACONITUM.

DURÉE D'ACTION, 16 à 48 h. — ANTID.: Vin, acides végét. — PUISSANCE, X; dans les mal. chron., V.

Vertiges à tomber en se baissant ou en se levant de son siège.—Vertiges pendant le mouvement de la tête avec perte de la vue.—Vertiges avec malaise.

Instabilité des idées. — Faiblesse de la mémoire, difficulté à réfléchir, avec le sentiment comme si toutes les fonctions s'accomplissent dans la région précordiale.—La tête est entreprise avec obtusion de l'esprit, surtout dans une chambre chaude.

Plénitude et pesanteur au front comme produite par un poids qui pousse en dehors, surtout en se penchant en avant. - Céphalalgie battante. - Douleur d'ulcération lancinante et avec battement dans la tête. - Sensation comme de ballotement du cerveau pendant le mouvement. - Céphalalgie comme si une partie du cerveau était soulevée, surtout pendant le mouvement, en buvant et en parlant. - Tiraillements dans une moitié de la tête. - Céphalalgie comprimante. - Céphalalgie avec astriction, jusqu'à faire perdre connaissance, surtout au-dessus de la racine du nez.-Céphalalgie avec élancement. - Sensation d'une boule montant de la région du nombril jusqu'à l'occiput et au sinciput, répandant un air frais. - Pression dans le

front et au-dessus des orbites. — Céphalalgie par refroidissement, avec bourdonnement d'oreilles; enchifrenement et mal de ventre. — Céphalalgie augmentée par la conversation. — Les maux de tête s'améliorent au grand air.

Gorflement dur et rouge de la paupière supérieure avec tension, surtout le matin. — Contraction des paupières avec somnolence. — Pesanteur et sécheresse des paupières. — Proéminence des yeux. — Sensation de gonflement dans les yeux. Ophtalmie aiguë. — Ophtalmie produite par des corps étrangers introduits. — Ophtalmie avec rougeur foncée des vaisseaux. — Ophtalmie excessivement douloureuse, avec écoulement, au point de souhaiter la mort. — Contorsion des yeux. — Dilatation des pupilles. — Regard fixe. — Photophobie. — Recherche de la lumière. — Attaque de cécité subite.

Face rouge, bouffie. — Visage brûlant. — Visage bleuâtre et lêvres noires. — Distorsion de la face. — Douleur fouillante dans les joues. — Douleur rhumatismale de la face avec gonflement de la mâchoire. — Sensation de gonflement aux joues. — Sueur de la joue sur laquelle on est couché. — Sueur sur la lèvre supérieure.

Compression engourdissante à la racine du nez.—Épistaxis.—Exaltation de l'odorat.

Sécheresse de la bouche. - Fourmille-

Aconitum.

ment et brâlure à la langue. — La langue est humide avec sensation de sécheresse dans la bouche. — Élancement dans la langue avec salivation. — Sensation d'écorchure à l'orifice des conduits salivaires. — Inflammation de la cavité de la bouche.

Etranglement avec élancement dans la gorge en avalant et en parlant. — Four-millement dans le pharynx. — Douleur brû-lante avec élancement dans la gorge et difficulté d'avaler. — Inflammation de la gorge avec rougeur foncée du pharynx et du voile du palais. — Astriction dans la gorge comme par des substances acres.

Goût amer dans la bouche et élancements dans la poitrine et sous les fausses côtes. — Goût putride de la bouche. — Soif ardente avec sécheresse de la bouche. — Désir du vin. — Nausées et perte d'appétit qui se prolongent.

Efforts inutiles d'éructation.—Éructation à vide. —Renvois d'eau douceâtre avec pausée et bourdonnement d'oreille.

Nausées le matin à jeun. — Envie de vomir en marchant au grand air. —Envie de vomir comme si on avait mangé quelque corps gras ou douceâtre ou dégoûtant. — Constriction et vomissement de mucosités et de sang. —Vomissement amer, bilieux. —Vomissement de sang. —Vomissement de lombries.

Douleurs d'estomac après le repas. -Pression dans l'estomac et l'épigastre, comme par un poids, avec gêne de la respiration. - Tension et pression douloureuse de l'estomac. - Contraction de l'estomac comme par des choses acerbes. -Constriction des hypochondres. - Tension avec pression sur les hypochondres comme par un poids. - Pression dans la région hépatique. - Douleur d'écorchure avec tension et sensation de brûlure dans l'hypochondre, jour et nuit. - Hépatite. -Rétraction du nombril. — Compression, pincement et saisissement dans la région du nombril. - Bas-ventre gonfle comme hydropique. - Tranchées insupportables le matin au lit. - Coliques venteuses. -

A conitum. ygmes et grouillement dans le bas-

Borborygmes et grouillement dans le basventre, surtout la nuit.—Sensibilité douloureuse du ventre, surtout au toucher.

Selles dures avec efforts. — Selles fréquentes peu copieuses, molles avec tenesme. — Selles involontaires par paralysie du sphincter. — Selles blanches. — Diarrhée aqueuse. — Douleur au rectum. — Élancements et pression dans l'anus. — Hémorrhoides fluentes.

Suppression de la sécrétion d'urine avec pression sur la vessie et élancements dans la région rénale. — Flux d'urine avec sueur, diarrhée et mal de ventre.—Fréquente et douloureuse envie d'uriner avec angoisses. — L'urine dépose du sang. — Écoulement involontaire de l'urine par la paralysie du col de la vessie. — Urine rouge et en petite quantité. — Urine brune et brûlante, déposant un sédiment briqueté.

Appétit vénérien diminué.—Accès érotique.—Fourmillement dans les organes génitaux.

Métrorrhagie. — Règles de trop longue durée. — Fureur à l'apparition des règles. — Leucorrhée jaune, épaisse.

Éternuement violent avec douleur dans les organes du bas-ventre. — Éternuement empêché par une douleur dans le côté gauche. — Haleine fétide. — Respiration courte, difficile, accélérée et peu profonde. — Paralysie de l'épiglotte, par accès, qui dispose les liquides à pénétrer dans la trachée. — Accès de suffocation avec anxiété. — Croup membraneux. — Sensation d'engourdissement dans la trachée.

Toux brève.—Toux produite par la fumée du tabac ou par la boisson.—Crachement de sang. — Toux douloureuse avec crachats sanguinolents, anxiété et fra yeur nocturne. — Toux sèche, brève, surtout après minuit.—Toux avec des élancements violents dans l'intérieur de la poitrine et dans les côtés.

Oppression, contractivité avec anxieté, suspension de la respiration.—Pesanteur

dans la poitrine avec compression de tout le côté. Élancements à travers la poitrine et les flancs, surtout pendant la respiration.

Fourmillement douloureux dans la poitrine. Pneumonie. Points de côté aigus (pleuritis). Sensation d'anxièté excessive dans la poitrine. Douleur chronique au cœur avec respiration difficile et élancements dans la région de l'organe pendant le mouvement et en montant. Palpitations avec anxièté et accroissement de chaleur générale.

Faiblesse qui empêche de supporter la tête, avec sensation comme si la chair était détachée des os. — Douleur rhumatismale dans la nuque, seulement pendant le mouvement. — Fourmillement le long de l'épine dorsale. — Élancement et fouillement douloureux le long du dos, augmenté surtout par la respiration. — Raideur douloureuse paralytique dans les articulations du sacrum et de la hanche. — Douleur de brisement dans le sacrum. — Douleur térèbrante au dos et au sacrum.

Gonflement des muscles scapulaires avec douleur de brisement au toucher.—Courbature et faiblesse des bras. —Sensation de pesanteur dans les bras avec engourdissement des doigts. —Paralysie de l'avant-bras et de la main en écrivant et dans le repos, amélioration par le mouvement.—Insensibilité, froid glacial et engourdissement de la main. — Sueur froide dans la paume des mains. —Gonflement des mains. — Fourmillement dans les doigts aussi en écrivant.

Douleur de courbature et de contusion dans l'articulation coxo-fémorale et dans les cuisses, surtout après avoir été couché ou après le sommeil. — Marche vaciltante par manque de force et douleur dans les trochanters. — Faiblesse et flexion involontaire des genoux. — Lourdeur des pieds. — Endolorissement des articulations du pied avec désespoir et crainte de la mort. — Gonflement inflammatoire des pieds et des jambes, avec chaleur intérieure et extérieure. — La peau rouge, tachetée

et douloureuse au toucher et par le mouvement. — Froid des pieds, surtout aux orteils. — Sueur des orteils et des talons.

Faiblesse et relâchement des ligaments des articulations.—Endolorissement universel qui ne permet pas le toucher.

Rhumatismes aigus.—Inflammation aiguë des organes intérieurs. — Gonflement du ventre, coloration de la peau en noir. —Proéminence des yeux et langue pendante.—Accès cataleptique, immobilité, raideur du corps, cris, grincements de dents et hoquet.—Accès d'évanouissement. —Grand désir d'être couché.

Douleurs lancinantes avec sensation d'écorchure. Fourmillement dans différentes parties, particulièrement avec prurit et desquammation des parties malades. Chaleur des parties malades. Grande susceptibilité des parties malades par le toucher et par le mouvement. Le soir et le matin, accroissement des symptômes; ils diminuent au grand air.

Taches comme de piqures de puces. — Milliaire. — Rougeole. — Ictère.

Bâillements fréquents.—Grande somnolence, même en se promenant, surtout après midi et après le repas. — Sommeil léger.—Assoupissement avec revasseries angoissantes.—Délire avec anxiété.—Rêves pénibles avec oppression de cauchemar. —Rêves avec souvenir.

Fièvre aiguë inflammatoire. — Chaleur sèche brûlante. — Soif. — Fièvre avec la peau brûlante aride. — Peau brûlante avec sueur et horripilations intercurrentes. — Sensation de suspension de circulation et de refroidissement. — Froid universel avec chaleur du front et des lobes des oreilles et chaleur intérieure. — Le soir les joues sont rouges, brûlantes; mal de tête qui pousse en dehors avec soif et horripilation générale. — Froid violent suivi d'une chaleur ardente et sèche avec grande oppression et angoisses. — Le pouls est dur, plein, petit ou intermittent.

Le bruit est insupportable. — Anxieté inconsolable avec plaintes et reproches. —

Gémissements et plaintes pendant les douleurs .- Craintes .- Pressentiments .-Peur de la mort. - Frayeurs. - Emportements violents. - Dépit. - Mauvaises suites de la frayeur et du chagrin, surtout chez les femmes pendant les règles.

#### 2. AGARICUS MUSCARIUS.

Dun. n'Act., 40 jours et plus. - Antid.: Camph., café, puls., vin. - Puiss., X.

Vertiges, comme ivre, le matin surtout au grand air .- Vertige subit à tomber par la lumière vive du soleil. - Vertiges après haillement.

Céphalalgie térébrante. - Douleur dans la région pariétale droite comme par un clou qu'on y aurait enfoncé. - Pression et déchirement dans la moitié gauche du cerveau et vide de la tête.

Sensation de froid à l'extérieur de la tête comme produite par la glace.

Prurit et titillation qui force à frotter l'œil gauche. - Pupilles dilatées. - Brûlure dans l'angle interne des yeux, avec douleur au toucher. - Pression dans les yeux. - Sécrétion d'une mucosité blanchâtre, jaunâtre dans les angles des yeux. qui colle les paupières. - La vue est faible et troublée. - Palpitation des paupières et des joues .- Tressaillements pénibles dans les year. - Tressaillements avec douleur pressive dans le globe de l'œil gauche.

Prurit dans les oreilles. - Engelures aux oreilles.

Écorchure et inflammation de l'intérieur des narines. - Grande sensibilité de l'intérieur du nez. - Excrétion de mucus sanguinolent suivi d'épistaxis. — Odorat augmenté.

Les lèvres sont bleues. - Engelures au

Odontalgie déchirante augmentée par le froid. - Déchirement dans l'os de la mâchoire supérieure. - Tiraillement spasmodique dans le menton et la mâchoire inférieure. - Gonflement des gencives.

Odeur fétide de la bouche comme celle

Agaricus muscarius.

du raifort,-Langue blanche parsemée de petits aphtes d'un jaune sale de suite après le repas. - Les aphtes produisent la sensation comme si l'épiderme allait s'enlever.

Le soir faim vive. - Goût désagréable dans la bouche. - Renvois à vide, hoquet.

Élancements dans le côté gauche du ventre en inspirant. - Elancements comme piqure d'aiguilles dans la région hépatique. - Sortie abondante de flatuosités: élancements obtus dans la crête de l'os des îles.

Constipation suivie d'excrétion dure, compacte, de couleur foncée. - Evacuation de matière de consistance de bouillie. - Diarrhée avec rétraction douloureuse de l'estomac et du ventre.

Urine rare et en petite quantité. -Urine claire citrine. - Grande excitation de l'appétit vénérien sans érection.- Éjaculation incomplète pendant le coït. -Grande faiblesse et sueur nocturne après le coït.

Éternuement fréquent sans enchifrenement. - Expectoration de mucus sous forme de globules, presque sans toux. Respiration courte, gênée, qui rend la

marche difficile, même quand elle est lente. - Sensation de douleur dans la partie inférieure de la poitrine (surtout dans la région précordiale) comme si les organes de la poitrine étaient comprimés. -Prurit violent des mamelons. - Sueur nocturne abondante sur la poitrine.

Faiblesse douloureuse des muscles du dos. -Douleur paralytique dans les lombes, aggravée par la marche et étant debout. -La partie supérieure du bras éprouve un engourdissement paralytique en écrivant. - Brûlure au-dessous du coude gauche et sur la partie antérieure de l'avant-bras (gauche). - Brûlure sur l'avantbras et sur les jambes, suivie de l'apparition de petits boutons blancs, avec desquammation de l'épiderme.-Serrement spasmodique douloureux des muscles de la base du pouce.-Engelures aux doigts.

Pression douloureuse à la partie exté-

rieure de la cuisse, comme par une cheville. — Pression douloureuse brûlante à la partie supérieure du tibia. — Pression déchirante dans une des malléoles du pied gauche. — Déchirement dans les extrémités inférieures, comme dans la moelle. — Douleur dans le calcanéum étant debout, qui produit le chancellement continuel du corps. — Les douleurs des membres inférieurs apparaissent presque toujours étant assis et debout. — Engelures aux orteils.

Le déchirement des membres est continuel dans le repos et cesse pendant le mouvement.

LES SYMPTÔMES SE MONTRENT SUR LES DEUX PARTIES DU CORPS EN SE CROISANT, COMME PAR EXEMPLE SUR LE BRAS GAUCHE ET LA JAMBE DROITE. — En marchant lentement on se trouve mieux.

Grandesusceptibilité du corps. — La moindre pression produit des douleurs qui se prolongent. — Courbature des bras et des Jambes après un mouvement modéré. — Grande susceptibilité à l'air frais.

Tremblement. — Accès épileptique avec grand déploiement de force.

Éruption cutanée blanchâtre, épaisse, de forme milliaire, avec prurit violent.

Somnolence pendant le jour, surtout après le repas. — Le matin on n'a pas assez dormi, on fait effort pour se lever.

Frissonnement au grand air ou en se découvrant étant au lit, souvent même lorsque les membres sont chauds.—Horripilations violentes générales avec le visage chaud, les mains froides, sans soif ni chaleur.

Peu de disposition à parier. — Horreur du travail. — Envie de faire des vers et prophétiser. — Folietimide. — Fureur sans résultat ou destruction avec grand déploiement de force.

#### 3. ALUMINA.

Dun. D'Act., 40 ljours. — Antid.: Champ., ipéc. (camph.). — Puiss., VI ou VIII.

Vertiges à tomber, avec brûlure dans la nuque. Ivresse par la fumée du tabac. — Impossibilité de penser avec suite. — Faiblesse de la mémoire. — Confusion des paroles.

Élancements violents dans le cerveau avec envie de vomir.—Céphalalgie coactante. — Céphalalgie avec pâleur de la face et lassitude. — Céphalalgie qui augmente en marchant à l'air libre.

Croûtes humides aux tempes.—Endolorissement des cheveux.

Pression dans les yeux; on ne peut les ouvrir.—Brûlure dans les yeux avec sécrétion de mucus pendant la nuit.—Strabisme des deux yeux.

Élancements dans les oreilles. — Le soir une oreille est chaude et rouge. — Gonflement des oreilles. — Écoulement de pus par l'oreille droite.

Tension de la peau de la face comme si elle était enduite de blanc d'œuf desséché.—Sensation de pesanteur dans la face, — Furoncles sur les joues. — Grosseurs tubéreuses à la face.

Gonflement du nez. — Furoncle sur le

Gonflement de la lèvre inférieure. — Éruption aux lèvres.

Gonflement des gencives.—Odontalgie en marchant. — Odontalgie des femmes enceintes. — Odontalgie le soir au lit. — Sensation comme si les dents étaient trop longues.

Sensation d'écorchure de l'intérieur de la bouche, de la langue, du palais et des gencives qui ne permet presque pas de manger. — Afflux d'une salive douceâtre ou acidule dans la bouche.

Douleur d'astriction pendant et hors le temps de la déglutition.—Déglutition difficile, douloureuse, comme si l'æsophage était trop étroit. — Douleur de la gorge qui augmente le soir et la nuit, et qui diminue par la boisson et les alimens chauds et avant midi.

Goût douceâtre comme de sang, suivi d'expectoration de mucosités sanguinolentes.—Goût âcre, astringent. Malaise avec envie de vomir. — Malaise avec envie de vomir en parlant, en entrant dans la chambre et après avoir marché au grand air. — Le soir pesanteur d'estomac.

Douleur dans le foie en se baissant.

Elancement douloureux dans le ventre, du bas jusque dans la poitrine.

Selles dures peu abondantes. — Selles difficiles par défaut de mouvement péristaltique. — Constipation. — Brûlure dans l'anus. — Écoulement de sang pendant et après la selle.

Envie d'ariner, avec excrétion augmentée, aqueuse.

Appétit vénérien supprimé. - Pollutions.

Élancements et pression douloureuse dans le périnée.

Règles trop hâtives, de peu de durée et en petite quantité. — Leucorrhée séreuse. — Leucorrhée âcre. — Leucorrhée qui produit des excoriations avant et après les règles.

Coriza fluent par une narine; l'autre est obstruée. — Enrouement subit avec perte de la voix l'après-midi et le soir.

Toux sèche le matin après le lever, suivie plus tard d'expectoration. — Toux saccadée, sèche, avec respiration entrecoupée.

Douleur pressive sur la poitrine. — Sensation de constriction de la poitrine.

Douleur de brisement dans le dos et dans le sacrum. — Douleur dans le dos comme si la poitrine était traversée par un fer chaud. — Douleur dorsale élancante.

Déchirement depuis les épaules jusqu'aux doigts. —Rongement au-dessous des ongles des doigts. —Croûtes humides dans les avant-bras. — Gerçures aux mains. — Douleur et brûlure aux bras, dans les coudes, aux doigts, comme produites par un fer chaud.

Tension des mollets en marchant. — Serrement dans les mollets en croisant les jambes ou en s'appuyant sur les orteils. — Déchirement dans toutes les parties des cuisses.

L'usage des pommes de terre augmente tous les symptômes.—On se trouve mieux alternativement d'un jour à l'autre. — Quelques parties du corps paraissent augmentées de volume.

Mouvement involontaire de la tête et des autres membres.—Spasmes avec rire et pleurs alternativement.

Grande lassitude et faiblesse. — Affaissement du corps, avec envie de se coucher, ce qui augmente encore la lassitude.

Dartres entre les orteils. — Grosseurs tubéreuses dans différentes parties du corps. — Les dartres démangent le soir. — Gerçures de la peau. — Les symptômes de maladie de peau augmentent à la nouvelle et à la pleine lune.

Insomnie avant minuit. — Sommeil inquiet, avec sursaut fréquent. — Somnambulisme.

Froid même près du feu et le soir au lit, de manière qu'on ne peut se réchausser.

Anxieté, inquiétude, pleurs involontaires.—Susceptibilité.—Air sombre, mécontent.

#### 4. AMBRA GRISEA.

Dur. D'ACT., 6 à 7 semaines. — Antid.: Camph., vit., puls. — Puiss., I et II.

Vertiges violents, périlleux. — Vertiges en marchant au grand air. — Vertiges avec sensation de faiblesse dans l'estomac qui force à se coucher. — Irréflexion, conception difficile.

Sensation de faiblesse et de froid dans la tête. — Céphasalgie matinale, comme après une débauche nocturne. — Tête entreprise, serrée, pressée, surtout dans le front et l'occiput. — Douleur pressive dans la tête avec peur de devenir fou. — Céphasalgie déprimante dans le sinciput, avec chaleur, brûlure dans les yeux, pâleur de la face alternativement d'un jour al'autre. — Congestion vers la tête surtout en écoutant de la musique. — Déchirement dans le sinciput, le front, une

moitié du cerveau et derrière les oreilles. Céphalalgie extérieure comme produite par un effort de reins.—Endolorissement des cheveux au toucher.—Chute des cheveux.

Prurit insupportable autour des yeux.

— Prurit aux paupières, comme s'il voulait y paraître un orgelet. — Pression audessus des yeux, comme s'ils étaient fortement fermés avec difficulté de les ouvrir,
surtout le matin. — Conjonctive injectée.

— Sensation comme si les yeux étaient
trop enfoncés. — Obscurcissement et
brouillard devant les yeux.

Déchirement dans et derrière les oreilles.

Diminution de l'ouïe (d'un côté). —
Fourmillement et chatouillement derrière es oreilles.

Tremblement et secousses spasmodiques dans les muscles de la face.—Chaleur fugace le la face, visage ictérique, — Prurit rongeant, fourmillant dans la face.—Érupion boutonneuse au front, dans la figure et dans les favoris. — Taches rouges aux oues.

Crampe de l'aile (droite) du nez. — Épistaxis surtout le matin. — Accumulaion de sang desséché dans le nez. — Sécheresse des narines.

Crampe dans la lèvre inférieure. — Lèvres rûlantes. - Douleur dans la mâchoire, omme si une vis la serrait ou l'écartait. Gencives douloureuses, gonflées. -Douleur dans les dents creuses, déchirante, lancante, surtout au grand air.-Odonalgie tiraillante jour et nuit, augmentée ar la chaleur. Saignement des gencives. Sensation d'engourdissement et de séheresse de la bouche, de la langue et des vres, le matin au réveil. - Démangeaison t cuisson dans l'intérieur de la bouche. - Bouche fétide. - Vésicules dans la ouche, douloureuses comme celles d'une rûlure.-Langue chargée, grise, jauâtre. — Petits boutons au-dessous de la

Grattement dans la gorge comme pen-

ngue, douloureux comme l'est une

corchure.

dant le coriza. — Sensation d'une cheville dans la gorge avec déglutition difficile. — Accumulation d'une salive grisâtre dans la gorge, avec étranglement et vomissement en crachotant.

Hoquet par la fumée du tabac.—Renvois à vides très fréquents.—Renvois acides.—Pyrosies le soir en marchant à l'air libre, avec des renvois qui avortent.

Aigreur dans la bouche après avoir bu du lait.—Après le repas, pression dans la fossette du cou, comme si des aliments y séjournaient.

Pression dans la région de l'estomac.

—Brûlure dans l'estomac et au-dessous de la région précordiale.

—Grampes d'estomac.

Pression douloureuse dans la region hépatique. — Douleur pressive à l'épigastre et l'hipogastre. — Tension et gonflement du bas-ventre après avoir bu et mangé. — Sensation de compression dans le bas-ventre, même le matin. — Colique venteuse après minuit. — Tranchée le soir après minuit et même le matin au lit avec diarrhée. — Sensation de froid dans le bas-ventre, souvent d'un seul côté. — Tressail-lement dans les muscles du ventre le soir.

Envie inutile d'aller à la selle, avec anxiété. — Constipation. — Selles molles, brun clair. — Excrétion de sang pendant la garde-robe. — Après l'évacuation, pression dans le bas-ventre. — Prurit et chatouillement dans l'anus et le rectum.

Sécrétion d'urine diminuée. — Envie d'uriner pressante le matin en se levant. — Sécrétion augmentée, surtout la nuit et le matin. — Urine trouble, jaune-brun avec un sédiment de même couleur. — Urine avec un nuage rougeâtre. — Urine sanguinolente. — Cuisson à l'orifice de l'urètre.

Ardeur dans la région des vésicules séminales.—Érections le matin sans sensation de volupté, avec engourdissement extérieur et diminution de la sensibilité.
—Sensation de volupté, prurit des organes génitaux intérieurs sans irritation extérieure.

Ambra grisea.

Écoulement de sang hors l'époque des règles.-Règles hâtives.-Pendant les règles, pression dans les jambes; elles sont bleuâtres et les varices gonflées. - Brûlure, cuisson et prurit des parties génitales.

Éternuements fréquents. — Nez obstrué avec douleur d'écorchure.-La voix enrouée avec une grande accumulation de mucosité épaisse dans la trachée. - Haleine fétide le matin après le réveil. - Oppression chez les enfants et les individus scrofuleux.

Toux avec coriza et expectoration muqueuse blanchâtre. - Toux nocturne produite par une irritation violente dans la gorge. - Toux le soir avec douleur sous les côtes gauches, comme si quelque chose se décollait. - Toux spasmodique avec renvois et enrouement. -- Coqueluche. -- Expectoration salée.

Sensation d'érosion dans la poitrine. - Sifflement dans la poitrine. - Serrement de poitrine et du dos. - Pression sur et dans la poitrine, surtout dans la région du cœur. - Palpitation de cœur en marchant au grand air, avec pâleur de la face et pression dans la poitrine comme par une pierre. - Douleur rhumatismale comme de brisure dans l'extérieur de la poitrine.

Elancements au sacrum. — Pesanteur dans le dos, et douleur comme si les entrailles étaient comprimées. - Pression et tiraillements rhumatiques dans la nuque et dans le dos.

Déchirement et douleur tiraillante d'entorse dans l'articulation des épaules. -Quand on s'appuie sur le bras il s'engourdit très facilement, de même la nuit. -Déchirement dans le coude et les avantbras. — Engourdissement nocturne des mains.—Crampes des mains.—Contraction des doigts (le soir).-Faiblesse des doigts pendant la nuit.-Froid continuel des mains. - Accès de tremblement dans les pouces le soir.-Déchirement et tiraillement dans les doigts. — Le matin la peau des doigts est ridée. - Dartres avec prurit entre les doigts.

zimora grisea.

Déchirement dans les jambes. - Lourdeur, raideur et flaccidité dans les membres. - Sensation d'engourdissement dans les jambes; on ne peut solidement s'en servir d'appui. - Jambes et pieds froids, -Taches douloureuses au tibia. -Serrement de crampe dans les jambes et pendant la nuit dans les mollets. - Douleur d'écorchure dans les jarrets, surtout le soir.-Frémissements dans les mollets et dans les pieds. - Douleurs arthritiques dans les articulations du pied et dans la pulpe du gros orteil. - Prurit dans la plante du pied qui ne cesse pas par le grattement. - Brûlure dans la plante du pied. - Douleur vive dans les cors aux

Tressaillement dans les membres.-Pulsations sensibles dans le corps.-Inquiétude et tremblement universel après avoir beaucoup parlé, avec insomnie.-Inquiétude avec fermentation du sang. Grande faiblesse par la marche au grand air.-Lassitude le matin au lit et la nui au réveil. - Le soir les symptômes s'aggravent.- Les symptômes diminuent en marchant à l'air libre, mais reviennent étant assis. - La chaleur les augmente.

Prurit presque universel, même au ventre. - Brûlure dans différentes parties de la peau. - Sensation d'engourdissement dans toute la surface du corps, surtou le matin.-Ce médicament fait reparaître la galle, les dartres.

Insomnie sans cause. - Insomnie produite par le froid du corps et des tressaillements dans tous les membres. - En s'endormant on s'éveille en sursaut et frayeur.-Rêves avec anxiété.

Chaleur fugace avec anxiété au cœur. - Frissons avant midi, avec faiblesse el somnolence.-Amélioration après le dîner .- Sueur nocturne, surtout apres minuit et sur le côté malade. - Sueur continuelle pendant la journée, surtout au bas-ventre et aux cuisses, en marchant.

Inquiétude, excitation, précipitation du travail d'esprit. - Visions et figures à grimaces et d'images voluptueuses. — Anxiété le soir, désespoir.

#### 5. AMMONIUM CARBONICUM.

Dur. D'ACT., presque 40 jours. — Antid.: Camph., hep. — Puiss., VI.

Vertiges avec nausées (le soir).

Sensation de mollesse du cerveau. — Céphalalgie le soir après la promenade au grand air.

La vue est troublée par des scintillements.—Impossibilité d'ouvrir les yeux.

Dureté de l'oule avec prurit et suppuration de l'oreille.

Pâleur cadavéreuse de la figure. — Visage pâle, bouffi. — Exanthème avec prurit au visage et au corps, avec gonflement des glandes du cou.

Sensation comme d'une accumulation de sang dans la pointe du nez.

Ébranlement chronique des dents. — Tiraillement des dents douloureux pendant les règles. — Odontalgie le soir dès qu'on se met au lit. — Douleur de dents tressaillante. — Putréfaction des dents.

Gonflement de l'intérieur de la bouche. -- Éruption de vésicules dans la bouche et sur la langue. -- Goût amer dans la bouche, surtout après le dîner.

Goût de sang dans la gorge.—Sensation d'astriction crampoïde dans les muscles antérieurs de la gorge en buvant. — Le matin, manque d'appétit. — Soif continuelle.—On ne peut manger sans boire.

—Visage chaud en mangeant.

Pesanteur à l'estomac, avec nausée et sensibilité de la région précordiale. — Pression pénible des vêtemens sur l'estomac.

Constipation.—Selles retardées, écoulement de sang par l'anus.

Écoulement d'arine diminué.

Pesanteur et constriction dans les testicules, avec pollutions fréquentes.—Éloignement pour le sexe.

Règles peu abondantes, de peu de du-

rée, de sang noir âcre. — Leucorrhée aqueuse brûlante. — Stérilité avec des menstrues peu copieuses.

Coriza sec, de sorte qu'on ne peut respirer que par la bouche. — Respiration courte.

Toux nocturne, toux sèche, comme produite par du duvet dans la gorge. — Toux avec crachats sanguinolents, précédée de goût douceâtre dans la gorge et grande souffrance de la poitrine.

Oppression avec battement de cœur. — Congestion de sang vers la poitrine après avoir écrit. — Hydrothorax.

Déchirement dans les articulations des membres supérieurs, l'épiderme de l'intérieur de la main s'exfolie. — Les vaisseaux sont gonflés. — Les mains deviennent bleues après l'immersion dans l'eau froide. — Douleur dans un poignet qui a été foulé autrefois. — Accès de tremblement des mains.

Grande faiblesse des jambes. — Endolorissement du gros orteil le soir au lit. — Le soir, rougeur avec gonflement douloureux dans l'orteil. — Serrement de crampe dans la plante du pied.

Grand besoin d'allonger les membres.

—Susceptibilité extraordinaire au froid.

—Le soir agitation, grande faiblesse.

Le côté droit paraît plus affecté que le gauche.

—Fatigue à parler, ou à entendre parler.

Prurit violent cà et là avec éruption de vésicules brûlantes et de boutons produits par le grattement. — Ganglion (sur os).

Somnolence pendant le jour. — Cauchemar. — Nausée la nuit avec bouillonnement de sang.

Le soir accès de froid.—Forte horripilation avant de s'endormir.

#### 6. ANACARDIUM ORIENTALE.

Dur. p'act., 30 jours. — Antid.: Camph., nux. — Puiss., X.

Céphalalgie pressive qui produit des vertiges et de l'engourdissement, aggravée par le mouvement. — Céphalalgie pressive comme par une cheville sur la partie gauche du crâne. — Pression douloureuse dans les tempes. — Céphalalgie pressive dechirante produite par les efforts d'esprit. — Céphalalgie avec constriction et une pression de dehors en dedans.

Faiblesse de l'esprit, on ne se souvient de rien. — Manque de réflexion. — Faiblesse de mémoire.

Visage pâleavec enfoncement des yeux, cercles bleus autour des yeux.

Pression sur le globe des yeux comme par une cheville.—Resserrement des pupilles.—Myopie.—Le soir la lumière paraît entourée d'une auréole.—Diminution de la vue. — Dureté de l'ouie. — Étreinte dans les oreilles, avec déchirement. — Pression dans les oreilles comme par une cheville.

Privation de l'odorat. — Aberration de l'odorat. — Odeur continuelle comme celle de la fiente des volailles. — Odontalgie déchirante par secousses.

Gonflement de la langue qui rend la parole difficile ou l'empêche. — Langue blanche, âpre.

Diminution du goût. — Goût fade pour tous les aliments. — Humeur hypochon-driaque après le repas. — Grande somnolence après le repas.

Chaque pas après le dîner retentit dans le creux de l'estomac. — Gloussement dans l'épigastre. — Pesanteur dans l'estomac après le dîner.

Élancements douloureux, obtus, ou pression dans la région du nombril, augmentés par l'inspiration, la toux et la pression extérieure. — Pincements et grouillements dans le ventre, avec besoin d'aller à la garde-robe.

Anacardium orientale.

Exonération difficile de matières molles par inactivité du rectum, envie inutile d'aller à la selle.

Sortie fréquente d'une petite quantité d'urine limpide. — Urine trouble, argileuse.

Pollutions nocturnes sans rêves voluptueux.

Oppression de la poitrine avec chaleur intérieure, anxiété qui fait rechercher l'air frais. — Pression dans la poitrine comme par une cheville qui y serait enfoncée. — Elancements dans la région précordiale qui s'étend jusqu'au sacrum.

Déchirement avec pression et élancements dans les omoplates. — Pression obtuse sur l'acromion, comme par un fardeau.—Raideur de la nuque.

Pression douloureuse dans les muscles et dans la cavité des os du bras, avec lassitude. - Serrement de crampe douloureux dans les mains et les articulations des doigts. - Douleur déchirante dans l'os du métacarpe qui soutient l'index. - Chatouillement nocturne dans la paume de la main et entre les doigts. --Tremblements, tressaillements et tiraillements dans les cuisses, surtout près du genou, comme si on avait long-temps marché.—Dans les muscles, pression comme avec une pointe mousse, par des coups qui se succèdent régulièrement. - Agitation douloureuse dans les jambes avec sentiment de raideur, comme si elles étaient enveloppées. - Pression crampoide (et tiraillement rémittent) dans les deux mollets. -Pression Douloureuse dans différentes parties, comme par une cheville. - Les symptômes se montrent périodiquement. — Beaucoup de symptômes se montrent après le repas, cependant la plupart dis-PARAISSENT PENDANT LE DÎNER; mais ils se renouvellent deux heures après. - DIMI-NUTION DE TOUS LES SENS.

Un léger exercice produit une grande fatigue.— Grande faiblesse dans tous les membres, qui va jusqu'à la paralysie.—
Paralysie apoplectique.

Démangeaison brûlante augmentée par le grattement.

Somnolence le soir de bonne heure, la nuit sommeil agité.

Frissonnement continuel, même dans une chambre chaude.—Tremblement de froid et horripilation fébrile générale sans soif.
— Sueur visqueuse dans la paume des mains.

Anxiété, découragement, méfiance de ses forces.—Manières gauches.—Hystérie mélancolique. — Hystérie après un coït immodéré.

#### 7. AUGUSTURA.

DUR. D'ACT., inconnu. -- ANTID.: Coff. -- PUISS., II.

Vertiges en marchant au grand air, ou en traversant une rivière. — Tête entreprise, serrée, tendue, avec battement dans le front. — Hébétement et stupeur comme après l'ivresse. — Distraction. — Vivacité de l'esprit, surtout après midi. — Rêves pendant la veille.

Céphalalgie pressive. — Céphalalgie térébrante dans les tempes. — Céphalalgie avec chaleur de la face. — Sensation de gonflement et d'engourdissement dans le temporal. — Tension dans les muscles des tempes, en écartant les mâchoires. — Céphalalgie spasmodique; les douleurs de tête se manifestent le soir au crépuscule et durent jusqu'au moment du sommeil. — Douleur de meurtrissure dans le cerveau.

Frémissement entre les sourcils en lisant.—Douleur d'écorchure et de sécheresse dans les paupières.—Paupières grandement ouvertes par une crampe.—Rougeur, chaleur et brûlure des yeux, avec suppuration nocturne. — Pression sur les yeux avec sentiment de fatigue, comme par une vive lumière.—Vue trouble, nébuleuse, comme par un obscurcissement de la cornée.— Myopie.—Yeux raides, immobiles, proéminens.

Serrement de crampe dans les oreilles. — Tressaillement déchirant devant et dans les oreilles. — Sensation comme si quelque chose était placé devant ou dans les oreilles. — Diminution de l'oute. — Oreilles chaudes.

Sensation de chaleur dans les joues le soir, qu'on ne peut apprécier par le toucher. — Les joues deviennent bleues. — Douleur de crampes dans les pommettes. — Tension partielle des muscles de la face. — Douleur de crampe dans les masseters, surtout dans le repos et diminuée par le mouvement de la mâchoire. — Grande sécheresse des lèvres et de la bouche, sans soif. — Trismus avec écartement des lèvres. — Lèvres livides.

Douleur d'érosion et prurit dans le nez.

Douleur tiraillante dans les dents (molaires). — Battement dans les dents creuses.

Pincement et élancement douloureux à la pointe de la langue. — Brûlure de la langue comme par du poivre. — Langue blanche avec sensation d'âpreté. — Mucus glutineux, fade, putride dans la bouche avec besoin continuel de boire, le soir dans un demi-sommeil.

Goût amer de la bouche, après le dîner et après avoir fumé du tabac. — Soif de boissons froides. — Grand appétit, insatiabilité malgré le dégoût pour les aliments et renvoi avec sentiment de plénitude sur la poitrine. — Grand désir de café.

Renvois à vides après le dîner.—Renvois bilieux.

Malaise, surtout pendant le dîner. — Malaise à s'évanouir en marchant au grand air.

Douleur d'écorchure dans l'estomac, en commençant le repas.—Douleur decrampe dans la région précordiale.—Déchirements dans la région précordiale et dans l'hypochondre (côté droit), augmenté par le mouvement du tronc.

Elancements dans le bas-ventre. — Douleur incisive dans la région lombaire de dedans en dehors. — Dechirement dans le bas-ventre, surtout après avoir

pris du lait chaud. — Coliques spasmodiques. — Fermentation et gargouillement dans le bas-ventre avec mouvements diarrhéiques. — Douleur de meurtrissure dans un côté du bas-ventre (droit).

Selles fréquentes, comme de la bouillie, ou liquides. — Diarrhée maqueuse avec tranchées. — Sensation de pression et de contraction dans l'anus, avec gonflement des hémorrhoïdes et douleur brûlante, rongeante, même avec des selles molles. Fréquente envie d'uriner. — Émission peu abondante. — Emission fréquente et

abondante d'urine, précédée de pression dans la vessie et suivie de tenesme. — Urine citrine qui bientôt se trouble.

Prurit voluptueux aux parties génitales.

Respiration entrecoupée. — Enroue-

Respiration entrecoupée. — Enrouement avec accumulation de mucosité dans la trachée. — Respiration sanglotante. — Voix faible, découragée.

Toux sèche, chatouillement au larynx.

— Toux violente qui paraît venir profondément de la trachée-artère, expulsion de mucosités jaunâtres.

Oppression en marchant vite et en montant.—Coups ou élancements violents dans les flancs et dans le sternum.—Crampes de la poitrine, comme par une impression subite de froid.—Sensibilité douloureuse de la poitrine en la pressant.—Douteur de meurtrissure dans les muscles de la poitrine en remuant le corps ou les bras.—Coups douloureux dans la région précordiale.—Battements violents étant assis, en se baissant, ou couché sur le côté gauche.—Sentiment douloureux de contraction du cœur.

Douleur de courbature dans le sacrum, la nuit, surtout le matin vers 4 heures; elle se dissipe en se levant. — Le matin au lit, raideur douloureuse entre les omoplates et la nuque, jusqu'à midi. — Frémissement dans les muscles du cou (côté gauche) et sur les épaules.

Lourdeur et sensation paralytique dans le bras. — Raideur dans l'articulation du coude, avec lassitude des bras.—*Tirait*-

lements spasmodiques dans les avant-bras, les mains et les doigts.—Froid des doigts.

Douleur d'entorse, de crampe dans l'articulation coxo-fémorale. — Douleur de brisement dans les cuisses et les jambes en marchant. — Lourdeur et lassitude des membres inférieurs. — Élancements douloureux par secousses dans les cuisses et dans la crête de l'os des îles. — Tiraillement pressif dans les membres inférieurs. — Serrement de crampe dans les cuisses et dans les pieds. — Paralysie des articulations des pieds.

Craquement dans presque toutes les articulations.-Le soir étant assis on devient raide avec presque impossibilité de se soulever. - Tension dans les muscles en marchant. - Sensation de mangue de forces générales, comme si la moelle des os était coagulée. - Raideur tétanique des muscles de tout le corps. — Tétanos excité par le toucher, par le bruit, ou par la déglutition de l'eau tiède. — Après l'accès, les joues et les lèvres deviennent bleues, la respiration difficile, haletante, gémissements, clôture des paupières. - Paralysie.-Ebranlement du tronc par des tressaillements le long du dos semblables à des secousses électriques. - Opistolonos. -Douleur déchirante spasmodique ou pression tiraillante.

Grande somnolence le soir, avec insomnie avant minuit. — Sommeil agité plein de rêves.

Le soir, accroissement de la chaleur du corps, surtout des joues; la tête est entreprise, ou pression tiraillante dans le front avec soif.

Grande excitation. — Hilarité soutenue, surtout hors le travail d'esprit. — Défiance de soi-même. — Pusillanimité. — Mécontentement de sa position. — Grande susceptibilité à se croire offensé. — Timidité et disposition à s'effrayer.

#### 8. ANTIMONIUM CRUDUM.

Dur. d'act., 60 jours. — Antid.: Hep., merc. — Puiss., X.

Vertiges avec nausée. -- Ivresse.

Esprit obtus. — Hébétitude. — Manie. —Sensation de vide dans la tête comme après un long travail au froid.

Céphalalgie après s'être baigné dans l'eau courante.—Céphalalgie suivie d'épistaxis.—Congestionvers latête.—Céphalalgie frontale et du sinciput, obtuse, augmentée en montant un escalier.—Céphalalgie avec engourdissement par la lumée du tabac (malgré l'habitude).

Déchirement dans la tête, amélioré par la marche, au grand air. — Douleur lérébrante dans le front et les tempes. — Sensation dans le front comme s'il devait éclater.—Douleur ostéocope au vertex, comme si le périoste était gonflé.—Chute des cheveux.

Paupières rouges. — Taches bleues, hunides dans l'angle externe de l'œil. — Chassie dans les angles. — Élancements dans les yeux. — Inflammation arthritique. — Diatation des yeux. — Sensibilité de l'œil droit) à la lumière du jour. — Cécité.

Élancements dans les oreilles. — Rougeur, gonflement et brûlure de l'oreille. — Fouillement, bruissement dans les preilles. — Bourdonnement. — Surdité comme si une feuille était placée devant es oreilles.

Les narines sont gercées et croûteuses. — Sensation d'écorchure et écorchure des naines et des angles des narines. — Éruption ésiculaire sur le nez.

Éruption à la face, rouge, brûlante, cre. — Petits granules jaunâtres sur la leau de la face. — Bosse sur la joue droite). —Boutons aux joues avec croûte aunâtre. — Éruption vésiculaire à la face tau menton. — Sensation de cuisson sur t sous le menton.

Écorchure et déchirement aux commis-

sures des tèvres. — Éruption boutonneuse sur la lèvre supérieure. — Sensation d'écorchure sur les bords de la langue. — Sécheresse de la bouche. — Sative satée. — Langue blanche chargée. — Accumulation de salive sur la langue et dans la bouche.

Douleur dans les dents creuses. — Quand on s'endort étant assis, on grince des dents.

Sensation d'un corps étranger dans la gorge. — Accumulation de mucosité épaisse dans la gorge, sécheresse et âpreté de la gorge.

Goût amer dans la bouche. — Sensation de faim qui ne cesse pas en mangeant, et sensation de vide dans la région précordiale, surtout le matin.—Soif, surtout la nuit.—Inappétence chronique.

Renvois avec gout acide. — Eructation avec gout des aliments. — Rapports aqueux. — Hoquet en fumant du tabac.

Nausée, malaise, vomiturition, suite de l'altération de l'estomac. — Malaise par l'usage du vin.—Vomissement de mucus et de bile.—Vomissement avec diarrhée et grande anxiété.

Endolorissement de la région de l'estomac; il est sensible au toucher.—Sensation de surcharge de l'estomac.—Crampes d'estomac, gastralgie.

Ventre ballonné, surtout après le repas.
—Tranchées violentes.—Sensation de vide
dans le ventre, comme après une forte
diarrhée. — Développement et mouvement de flatuosités avec borborygmes. —
Claquement.

Sensation de gonflement et dureté dans la région inguinale, au toucher et en pressant.—Affections bilieuses.

Sortie difficile d'une selle dure. — Garde-robe pressante avec effort.—Selle de consistance de bouillie. — Diarrhée avec tranchée. — Diarrhée des femmes en couche. — Diarrhée alternative avec la constipation chez les vieillards. — Excrétion de sang noir par l'anus. — Hémorrhoides fluentes et avec gress. — Nœuds hémorrhoï-

daux avec fourmillement et brûlure.

— Clou brûlant au périnée. — Pression d'écartement dans le rectum et l'anus.—
Prurit brûlant et cuisson dans l'anus.

Fréquente envie d'uriner —Urine peu abondante. —Incontinence d'urine en toussant. — Émission fréquente et copieuse d'urine. —Urine de couleur orangée, terne ou rouge brun. — Urine avec sédiment de corpuscules rouges. — Hémorrhoides de la vessie.

Grande excitation de l'appétit vénérien.

— Grande lascivité. — Pollutions nocturnes.

Écoulement sanguin par le vagin.

Obturation du nez. — Grande faiblesse de la voix. — Perte de la voix par échauffement. — Grande chaleur dans le larynx. — Respiration profonde, suspireuse.

Toux avec brûlure dans la poitrine. — Toux sèche le matin qui ébranle.

Oppression suffocante. — Élancement dans la poitrine pendant et hors le temps de la respiration. — Douleur de coup dans le grand pectoral, en levant le bras, ou par compression.

Tiraillement de crampe dans les muscles du cou et la nuque.—Petits boutons à la nuque, sur les omoplates et derrière les oreilles. — Douleur rhumatismale à la nuque.

Douleur rhumatismale dans le bras. — Tiraillement dans l'avant-bras, les doigts et leurs articulations. — Douleur de goutte dans les articulations des doigts. — Gonflement rouge, chaud, avec tension et élancement de l'avant-bras. — Après le frottement, vésicule avec prurit au bras. — Sensibilité, endolorissement à la peau sous les ongles. — Les ongles croissent moins qu'à l'ordinaire.

Traction dans les membres inférieurs. —
Bosse avec auréole rouge aux fesses et aux jambes. — Élancement douloureux dans le genou et le tibia. — Fongus au genou. — Brûluré à la partie charnue du gros orteil. — Cors à la plante des pieds. — Callosité de l'épiderme à l'extrémité des

orteils. — Douleur pressive des cors

Pesanteur dans tous les membres. —
Grande lassitude. — Tremblement aprè
le dîner. — Faiblesse générale la nuit et
s'éveillant. — Amaigrissement. — Gonflement hydropique du ventre. — Apoplexie
— Inflammation des tendons. — Inflamma
tion rhumatismale. — Ulcère fistuleux.

Les douleurs augmentent après avoi mangé, la nuit (et le matin).

Eruption de boutons dans différente parties du corps.—Éruption milliaire.—Éruption vésiculaire dans différentes parties surtout aux articulations des membres e à la face.

Grande somnolence pendant le jour.— Envie de dormir, surtout avant midi.— Réveil la nuit avec frayeur.— Rêves pé nibles où l'on se querelle.

Fièvre intermittente avec prédominence d'affection gastrique ou bilieuse. —
Fièvre intermittente avec nausée, malaise vomiturition et peu de soif. —Fièvre intermittente tierce, avec un état gastriqu dans l'apyrexie. — Fièvre intermittent avec la langue chargée, renvois, inappétence, amertume de la bouche et pe de soif. —Le matin, sueur chaude chaquitroisième jour.

Indisposition, mauvaise humeur. – Désir extatique. — Réflexions tristes su son état présent et futur. — Penchant a suicide. —Grande disposition à s'effrayer

#### 9. ARGENTUM FOLIATUM.

Dur. D'ACT., incon. - ANTID.: Incon. - Puiss.,

Vertiges avec obscurcissement de la vu--Vertiges avec assoupissement et chu des paupières.

Sensation d'irresse avec fourmillemet dans la tête. — Obscurcissement comm par la fumée. — Stupidité et sensation de vide dans la tête.

Élancement, déchirement doulourer dans la tête. — Pression et déchirement dans les os de la tête, surtout dans le ten

coral et les pariétaux.—Pression et tirailement dans l'occiput, comme s'il y avait in corps étranger, avec sensation de raileur dans la nuque. — Pression engourlissante dans la région frontale. — Accès le compression du cerveau avec nausée et brûlure dans l'épigastre en lisant et etant debout.

Douleur d'écorchure à la tête produite sir une légère pression.—Tressaillement ouloureux, crampoïde et soubresaut ans les muscles des tempes et du front droit).—Boutons aux tempes, douloueux comme un ulcère.

Gonflement et rougeur des bords des aupières.—Prurit aux angles des yeux.
Prurit rongeant dans l'oreille extérieure; in gratte jusqu'au sang. — Elancement néisif à l'oreille jusque dans le cerveau.
—Sensation d'obturation dans les oreilles.

Pression rongeante et déchirement dans es os de la face. —Gonflement de la lèvre upérieure, immédiatement au-dessus du ez. — Épistaxis après s'être mouché u précédé de fourmillement dans le nez.

Endolorissement des gencives, surtout u toucher.—Les gencives sont décollées t saignent facilement.

Accumulation de salive épaisse dans la ouche avec horripilation. — Sensation e sécheresse quoique la langue soit hunide. — Vésicules brûlantes sur la langue. — Accumulation de mucosité grise, visueuse dans le pharynx, qu'on expectore milement.

Déglutition difficile comme par un gonement intérieur de la gorge en avalant et ans l'expiration. — Inflammation de la orge après l'abus du mercure. — Térèbraon et fouillement dans la gorge.

Dégoût pour tout aliment, même dans pensée, avec prompte satiété.

Grand appétit, même lors de la pléninde de l'estomac.—Faim dévorante qui e cesse pas en mangeant.

Pyrosis.—Hoquet par la fumée du ta-

Nausée et malaise continuel, - Ren-

vois d'une eau âcre, désagréable, et qui laisse dans la gorge de la brûlure et un grattement. Pression à l'épigastre: Pression très

forte sur le bas-ventre, vers la région du pubis, de suite, au commencement du repas, augmentée par la respiration et diminuée en se mettant debout. — Ballonnement du ventre avec douteur et pression. — Borborygmes bruyans dans le ventre. — Contraction des muscles du ventre en marchant. — Tranchées.

Envies fréquentes d'aller à la selle. — Selle peu copieuse et molle. — Selles sèches, terreuses. — Vomissement pendant l'évacuation. — Douleur de contraction par refroidissement, après une garderobe du matin.

Fréquente envie d'uriner.—Urine abondante (diabétès). — Pollutions nocturnes.
—Douleur de meurtrissure dans les testicules.

Obturation des narines avec démangeaison. — Coriza fluent très fort avec éternuement. — En se baissant, en riant, en montant un escalier, il se produit beaucoup de mucosité dans la trachée, dont l'expulsion est facile. — Sensation d'écorchure dans le larynx en toussant

Pendant la journée, accès de toux courte avec râle et expectoration aqueuse.

Abondance de mucus dans la poitrine.

—Pression et élancement sur le sternum et dans les flancs.—Douleur incisive dans les côtés de la poitrine en inspirant.

Pression tiraillante et déchirement dans les membres. — Douleur de brisement dans le sacrum et les articulations des membres inférieurs. — Commencement de paralysie du bras et de la main.—Engourdissement et sensation de raideur dans les membres. — Accès épileptique. — Suite fâcheuse de l'abus du mercure. — Les symptômes se renouvellent à midi.

Prurit brûlant dans différentes parties de la peau.—Rêves avec anxiété.

Horripilation et froid, surtout après midi et la nuit.

16 Antimonium crudum.

Anxiété, mauvaise humeur. — Peu de disposition d parler.

#### 10. ARNICA MONTANA.

Dur. D'Act., 4 semaines. — Antid.: Camph., ipéc.— Puiss., II.

Vertiges tournoyans en marchant, en se redressant et en remuant la tête.—Vertiges à tomber en avant pendant le dîner.

Irréflexion. — Distraction. — Rêveries. — Engourdissement qui alterne avec des cris. — Embarras de la tête avec élancement.

Pesanteur et faiblesse de la tête qu'on supporte difficilement. - Chaleur brûlante dans le cerveau, le corps n'étant pas chaud. - Céphalalgie pressive avec chaleur dans le cerveau, plus forte après le dîner. - Céphalalgie sus-orbitaire, comme si les membranes du cerveau étaient spasmodiquement tendues. - Sensation comme si le cerveau était durci dans le front (surtout étant près du feu).-Céphalalgie frontale pressive, surtout en marchant, en montant un escalier, en réfléchissant et en lisant. - Céphalalgie pressive engourdissante. - Elancements ou déchirement par secousses dans la têle en toussant. Sensation comme si un clou était enfoncé dans les tempes. - Déchirement avec élancement périodique dans les tempes.—Congestion vers la tête.—Cephalalgie produite par un coup. — Commotion au cerveau. - Fourmillement dans le front et au-dessus des orbites. - Déchirement au travers de la tête comme par un couteau, suivi d'une sensation de froid intérieur qui fait dresser les cheveux.

Fourmillement à l'extérieur du vertex.

—Tous les tégumens du crâne sont fixes, immobiles.

Pression obtuse sur le bord de l'orbite avec fourmillement autour de l'æil. — Les paupières sont gonflèes, échymosées. — Douleur d'écorchure des bords des paupières dans leur mouvement. — Yeux à moitié fermés, ternes, troubles.— Proéminence des yeux.—Brûlure des yeux.—Douleu d'écorchure et mouvement difficile de yeux.— Contusion des yeux.— Rougeu de la conjonctive.—Écoulement de larme brûlantes.— Susceptibilité des yeux à la

Yeux fixes annonçant de l'anxiété.

Douleur de contusion des oreilles.—Déchirement dans les oreilles.—Élancemen dans et derrière les oreilles. — Bourdonne ment.

lumière.-Obscurcissement de la vue.-

Face creuse, pâle.—Le soir, le visage es chaud, sec, sans soif, le nez est froid.—Visage jaune bouffi.—Enfluredure, rouge luisante, chaude des joues, avec des battements douloureux.— Éruption varice loïde à la face, surtout au-dessous de yeux.—Rougeur, chaleur brûlante d'une joue sans chaleur du corps.—Battement avec tressaillement ou horripilation four-millante dans les joues.

Douleur de crampe à la racine du nez.

— Contusion du nez. — Gonstement du nez.

— Ulcération des narines. — Épistaxis. —
Fourmillement au nez.

Gonflement des lèvres.—Les bords des lèvres sont fendillés. — Sécheresse des lèvres. — Ulcération des commissures des lèvres. — Fourmillement dans les tèvres comme si elles étaient engourdies. — Chaleur brûlante des lèvres, le corps étan d'une chaleur modérée.—Paralysie commençante de la mâchoire inférieure. — Gonflement douloureux des glandes sous maxillaires.

Fourmillement des gencives comme s elles étaient engourdies. — Ébranlemen et allongement des dents. — Odontalgie déchirante dans les dents molaires supérieures en mangeant. — Odontalgie aver gonflement des joues dur et tendu.

Sécheresse de la bouche avec soif. —
Sensation d'excoriation et démangeaisor
sur la langue. — Langue blanche chargée
— Salive sanguinolente. — Sensation d'astriction au palais comme par des substances acerbes. — Crachats de sang.

Brûlure dans la gorge avec anxiété comme par une chaleur intérieure. — Élancement dans la gorge, hors le temps de la déglutition. — Bruit pendant la déglutition. — La déglutition est empêchée par malaise, comme si les aliments ne pouvaient descendre. — Mucosités amères dans la gorge.

Goût amer de la bouche le matin au réveil. — Goût putride muqueux. — Appétit extraordinaire avec pression et sensation de plénitude dans le bas-ventre, immédiatement après le repas. — Dégoût de la viande et du bouillon. — Goût pour le vinaigre. — Éloignement pour la fumée du tabac. — Soif de l'eau. — Désir de boire et cependant répugnance pour les boissons.

Rapports à vide violents. — Renvois amers, putrides. — Éructation de mucosité amère ou d'eau salée. — Éructation interrompue.

Le matin, nausées avec vomiturition.—
Nausée avec vertiges produite par la lecture prolongée. — Effort inutile de vomissement avec strangulation; il a lieu aussi la nuit avec une pression sur l'épigastre.
— Vomissement de sang coagulé. — Après avoir bu, vomissement de sang.

Plénitude dans l'estomac et la région précordiale, comme produite par une satiété nauséeuse. — Fouillement dans la région précordiale avec la sensation de quelque chose qui s'y coagule. — Crampe d'estomac avec pincement. — Élancement dans l'épigastre avec pression jusque dans le dos et sensation de constriction sur la poitrine augmentée par les aliments, les boissons et le toucher. — Pression ou pesanteur dans l'estomac ou l'épigastre comme par une pierre.

Élancement dans la rate en marchant. — Élancement au - dessous de l'hypochondre gauche; ils coupent la respiration. — Pression dans la région hépatique. — Mal de ventre fouillant, dyssentérique, avec nausée et somnolence. — Ballonnement dans le basventre avec des tranchées dans les flancs; il diminue par l'expulsion de flatuosités; cet état dure depuis le matin jusqu'à deux heures. — Coups aigus au travers du ventre. — Douleur de meurtrissure dans les flancs. — Mal de ventre après un effort de reins. — Flux des femmes enceintes. — Tourment par flatuosités; elles sont fétides comme des œufs pourris.

Effort inutile pour aller à la selle.—Garde-robeténue comme de la bouillie, d'une odeur acide, après de fréquents et inutiles efforts. — Évacuations peu copieuses et fréquentes de muçosités.—Excrétion involontaire la nuit.

Selles sanguinolentes, puriformes. — Selles de matières peu digérées. —Constipation. — Hémorrhoïdes aveugles. — Pression dans le rectum.

Tenesme en urinant. - Urine brune avec sédiment briqueté.

Accroissement de l'appétit vénérien avec fréquentes érections. — Pollutions nocturnes avec rêves voluptueux. — Taches rouges avec prurit sur le gland. — Gonflement rouge bleuâtre du pénis et du scrotum extraordinaire avec tension, douleur d'écorchure et sensation de brisement. — Gonflement des testicules, dur avec douleur en marchant, étant debout et autoucher (produit par un coup). — Hydrocète. — Élancement dans les testicules et le conduit spermatique jusque dans la cavité du ventre, dans le repos.

Règles hâtives, écoulement de sang hors le temps des règles.

Haleine d'odeur putride. — Respiration haletante. — Fourmillement continuel dans la trachée artère qui force à crachoter. — Râlement, oppression avec anxiété.

Toux seche produite par l'irritation de la trachée, le matin après le lever. — Toux nocturne pendant le sommeil. — Toux chez les enfans après avoir crie et pleuré. — Accès de toux convulsive. — Hémoptisie. — Expuition de sang clair, écumeux, mêlé de caillots et de mucus. Bouillonnement du sang. — Palpitation de cœur et chaleur périodique qui augmente le crachement de sang. — Expectoration sanguinolente avec serrement de la

Arnica montana.

18

noitrine. - Toux avec douleur de meurtrissure aux côtes.

Serrement de poitrine. - Elancements. - Elancements avec toux qui coupe la respiration et est augmentée par le mouvement .- Pleurodinie .- Sensation d'écorchures vives dans la poitrine. -- Mouvement anormal du thorax.

Douleur de brisement dans les cartilages des côtes et leurarticulation postérieure. - Compression à l'épigastre. - Le battement du cœur est tressaillant. - Élancements vifs au cœur. - Écorchure des mamelons; sueur rougeâtre sur la poitrine.

Douleur de coup, de meurtrissure au sacrum, sur les omoplates et dans le dos. -Fourmillement le long du dos. - Douleur de crampe dans les muscles de la nuque. surtout en éternuant et en baillant. - Faiblesse des muscles du cou. - Gonflement douloureux des glandes du cou.

Elancements dans les oreilles .- Tressaillement dans les bras. - Douleur de brisure et de fourmillement dans les bras et dans les mains. - Douleur d'entorse dans l'articulation des bras et des mains. - Gonflement des veines des mains avec pouls fort et dur. - Manque de force dans les mains quand on veut saisir quelque chose. - Crampes dans les doigts.

Tiraillements, tension et lassitude dans les cuisses qui augmentent par la marche. -Déchirement dans les genoux, ou tension comme si les tendons étaient trop courts, augmentés par la marche. - Douleur de brisure et de coup dans les jambes et dans les pieds.-Faiblesse dans les genoux qui fléchissent avec engourdissement et insensibilité des pieds. - Gonflement des articulations du pied avec douleur pendant le mouvement. - Déchirement et inquiétude dans un pied qui a éprouvé une entorse.-Elancement dans l'articulation du pied pendant le mouvement. - Gonflement rouge, chaud, du pied jusqu'au milieu de la jambe. Brûlure et gonflement luisant des orteils et des parties voisines. - La peau du pied est rouge

Arnica montana. foncé, bleuâtre ou jaunâtre.-Fourmillement dans le pied.

Douleur de rhumatisme chronique. avec tension, déchirement. - Relâchement et pesanteur dans tous les membres. -Douleur de brisement paralytique dans tous les membres et les articulations, pendant le mouvement. - Retentissement dans tout le membre quand on l'appuie ou quand le corps est ébranlé. - Accès d'évanouissement. - L'enfant devient raide, a des convulsions, ne peut supporter sa tête. - Apoplexie avec extravasation par plethore du cerreau. - Maladie produite par l'abus du quinquina.

Les douleurs augmentent en parlant, se mouchant, par le mouvement, même par le

Elancements douloureux. - Brûlure dans la partie supérieure du corps avec une chaleur naturelle, même avec fraîcheur des parties inférieures .- Douleur fourmillante, surtout dans les parties lésées. - Compression et élancement dans les parties lésées. - Affections produites par un coup. PAR UNE CHUTE, PAR MEURTRISSURE ET TOUTE LESION MECANIQUE. - Entorse, luxation.

Piaie, morsure. - Furoncle. - Piqûre d'abeille. - Grande somnolence le jour, trop tôt le soir. - Sommeil plein de rêves et non réparateur. - La nuit, sommeil avec rêvasseries. - Rêves terribles anxieux. -Frayeur et gémissements dans le som-

Froid comme par une ablution d'eau froide. Fièvre et frisson le soir. - Fièvre matinale; au début froid, ensuite chaleur. -Fièvre intermittente avec grande soif avant le frisson, bâillement suivi de chaleur avec frisson et moins de soif. -Avant l'accès, tiraillement dans le perioste de tous les membres. - Soif sans chaleur extérieure avec rétrécissement des pupilles. ors para . s. plast to a vis , incilius?

Grande inquiétude, anxiété, hypochondrie anxieuse. - Excès de sensibilité. -Disposition à s'effrayer. — Manque d'espérance. - Caractère rétif.

#### 11. ARSENIUM ALBUM.

Dun. d'act., 6 semaines.—Antid.: Chin., ipéc., nux., somb., verat. — Puiss., X.

Vertiges le soir; on est forcé de chercher un appui en fermant les yeux. — Vertiges avec battement dans la tête en se redressant.

Pesanteur et vide de la tête avec bourdonnement d'oreilles dans la chambre; elle se dissipe au grand air.—Céphalalgie frontale avec battement et vomiturition.— Céphalalgie avec pression et engourdissement.

Teigne, douleur du cuir chevelu au toucher.

Inflammation de la surface interne des paupières, avec difficulté d'ouvrir les yeux.

—Ophtalmie avec brûlure violente.—Ophtalmie scrofuleuse; les yeux sont ternes.

— Taches de la cornée. — Regard féroce fixe.

Bourdonnement avec dureté de l'ouïe, comme si les oreilles étaient bouchées.

Face bouffie, pâle; face jaunâtre, yeux enfoncés avec des cercles bleuâtres. — Gonflement de la face (et de la tête), surtout aux paupières. — Douleur brûlante de la face, ou elle est tiraillante, élançante. — Couperose. — Dartres farineuses à la face et autour des yeux. — Gourmes. — Cancer de la face.

Nez pointu. — Gonflement du nez. — Brûlure continuelle du nez.

Lèvres sèches, noirâtres, fendillées. — Éruption aux lèvres, sur le bord de la partie rouge. — Cancer de la lèvre inférieure avec fond lardacé et bords durs, renversés. — Langue sèche, brune. — Gangrène de la langue. — Langue noire, sèche, déchirée. — Gonflement de la langue. — Gonflement du palais. — Parole précipitée. — Aphtes dans la bouche.

Douleur de brûlure dans la gorge. — Gonflement mou, indolent, au cou et dans la mâchoire inférieure. — Mal de gorge, comme si ce qu'on avale passait sur une tumeur brûlante.

Odontalgie nocturne, augmentée étant couché sur la partie malade et diminuée par la chaleur du feu.—Odontalgie nocturne et douleur à la joue avec battement profond dans l'os; elle se propage aux dents et dans l'oreille. — Les dents sont comme trop longues. —Grande envie de grincer des dents. — Ébranlement des dents. —Saignement des gencives.—Soif haletante inextinguible par les boissons. —On boit fréquemment et peu. — Soif violente d'eau froide. — Goût salé. — Goût amer après le dîner. — Le goût des alimens est perdu.

Renvois d'une eau âcre. — Renvois après le dîner avec pesanteur d'estomac et nausée. — Tous les aliments produisent une pression dans le pharynx comme s'ils y étaient retenus.

Nausée, surtout pendant le mouvement.—Nausée continuelle avec vomissement et diarrhée.—Vomiturition avec effort.—Vomissement chronique des aliments.—Vomissement des aliments ingérés, ensuite de bile.—Vomissement violent d'eau (et de mucosités).—Pendant le vomissement, douleur dans la région de l'estomac.—Vomissement de sang.— Vomissement noir.—Après l'injection d'une petite quantité de liquide, vomissement verdâtre avec diarrhée.—Choléra de l'Inde et sporadique.

Pression dans l'estomac après le dîner.

—Pression et brûlure dans l'épigastre, l'estomac, le bas-ventre et le rectum. — Fort endolorissement et anxieté dans la région du cœur.

Insensibilité de l'hypochondre gauche jusque sous l'estomac. — Induration du foie. — Douleur violente de brûlure dans l'épigastre et les intestins. — Grande douleur et anxiété dans le bas-ventre. — Tranchées avec pesanteur dans le bas-ventre, vo-missement et diarrhée. — Tranchées avec froid, anxiété et soif. — Douleur nocturne tressaillante dans le bas-ventre. — Bas-ven-

tre gonflé et dur. — Gonflement mou du bas-ventre, douloureux au toucher. — Borborygmes. — Ascite. — Gonflement douloureux des glandes de l'aine.

Envie d'aller à la selle, précédée de pincements et douleur brûlante à l'anus. — Évacuations brûlantes avec violentes co-liques. — Selles muqueuses, aqueuses. — Diarrhée verdâtre. — Diarrhée puante avec des vers. — Exonération sanguine. — Diarrhée jaunâtre. — Selles de matières non digérées. — Selles involontaires. — Nœuds hémorrhoïdaux brûlants. — Hémorrhoïdes aveugles. — Chute du rectum.

Sécrétion d'urine supprimée. — Urine sanguinolente brûlante. — Urine trouble. — Urine avec sédiment muqueux. — Incontinence d'urine.

Gonflement douloureux des organes génitaux jusqu'à la gangrène. — Gland rouge, bleuâtre, gonflé et fendillé en raghades. — Inflammation érysipélateuse du scrotum. — Menstruation trop hâtive et trop forte. — Perte de sang et autres symptômes pendant les règles. — Leucorrhée âcre qui produit des excoriations.

Coriza fluent, extraordinaire, âcre, de liquide brûlant, avec enrouement et insomnie. — Coriza avec épistaxis et pression au-dessous des sourcils. — Coriza avec excrétion âcre et brûlure dans le nez. — Grippe opiniâtre.

Accès de suffocation le soir au lit. — Asthme subit avec faiblesse et lassitude extrême pendant le mouvement. — Inflammation de la trachée. — Phthisie trachéale avec défaut de sécrétion de mucosité.

Toux avec oppression et mucosité épaisse dans la poitrine. — Toux sèche, surtout après avoir bu. — Toux sèche périodique qui revient le soir. — Toux sanguinolente la nuit avec chaleur brûlante de tout le corps.

Oppression dans le froid extérieur. —
Oppression en montant. — Oppression
avec pression douloureuse dans la région
précordiale. — Étranglement de la poitrine. — A chaque mouvement la poitrine

est contractée à ne pouvoir recevoir l'air.

— Pression au sternum. — Élancements dans les côtés de la poitrine. — Froid dans la poitrine et les parties supérieures du ventre, le soir. — Hydrothorax. — Cancer des mamelles. — Battements de cœur pendant la nuit avec grande anxiété.

Douleur de brûlure violente dans le dos, accrue par le toucher. Déchirement dans le dos (et dans les membres supérieurs et inférieurs). Douleur tiraillante dans le dos.

Gonflement du bras, qui est couvert d'ampoules noires d'odeur fétide. — Déchirement et tiraillements nocturnes du coude jusqu'à l'aisselle.

Douleur déchirante dans les jambes et de la hanche jusqu'à la cheville, qui force à mouvoir le membre. — Faiblesse paralytique de la cuisse. — Douleur de brisement dans le genou. — Dartre pruriante dans le jarret. — Vieil ulcère avec brûlure et élancement à la jambe. — Raccourcissement des tendons des jarrets. — Grampes des mollets. — Tumeur blanche. — Gonflement du pied, dur, luisant, brûlant, avec vésicules bleuâtres, noirâtres, brûlantes sur le dos du pied. — En marchant, les talons, les orteils sont douloureux, comme écorchés.

Sensation comme si les membres étaient engourdis. — Crampes toniques. — Inflammation des organes intérieurs avec violente douleur brûlante. — Amaigrissement. — Atrophie. — Douleur brûlante.

Peau sèche comme du parchemin. —
Peau bleue et froide. — Anazarque universet. — Ulcères sanieux avec bords élevés,
douleur brûlante, surtout quand la partie
devient froide. — Brûlure dans les ulcères. —
Ulcères avec escarres légères. —
Grand endolorissement (ou insensibilité)
des ulcères. — Ulcère gangréneux. — Anthrax. — Pétéchies dans les fièvres putrides. — Varioloïde. — Dartres brûlantes. —
Dartres entre les omoplates et au-dessous du sternum. — Vésicules pleines de sang sur tout le corps. — Éruption orticaire,

milliaire. - Ongles décolorés. - Varices. Accès avec des symptômes la plupart étrangers ET GRANDE CHUTE DES FORCES. -- DOU-LEUR AVEC ANXIÉTÉ, ENVIE DE SE COUCHER ET FAIBLESSE SUBITE. - Les symptômes apparaissent comme dans les fièvres intermittentes. - Exacerbation le soir après s'être couché.-Les symptômes augmentent étant couché sur la partie malade,-Amélioration par la chaleur. - Les symptômes augmentent après le dîner, étant assis, mais diminuent étant debout ou dans le mouvement. -- Douleur nocturne qui devient insupportable en marchant. -On sent les douleurs même pendant le sommeil. - Accès périodique de douleur chaque trois ou quatre semaines. - On ne peut entendre parler. - Les douleurs deviennent plus vives étant couché; on désire se lever, mais on retombe bientôt.

Somnolence le soir. -- Insomnie nocturne avec agitation continuelle. - Jactation. - Sursaut et tressaillement dans le sommeil. - Quand on se réveille, on se rendort difficilement. - Vomissement nocturne. - Brûlure dans l'épigastre en s'endormant. - Tressaillement violent dans les membres en s'endormant. -Brûlures au-dessous de la peau pendant la nuit, comme s'il coulait de l'eau bouillante dans les vaisseaux. - Inquiétude nocturne avec anxiété. - Demi-sommeil continuel (interrompu par des gémissements et grincements de dents). Frisson et horripilation sans soif, surtout dans la chambre et avec douleur.-Horripilation le soir avec inquiétude et pendiculation. - Froid universel avec absence du pouls, sueur froide visqueuse. Frisson sans soif et autres symptômes accessoires .- Frisson et horripilation immédiatement après avoir bu. - Chaleur ardente, universelle pendant la nuit, avec brûlure dans les veines, sans soif et sans sueur. - Sueur au commencement du sommeil.—Sueur après un accès de sièvre. Sueur collante. - Fièvre précédée de vertiges et grande faiblesse. - Accès de

fièvre suivi de douleur frontale pressive — Bourdonnement d'oreilles pendant l'accès de fièvre.

Accès d'anxiété nocturne qui chasse du lit. — Anxiété le soir après s'être couché et le matin (à 3 heures) quand on s'éveille. — Crainte de la solitude. — Irritabilité morale. — Irascibilité pour peu de chose. — Envie de médire. — Peur excessive de la mort. — Manie.

#### 12. ASA-FETIDA.

Dur. D'Act., 7 semaines. — Antid.: Caust., chin., électris. — Purss., III, VI.

La tête est vide, tournoiement dans la tête sans diminution dans la force de la pensée. — Émoussement des sens sans diminution de la conscience de son être.

Tension engourdissante dans la tête.— Céphalalgie poussant en dehors ou élançante.—Pression au front, à la partie latérale de la tête et dans les tempes. — Douleur comme par une cheville enfoncée dans les côtés et les tempes. — Céphalalgie battante qui presse en dedans.—Douleur de la tête qui s'efface par le toucher ou se change en une autre espèce de douleur.

Serrement de crampe au dessus des sourcils. — Brûlure dans les yeux avec compression des paupières comme par la somnolence. — Sensation de sécheresse et sécheresse pénible dans les yeux. — Obscurcissement des yeux en écrivant. — Frémissement des paupières.

Tension avec sensation d'engourdissement à la face, surtout à l'os de la pommette. —Pression en dehors dans la face.

Pression dans les oreilles. — Émoussement de l'ouïe avec écoulement de pus par l'oreille après l'abus du mercure.

Tension avec sensation d'engourdissement sur l'os du nez. — Douleur pressive en dehors dans le nez, surtout à l'aile droite.

Douteur de crampe dans la mâchoire

inférieure. — Pression engourdissante dans le menton.

Sensation de sécheresse dans la bouche qui est humide.—Sécheresse dans la gorge avec tension pendant la déglutition.

Dégoût de la bière qui a le goût mu-

queux....objectios ac ob.

Douleur de brisement avec sensation de plenitude dans la région de l'estomac. — Pesanteur à l'estomac après le dîner. — Pulsations visibles et sensibles dans la région précordiale. — Élancement fouillant de dedans en dehors dans les hypochondres en respirant. — Élancements et pression dans la région hépatique. — Élancements de dedans en dehors dans les flancs. — Pesanteur et froid dans le ventre après avoir bu. — Pincement dans le ventre par les vents. — Grand malaise dans le bas-ventre avec anxiété chagrine.

Selles diarrhéiques avec mal de ventre et beaucoup de vents.

Crampes de la vessie pendant et après l'émission des urines. — Pression de dedans en dehors dans le périnée.

Toux rauque, assourdissement des sons dans la trachée.

Oppression de la poitrine étant couché après le repas, avec pression et pulsation dans le thorax.—Élanoements et pression dans la poitrine étant couché, avec la respiration difficile et saccadée. — Pression au sternum. — Élancements dans la poitrine de dedans en dehors.

Douleur violente dans le dos. Élaucements dans les muscles des lombes.

Fremissements et tressaillements des muscles des membres supérieurs et inférieurs.— Sensation de raideur de la main et du pied.—Humeurs froides autour des malléoles. — Battement douloureux dans le gros orteil.—Douleur dans les surfaces articulaires.

Sensation de pesanteur dans tout le corps.—Chorée.—Maladies des os.—Ramollissement des os.—Carie des os.—Douleur des os syphilitique et mercurielle.—

Douleur de raclement et de térébration dans les os.—Scrofule.—Rachitis, gon-flement rouge foncé, chaud des parties malades. — Les bords des ulcères sont durs, bleuâtres et douloureux au toucher.—Pus fétide, sanieux.

Les douleurs se manifestent de dedans en dehors, diminuent par le toucher, ou se changent en douleurs d'une autre espèce.

Tressaillement et frémissement involontaire de quelques muscles particuliers, ou de quelques-unes de leurs fibres. — Les douleurs sont unies à une sensation d'engourdissement. — Douleurs élançantes pressives. — Les douleurs sont intermittente rythmiques. — Les symptômes se montren étant assis. — Douleur serrante, tiraillante. — Hémorrhagie.

Sommeil plein de rêves.—Rêves gais —Grande envie de dormir.

Sensation de chaleur à la face après le dîner, sans soif, avec anxiété et somnolence.

Dégoût pour le travail et mauvaise hu meur.—Grande irritabilité, et cependan indifférence pour toute chose. — Hypo chondrie.—Hystérie.

#### 13. ASARUM EUROPEUM.

Dur. D'ACT., 2 sem.—Antid.: Camph.—Puiss., IV

Vertiges comme par ivresse en se le vant de son siège et en se promenant. Perte d'idées. La tête est entreprise, ave pression; étourdissement et difficulté d travailler. Embarras de la tête avec ten sion.

Pesanteur de la tête comme si elle contenait quelque chose de mobile.—Cépha lalgie pressive, surtout dans les tempes au front et au-dessous de la racine de nez. — Compression ou pression que pousse en dehors aux parties latérales de la tête. —Tiraillement engour dissant dans la tête. —Pulsations dans la tête. —Batte ments au front en se penchant en avant —Céphalalgie accrue par la pensée.

Tension du cuir chevelu avec douleur des cheveux.

Tressaillement des paupières. — Sensation de pression dans les yeux qui écarte en lisant. — Sensation de froid dans es angles des yeux. — Sensation de sécheresse et brûlure dans les yeux. — Déchirenent pulsatif dans les yeux. — Yeux ternes, obscurcissement des yeux.

Chaleur à l'oreille extérieure. — Tenion pressive à l'orifice du conduit audiif. — Diminution de l'ouie comme par obturation ou resserrement du conduit auditif.

Sensation de chaleur et élancement
rûlant dans les joues. — Sensation de
roid dans les dents incisives supérieures.

Accumulation de beaucoup de salive
raîche dans la bouche. — Contraction
lans la bouche avec accumulation de saive aqueuse. — Démangeaison et ardeur
lans la bouche et sur la langue. — Beauoup de mucosité dans la bouche et dans
a gorge.

Le pain a un goût amer, ainsi que le abac.

Éructation d'air. — Beaucoup de raports à vide.

Malaise avec nausée et horripilation. -Envie de vomir avec pression au front t accumulation de beaucoup d'eau dans bouche .- Etranglement avec vomiturion violente et vide, avec augmentation e tous les symptômes, excepté l'étourissement qui diminue. - Vomissement vec de grand efforts et douleur dans l'esomac, partie supérieure du ventre, épiastre et la tête. - Vomissement avec rande anxiété. -- Vomissement avec iarrhées. - Pincements dans l'estomac. - Pression à la région de l'estomac et à épigastre. - Plénitude dans l'estomac vec faim. - Plénitude dans le bas-vene. — Tranchée dans le haut du ventre. - Contraction dans la région diaphragnatique en lignes douloureuses avec vomisment. — Selles diarrhéiques de mucus pais avec expulsion d'ascarides.—Selles lanchâtres, grises.

Envie continuelle d'uriner.—Pression sur la vessie pendant et après avoir uriné. Avortement.

Respiration courte par constriction de la gorge. — Toux produite par une titillation de la gorge avec expectoration muqueuse abondante. — Élancements dans la poitrine en respirant. — Pression sur la poitrine. — Gonstriction dans les poumons. — Tressaillement des muscles autour des clavicules.

Douleur de brisement paralytique dans le dos et aux omoplates. — Contraction crampoïde dans les muscles du cou qui entraînent la tête de côté. — Crampe dans le cou et dans la nuque.

Tiraillement paralytique dans les articulations des mains et des doigts. — Douleur d'entorse dans l'articulation axillaire pendant le mouvement du bras.

Douleur pressante obtuse dans l'articulation coxo-fémorale et dans la cuisse, surtout en s'appuyant sur le pied et en marchant.—Contraction crampoïde dans les
muscles de la cuisse.—Tiraillements dans
le genou et les tendons du jarret.—Faiblesse des jambes et des genoux avec
marche vacillante. — Tressaillement des
muscles des mollets.

Déchirement tressaillant dans les membres. — Grand affaissement après le dîner, avec paresse et éloignement du travail. — Grande agilité dans tous les membres; on croit qu'on vole en marchant. — Faiblesse le soir et envie de vomir qui force à se coucher. — Sensibilité extraordinaire du système nerveux.

Somnolence pendant le jour; on est empêché de dormir le soir par le bouillonnement du sang. — Rêves pleins de chagrin.

Prédominence du froid, frisson et horripilation, humeur chagrine, mélancolique. DUR. DACT., 6 sem. - ANTID. : Incon. - Puiss., IV.

On est fatigué par le travail d'esprit. — Douleur de brisement dans la tête par les efforts intellectuels, ce qui va jusqu'à la confusion de la conception. — Étour-dissement subit avec perte de connaissance.

Le matin mal de tête, comme si le cerveau était brisé. — Le matin céphalalgie unilatérale avec battements violents. — Congestion vers la tête. — Céphalalgie comme si l'air passait au travers de la tête, si on ne se tient pas assez chaudement. — Céphalalgie déchirante.

Exostose de la tête. — Chute des cheveux. — Éruption rouge avec desquammation au front et au nez. — Yeux rouges proéminens avec douleur de brûlure. — Douleur pressive dans le globe des yeux, du dehors en dedans augmentée par le toucher. — Maladies scrofuleuses des yeux. — Tension dans les yeux avec diminution de la vue. — Taches de la cornée. — Amaurose par paralysie des nerfs optiques. — Scintillement; on voit du feu.

Bruissement dans les oreilles. - Écoulement de pus fétide par les oreilles.—Carie des apophyses mastoides. - Diminution de l'ouïe par l'augmentation de volume des amygdales et difficulté de la parole. Face bouffie luisante comme par la sueur, avec proéminence des yeux.-Inflammation des os de la face. - Nez rouge avec gonflement inflammatoire. - Douleur des os du nez au toucher. - Ulcération des narines couvertes de croûtes épaisses. --Gonflement des os du nez, du front (et du maxillaire supérieur ). - Carie des os du nez et du palais. - Desquammation furfuracée de l'épiderme du nez. - Odorat augmenté. - Cancer du nez. - Traction dans la mâchoire inférieure avec gonflement de la joue. - Douleur tensive à l'os

sus-maxillaire. — Douleur térébrante dans la voûte palatine.

Goût douceâtre sur la langue. — Odeur désagréable, putride, comme du fromage trop fait, dans la bouche.

Soif ardente et faim .. way en eniger se

Douleur de l'estomac comme produite par la faim.—Sensation de malaise inexprimable dans l'épigastre.

Pression tensive avec plénitude dans le bas-ventre. — l'incements avec borborygmes et gargouillement dans le bas-ventre. — Malaise dans le bas-ventre avec envie d'aller à la selle. — Gonflement du ventre. — Coliques venteuses la nuit. — Expulsion de beaucoup de flatuosités fétides. — Exostose dans l'intérieur du bas-sin. — Hernies inguinales des enfants et des adultes. — Sortie des hernies.

Selles copieuses, diarrhée nocturne. Émission fréquente d'urine claire. — Rétention d'urine.—Ischurie.

Appétit vénérien fort augmenté. —
Pollutions nocturnes et érections. — Induration des testicules. — Gonflement de la partie inférieure des testicules avec douleur au toucher et au frottement. — Syphilisinvétérée.

Induration et prolapsus de l'utérus.

Coriza fluent. — Sécrétion de pus de couleur jaune verdâtre dans le nez. — Coriza sec. — Obturation du nez.

Accumulation de mucosité dans la poitrine et la trachée-artère expectorée avec difficulté. — Grande gêne dans la ca vité thoracique la nuit et en marchant au grand air, avec besoin de respiration profonde. — Douleur d'élancements obtus du sternum, au-dessous des dernière vraies côtes ou douleur comme celle d'un cheville appuyée au-dessous des trois pre miers cartilages des côtes. — Pression continue dans le côté gauche de la poitrine — Violent battement du cœur avec grand congestion de sang vers la poitrine. — Maladies chroniques du cœur.

Douleur véhémente au dos; on ne peu mouvoir aucun membre le matin. Douleur déchirante et pressive au dos.—Douleur pressive dans le bras et l'avant-bras.—Déchirement de crampe dans les os du métacarpe.—Déchirement paralytique dans les articulations des doigts et des orteils.

Déchirement dans les cuisses soir et matin. — Douleur dans le genou comme par une forte ligature. — Tiraillements paralytiques dans les articulations et les os des orteils.

Douleur de brisement avec déchirement paralytique dans les extrémités, surtout dans les articulations, particulièrement en découvrant les membres et dans le repos; elles se dissipent en se levant. — Goutte noueuse. — Douleur élançante dans les membres avec grande lassitude. — Douleur ostéocope.

Grand bouillonnement du sang, fortespalpitations de cœur et congestion vers la tête avec bruissement.—Crampes hystériques; on rit et on pleure alternativement.

Suites fâcheuses de l'abus du mercure.

— Gonflement hydropique de tout le corps.

Finesse et susceptibilité des sens. — Grande susceptibilité pour chaque douleur. — Besoin de grand air, même quand le temps est mauvais.

Somnolence après le dîner. —On ne dort que jusqu'à quatre heures du matin. — Le matin, au réveil, fatigue, faiblesse. — Sommeil agité avec rêves anxieux.

Frisson universel et sièvre le soir au lit, sans soif et non suivi de chaleur. — Chaleur de la face avec mains et pieds froids. — Forte sueur universelle le matin.

Humeur mélancolique, anxiété, agitation et désir de la mort. — Mélancolie profonde qui se change en emportement à la moindre contradiction. — Grande irrésolution. — Nostalgie. — Caractère plaintif, langoureux. — Besoin irrésistible depleurer. — Eloignement pour la conversation. — Inquiétude. — On désespère de soi et des autres. — Passage de l'emportement à l'hilarité ou à la langueur.

#### 15. BARYTA CARBONICA.

Dur. d'act., 50 jours. — Antid.: Camph. — Puiss., VI.

Grand oubli.

Céphalalgie fouillante. — Céphalalgie au-dessus des yeux. — Endolorissement du cuir chevelu. — Calvitie. — Teigne sèche.

Craquement dans les oreilles quand on marche vite, en avalant ou en éternuant.

—Criquement dans l'oreille en avalant.

—Glouquement de l'oreille gauche vers la droite, étant couché sur le côté droit.

— Dureté d'ouïe. — Éruption sur et derrière les oreilles.

Étincelle dans les yeux dans l'obscurité.

Tension dans la face comme si elle était couverte d'une toile d'araignée.—Sensation de gonflement et gonflement dans la face, avec tension de la peau. — Rougeur circonscrite foncée des joues. — Éruption cutanée au visage.—Gourme.

Sécheresse pénible du nez. — Croûte au-dessous du nez. — Saignement de nez. — Odorat très sensible.

Gonflement etsaignement des gencives.

—Secousses isolées dans les dents.

Elancement brûlant dans les dents creuses, quand quelque chose de chaud les touche. — Saignement des dents. — Odontalgie avant les règles, avec gonflement rouge-pâle des gencives et de la joue.

Sécheresse de la bouche. — Augmentation de la salive dans la bouche. Maint la late

Mal de gorge après refroidissement avec gonflement du palais et des amygdales.

— Pression dans la gorge comme par une cheville, en avalant. — Douleur cuisante dans la gorge hors le temps de la déglutition. — Les glandes du cou sont gonflées, dures comme la pierre. — Inflammation de la gorge.

Le matin, mauvais goût de la bouche,

langue chargée. — Goût amer le matin. — Peu d'appétit, quoiqu'on savoure les aliments.

Renvois à vides, malaise après le dîner et satiété prompte.

Paresse, éloignement pour le travail après le dîner.

Pesanteur à l'estomac après le dîner.—
Douleur à l'estomac à jeun et après le manger. — Pesanteur et plénitude dans l'estomac après avoir peu mangé.—Sensation d'écorchure dans la région de l'estomac, avec sensation, au dîner, comme si le bol alimentaire était retenu.—Faiblesse d'estomac.

Mal de ventre avec rétraction du nombril. — Accumulation de vents dans le bas-ventre.

Envie d'aller à la selle, avec sentiment d'anxiété dans les lombes et frisson qui parcourt le haut des cuisses, suivie de selles molles ou diarrhéiques. — Diarrhée. — Élancements dans les hémorrhoïdes. — Prurit et humidité à l'anus.

Augmentation de sécrétion d'urine.— Èmission fréquente d'urine.

Appétit vénérien diminué. — Faiblesse de la faculté reproductive.

Coriza fluent et toux sèche, avec la parole creuse et profonde.

Mucosités dans la poitrine.—Plénitude de poitrine avec toux nocturne.—Paralysie des poumons chez les personnes âgées. —Asthme.

Raideur du dos, plus forte étant assis que pendant le mouvement. — Élancement dans les omoplates, dans la nuque et les muscles du cou, surtout quand on est à l'air froid et âpre. — Raideur de la nuque. — Élancement dans la nuque. — Douleur ostéocope à la nuque. — Stéatome à la nuque avec brûlure profonde.

En levant les bras, douleur dans le deltoïde. — Engourdissement du bras quand on est couché dessus. — Engourdissement des doigts. — Sécheresse des mains; elles sont comme du parchemin. — Mains froides avec des taches bleues.

— Desquammation de la peau des mains et du bout des doigts. — Fourmillement et démangeaison insupportable dans la paume de la main; on est forcé de la gratter.

Douleur dans l'articulation du pied, comme celle que produit l'entorse. — Sueur fétide des pieds. — Traction douloureuse dans toute la jambe gauche.

Douleur dans les articulations et la cavité des os.—Déchirement dans les membres avec horripilation. — Élancements comme des coups d'aiguilles, subits, four-millants, brûlants, dans différentes parties du corps.—Tressaillements nocturnes des muscles de tout le corps.—Grande facilité à se refroidre et par suite inflammation de la gorge.—Beaucoup de ces symptômes s'effacent au grand air, d'autres se montrent quand on est assis et disparaissent par le mouvement. — Les symptômes se montrent surtout au côté gauche.

Grand affaissement général.—Excès de susceptibilité de tous les sens. — Grande faiblesse qui ne permet pas d'être debout.
—Faiblesse physique et morale chez les vieillards. — Apoplexie avec paralysie chez les personnes âgées. — Envie d'être assis, ou de se coucher.

La peau ne guérit que difficilement de ses lésions de continuité. — Affection du sytème glandulaire (scrofule).

Grande somnolence pendant le jour.— Sommeil agité, réveil fréquent et rêves effrayants.—Prurit nocturne, fourmillement général, insupportable. — Envie de dormir continuelle, jour et nuit.

Prédominence de la sensation du froid.— Frisson, horripilation qui part de la région précordiale ou de la face, suivi d'une chaleur universelle, passagère.— Sueur nocturne.

Grande hésitation. — Irrésolution avec soupçon et défiance de soi-même. — Misanthropie. — Emportement subit (pour peu de chose); il ne dure pas long-temps. —Activité infatigable.

#### 16. BELLADONNA.

Dur. D'Act., 7 à 9 semaines. — Antid.: Coff., hep., hyon., puls., vin. — Puiss., X.

Vertiges tournoyants avec nausée et scintillement devant les yeux —Vertiges quand on se baisse et quand on se redresse. —Vertiges avec anxiété et chute sur le côté gauche avec perte de connaissance.

Chancellement et embrouillement de la tête comme par l'ivresse. — Sensation d'ivresse après avoir mangé ou bu.—Perte de connaissance. — Étourdissement avec soif, dilatation des pupilles, les yeux et la bouche demi-ouverts. — Perte des sens et des pensées.—Esprit égaré à la suite de frayeur ou de chagrins. — Manie facétieuse. —Trouble d'imagination. —Visions effrayantes.—Délire.—Oubli.

Céphalalgie assoupissante avec perte de connaissance. - Douleur au front comme si le crâne devait éclater. - Céphalalgie avec sensation d'écartement. - Sensation de gonflement du cerveau, encephalite, -Céphalalgie pressive au front avec chaleur et congestion de sang à la tête. -Congestion du sang à la tête avec gonflement des vaisseaux. - Céphalalgie battante par l'afflux du sang. — Céphalalgie frontale violente qui est brûlante au toucher. - Céphalalgie par secousses en marchant vite et en montant les escaliers. - Sensation d'ondulation de liquide dans la tête. - Hydrocéphale. - Céphalalgie élançante. — Céphalalgie déchirante. — Céphalalgie nerveuse périodique. - Céphalalgie quotidienne depuis quatre heures après midi jusqu'à trois heures du matin et qui augmente en se couchant et par la chaleur du lit. - Céphalalgie après le refroidissement de la tête. - Céphalalgie qui est aggravée par le mouvement des veux, par la secousse de la tête ou par un courant d'air. - La céphalalgie augmente en s'appuyant ou en renversant la tête.

Sensation de ténuité du crâne. - Ser-

rement de crampe dans le cuir chevelu.

— Transpiration abondante dans les cheveux. — Rétraction de la tête en arrière. — Vacillation de la tête.

Douleur dans les orbites. - Brûlure et prurit aux paupières. Gonflement, rougeur et ectropion. - Pesanteur des paupières qui retombent comme paralysées. --Collement et saignement des paupières en les ouvrant.-Pression violente au travers des yeux jusque dans la tête. - Crampes des yeux. - Brûlure dans les yeux. - Inflammation des yeux. - Gonflement des veines par le sang. - Larmoiement continuel de larmes âcres, brûlantes .- Rou geur et ramollissement de la conjonctive. - Fongus médullaire dans les yeux. -Rougeur de la conjonctive. - Conjonctive jaune. - Taches de la cornée. - Aspect terne des yeux. - Les yeux sont rouges, brillants, étincelants.-Regard féroce vague. -Proeminence des yeux. - Yeux hagards. -Renversement des yeux.-La lumière produit des mouvements convulsifs avec pression douloureuse. - Dilatation des pupilles. - Strabisme. - Diplopie. - Auréole colorée autour de la lumière. - Les objets paraissent rouges. - On voit des étincelles et des flammes. - Recherche de la lumière. - Photophobie. - Faiblesse de la vue, comme par un brouillard devant les yeux.-Nictalopie depuis le crépuscule. - Amaurose par paralysie du nerf optique.

Élancement dans et derrière les oreilles. — Douleur térébrante dans les oreilles. — Bourdonnement, tintement dans les oreilles. — Bruissement devant les oreilles. — Déchirement et élancements dans les parotides et le gosier.—Parotidité.

Chaleur brûlante et rougeur de la face.

— Changement de la couleur de la face, tantôt rouge bleuâtre, tantôt pâle. — Face pâle, hâve. — Couleur ictérique. — Bouffissure de la face, rouge bleuâtre. — Gonflement d'un côté de la face. — Érysipèle. — Épaisseur de la peau. — Ex-

pression d'une grande anxiété. — Gonflement rouge. — Distorsion des traits. — Mouvements convulsifs des muscles de la face, de la bouche et des yeux. — La bouche est entraînée vers l'oreille. — Douleur nerveuse violente et incisive dans la face (tic douloureux). — Prurit incommode et fourmillement à l'os de la pommette et sur le côté du nez.

Gonflement rouge inflammatoire du nez.

Gonflement et rougeur intérieure.

Douleur de brisement au toucher et ardeur.

Elancement nocturne.

Hémorrhagie du nez et de la bouche.

Exaltation de l'odorat.

Odeur putride du nez.

Sécheresse du nez.

Gonflement des lèvres.—Gonflement et dureté de la lèvre supérieure.—Les lèvres sont sèches.—Rougeur foncée des lèvres.—Éruption à la commissure des lèvres, douloureuses au toucher.—Bouche fermée.—Impossibilité d'ouvrir la bouche.—Trismus.—Déchirement dans les mâchoires.—Élancement et tension dans l'articulation de la mâchoire.—Gonflement des glandes sous-maxillaires.

Gonflement des geneives avec brûlure et élancement.—Grincement des dents.

— Odontalgie nocturne tiraillante. — Odontalgie très augmentée par le toucher, par l'air et le manger. — Odontalgie chez les femmes.

Sécheresse sans soif. — Sensation de sécheresse avec humidité et mucosités intérieures. — Rougeur et gonflement inflammatoire de l'intérieur de la bouche et du voile du palais. — Accroissement de sécrétion de salive et de mucosité. — Écume rougeûtre devant la bouche. — Langue sèche, chaude. — Langue fendillée. — Langue d'un rouge intense. — Les bords de la langue sont rouges et le milieu blanc. — Langue chargée de mucus jaunâtre, bleuâtre. — Gonflement inflammatoire de la langue. — Pesanteur de la langue et parole difficile. — Bégaiement. — Aphonie. — Parole nasillarde. — Voix sifflante.

Brûlure à la gorge. - Elancement jusque

dans les oreilles. — Grande sécheresse. — Inflammation. — Gonflement inflammatoire de la luette, des tonsilles et du voile du palais. — Elancement et pression dans les amygdales en avalant et en parlant. — Angine tonsillaire. — Gonflement et suppuration des amygdales. — Sensation de gonflement et d'embarras qui force à crachoter. — La déglutition est difficile, empêchée. — Danger de suffocation en avalant. — Sensation de retrecissement dans la gorge. — Déglutition douloureuse. — Le liquide sort par le nez. — Besoin continuel d'avaler.

Goût amer, putride, muqueux.—Perte du goût.—Le pain a un goût acide.—L'appétit manque. — Dégoût chronique pour les aliments. — Dégoût pour le lait, la bière et les aliments acides. — Soif et faim impérieuses. — Soif ardente excessive. — Soif avec dégoût pour les boissons. — Désir continuel de boire avec impossibilité d'avaler.

Efforts inutiles d'éructation.—Rapports à vide, fétides.—Renvois d'aliments avec pesanteur de l'estomac.—Hoquet.

Nausées avec goût amer dans la bouche et aversion pour les aliments.—Malaise avec envie de vomir. — Soulèvement de l'estomac sans résultat. — Vomissements aqueux, acides, muqueux, bilieux. — Vomissement avec diarrhée après un refroidissement.

Pression à l'estomac après le diner. — Insensibilité de l'estomac. — Gonflement de la région précordiale. — Oppression dans l'épigastre. — Pression doutoureuse au creux de l'estomac en marchant.

Douleur des hypochondres. — Ballonnement douloureux du bas-ventre. — Endolorissement dans le bas-ventre avec sensation d'écorchure. — Fièvre puer pérale. — Douleur de ventre violente comme si une partie était chargée de pointes de clous, aggravée par la pression extérieure. — Colique qui ne permet point de repos. — Colique fouillante. — Endolorissement des parois du ventre. —

Élancements dans la région de l'aine.

Constipation. — Selles dures peu abondantes. — Selles fréquentes peu copieuses ét diarrhéiques. — Diarrhée muqueuse. — Selles involontaires.

Fréquente envie d'uriner. — Urine rare, trouble, foncée. — Urine rouge foncée. — Émission fréquente d'urine d'un jaune pâle. — Urines involontaires. — Suppression de la sécrétion d'urine.

Appétit vénérien augmenté. Écoulement de l'humeur prostatique sans érection. Pollutions nocturnes sans érection. Elancements dans les testicules qui sont rétractés.

Pression forte vers les parties génitales, comme si tout devait tomber en dehors.— Chute et induration de l'utérus. — Métrite.

Diminution des lochies.—Règles trop hâtives et trop abondantes. — Écoulement abondant de sang rouge vif par l'utérus, avec coliques et pression sur les organes génitaux. — Metrorrhagie. — Sortie de caillots d'un sang fétide de l'utérus, avec pression périodique vers les parties génitales.

Respiration irrégulière alternativement longue et courte. Expiration violente. Respiration courte, vite, anxieuse, avec gémissements. Oppression avec serrement de la poitrine. Péril de suffocation en avalant, en tournant et en touchant le cou. Soubresauts avec expression d'anxiété quand on touche le larynx, par la respiration, la parole et la toux.

Toux nocturne chronique avec râlement chez les scrosuleux. — Toux sèche courte. — Toux sèche avec céphalalgie et coloration du visage. — Accès de toux sèche jour et nuit avec chatouillement à la fossette du cou. — Toux nocturne, violente, sèche, avec déchirement dans la poitrine. — Toux spasmodique, sèche vers minuit. — Accès de toux convulsive précédée de pleurs, de sentiment désagréable dans la région de l'estomac. — Accès de toux qui finit par des éternuements. — A chaque effort de la toux, sensation dans l'articulation coxo-

fémorale avec douteur de déchirement dans l'utérus. — Toux avec oppression de la poitrine produite par congestion de sang. —Toux après le repas avec expectoration de mucosités.

Douleur pressive dans la poitrine et entre les épaules, avec respiration courte.

Poids sur la poitrine comme dans un catarrhe sec. — Élancement avec irritation pour tousser. — Tension. — Congestion. — Inquiétude et battements dans la poitrine. — Battements violents du cœur qui retentissent dans la tête. — Pression au cœur. — Sécrétion laiteuse hors la grossesse et l'allaitement. — Gonflement et induration des glandes mammaires. — Cancer.

Raideur douloureuse de la nuque en tournant la tête. — Gonflement et raideur de la nuque. — Gonflement des glandes du cou.

Déchirement dans l'aisselle.—Douleur pressive et déchirante dans l'épaule, qui se propage rapidement dans le bras, surtout pendant la nuit; il augmente par le mouvement et diminue par la pression extérieure. — Grand besoin de s'étirer. — Pression paralytique dans le bras. — Gonflement rouge de scarlatine aux bras et aux mains. —Tension dans les mains gonflées. — Tressaillement dans les mains. — Tremblement des mains.

Elancements dans les articulations coxo-témorales. Douleur brûlante dans la même partie (droite), surtout la nuit; elle s'aggrave sous forme de secousses isolées et augmente par le plus téger attouchement. Détant assis, raideur dans les lombes; on a de la peine à se lever. Déchirements dans les membres inférieurs, surtout dans le genou. Sensation en marchant comme si les jambes allaient se casser.

Douleur rhumatismale des articulations.

Elancements dans les membres. —
Douleur de brisement dans les articulations et l'intérieur des os. — Inquiétude
dans les membres. — Pesanteur dans les
membres. — Froid des membres. — Apo-

plexie. — Perte du mouvement et du sentiment d'un côté (droit). — Tremblement des membres quand on essaie à marcher. — Faiblesse et fatigue des jambes. — Constitution pléthorique.

Mouvement convulsif du corps, des membres, de la face et des yeux.-Convulsion et raideur de tout le corps avec serrement des pouces dans la main. - Convulsion épileptique. - Opisthotonos. - Tétanos .- Crampes chez les enfants à qui on refuse ce qu'ils demandent. - Convulsion précédée de sourire. - Avant les accès, fourmillement, sensation de gonflement et engourdissement dans l'articulation de l'épaule ou tranchées dans le ventre avec sensation égale à quelque chose qui remonte vers la tête, et perte de connaissance.-Le plus léger attouchement renouvelle les accès. - Après les accès oppression de la poitrine, comme par un poids

La peau est d'une chaleur ardente, sèche.

— Scarlatine lisse avec gonflement de toute la peau. — Rougeur lisse foncée de la peau, sèche, pruriante au cou, à la poitrine, au ventre et aux mains. —Rougeur vive non circonscrite avec bouffissure à la face et aux mains. — Taches confluentes, élevées, scarlatineuses aux membres. —Éruption miliaire générale. —Miliaire pourprée. —Éruption de petites vésicules granuleuses, qui rendent la peau rude et de rougeur scarlatineuse. —Éruption vésiculaire avec croûtes, des bords blanchâtres sur un gonflement cedémateux. —Anthrax. —Furoncle.

Somnolence pendant le jour, sommeil inquiet pendant la nuit. — Insomnie par anxiété. — On s'efforce inutilement de s'endormir. — Sommeil d'engourdissement. — Sommeil troublé par des rêves effrayants. — Réveil en sursaut. — On parle pendant le sommeil. — En fermant les yeux, on voit des images effrayantes, on éprouve des tressaillements et des sursauts. — On s'éveille brusquement en ouvrant les yeux largement. — Jactation. — On enfonce la tête

dans l'oreiller, pendant le sommeil.—Délin nocturne avec anxiété, inquiétude et jac tation d'agonie. — Délire violent ave cris, tapage; on bat tout ce qui entoure

Frisson sur les épaules, au dos, ave nausée. - Horripilation. - Brisement tiraillement dans le dos et les membres - Chaleur brûlante avec agitation général et continuelle ( extérieurement et inté rieurement ) frisson et froid de quelque parties (des membres) lorsque les autre (la tête) sont brûlantes. - Froid avec cha leur alternativement. - Fièvre le soir, au début, horripilation suivie de chaleur avec soif. - Congestion de sang à la tête et céphalalgie frontale pressive. - Fièvre continue avec exacerbations le soir. -Sueur continuelle d'odeur empyreumatique. - Pouls acceléré, dur, tendu. -Fièvre nerveuse. - Battements des artères.

Anxiété et inquiétude.—Timidité tremblante.—Timidité avec pleurs.—Facilité à s'effrayer. — Méfiance. — Tristesse. — Abattement hypochondriaque. — Découragement. —Horreur du travail et du mouvement. — On évite de parler. — Grandentêtement. — Hurlement, cris et pleurs de méchanceté.—Rage, fureur; on mord, on crache, on bat, on déchire tout ce qu'on a sous la main. — Impudeur. — Envie de s'enfuir. — On parle vite. — Mouvements brusques des mains dans l'air, comme pour saisir quelque chose.

#### 17. BISMUTHUM.

Dur. D'ACT., incon. - ANTID.: Incon. - Puiss., X.

Vertiges avec fourmillement.—Le matin étourdissement. — Céphalalgie avec pression et pesanteur, surtout au front, audessous de la racine du nez et dans les tempes. — Fouillement et térébration dans le front qui s'étendent aux yeux et jusqu'à la pointe du nez.—Contraction brûlante dans la tête, surtout au front et dans les yeux. — Les douleurs de la tête ont leur siège dans la partie frontale et aux yeux.

Pression dans le globe des yeux ( droit ), ui s'élève de la partie postérieure à la upérieure. - Chassie dans les angles des

Face pâle, terreuse, maladive avec es cercles bleus autour des yeux.-Doueur pressive d la pommette.

Gencives gonflées, douloureuses comne écorchées, avec sensation d'écorchure e toute la cavité de la bouche. - Odon-

algie pressive tiraillante.

Goût de sang dans la bouche, le matin vec crachotement de mucosité sanguiolente.-Le soir la langue est chargée, lanche. - Grande soif pour les boissons roides, le soir.

Malaise et nausée dans l'estomac surout après le manger.

Crampes pressives de l'estomac après le epas.

Gargouillement et borborygmes dans e bas-ventre. - Coliques avec pression et esoin d'aller à la selle.

Le soir envie inutile d'aller à la selle. Émission fréquente et copieuse d'uine aqueuse.

Douleur pressive dans les testicules. -Pollutions nocturnes sans rêves volupueux.

Toux jour et nuit avec beaucoup de erachats.

Pression et serrement de crampe au travers de la poitrine, dans la région diaphragmatique.—Contraction brûlante dans la poitrine avec difficulté de respirer et de parler. - Brûlure et térébration dans la poitrine et le dos.—Battement de cœur.

Pression paralytique déchirante dans l'avant-bras et les os du métacarpe. — Déchirement dans les pointes des doigts, audessous des ongles. - Tremblement des mains après le dîner.

Prurit et rongement au tibia et au dos du pied, augmenté par le grattement.-Déchirement pressif dans les os du pied.

Douleur pressive et pression déchirante.

Grande somnolence le matin après

s'être levé.—Sursaut dans le sommeil.— Réveil fréquent comme par frayeur. -Rêves voluptueux: - Lassitudes quand on se réveille.

Morosité. - Mécontentement et plaintes sur son état.-Inconstance, on fuit la solitude.

#### 18. BORAX.

Dur. D'ACT., 3 à 4 sem.—Antid.: Incon.—Puiss., X.

Plénitude dans la tête, avec pression audessus des yeux. - Congestion de sang à la tête avec pulsation. - Sensation de plénitude et de vertiges en montant.

Douleur d'écorchure dans les oreilles. - Gonflement inflammatoire chaud des oreilles. — Écoulement de pus par les oreilles.

Gonflement des gencives avec douleur de pression dans les dents creuses pendant le mauvais temps. -- Aphtes saignants dans l'intérieur des joues. -Aphtes des enfants.

Gonflement des glandes du cou; le toucher y produit des élancements.

Malaise, inquiétude pendant le repas ou après une longue conversation. -Après le repas gonflement par des vents, ou coliques et diarrhée.

Nausée avec faiblesse dans les membres inférieurs et tremblement dans tout le

Sensation dans les hypochondres et dans le bas-ventre comme s'il y avait des corps durs et anguleux, mobiles quand on marche vite.

Selles diarrhéiques.—Diarrhée muqueuse et sanguinolente. - Souffrances hémorrhoïdales. - Hémorrholdes muqueuses.

Douleur brûlante au sacrum. - Prurit et fourmillement au coccix.

Douleur avec battement à l'éxtrémité du pouce, elle réveille la nuit.

Fourmillement et tremblement des pieds avec nausée et disposition à s'évanouir; ces symptômes se dissipent au grand air. - Faiblesse dans les articulaBorax.

tions.—La plupart des symptômes paraissent pendant et après le repas.

Passé minuit, l'abondance des pensées éloigne le sommeil.

Chaleur fugace avec nausée et envie de vomir, le matin.

Irritabilité.

#### 19. BOVISTA (LYCOPERDON).

Dur. D'Act., 50 jours.—Antid.: Camph.—Puiss., X.

Vertiges étourdissants avec perte de sens (on s'enivre avec peu de vin).

Faiblesse de la mémoire. — Distraction. — Maladresse, tout vous échappe des mains.

Céphalalgie profonde dans le cerveau avec sensation d'augmentation du volume de la tête. — Céphalalgie pressive étourdissante. — Céphalalgie pressive battante comme d'un abcès.—Céphalalgie quand on se réveille, comme quand on a trop dormi. — Céphalalgie nocturne qui rend le soulèvement de la tête insupportable.

Grande susceptibilité du cuir chevelu au toucher. Quelques parties sont excoriées. — Chute des cheveux.

Yeux ternes. — Pression douloureuse avec vibration dans la cavité de l'orbite et les os qui la forment.

Écoulement de pus fétide par les oreilles.

— Diminution de l'ouïe. — Ulcère dans l'oreille qui cause de la douleur en avalant (éruption croûteuse, humide aux oreilles).

Térébration et fouillement dans les os de la pommette.—Bouillonnement chaud dans la face.—Chaleur aux joues comme si elles devaient éclater.—Changement de couleur à la face, tantôt rouge, tantôt pâle.
—Grande pâleur le matin après le lever.
— La tèvre supérieure est gonflée, pâle (ainsi du nez et des joues).—Ulcération des commissures des tèvres.

Odontalgie tiraillante, le soir et pendant la nuit; elle diminue à l'air libre et par la chaleur. — Odontalgie des dents incisives supérieures, suivie du gonflement de la levre. — Saignement facile abondant des gencives. — Déchirement dans la mâchoire inférieure (et devan l'oreille), avec battement et gonflement

Salivation abondante. — Bégaiemen — Engourdissement de l'intérieur de lbouche.

des glandes sous-maxillaires.

Brûlure et gratiement dans la gorge. Goût putride. — Goût de sang. — So

pour les boissons froides, surtout l'après midi et le soir (manque de soif).

Nausee et frissannement depuis le ma tin jusqu'à midi.—Hoquet avant et aprè le repas.

Sensation de froid dans l'estomac comme s'il y avait de la glace.

Coliques dans la région du nombril aprè le dîner. — Tranchées fortes, augmentée par le repos. — Sensibilité vive de l'in térieur et de l'extérieur du ventre. — Douleur violente de colique avec tremble ment et claquement des dents par le froid surtout après une garde-robe. — Gonfle ment par des vents. — Expulsion de vent fétides.

Selles dures, compactes. — Constipation.—Diarrhée avec tranchée.

Fréquente envie d'uriner. — En uri nant, sensation comme si le canal étai excorié.

Appétit vénérien augmenté, — Pollu tions fréquentes. — Engourdissement de la tête après le coît.

Règles trop hâtives et trop abondantes — Règles qui ne coulent que pendant le nuit. — Écoulement de sang hors l'époque des règles. — Leucorrhée âcre avec démangeaison. — Excoriation dans le pli de le cuisse pendant les règles.

Le matin, enrouement et la voix comme quand on est enchifrené. — Respiration courte pendant le travait manuel. — Obstruction des narines à gêner la respiration.

Toux sèche.

Oppression avec constriction de la poitrine, tout vêtement paraît trop étroit.- Elancements dans la poitrine.—Palpitations de cœur avec inquiétude et tremblement, vertiges et mal de tête.

Tension dans l'articulation scapulo-humérale.—De l'aisselle il s'exhale une odeur désagréable comme celle de l'ognon.—Douleur de luxations et de paralysie dans les articulations des membres.—Dartres humides sur le dos de la main.

Fourmillement et engourdissement dans les jambes, qui empêchent de se tenir debout.—Élancements dans les articulations du genou et du pied.—Crampes douloureuses dans le mollet, le matin au lit, douleur qui se prolonge jusqu'au soir comme si la jambe était trop courte.

Grande lassitude et faiblesse dans les articulations, surtout dans celles des mains et des bras; on abandonne involontairement les choses les plus légères.

Prurit dans différentes parties qu'on ne soulage que par le grattement, surtout quand on a chaud. — Dartres. — Élancements violents dans les cors.

Grande somnolence de bonne heure, l'après-midi et le soir. — Sommeil inquiet, eaucoup de rê ves.

Frisson avec soif, même près du feu et le soir au lit. — Chaleur avec soif. — Anxiété, inquiétude, oppression de poitrine. — Sueur le matin, surtout à la poitrine. — Bouillonnement du sang avec soif. — (Fièvre intermittente avec frisson le soir, horripilation dans le dos et coliques tiraillantes.)

Inquiétude, tristesse et mélancolie.

— Abattement quand on est seul. — Disposition à prendre les choses mal.

#### 20. BRYONIA.

Dur. D'ACT., 4 semaines dans les affect. chron. — ANTID.: Rhs. — Puiss., VI et X.

Vertiges en se redressant.

Céphalalgie frontale brûlante. — Céphalalgie avec sensation d'écarlement. — Douleur avec pression en dehors dans les deux tempes. — Céphalalgie, où il semble qu'en se baissant tout s'échappe par le front. — Céphalalgie fouillante, pressive, frontale, surtout en se baissant et en marchant vite. — Encéphalite nerveuse.

Douleur extérieure de la tête, déchirement. — Tressaillement dans la région temporale droite augmenté par le toucher, sueur froide au front.

Brûlure dans les yeux. — Larmoiement. — Scintillement. — Apparition de flammes. — Dartres farineuses, brûlantes, pruriantes aux paupières.

Face jaune, pâle, terreuse. — Joues rouges brûlantes. — Face bouffie, bleuâtre ou rouge brunâtre. — Pression douloureuse sur l'os de la pommette droite, adoucie par le toucher. — Pression pinçante dans l'articulation de la mâchoire pendant le mouvement.

Nez sec, obstrué. — Epistaxis par suppression des règles. — Gonflement chronique douloureux du nez, avec coriza sec.

Odontalgie tiraillante, tressaillante, avec la sensation d'allongement et de vacillation des dents, seulement pendant et après le repas.

Odeur putride de la bouche. — Sécheresse de la bouche. — Salive abondante
écumeuse. — Langue blanche, chargée.
— Langue sèche. — Mucus épais dans le
pharynx, qui est expulsé en crachotant.

Sensation de sécheresse dans la gorge.

— Élancement dans la gorge par le toucher. — Élancement avec prurit dans la
gorge quand on a marché vite; on est
porté a se gratter, et le grattement soulage.

Goût amer. — Goût fade pâteux. — Goût putride. — Le goût est presque perdu. — Soif violente. — Désir de boissons acides. — Désir de café. — Dégoût pour le lait, il cesse en en mangeant. — Dégoût pour les aliments. — Appétit prononcé.

Après le dîner, renvois avec goût des aliments. — Renvois amers après le dîner. — Rapports, avec poids sur l'estomac et coliques. — Après avoir mangé avec plaisir vient une envie de vomir. — Rapports à vide après le repas.

34 Bryonia.

Envie inutile de vomir, écoulement d'eau parlabouche. — Hoquet, avec étranglement et vomissement de tous les alimens ingérés. — Vomissement aqueux, amer. — Vomissement de bile et de sang. — Symptômes gastriques variés.

Après le repas, poids lourd sur l'estomac, qui met de mauvaise humeur. — Elancements dans l'estomac, étant couché sur un côté. — Au toucher, brûlure dans l'estomac. — Brûlure dans la région précordiale. — Les aliments ingérés pèsent et bientôt sont rapportés par régurgitation. — Tension douloureuse au toucher dans la région précordiale, avec sensation de chaleur. — Oppression à l'épigastre. — Sensation de gonflement dans l'épigastre. — Elancement dans l'épigastre pendant le mouvement et en appuyant le pied. — Dou-leur d'écorchure au toucher, dans la région précordiale.

Elancement dans le côté gauche du ventre pendant le vomissement. — Elancement dans le foie au toucher, en toussant et en respirant. — Douleur tensive dans la région hépatique. — Hépatite. — Symptômes bilieux. — Ascite.

Rétention des selles. — Constipation chronique. — Diarrhée par refroidissements. — Évacuation d'aliments non digérés (et précédée de coliques).

Urine brune. — Urine rouge peu abondante. — Aménorrhée. — Écoulement de sang par le vagin. — Douleur brûlante au fond de l'utérus pendant la grossesse, diminuée par la pression et le repos. — Fièvre puerpérale.

Coriza fluent sans toux. — Coriza sec. Les mucosités se dessèchent et forment des croûtes dures. — Respiration courte, accélérée, avec anxiété. — Respiration difficile.

Toux avec chatouillement dans la gorge et douleur dans l'hypochondre, jusqu'à produire le vomissement. — Toux convulsive, sèche après le repas, avec vomissement. — Toux sèche produite par chatouillement dans la gorge, —Grande dis-

Bryonia. position à toussoter, comme produite par des mucosités dans la trachée-artère, et suivie d'une douleur vive augmentée par la parole et la fumée du tabac. — Quand on passe d'un lieu fermé au grand air. on éprouve une sensation qui force à tousser et à respirer rapidement.-Toux qui produit une pression au cerveau. Toux avec élancement dans le côté de la poitrine.-Toux avec élancement dans la région précordiale et céphalalgie très violente. - Toux avec expectoration jaunâtre. - Toux seche, suivie d'expectoration de sang. — Toux avec expectoration de mucosités mêlées de stries ou de petits caillots de sang.

Elancements dans les côtés de la poitrine.

—Élancements dans la poitrine avec frissonnement. — Élancements dans la poitrine en respirant profondément, ce qui force à se mettre sur son séant; ils sont augmentés par le mouvement. — Douleur de contraction dans la poitrine, produite par l'air froid. — Oppression de poitrine comme par un poids. Serrement de poitrine avec pression au milieu du sternum. — Accès d'asthme nocturne avec coliques élançantes et envie d'aller à la selle. — Pneumonie. — Cardite. — Pneumonie nerveuse.

Pression sur l'acromion droit, avec élancement en respirant profondément.

—Élancements au-dessous de l'omoplate gauche, jusqu'au cœur.

—Raideur douloureuse au sacrum qui force à marcher courbé.

Douleur élançante dans la cuisse, de la fesse à la malléole; on ne peut supporter le mouvement et le toucher. — Sueur universelle.

Raideur douloureuse, tensive des genoux. — Lassitude dans les cuisses en montant. — Élancement dans le genou en marchant. — Chancellement et craquement des genoux. — Lassitudes des jambes en marchant et dans la station. — Douleur d'entorse dans l'articulation du pied, quand on s'appuie sur lui. — Gonflement chaud du pied.

Douleur d'entorse dans le métacarpe pendantle mouvement. — Gonflement autour de l'articulation du coude, en même temps gonflement des pieds. — Gonflement des mains. — Secousses convulsives dans les deux bras. — Douleur d'élancement dans les doigts en écrivant.

Elancements douloureux. - Douleur de déchirement dans les membres lors des mouvements. Rhumatisme aigu. -- Dechirement avec tension, élancements dans les membres gonfles, luisants, rouges, avec impossibilité de supporter le mouvement et le toucher. - Traction douloureuse vers les parties malades. - Traction pressive dans le périoste. - Traction au travers de tous les membres.—Symptômes arthritiques. Sensation de courbature dans tous les membres, besoin de changer de position. -LES MOUVEMENTS, SURTOUTEN APPUYANT LE PIED, ET LE TOUCHER PRODUISENT OU AUGmentent les symptômes. - Le matin, la faiblesse est plus grande. - La pression des vêtements produit du malaise, du frissonnement. - Brûlure élançante générale après de légères émotions.

Gonflement luisant rouge des parties malades. — Gonflement pâle, tendu, chaud. — Sensation de froid, ou battement et rougement dans les ulcères. — Éruption miliaire.

Grande disposition au bâitlement. —
Grande somnolence interrompue par un délire anxieux. —Insomnie. —Inquiétude nocturne avec oppression. — Sommeil interrompu par la soif, goût amer à la bouche au réveil. — Rêves chagrinants. — Rêves exacts des sensations de la journée. —Somnambulisme. — Délire avec les yeux ouverts. — Impossibilité d'être couché sur le côté droit.

Fièvre inflammatoire. — Fièvre nerveuse. — Tremblement de froid, avec chaleur de la têle, rougeur de la face et soif. — Frisson avec douleur dans toutes les articulations et sueur froide au front. — Tremblement de froid avec chaleur, suivi de soif et de sueur. — Froid suivi de chaleur. — Embar-

ras de la tête, vertiges et détaillance. — Frissonnement et vide de la tête après avoir dormi dans le milieu du jour. — Chaleur sèche brûlante. — Chaleur générale sans sueur et avec grande soif. — Chaleur intérieure, sans chaleur au dehors, avec soif pour les boissons froides. — Sueur forte en marchant à l'air froid. — Tous les matins après trois heures sueur abondante.

Irritabilité, humeur chagrine. — Colère. — Anxieté, avec inquietude pour l'avenir.

# 21. CALADIUM SEGUINUM.

Dur. d'act., 6 à 8 sem.—Antid. : Caps.—Puiss., X.

Envie de se coucher et de fermer les yeux, suivie de la sensation comme si on était bercé.

Grande susceptibilité au bruit, surtout en s'endormant.

Goût pâteux, herbacé. — Dégoût pour l'eau froide (avec sécheresse du pharynx et de l'œsophage sans soif); —Adipsée. — On n'a pas faim, malgré une sensation de vide qui force à manger vite. — Renvois à vide. — Sensation de plénitude de l'estomac.

Brâlure dans l'estomac et l'épigastre, elle n'est pas soulagée par la boisson.—Sensation de coupure au-dessous de l'épigastre.—Élancements dans la région précordiale, avec rétraction à chaque coup.—Battements fatigants dans l'épigastre après la marche.

Pulsations et battements dans la région supérieure du ventre, surtout du côté droit, au-dessus du nombril.—Flatuosités fétides.

Selles de consistance de bouillie.

Faiblesse de la faculté du coît. — Impuissance. — Gonflement et écorchure du prépuce avec paraphimosis après le coît.

Sensation de contraction de la trachéeartère et du larynx.

Toux nocturne faible, qui empêche de dormir.—Toux avec oppression produite par un poids sur la région précordiale. Sensation de vacuité de la poitrine, après

l'expectoration de globules muqueux.

Brûlure subite, violente sur des parties isolées de la peau; involontairement on y porte les doigts. - Grande douleur après les pigures des cousins. - Éruption miliaire avec boutons plus élevés, pruriante, brûlante à l'avant-bras, à la poitrine, alternant avec l'oppression de la poitrine.

Horreur du mouvement et envie continuelle d'être couché. — Après avoir écrit, pensé, après avoir été couché et en se redressant, sensation d'évanouisse-

On est forcé de se coucher pendant la journée sans pouvoir dormir, on éprouve de l'horripilation et des étourdissements. -Assoupissement. - Gémissement dans le sommeil.-Serrement de crampe dans la plante des pieds pendant la nuit. -Un court sommeit pendant le jour diminue tous les symptômes.

Transpiration qui attire les mouches. -La sueur diminue tous les symptômes. On craint de s'endormir. - On est inquiet de sa santé. - Anxiété, craintes.

## 22. CALCAREA CARBONICA.

Dur. D'Act., 50 jours. - Antid.: Camph., ether, nitreux. - Puiss., VI. X.

Vertiges en montant et en marchant au grand air. — Embarras chronique de la tête, comme si elle était pressée par une planche. - Etourdissement et tremblement avant le déjeuner.

Céphalalgie frontale, pressive, étourdissante, produite par toute application de l'esprit, et en se baissant. -- Céphalalgie tensive dans les tempes, s'étend vers le vertex. — Céphalalgie martellante après avoir marché au grand air; elle force à se coucher. - Céphalaigie battante acerue par le travail de l'esprit et les boissons spiritueuses. - Battement au centre du cerveau. - Bourdonnement et mal de

tête avec chaleur des joues. - Froid glacial dans le côté droit de la tête. - Céphalalgie lorsqu'on lève quelque chose à faux. - Céphalalgie quand on se ceint la tête.

Grand volume de la tête et fontanelle ouverte chez les enfants. - Le soir sueur à la tête. - Chute des cheveux (chez les femmes en couches). - Douleur aux racines des cheveux.-Vue trouble comme des plumes devant les yeux.-Presbiopie. - Pupilles très dilatées. - Obscurcissement devant les yeux en lisant ou après avoir mangé. - Pression sur les yeux. -Ophtalmie scrofuleuse avec ulcère de la cornée et ptérigion. - Obscurcissement de la cornée (avec fongus hématode). Ophtalmie par l'introduction des corps etrangers. - Cuisson, brûlure et déchirement dans les yeux en lisant à la lumière. - Elancement et prurit dans les yeux. - Agglutination des paupières. - Sensation de froid dans les yeux.

Éruption avec prurit à la face. - Croûtes humides, brûlantes sur les joues, (les bras ) et au front. - Ephélides. - Gonflement de la face sans chaleur. - Couleur. pâle jaune.

Bruissement, bourdonnement, tintement d'oreilles. - Battement dans les oreilles. - Craquement dans les oreilles en avalant .- Dureté de l'ouie .- Diminution de l'ouïe produite par la suppression de fièvre intermittente avec le sulfate de quinine. - Polype de l'oreille.

Sécheresse pénible du nez. - Croûtes dans le nez .-- Obstruction des narines par du pus jaune fétide. - Odorat emousse. - Taches rouges sur la pointe du nez. - Aberration de l'odorat; on sent une odeur comme celle des œufs corrompus, ou de poudre à canon.

Dentition difficile. - Gonflement des gencives. - Odontalgie après des boissons froides. - Odontalgie élancante, tiraillante jour et nuit, renouvelée par les choses chaudes et les choses froides. - Odontalgie produite par un courant d'air et augmentée par le bruit.-Odontalgie des

emmes enceintes.—Ulcère fistuleux à la nâchoire inférieure. — Odeur fétide des ents.

Contraction crampoïde de la bouche. Sécheresse de la langue le matin au réell. — Expuition continuelle de salive cide.

Gonflement des amygdales avec sensaion de rétrécissement de la gorge en valant. — Douleur et gonflement des landes du cou et de la mâchoire inféieure. — Goître volumineux.

Le matin bouche amère.—Dégoût pour fumée du tabac. — Faim de suite après repas. — Boulimie le matin. — Soif orte continuelle des liquides froids avec appétence complète. — Dégoût chronique our les viandes.

Renvois amers. — Chaleur après le dîner. — Vomissement acide chez les enfants. — omissement de sang.

Faiblesse de l'estomac avec digestion inte.—Pression à l'estomac après le dîrer et en toussant. — Crampes de l'estomac. — Pression nocturne dans le creux e l'estomac. — Gonflement de l'épigastre rec douleur de pression. — Crampe de estomac avec vomissement des aliments. La pression des vêtements est insupprable. — Tranchées dans la partie surieure du ventre. — Coliques avec élantements ou pincements et pression sans arrhée. — Déplacement des vents. — Borrygmes et gargouillements dans le vente. — Les glandes du mésentère sont dures tuméfiées chez les enfants ( carreau ).

Relâchement du ventre, deux selles par ur. — Diarrhée d'odeur aigre chez les fants. — Constipation. — Pendant l'éxoration sortie des hémorrhoïdes avec uleur brûlante. — Après la selle, abatment de courbature. — Avant l'évacuanon on est irritable et facile à mettre en lère, — Contraction du rectum.

Besoin fréquent d'uriner.—Tenesme. maturie. — Polype de la vessie. — Arur dans l'urètre. Urine fétide de couur de sang, avec un sédiment blanchâtre. — Appétit vénérien augmenté. — Fatigue de la tête après le coït.

Règles trop hâtives et trop fortes.—Écoulement sanguin de l'utérus hors le temps
des règles.—Suppression des règles avec
grande pléthore.—Avant les règles, gonflement douloureux des mamelles; pendant les règles, déchirement dans le basventre et serrement de griffe dans le sacrum. — Avortement. — Stérilité avec des
règles trop fortes ou trop hâtives. — Leucorrhée avant les règles. — Leucorrhée de
couleur laiteuse qui s'échappe quand on
urine. — Leucorrhée brûlante et avec prurit.

Eternuement fréquent sans coriza. —
Coriza sec. — Continuel. — Enrouement.
— Gêne de la respiration en se baissant.

Toux sèche produite par un chatouillement de la gorge, accompagnée souvent de vomissement.—Toux sèche le soir au lit. — Toux dans le sommeil. — Toux sèche violente le soir et la nuit. — Toux sèche le matin, avec expectoration jaune fétide. — Toussotement pendant la journée comme produit par du duvet. — Toux des femmes enceintes.—Toux produite en jouant du piano.

Oppression de la poitrine, soulagée en rapprochant les omoplates. — Brûlure dans la poitrine. — Coups dans la poitrine. — Élancements dans la poitrine par une profonde inspiration. — Élancements dans le côté de la poitrine pendant le mouvement et étant couché sur le côté. — Phthisie tuberculeuse. — Gonflement avec chaleur des mamelles. — Suppression de la sécrétion du lait chez une nourrice. — Écorchure des mamelles. — Palpitation de cœur avec anxiété. — Palpitation de cœur avec tremblement.

Douleur nocturne dans le dos et dans les bras. — Élancement dans le dos, le sacrum et les omoplates. — Douleur de luxation dans le dos. — Raideur de la nuque. — Gonflement et courbure de la colonne vertébrale. — Douleur dans les lombes et les reins en allant en voiture.

Tiraillements nocturnes et déchirement dans les bras. — Faiblesse subite, paralytique des bras. — Engourdissement de la main en saisissant un objet. — Gonflement des mains. — Engourdissement des doigts même dans la chaleur. — Nodosités goutteuses des articulations de la main et des doigts. — Fourmillement dans les doigts. — Fréquente paralysie des doigts.

Elancements dans les cuisses en mettant pied à terre. — Pesanteur et raideur des jambes — Serrement de crampe dans les jambes. — Serrement à la plante des pieds et les orteils en chaussant des bottes. — Gonflement blanc. — Tuméfaction du genou. — Tension au-dessous du genou quand on est accroupi. — Taches rouges aux jambes. — Ulcères des jambes. — Gonflement des malléoles et de la plante du pied. — Pression violente aux jambes. — Sueur des pieds. — Brûlure au talon. — Sensibilité du gros orteil. — Douleur des cors. — Varices des femmes enceintes. — Les enfants sont tardifs à marcher.

Frémissement visible de la peau des pieds à la tête, elle s'engourdit. - Besoin continuel du mouvement des mains et des pieds. — Danse de St. Guy. — Accès épileptique. - Déchirement dans les membres. — Grande disposition à se donnér des tours de reins, ce qui rend la nuque raide avec céphalalgie.—Le soir malaise comme avant un accès de fièvre intermittente. — Forte sueur même par un mouvement modéré. - Grande fatigue après une marche peu longue au grand air. - Manque de force, lassitude. La conversation fatigue. - Augmentation et renouvellement des symptômes par un travail fait dans l'eau, ou par une lotion. - Grande plethore. -Grande obésité des jeunes gens. - Ce médicament est surtout utile après l'usage du soufre et de l'acide nitrique.

La peau est rude et couverte de boutons miliaires. — Verrues (aux mains). — Écorchure entre les fesses en marchant. — Éruption chronique. — Éruption urticaire. — Dartres humides. — Gonflement

variqueux.—Loupes qui se renouvell tous les mois et suppurent, même à la f — Ulcère fistuleux. — Exostose et ca

Somnolence pendant la journée e soir de bonne heure. — Fréquent réla nuit. —Rêves avec anxiété et rêvas ries. — Oppression nocturne avec chale anxiété et agitation au tit. —Pression de la région précordiale pendant la nuit, remonte de là au larynx et à la tête. Soif nocturne.

Grande susceptibilité à l'air froid humide. — Grande disposition à se ref dir. — Frissonnement intérieur avec ou soif. — Chaleur avec soif. — Fièvre tie le soir, commençant avec chaleur à la et suivie de froid. — Sueur avec anxi — Sueur nocturne surtout sur la poitr

Grand affaissement nerveux. — Anx au crépuscule. — Disposition à s'effra — Caractère peureux. — Tristesse à lourdeur des jambes. — Accès de dé poir causé par la perte de la santé. Mélancolie.

#### 23. CAMPHORA.

Dur. D'Act., quelques minutes. — Antid.: Op — Puiss., 1/8 gr.

Vertiges avec lourdeur de la tête manière qu'elle tombe en arrière Chancellement en marchant comme d l'ivresse.

Céphalalgie frontale obtuse avec vie de vomir, et congestion ver tête. — Céphalalgie compressive, a qui disparaît quand on pense aux doule — Constriction dans l'occiput et dessous de la racine du nez, augmen par le toucher, en se baissant et er couchant; elle fait pencher la tête ocôté.

Tous les objets paraissent très écla et brillants. — Resserrement de la pille. — Les yeux sont fixes, convul

Ulcère de couleur rouge foncé, sup rant et causant un élancement prodans le conduit auditif.

Trysipèle de la face. ccumulation de salive épaisse dans ouche. - Ecume devant la bouche. es dents paraissent trop longues; s sont douloureuses comme par un flement de la glande sous-maxillaire. Crampe de la mâchoire.

lenvois à vide après le dîner. - Les nents sont plus sapides. — La fumée tabac et les aliments paraissent amers. Thaleur brûlante dans la partie supérieure inferieure du ventre. - Sensation de id dans le ventre.

Première période du choléra. — Gardee difficile comme par manque de uvement péristaltique et contraction rectum.

Ardeur en urinant. - L'urine coule tement et par un jet très mince. tention d'urine.

Manque d'appetit venerien. - Impuisrce.

Grippe.

Elancements douloureux avec tracn dans la poitrine pendant les mouveents du bras, qui paraît sortir des noplates. — Oppression asthmatique. Battements du cœur, après le dîner, 'on peut entendre.

Pression douloureuse dans le coude oit en s'appuyant, elle se propage dans main.

Douleur de brisure dans la cuisse oite et dans le genou.-Serrement de ampe depuis le dos du pied à travers mollet jusque dans la cuisse. - Déchiment dans l'extrémité des orteils auessous des ongles, en marchant.

Craquement dans les articulations des mbes des genoux et des pieds. - Sention de sécheresse générale, extérieument et intérieurement. - Élanceent rhumatismal dans tous les muses. - Endolorissement du périoste de ous les os. — Difficulté à mouvoir les embres. - Mauvaises suites de l'usage l'opium. - Il annule l'action de la upart des médicaments tirés du règne végétal et de quelques autres. - La plupart des symptômes se montrent pendant le mouvement et souvent quand l'attention est dirigée sur soi-même.

Sensibilité douloureuse de la peau même au plus léger attouchement. -Inflammation érysipélateuse des parties extérieures.

Convulsions. - Malaise général. - Tétanos suivi d'un vomissement qui rend la connaissance. — Crampes dans le Choléra'. - Accès épileptique. - Crampes produites par l'usage du cocculus.

. Somnolence. - Ronflement et paroles pendant le sommeil.

Grande susceptibilité à l'air froid. - Disposition à se refroidir suivie de diarrhée d'excréments bruns noirâtres avec tranchées. - Froid général du corps. - Frisson avec tremblement et claquement de dents. - Chaleur du corps augmentée avec rougeur de la face. - Rougeur des joues et du petit lobe de l'oreille. - Chaleur générale qui s'élève au plus haut degré en marchant.

Tous les symptômes s'aggravent au toucher, pendant le mouvement, à l'air libre et aussi par le froid. - Les symptômes paraissent surtout la nuit.-Anxiété avec pleurs. - Humeur querelleuse. - Délire. - Fureur.

## 24. CANNABIS SATIVA.

DUR. D'ACT., 3 sem. dans les mal. chron. — ANTID. Incon. -- Puiss., X.

r'Interruption des idées, et par-là suspension de la mémoire.

Pression aux tempes. - Compression dans la partie frontale, du bord des orbites jusqu'aux tempes. - Sensation dans différentes parties de la tête, comme s'il y tombait une goutte d'eau froide. -Congestion vers la tête avec douleur pressive et battement.

Pression dans les yeux, d'arrière en avant. - Traction crampoide dans les 40 Cannavis suciva.

yeux. — Faiblesse de la vue; on distingue mal les objets éloignés et ceux qui sont trop près. — Obscurcissement de la cornée. — Cataracte.

Tressaillement léger des muscles dans différentes parties de la face.

Sécheresse du nez. — Épistaxis à la suite d'une sensation de chaleur dans le nez, qui est extrêmement sec. — Le nez estrouge, gonflé comme par la couperose.

Sécheresse de la bouche avec salive gluante, absence de soif. — Difficulté de parler, tantôt par manque de paroles, tantôt par manque de la voix. — Forte douleur dans le dos en parlant.

Renvois de fluide acide, amer, âcre.— Renvois à vide.

Nausées avec saveur des aliments.— Étranglement depuis la région précordiale jusque dans la gorge. — Vomissement de bile verdâtre.

L'estomac est douloureux au toucher, comme s'il était ulcéré.

Battement dans le haut du ventre, de dedans en dehors. — Douleur de meurtrissure des intestins (et pendant le mouvement des bras et des épaules).

Secousses douloureuses dans le ventre, comme s'il y avait quelque chose de vivant. — Douleur rénale.

Diarrhée avec coliques. — Sensation dans l'anus, comme s'il s'en échappait quelque chose de froid.

Ardeur en urinant. — Élancements brûlants dans l'urètre.

Période inflammatoire de la blénorrhagie.

— Gonflement inflammatoire non syphilitique du prépuce, du gland et de la verge. — Érections douloureuses, tensives. — Pression dans les testicules et tension dans le cordon des vaisseaux spermatiques, étant debout.

Sterilité.

Catarrhe des bronches. — Respiration courte, oppression.

Toux avec crachats épais, verdâtres.

Élancements profonds dans la poitrine en parlant, pendant le mouvement, et en respirant. — Affections inflamm toires de la poitrine. — Cardite.

Cannavis sativa.

Douleurs d'élancement entre les om plates. — Pression au coccix.

Crampe dans l'articulation du pour en écrivant. — Paralysie subite de main avec tremblement quand on sais quelque chose, et impossibilité de ten les objets.

Lassitude avec chancellement et doi
leur obtuse aux genoux. — Tirailleme
rhumatismal dans le périoste de to
les os, comme s'ils étaient brisés, per
dant le mouvement. — Pression de
chirante, contractive, ou coups déch
rants. — Ou élancements déchirants quénètrent profondément dans différent
parties. — Tétanos du tronc et des men
bres supérieurs. — Pincements super
ciels dans les chairs, comme ceux qu'e
fait avec les doigts. — Fatigue par la p
role et en écrivant.

Les symptômes sont augmentés e même produits par le toucher, à l'air l bre et à la chaleur. — La nuit, et apre minuit, la plupart des symptômes a montrent.

Somnolence invincible pendant journée. — Insomnie nocturne; le matin, au réveil, on est plus fatigué que soir. — La nuit on éprouve des piqure pénibles comme des coups d'aiguille avec grande anxiété, et la sensation produite par une affusion d'eau chaude.

Horripilation et frisson avec soif, aver froid extérieur et malaise. — Pouls peti presque insensible.

Humeur triste. - Indifférence.

## 25. CANTHARIDES.

Dur. D'ACT., 3 semaines. — ANTID.: Camph. –
Puiss., X.

Vertiges au grand air, avec perte d connaissance et brouillard devant le yeux. Céphalalgie pressive élançante qui se dissipe en marchant. — Céphalalgie déchirante, de l'occiput jusqu'au front, avec vertiges. — Chaleur qui s'élève à la tête avec battement intérieur.

Sensation comme celle que produit le tiraillement d'une touffe de cheveux. — Hérissement des cheveux.

Rotation crampoïde du globe de l'œil. — Les objets paraissent jaunes. — Brûlure violente dans les yeux.

Sensation d'une vapeur brûlante qui

s'échappe de l'oreille.

Face hippocratique. — Expression effrayante de désespoir. — Sensation comme si la peau du côté droit de la bouche était soulevée avec une aiguille. — Inflammation érysipélateuse suivie de desquammation.

Le nez est rouge, gonflé, brûlant.

Suppuration des gencives. — Odontalgie tiraillante, augmentée par le man-

Gonflement des parois de la bouche sans douleur. — Suppuration de la langue. — Parole faible avec sensation de cette faiblesse dans les organes de la parole. — Voix faible, tremblante. — Salivation écumeuse avec strie de sang. — Du sang coagulé vient dans la bouche. — Odeur de poix dans la bouche.

Déglutition difficile sans douleur. — Impossibilité d'avaler les liquides. — Difficulté d'avaler avec renvois des aliments

demi-digérés, la nuit.

Goût de poix dans la bouche et dans la gorge. — Absence d'appétit avec nausées et dégoût pour tous les aliments.— Soif par sécheresse des lèvres. — Dégoût pour les boissons.

Renvois brûlants comme du pyrosis, avec augmentation de la brûlure par la boisson.

Sensation de plénitude avec pression, anxiété, inquiétudes dans l'estomac. — Ardeur d'estomac. — Inflammation d'estomac.

Extrême sensibilité du ventre au tou-

cher. — Brûlure dans le bas-ventre et toute l'étendue du canal intestinal. — Élancements dans la région des reins. — Douleurs obtuses ou battements dans les reins. — Néphrite. — Entérite. — Hydropisie.

Selles dures retenues. — Diarrhée d'excréments écumeux ou de mucosités verdâtres. — Selles sanguinolentes.

Rétention d'urine douloureuse. — Strangurie et tenesme du col de la vessie. — Urines purulentes. — Hématurie. — Prurit avec ardeur en urinant. — Douleur incisive dans l'urètre pendant et après l'émission de l'urine. — Inflammation de l'urêtre et de la vessie.

Accroissement de l'appétit vénérien, fortes érections prolongées. — Érections doulou-reuses. — Inflammation des parties génitales. — Blénorrhagie douloureuse et suppression d'écoulement. — Gonorrhée chronique. — Gonflement douloureux des testicules.

Règles hâtives plus abondantes, douleur pendant leur écoulement. — Gonflement du col de l'utérus.

Coriza chronique. — Catarrhe nasal avec sécrétion abondante de mucus épais. — Enrouement. — Expectoration douloureuse de mucosités épaisses, suivie d'un élancement dans la trachée. — Parole faible, timide, par faiblesse des organes de la respiration.

Ardeur dans la poitrine; il s'échappe souvent de la poitrine de petits globules de sang.

Déchirements dans les membres. — Déchirements térébrants des pieds jusqu'aux hanches. — Sciatique avec affection des voies urinaires.

Brulure vive comme d'Écorchure dans toutes les cavités du corps. — Élancements déchirants de dehors en dedans, dans différentes parties. — Le plus grand nombre des symptômes se montrent du côté droit et s'améliorent étant couché. Les symptômes se renouvellent tous les sept jours.

Vésicules avec prurit sur la peau;

elles brûlent par le toucher. — Douleurs déchirantes dans les ulcères avec augmentation de suppuration.

Faiblesse et lassitude. — Grande sensibilité intérieure et extérieure. — Tremblement des jambes et nécessité de se coucher.

Après midi, grande somnolence avec bâillements fréquents et pendiculation. — La nuit, demi-sommeil avec réveil fréquent.

Fièvre caractérisée seulement par le froid. — Frissonnement et froid avec tremblement, avec chair de poule et pâleur de la face.

Abattement avec disposition à pleurer. — Anxièté avec inquiétude qui force à semouvoir continuellement. — Dépit. — Disposition à la colère. — Fureur avec cris, aboiement, et l'on frappe ceux qui entourent.

#### 26. CAPSICUM ANNUUM.

DUR. D'ACT., 3 sem .- ANTID.: Camph .- Puiss., III.

Ivresse comme par des spiritueux. Émoussement de tous les sens.

Embarras de la tête. — Céphalalgie à l'éclater en marchant et en faisant des mouvements de la tête. — Céphalalgie frontale, pressive de dedans en dehors, avec douleurs incisives dans l'occiput. — Céphalalgie élançante, déchirante, surtout dans le repos. — Douleur pariétale ou frontale tiraillante, déchirante. — Céphalalgie avec sensation d'écartement comme par la plénitude du crâne. — Céphalalgie avec battement.

Pression dans les yeux, comme par un corps étranger.

Déchirement dans la conque de l'oreille.—Pression et prurit dans l'oreille.

Épistaxis le matin au lit.

Les lèvres gercées ou fendillées.

Mucosités épaisses dans la bouche. — Petites vésicules brûlantes, douloureuses, dans la bouche. — Stomacace matigne.

# Capsicum annuum.

Déglutition douloureuse, et hors du temps de la déglutition, tiraillements dans l'œsophage.—Déchirement par secousses dans les glandes du côté droit du cou.

Goût fade, aqueux. - Pyrosis.

Envie de vomir.

Douleur de tension dans le bas-ventre, qui s'élève à la poitrine avec gonflement.—
Tension douloureuse de l'épigastre augmentée par le mouvement. — Sensation de gonflement, comme pour éclater, qui gêne la respiration.—Coliques de vents.—Tiraillements et remuement dans le bas-ventre.

Brûlure à l'anus. — Tenesme. — Diarrhée dyssentérique. — Selles peu abondantes, muqueuses, mêlées de sang, précédées de coliques venteuses. — Diarrhée nocturne avec brûlure à l'anus.

Tenesme de la vessie.—On urine très peu et fréquemment avec ardeur.

Froid du scrotum et impuissance.

Fourmillement et chatouillement dans le nez, comme par un coriza sec.—Coriza sec.—Enrouement.

Toux avec céphalalgie, comme si le crâne allait éclater. — Toux le soir et plus forte la nuit.

Oppression de la poitrine qui semble venir de l'estomac. — Douleur de constriction dans la poitrine. — Douleur de poitrine avec battement et asthme, augmenté par le mouvement.

Déchirement tiraillant, dans et près de l'épine dorsale.

Tension douloureuse dans le genou. Maladies des articulations.—Douleur de luxation dans les articulations.—Raideur des articulations avec craquement. — Tiraillements douloureux dans les membres produits par le mouvement. — Douleur de pression. — Crampes dans le corps avec les bras et les pieds raides et engourdis.

Horreur du mouvement. — Le toucher, le grand air, le froid augmentent les symptômes. — Le soir et la nuit, la plupart des symptômes paraissent.

Insomnie sans fatigue. — Sommeil plein de rêves.

Fièvre intermittente avec prédominence de frisson. — Froid général avec mauvaise humeur, qui augmente avec le froid. — Après avoir bu, frisson et horripitation. — Frisson de sièvre et froid avec anxiété, vertiges et étourdissement.

Tempérament phlegmatique. — Facilité à s'effrayer. — Mécontentement. — Maladresse; on se heurte partout. — Caractère d'opposition opiniâtre. — Disposition à la colère presque sans motif, même en jouant. — Humeur fantasque.

#### 27. CARBO ANIMALIS.

Dur. D'Act., 30 jours.—Antid.: Camph. — Purss., VIII. X.

Vertiges avec nausée en se redressant.

— Vertiges le matin.

Céphalalgie matinale comme après l'ivresse. — Lourdeur et embarras dans l'occiput. — Céphalalgie qui augmente à t'air frais. — Sensation comme si on avait quelque chose de placé dans le front au-dessus des yeux, qui empêche de regarder en-haut.

Sensibilité du cuir chevelu par la pression du chapeau.

Forte presbyopie avec dilatation de la pupille.

Bourdonnement d'oreille. — Ecoulement par l'oreille. — Gonflement du périoste derrière l'oreille droite. — Gonflement des glandes de l'oreille.

Éruption de boutons non douloureux à la face. — Taches lisses, rosées, épaisses au toucher. — Erysipèle de la face. — Couperose.

Douleur des os du nez. — La pointe du nez rouge, brûlante, gercée.

Gonflement des gencives douloureuses rouges. — Grand ébranlement des dents.

Goût amer à la bouche. — Odeur fétide de la bouche.

Renvois incomplets avec douleur.—Nausees nocturnes. Pression d l'estomac à jeun et le soir après s'être couché. — Faiblesse de l'estomac telle que tout aliment produit du malaise. — Borborygmes bruyants dans l'estomac et le ventre. — Crampes d'estomac.

Pression et douleur de tranchée dans la région hépatique. — Le toucher cause au foie une douleur d'écorchure. — Déplacement des vents. — Flatuosités fétides. — Hernie inguinale.

Envie inutile d'aller à la garde-robe, on ne rend que des flatuosités. — Selle dure globuleuse. — Avant la selle, tiraillement de l'anus aux parties génitales.

Suintement collant au périnée.

Urines abondantes. — Écoulement involontaire d'urine.

Leucorrhée qui tache en jaune. — Lochies ternes et fétides.

Coriza sec. — Obstruction des narines. Toux le matin avec sécheresse de la gorge.

Oppression de poitrine le matin et après le dîner. — Sensation de froid dans la poitrine. — Nodosités douloureuses dans les mamelles. — Inflammation érysipélateuse des mamelles chez les accouchées

Elancements au-dessus du sacrum en respirant profondément. — Douleur brûlante du coccix au toucher.

Suintement humide dans le creux de l'aisselle.—Induration des glandes axillaires.—Raideur arthritique des articulations des doigts.—Engourdissement des mains.
—Raideur douloureuse des articulations des doigts.

Gonflement inflammatoire aux pieds, aux orteils, comme une engelure, avec chaleur et douleur. — Serrement de crampe dans les orteils. — Flexion involontaire du pied et des orteils en marchant.

Pression douloureuse dans les articulations et les muscles des membres.

- Engourdissement de tous les membres, surtout de la tête. - Grande facilité à se donner des tours de reins.

Prurit universel, surtout le soir au lit,

- Gonflement, induration et douleur des glandes. - Engelures.

Sommeil agité, plein de rêves.

Frisson le soir au lit avec sueur pendant le sommeil. — Le soir grand froid des pieds et des mains. — Chaleur nocturne. — Sueur nocturne débilitante, surtout aux cuisses.

Gaîté, tristesse alternatives. — Sensibilité excessive, alternant avec morosité et taciturnité.

#### 28. CARBO VEGETABILIS.

Dur. D'Act., 36 jours. — Antid.: Ars., camph., café-

Lenteur des idées. — Idées fixes. — Faiblesse subite de mémoire qui revient périodiquement.

Lourdeur de la tête. — Cephalalgie produite par l'échauffement. — Céphalalgie avec battement le soir et après le repas. — Déchirement dans l'occiput. — Céphalalgie pressive au-dessus des yeux et dans les tempes. — Céphalalgie comme produite par la contraction des téguments de la tête. — Céphalalgie avec tremblement des mâchoires.

Sensibilité du cuir chevelu à la pression extérieure (par exemple, celle d'un chapeau).

Douleur dans les muscles des yeux.—
Douleur dans les yeux après avoir fixé longtemps un objet.— Pression sur les yeux.—
Collement des paupières pendant la nuit.—
Prurit dans les angles des yeux.— Myopie.

Rougeur et chaleur de l'oreille externe le soir. — Défaut de cérumen. — Bourdonnement, tintement.

Face pâle. — Couleur de la face jaunegrise.

Fort épistaxis avec pâleur de la face avant et après. — Fourmillement et chatouillement continuels dans le nez. — La pointe du nez est croûteuse.

# Carbo vegetabilis.

Lèvres gercées. — Tressaillement dans la lèvre supérieure.

Saignement des gencives. — Rétraction des gencives des dents incisives. — Ebranlement chronique des dents. — Odontalgie tiraillante, déchirante. — Écorchure et suppuration des gencives. — Tiraillement déchirant dans les mâchoires.

Sécheresse ou accumulation d'eau dans la bouche. — Stomacace. — Rudesse dans la bouche et sur la langue.

Mal de gorge comme par gonflement dans le gosier. — Sensation de strangulation avec difficulté d'avaler. — Sensation d'égratignure dans la gorge. — Mucosités abondantes qu'on expectore en renaclant.

Goût amer à la bouche. — Goût salé. — Les aliments ont un goût trop salé. — Dégoût habituel pour la viande. — Soif et faim immodérées.

Renvois amers ou à vide. — Rapport des corps gras qu'on a mangés. — Régurgitation des aliments ingérés. — Sueur en mangeant. — Aigreur dans la bouche après le dîner. — Pression et malaise dans l'estomac après le repas. — Ballonnement du bas-ventre après le repas.

Le matin mataise. — Malaise continuel. — Vomissement de sang. — Renvois pendant la nuit d'un acide désagréable.

Crampe de l'estomac avec pression brûlante, beaucoup de vents et grande sensibilité de la région précordiale. — Douleur à l'estomac chez les nourrices. — Griffement dans l'estomac. — Tremblement dans et sur l'estomac.

Élancements au-dessous des côtes. — Grande tension du bas-ventre. — Coliques venteuses spasmodiques. — Pincement dans le ventre au-dessous du nombril qui s'étend à droite ou à gauche avec sensation paralytique dans une cuisse. — Ballonnement extraordinaire par des vents avec chaleur universelle.

Selles tiquides, pâles.—Selle difficile sans être dure, avec grand besoin d'évacuation. — Ardeur à l'anus et douleur comme celle d'enfantement dans le bas-ventre. - Constipation. - Douleur d'hémorrhoïdes. - Hémorrhoïdes fluentes. -Écorchure et suintement au périnée.

Fréquente envie d'uriner, avec anxieté, le jour et la nuit. — Pissement au lit. — Urine de couleur foncée. — Urine rouge comme si elle était mêlée de sang. — Diabète.

Pollutions très fréquentes. — Imagination trop voluptueuse. — Éjaculation trop prompte pendant le coït. — Taches lisses, rouges, humides sur le gland.

Menstruation trop hâtive, avec des crampes qui précèdent. — Menstruation trop abondante. — Brûlure et écorchure aux parties génitales.

Enrouement prolongé le matin et le soir. — Enrouement accru par la parole. — Éternuements fréquents. — Obstruction des narines augmentée le soir. — Catarrhe et mal de gorge pendant la miliaire.

Toux convulsive, trois ou quatre accès par jour. — Toux chronique, spasmodique le soir. — Toux avec crachement de sang et douleur brûlante dans la poitrine.

Oppression de poitrine. — Hydrothorax. — Respiration courte en marchant. — Affection de la trachée-artère. — Cuisson et douleur vive dans la poitrine. — Ardeur dans la région précordiale avec congestion vers la poitrine et fortes palpitations de cœur. — Phthisie pulmonaire. — Taches brunâtres sur la poitrine. — Inflammation des mamelles. — Sensation de faiblesse dans la poitrine.

Douleur de traction dans le dos. — Déchirement dans les muscles du cou.

Chaleur dans les mains. — Déchirement dans les avant-bras et les métacarpes. — Dans l'articulation de la main gauche, sensation comme si les tendons étaient trop courts. — Fatigue des muscles, des bras et des mains en riant.

Orteils rouges, gonflés, avec élancements comme s'ils étaient gelés. — La nuit crampes au mollet. — Ulcères indoents au hout des doigts et des orteils. —

Varices des femmes enceintes. — Sueur aux pieds. — Douleur tiraillante paralytique dans les jambes, qui part du basventre.

Engourdissement des membres. — Douleur dans les membres comme par des luxations ou parce qu'on a levé un poids à faux. — Courbature le matin après être sorti du lit. — Douleur rhumatismale déchirante dans les membres. — Douleur brûlante dans les membres, les os et les ulcères.

Tremblotement et tressaillement partiel dans les membres, pendant la journée. — Souffrances à la suite d'une débauche de vin. — Grande lassitude jusqu'à l'évanouissement, le matin au lit, ou quand on commence à marcher. — Affaissement général vers midi avec besoin de soutenir sa tête ou de se coucher.

Sensation de fourmillement dans toute la peau. — Prurit général le soir, par la chaleur du lit. — Ulcères fétides aux jambes qui saignent facilement; ils causent des douleurs brûlantes et fournissent du pus âcre, sanieux. — Induration des glandes. — Eruption petite, granuleuse (aux mains). — Stries rouges, brunâtres. — Urticaire miliaire.

Grande somnolence dans le jour. — Insomnie avec agitation générale. — Rêves effrayants qui causent des sursauts. — Peur de fantômes.

Le soir et la nuit, fièvre, froid fébrile, suivi de chaleur fugace. — Sueur nocturne. — Sueur du matin, d'odeur acide. — Fièvre intermittente avec soif seulement pendant le froid.

Dépit, humeur violente. — Le soir anxiété et agitation.

#### 29. CASTOREUM.

Dur. D'ACT., Incon. — ANTID.: Incon. — Puiss., II,

Douleur d'ulcération au vertex aggravée par la compression. — Céphalalgie augmentée par la pression ou le toucher.

— Céphalalgie avec battements comme ceux d'un abcès intérieur.

— Grande susceptibilité des yeux au soleil et aux lumières; ils ressentent de la cuisson. — Larmoiement. — Collement des paupières la nuit. — Besoin de fixer les objets en travaillant; il y a douleur de pression dans les yeux le soir.

Tintement, bruissement et bourdonnement dans l'oreille; ils cessent en introduisant le doigt dans le conduit auditif.

Frémissement visible de la lèvre inférieure.

Gonslement nocturne des gencives avec déchirement dans les tempes. — Odontalgie en mangeant produite par le froid et diminuée par le chaud. — Odontalgie déchirante par secousses et produite ou aggravée par le toucher.

Tiraillement et tressaillement de la langue vers la gorge. — Odeur fétide de la bouche, dont on s'apercoit soi-même.

Ardeur dans la gorge, comme pyrosis. Soif violente.

Nausées et vomituritions.

Pesanteur et plénitude de l'estomac.— Sensation d'engourdissement dans l'estomac. — Douleur d'ulcère, avec sensation de contraction dans la région précordiale.

Ballonnement douloureux du bas-ventre. — Coliques violentes avec rougeur de la face. — Bâillement continuel amélioré par la chaleur et en fléchissant le corps. — Coliques avec borborygmes suivies d'une diarrhée brûlante.

Selles diarrhéiques avec brûlure dans l'anus pendant et après l'évacuation. — Diarrhée avec frisson et bâillement. — Besoin très pressant d'aller à la selle. — Selle muqueuse sanguinolente.

On urine fréquemment avec soif violente, jour et nuit.

Règles trop hâtives. — Douleur au sacrum, et céphalalgie pendant les règles. — Leucorrhée brûlante.

Obstruction des narines. - Écoule-

ment d'eau âcre qui ronge les narines (asthme).

Poids opprimant la poitrine, chaleur brûlante dans la poitrine.

Douleur tiraillante dans la nuque.

Douleur nocturne dans les aisselles et la partie supérieure des bras. — Lassitude dans les membres inférieurs.

Sommeil agité, avec jactation et réveil fréquent; soubresauts avec anxiété. Tressaillement dans les membres pendant le sommeil. — Rêves effrayants.

Prédominence du froid, avec horripilation. — Tremblement subit avec froid glacial dans le dos, par accès.

Grande tristesse. - Sensibilité et pleurs.

#### 30. CAUSTICUM.

Dur. dact., 50 jours. — Antid.: Café, éther nitr. — Puiss., X.

Ivresse à tomber.

Distraction. — On prononce un mot pour l'autre. — Faiblesse de la mémoire.

Céphalalgie pressive qui rend stupide.

— Élancements dans les tempes. — Tension lancinante au vertex. — Élancements à la tête. Sensation d'engourdissement à l'occiput. — Tension et raideur du cuir chevelu. — Céphalalgie frontale avec pression.

Sécrétion de chassie, collement des paupières. — Ophtalmie scrofuleuse. — Inflammation des paupières. — Frémissement visible des paupières. — Pression
dans les yeux comme quand du sable y est
introduit, augmentée par le toucher. —
Douleur extensive dans le globe droit.
— Difficulté d'écarter les paupières. —
Larmoiement. — Cuisson dans les yeux.
— Scintillement devant les yeux. — On
voit des fils noirs devant les yeux. — Amaurose et (cataracte) commençante.

Couleur jaune de la face, surtout aux tempes ; lèvres bleues. — Éruption à la face. Serrement dans l'oreille. — Sensation dans l'oreille comme si tout ce qu'elle contient faisait effort pour sortir. — Bourdonnement et bruissement dans la tête et les oreilles. — Écoulement de pus fétide. — Douleur d'excoriation dans le conduit auditif. — Gonflement des parties extérieures de l'oreille, avec élancement et cuisson. — Dartre au lobe de l'oreille.

Prurit au bout et à l'aile du nez. — Éruption au bout du nez. — Verrues anciennes sur le nez ou sur les paupières. — On mouche du sang tous les matins. Épistaxis.

Dents douloureuses, chassées de leurs alcécles. — Suppuration chronique dans une partie des gencives. — Fistule dentaire. — Douleur rhumatismale dans la mâchoire. — Une sensation de gonflement au-dessous de la mâchoire ou dans le cou, qui empêche d'écarter les mâchoires. — Odontalgie élançante. — Odontalgie pulsative.

Sensation de crampe dans les lèvres.—
Douleur tiraillante, tensive au-dessous du menton. — Douleur d'excoriation au palais. — Excoriation de l'extrémité de la langue.

Mucosités dans le pharynx et derrière le poile du palais. — Expuition de mucosités en renaclant. — Mal de gorge comme de déchirure, en faisant des efforts. — Sensation de froid qui s'élève de la gorge. — Gonflement des glandes du cou, qui ressemble au goître.

Renvois à vide. — Renvois comme après avoir pris un aliment qui n'est pas digéré.

Nausées jusqu'à l'évanouissement.

Pression et griffement dans l'estomac. — Douleur spasmodique d'estomac. — Pesanteur après avoir mangé du pain. — Douleur d'estomac avec chaleur à la tête, augmentée par chaque mouvement subit, et avec horripilation lorsque les douleurs augmentent. — Pression dans la région précordiale.

Pression dans le haut du ventre. -

Gros ventre chez les enfants. — Gonflement du bas-ventre. — Déplacement de vents avec selles dures. — Coliques le matin.

Efforts fréquents et infructueux pour aller à la selle, avec rougeur de la face et anxiété. — Constipation chronique. — Évacuation de matières noueuses ou très minces. — Tranchées dans le rectum pendant la garde-robe. — Prurit à l'anus. — Boutons hémorrhoïdaux.

Fréquente envie d'uriner avec soif, mais on urine peu. — Incontinence d'urine jour et nuit. — L'urine s'échappe involontairement, en toussant, en éternuant et en marchant. — Les urines sont acres et excorient les parties qu'elles touchent. — Cuisson dans l'urètre en urinant. — L'urine se trouble en se refroidissant.

Pollutions fréquentes. — Défaut d'érrection.

Règles retardées, mais abondantes; elles s'échappeut en gros caillots. — Les règles tardent à paraître à l'époque de la puberté. — Stérilité par le retard des règles. — Leucorrhée abondante avec l'odeur des règles. — Pendant les règles, douleur dans le dos.

Éternuement le matin. — Obstruction des narines. — Raucité et enrouement matin et soir. — Sensation d'excoriation au larynx hors le temps de la déglutition.

Toux brève. — Toux sèche, creuse, avec douleur d'excoriation dans la poitrine. — Oppression spasmodique. — Étancements au cœur. — Palpitations.

Raideur douloureuse du dos. — Surtout en se levant de son siège. — Tiraillements et déchirements dans les omoplates. — Douleurs dans le dos, à chaque mouvement du corps. — Douleur pressive au dos étant assis.

Tiraillements dans le bras. Douleur pressive au-dessous des coudes. — Sensation d'engourdissement douloureux d'un doigt. — Élancements des doigts jusqu'au coude. — Raccourcissement et indurations des tendons des doigts. — Douleur tensive dans les articulations

des doigts. - Rétraction des doigts.

Froid de pieds. — Gonflement des pieds. - Marche mal assurée d'un enfant, et facilité à tomber. — Raideur dans les articulations desjambes. - Douleur dans l'articulation coxo-fémorale ( et le pied ), comme si elle était foulée ou luxée. - Douleur de brisure dans les cuisses et dans les jambes, le matin au lit. - Crampe au pied. - Douleur nerveuse dans les talons .- La peau des cuisses et des jambes est marbrée. - Raccourcissement du coude-pied, qui cause une douleur tensive quand on s'appuie.

Douleur rhumatismale arthritique dans les membres. - Déchirements violents dans les articulations, diminués par la chaleur, - Faiblesse paralytique des membres et marche mal assurée. — Inquiétude insupportable dans les membres, le soir. - Étant assis, inquiétude universelle et anxiété au cœur. -- Grande lassi-TUDE ET ABATTEMENT GÉNÉRAL LE SOIR. -Paralysie des membres. - Accès épileptique. - En marchant au grand air, le soir les symptômes paraissent s'aggraver.-Les symptômes qui se montrent au grand air se dissipent dans l'appartement (jusqu'à un léger mal de tête). - Le café semble augmenter tous les symptômes. - (Les symptômes primitifs semblent paraître plus tard que ceux des autres médicaments.)

Somnolence le jour. - Insomnie la nuit produite par les souffrances avec réveil en sursaut fréquent quand on s'endort. - Insomnie avec chaleur sèche. -Bâillements fréquents avec pendiculations.

Éruption miliaire. — Éruption urticaire. - Dartres. - Vésicules rongeantes. - Panaris. - Cors douloureux. - Fort prurit au dos et aux mollets. - Excoriation entre les cuisses. - Gale.

Grande susceptibilité pour le froid et les courants d'air. - Frissons nocturnes avec douleur au dos suivie d'une sueur générale. - Sueur nocturne. - Sueur en marchant d l'air libre. - Grippe opiniatre. - Mélancolie. - Crainte. - Pensées chagrines jour et nuit. - Pleurs. - Craintes la nuit. - Tristesse, grande anxiété.

# 31. CHAMOMILLA VULGARIS.

DUR. D'ACT., 4 jours. - ANTID.: Acon., coff., ign., nux., puls. - Puiss., IV.

Vertiges après le dîner. - Vertiges le matin; on est comme ivre, on chancelle en sortant du lit. - Accès de vertiges et d'évanouissement.

Diminution de la conception.-Insensibilité au plaisir avec somnolence sans pouvoir dormir.—Espèce d'engourdissement ou coma-vigil qui empêche de comprendre.

Déchirement semi-latéral dans la tête avec déchirement dans les mâchoires .- Hémicranie tractive. - Céphalalgie avec bat-

Ophtalmie catarrhale. - Ophtalmie des nouveau-nés. - Saignement des yeux.

Élancements douloureux dans l'oreille. - Gonslement des parotides avec mal de gorge. - Tintements d'oreilles.

Joues pâles, froides, avec le front chaud. - Rougeur d'une joue, l'autre est pâle. Face rouge brûlante. - Miliaire rouge sur les joues. - Erysipèle après odontalgie. - Gonflement de la face et d'une partie de la tête avec dureté, couleur bleuâtre et palpitation dans la joue droite.

Gerçure de la lèvre inférieure.

Odontalgie après les boissons chaudes surtout après le café. - Odontalgie nocturne insupportable avec gonflement des joues. - Odontalgie des enfants.

Odeur fétide de la bouche après le dîner .- Mâchonnement continuel .- Salivation. - Langue rouge fendillée. - Audessous et au-dessus de la langue, petites ampoules lancinantes.

Chamomilla vulgaris.

Chatouillement, qui excite à tousser, sur la partie supérieure du sternum.

Mal de gorge en avalant comme si on avait une cheville dans la gorge.—Chaleur brûlante dans la bouche, dans l'æsophage, jusque dans l'estomac. — Angine catarrhale. — Angine chez les enfants. — Impossibilité d'avaler étant couché, ou d'avaler des aliments secs. — Bruit ronflant dans la gorge.—Gonflement inflammatoire des glandes du cou.

Goût amer. - Goût putride.

Renvois qui augmentent les douleurs qui existent. — Ballonnement du ventre après le manger. — Chaleur de la face après le repas.

Assections gastriques .- Envie de vomir.

- Vomissement de bile.

Crampe d'estomac.—Nausée et pression dans la région précordiale. — Douleur pressive dans l'épigastre comme par une pierre après le diner avec gêne de la respiration, ces symptômes sont diminués en fléchissant le corps et par le repos.—Plénitude et tension dans la région précordiale avec anxiété. — Suffocation chez les enfants.

Douleur violente avec ballonnement du bas-ventre, le toucher est insupportable.

— Coliques venteuses avec gonstement du bas-ventre. — Tranchées déchirantes. — Crampes du bas-ventre. — Pression à l'anneau inguinal comme s'il devait se former une hernie. — Affections bilieuses. — Hépatite, des douleurs brûlantes incisives de l'estomac au nombril avec respiration courte et pûleur de la face.

Selles diarrhéiques verdâtres de matières et de mucosités.—Diarrhée de mucosités

blanches avec coliques.

Urine brûlante jaune.

Leucorrhée jaune avec prurit.—Excrétion sanguinolente du vagin avec douleurs au sacrum comme celles de l'enfantement qui s'étendent au bas-ventre et aux parties génitales.—Métrorrhagie. — Lochies avec douleur.—Fièvre puerpérale.

Enrouement catarrhal. — Enrouement produit par des mucosités épaisses dans la trachée-artère. — Catarrhe des enfants. —

Toux avec crachats épais et amers. — Toux le soir et le matin produite surtout par la parole; précédée de chatouillement dans la fossette du cou, elle cesse le soir au lit. — Toux des enfants par le refroidissement.

Oppression asthmatique avec envie de tousser continuelle produite par l'irritation dans la fossette du cou. — Élancements d'aiguilles dans la poitrine. — Excoriation des mamelles. — Induration des glandes mammaires. — Suppression du lait chez les femmes en couche.

Tiraillements douloureux dans le dos.

Douleur dorsale nocturne.

Raideur du bras, il est engourdi quand on veut saisir quelque chose. — Engourdissement du bras quand on saisit fortement quelque chose.

Douleur tiraillante, déchirante dans la cuisse, depuis la tubérosité de l'ischion jusqu'au talon, avec tension des muscles des jambes, plus forte la nuit et étant assis. — Crampes des mollets.

Déchirement dans les membres et dans le ventre. — Rhumatisme aigu. — Douleurs déchirantes tiraillantes avec sensation d'engourdissement des parties malades. —
Craquement dans les articulations, surtout des membres inférieurs. — Les douleurs sont plus fortes la nuit, souvent avec soif, chaleur, rougeur d'une joue, ou sueur chaude dans toute la tête. — Les douleurs sont intolérables et vont jusqu'à produire le désespoir. — Mauvais effet du café. — Maladies des nouveau-nés et des enfants.

La peau est maladive, chaque lésion est disposée à passer à l'ulcération. Douleur brûlante et prurit dans les ulcères avec fourmillement, et intolérance du toucher. — Écorchures des enfants.

Accès d'évanouissement. — Crampes et convulsions des enfants. — Accès de relâchement universel avec les pouces fléchis. — Le corps est raide, tendu en arrière; les Chamomilla vulgaris.

50

bras sont raides, les pouces fléchis. — Convulsions des bras, de la face, avec renversement des yeux. — Convulsions avec grincement des dents, contorsion et secousses dans les yeux et dans les doigts. — Convulsions spasmodiques dans tous les membres, dans les lèvres, les paupières et les muscles de la face. — Écume à la bouche pendant les convulsions; serrement des dents. — Mouvement convulsif de la langue. — Convulsions pendant la dentition. — Convulsions des femmes en couches.

Demi-sommeil et soif. — Somnolence avec sièvre, agitation, gémissements, soubresauts et respiration courte. — Gémissements, pleurs, hurlements, soubresauts, cris, jactation et paroles dans le sommeil. — La nuit on croit entendre la voix des personnes absentes. — Écartement continuel des cuisses pendant le sommeil.

Susceptibilité au grand air. — Horripilation à l'air froid. — Horripilation dans des parties isolées, avec ou sans froid extérieur. — Horripilation fugace le soir avec chaleur brûlante aux joues. — Horripilation avec chaleur intérieure. — Rougeur dans une joue sans horripilation et sans chaleur interne. — Sensation de chaleur extérieure qui cependant n'existe pas. — Froid suivi de chaleur et de sueur aigre. — Fièvre avec exacerbation nocturne. — Chaleur brûlante, sueur et délire furieux.

Agitation, jactation avec gémissements et coliques déchirantes. — Inquiétude, pleurs, avec désir de choses qu'on rejette quand on lesa. — Mauvaise suite du chagrin. — Cris à cause d'offenses légères, parfois même imaginaires, ou qui datent de long-temps. — Mauvaises suites du chagrin. — Cris des nouveau-nés.

# 32. CHELIDONIUM MAJUS.

Dur. D'ACT., incon. — ANTID.: Incon. — Puiss., teinture.

Vertige tournoyant, avec horripilation à la partie supérieure du corps, et perte de connaissance.

# Chelidonium majus.

Céphalalgie obtuse avec pulsation aux tempes comme par congestion.—Sensation de froid dans l'occiput, qui s'élève de la nuque.

Douleur au-dessusde l'œil gauche, qui déprime la paupière. — Collement des paupières et trouble de la vue, le matin. —Sensation comme d'une tache éblouissante devant les yeux, avec larmoiement.

Élancements dans les oreilles. — Sensation dans les deux oreilles comme s'il s'en échappait de l'air. — Dans les oreilles, bruit comme celui d'une explosion lointaine.

Tension, prurit, et tiraillements dans l'os de la pommette et aux côtés du nez.

Ébranlement des dents de la mâchoire inférieure, avec douleur obtuse au toucher.

Tension qui resserre l'isthme du gosier. — Difficulté d'avaler, par la sensation qu'on éprouve d'une compression du larynx sur l'œsophage. — Étranglement dans la gorge comme quand on avale une trop forte bouchée. — Goût fade.—Hoquet.—Malaise causé par le lait.

Douleur rongeante, fouillante à l'estomac, qui se dissipe après le repas. — Serrement et battement dans la région précordiale, avec gêne de la respiration. — Sensation de froid à l'estomac.

Tranchées continuelles dans les intestins, après avoir mangé avec plaisir. — Tranchées par secousses avec selles molles. — Élancements obtus au-dessous du nombril, qui forcent à se fléchir. — Rétraction crampoïde du nombril, avec malaise.

Selles dures, noueuses, avec pression.

—Diarrhée muqueuse nocturne.

Urine fréquente, abondante ou en petite quantité, et pâle.

Règles trop fortes et retardées.

Coriza sec.—Obstruction des narines.

Pression déchirante dans les vertèbres lombaires inférieures en se penchant en avant ou en arrière, comme si elles étaient brisées. Paralysie des muscles du bras avec mouvements douloureux et difficiles. — Paralysie des dernières phalanges des doigts qui deviennent jaunes, froides et les ongles bleus.

Engourdissement dans la cuisse gauche et le genou en appuyant le pied. — Tiraillements paralytiques depuis le trochanterjusqu'aux orteils. — Crampes dans la plante du pied qui la fait fléchir. — Insensibilité et engourdissement des orteils.

Élancements d'aiguilles passagers sur différentes parties. — Grande fatigue et paresse le matin au réveil; on a de la peine à se lever. — Horreur du mouvement. — Sensation de malaise qu'on ne peut déterminer. — Besoin de se coucher sans pouvoir dormir.

Soubresaut très facile en s'endormant suivi de céphalalgie. — On s'endort tard. — Réveil fréquent, subit avec sueur extraordinaire qui s'est montré pendant le sommeil et se prolonge après le réveil.

Frisson, horripilation et froid.

Affaissement moral.—Inquiétude soucieuse du présent et de l'avenir.

#### 33. CHINA.

Dur. D'ACT., 3 sem. — ANTID.: Arn., ars., bell., ferr., ipéc., veratr. — Puiss., VIII.

Vertiges en levant la tête. — Vertiges avec renversement de la tête surtout pendant le mouvement en marchant, amélioration étant couché.

Grande foule de projets avec marche lente des idées.

Céphalalgie pressive augmentée au grand air. — Céphalalgie temporale, pressive, déchirante comme si la tête allait éclater. — Céphalalgie comme de brisure avec douleur de térébration au vertex. — Céphalalgie déchirante, tressaillante, surtout pendant le mouvement et en marchant, amélioration étant couché; sensation de vacillation

dans le crâne et de heurtement dans le côté gauche de la tête, ce qui force de la balancer d'avant en arrière; ces symptômes sont augmentés par le mouvement jusqu'à la sensation comme si la tête allait éclater.—Chaleur et plénitude de la tête.—Céphalalgie frontale en ouvrant les yeux.—Congestion vers la tête.

Sensibilité au toucher du cuir chevelu, même des cheveux. — Céphalalgie extérieure comme une contraction de la peau à la partie gauche de l'occiput. — Élancements pressifs extérieurs à la bosse frontale droite.

Larmoiement avec fourmillement dans les paupières.—Ophtalmie scrofuleuse.— Inflammation des yeux avec exacerbation le soir.—L'œil est douloureux au mouvement comme s'il y avait du sable.—Douleur pressive au bord orbitaire.—Photophobie. — Yeux ternes. — La cornée est sans éclat et le fond de l'œil paraît de couleur de fumée.—Amaurose commençante.

Déchirement dans la conque de l'oreille et le conduit auditif extérieur. — Tintement et élancements dans les oreilles.

Couleur terreuse, jaune, noirâtre de la face.—Pâleur du visage avec les yeux creux, entourés de cercles bleus. — Chaleur et rougeur de la face.—Rougeur des joues et des lobes des oreilles.

Lèvres sèches. — Lèvres couvertes d'enduit noir.

Dents fuligineuses. — Odontalgie déchirante par secousses. — Odontalgie pressive tiraillante. — Forte douleur engourdissante dans les dents creuses. — Vaciliation des dents; elles causent de la douleur quand on mâche.

La langue jaune chargée.—Langue noire fendillée. — Élancements brûlants à la langue.—Gonflement douloureux sur les côtés et en arrière de la langue.

Goût de terre glaise à tout ce qu'on mange.—Appétit seulement en mangeant avec indifférence pour les aliments et les boissons.—Dégoût pour les aliments et les hoissons avec sentiment de plénitude.—

Envie pour différentes choses sans savoir ce qu'on désire. - Soif grande.

Renvois après chaque repas; pyrosis, accumulation de salive dans la bouche, pression à l'estomac et vomituritions inutiles qui fatiguent. — Après chaque repas, pression douloureuse sur le bas-ventre, la région de l'estomac, avec difficulté de respirer et rapports qui soulagent. — Après le dîner, pesanteur d'estomac et somnolence. — Lassitude, paresse et somnolence après le repas. — Après chaque gorgée de boisson, horripilation ou frisson avec chair de poule.

Vomissement de mucosité, d'eau et d'aliments.

Pression forte à l'estomac après le dîner.

— Douleur d'écorchure avec pression dans la région du cœur le matin. — Élancements aigus au-dessus des dernières côtes.

Douleur de colique dans la région de l'ombilic, avec horripilation. — Pression dans la région du nombril le soir au lit. — Mal de ventre pressif, élançant, au-dessous du nombril, en marchant vite. — Elancement obtus dans la région rénale droite, surtout en fléchissant le corps. — Douleur au toucher dans la région hépatique. — Tension douloureuse du ventre. — Gonflement pâteux du bas-ventre. — Affections bilieuses. — Expulsion des vents fétides. — Déplacement de vents.

Chaque jour, selle peu abondante et difficile. — Les matières molles sont expulsées difficilement. — Selles blanches de consistance de bouillie, fréquentes. — Diarrhée jaune, aqueuse. — Selles involontaires, ténues, jaunâtres. — Diarrhée nocturne, muqueuse et excrétion d'aliments non digérés. — Pression sur le rectum. — Pression sur la vessie après avoir éprouvé de fréquents besoins d'uriner et n'ayant rendu que peu d'urine.

Appétit vénérien augmenté, pensées érotiques nuit et jour. — Mauvaises suites de l'onanisme.

En marchant, pression douloureuse

vers les organes inférieurs avec sensation de plénitude dans les parties génitales. - Leucorrhée qui précède la menstruation qui dure huit jours, avec contraction préalable de l'utérus et pression sensible vers en-bas. - Leucorrhée séreuse, sanguinolente, mêlée de petits caillots ou de pus fétide, avec prurit et resserrement de crampe aux parties intérieures de la génération, et excoriation des cuisses. -Écoulement continuel de sang par le vagin, sans aucune sensation; menace de fausse couche. - Pendant les règles, convulsions avec crampes dans la poitrine et le bas-ventre. - Congestion sanguine à la tête pendant les règles. - Battement des carotides. - Visage gonflé. - Yeux proéminents, larmoyants.-Perte de connaissance et mouvement convulsif des paupières. - Induration douloureuse du col et de l'orifice de l'utérus.

Éternuement avec coriza. — Il y a dans le larynx une altération qui rend la parole et le chant grave. — Sifflement dans la trachée-artère en respirant. — Impossibilité de respirer quand on est couché, si le tronc n'est élevé. — Accès de suffocation comme si la trachée-artère était pleine de mucosité, le soir et la nuit quand on s'éveille.

Chatouillement continuel comme celui que produit la vapeur du soufre qui force à tousser, sans qu'il s'ensuive d'expectoration. — Toux avec crachats striés. — Toux avec crachats muqueux, épais, transparens, rendus difficilement et avec douleur. — Ébranlement des omoplates qui fait crier et vomissement de bile.

Inflammation du poumon quand elle passe à l'état typhoïde. — Élancements obtus dans la poitrine en respirant. — Élancements violents au-dessous de la région du cœur, surtout en lisant. — Élancements dans le thorax du dedans en dehors, sans troubler la respiration. — Élancements aigus au sternum et dans le côté droit de la poitrine. — Inflammation du poumon après de fréquents accès d'hémo-

ptysie, crachats purulents et forte toux.— Oppression de poitrine comme s'il y avait quelque chose qui fouille dans la région précordiale.— Palpitation de cœur.

Déchirement paralytique avec tressaillement dans toutes les parties du bras, de la main et des doigts, excités par le toucher.— Déchirement dans les dernières phalanges et leurs articulations. — Extensions des bras avec les doigts fléchis. — Déchirement paralytique par secousses dans les cavités médullaires des os des membres supérieurs.

Déchirements tressaillants dans les cuisses, dans les os du pied et des orteils au toucher.

Douleur tractive dans le tube osseux des membres inférieurs. — Douleur de saccades dans les genoux. — Déchirement de l'articulation du genou avec faiblesse, telle que la station et la marche sont difficiles. — Déchirement paralytique dans l'articulation du genou qui monte et descend; il est excité par le toucher; grande faiblesse de la partie. — Élancements dans les tibias en marchant. — Gonflement du pied.

LE TOUCHER PRODUIT ET AGGRAVE LES DOULEURS. — AUGMENTATION DES SYMPTÔMES PENDANT LA NUIT. — DOULEUR TRESSAILLANTE, DÉCHIRANTE, AVEC ENGOURDISSEMENT ET FAIBLESSE DES PARTIES MALADES. — Besoin de mouvoir les parties malades de temps à autre. — Déchirement rhumatismal dans tous les membres au commencement de la marche. — Mauvais effets de l'usage du thé. — Souffrances par abus du mercure.

Ictère. — Gangrène humide. — Douleur d'élancement, de battement, de térébration dans les ulcères. — Peau sèche, relâchée. — Couleur jaune de la peau. — Hydropisie aiguë.

Douleur des os très vive, tiraillante.

— Tiraillement ou déchirement par saccade dans la cavité des os longs.

Engourdissement des membres sur lesquels on est couché. — Faiblesse avec tremblement. — Marche difficile qui cause de la sueur. — Atrophie et amaigrissement des ensants. — Faiblesse ou autres mauvaises suites de grandes évacuations d'humeur (de sang ou de sperme). — Sensibilité excessive du système nerveux. — Dégoût par le travail physique et intellectuel.

Somnolence pendant la journée. — Bâillement et pendiculations. — Sommeil agité qui ne délasse pas. — Insonnie avec céphalalge pressive ou avec boulimie nocturne. — Respiration ronslante pendant le sommeil. — Ronslement et gémissement dans le sommeil chez les enfants. — Rêves fatigants qui causent encore du malaise après le réveil. — Rêves confus après minuit, et quand on se réveille on n'en a qu'un demi-souvenir.

Fièvre intermittente des marais. -FIÈVRE QUI COMMENCE AVEC DES SYMPTÔMES OUI LUI SONT ORDINAIREMENT ÉTRANGERS. -Fièvre typhoide. - Horripilation générale sans soif. - Horripilation ou frisson général et tremblement. - Froid avec tremblement et douleur dans la région du foie, vomissement de bile et grande anxiété. -Froid du corps avec le front chaud et congestion vers la tête. - Froid du corps avec chaleur et rougeur de la face, souvent sensation de froid au front. - Chaleur du corps augmentée, gonflement des veines, sans soif. - Chaleur qui dure plusieurs heures le soir, non précédée de froid avec soif ardente suivie de sueur. - Sensation de chaleur générale passagère, avec des coups d'aiguilles cà et là, et désir de boire de l'eau froide. - Fièvre avec soif dans le froid, et vomissement après l'accès. -Fièvre avec soif après le froid, suivie de chaleur et sueur fatigantes. - Soif après frisson et chaleur avec sueur. -Fièvre avant midi.

Désobéissance. — Mépris pour toute chose; toute chose inspire peu d'intérêt. — Mécontentement; on se croit malheureux et on croit être tracassé par tout le monde. — Découragement. — Hésitation.

4

#### 34. CICUTA VIROSA.

Dur. D'Act., 5 sem. - Antid.: Inconn. - Puiss., X.

Vertiges avec tournoiement. — Vertiges à tomber. — Vertiges tournoyants quand on se lève du lit, avec obscurcissement de la vue.

Perte de sens. - Étourdissement.

Pesanteur de la tête avec étourdissement. — Céphalalgie sus-orbitaire. — Hemicranie, suite d'une commotion du cerveau. — Douleur extérieure au front, pressive, engourdissante.

Cuisson aux yeux. — Pupilles d'abord très resserrées, ensuite dilatées. — Affections nerveuses des yeux. — Vue double. — Les lettres semblent se renverser en lisant. — Tout ce qu'on voit est entouré d'un cercle iridé. — Les objets qui environnent paraissent vacillants. — Perte de la vue avec vertiges, en marchant. — En fixant long-temps un objet on perd la pensée. — Photophobie. — Diplopie ou obscurcissement de la vue, qui alterne avec la dureté de l'ouïe.

Ouïe émoussée.

Visage pâle avec froid des mains et de la face. — Éruption chronique à la face, confluente, suppurante, avec douleur de cuisson. — Croûtes brûlantes qui donnent un suintement jaunâtre sur la lèvre supérieure, aux joues et au menton.

Douleur de coup ou d'écorchure à l'aile du nez. — Croûtes dans les narines. — Il coule du pus jaunâtre du nez.

Ulcérations douloureuses aux lèvres. — Gonflement douloureux des glandes sousmaxillaires. — Trismus. — Besoin de grincer des dents.

Écume dans la bouche et sur les lèvres.— Vésicules, sur le bord de la langue, blanches et douloureuses au toucher. — Ulcère douloureux au bord de la langue.— Parole difficile avec secousse dans la tête et dans les bras en prononçant. — Mutisme. Impossibilité d'avaler. — La gorge est comme serrée.

Manque d'appétit par sensation de sécheresse à la bouche. — Satiété et pression à l'estomac après la première gorgée. — Grand désir de manger du charbon. — Grande soif (pendant les crampes).

Hoquet violent, bruyant. — Régurgitation d'un liquide amer, jaunâtre, en se baissant, suivie de cuisson dans la gorge.

Nausées le matin et pendant le repas.

Vomissement de sang.

Pression brûlante à l'estomace — Battement dans l'épigastre, qui est ballonné. — Anxiété dans la région précordiale.

Tranchées dans le bas-ventre, immédiatement après le repas, avec somnolence.
— Pincements et borborygmes dans le bas-ventre. — Mal de ventre avec convulsion produit par des vers, chez les enfants. — Grande accumulation de vents qui cause de l'anxiété et rend morose. — Douleur d'ulcération dans l'aine.

Constipation. — Selles liquides, trop fréquentes.

Rétention d'urine. — Envie fréquente d'uriner. — Incontinence d'urine.

Crampes des femmes en couche. — Hystérie. — Retard des règles.

Obstruction des narines, avec sécrétion abondante de mucus. — Oppression de poitrine. — Asthme. — Enrouement.

Sensation d'une masse qui presse sur la poitrine et qui rend la respiration difficile. — Chaleur dans la poitrine. — Douleur de coup et d'excoriation au cartilage xiphoide. — Cuisson dans les mamelles.

Renversement du dos. — Tension avec douleur vive dans les muscles du cou, en renversant la tête. — Le cou est gonfié. — Tension au-dessous des omoplates. — Douleur d'ulcération sur les omoplates.

Douleur de coup ou d'excoriation dans l'acromion et dans les avant-bras. — Pesanteur et faiblesse dans les bras. — Tressaillement et secousses dans les bras et

dans les doigts. — Paralysie des doigts.

Tressaillement involontaire dans les membres inférieurs. — Sensation de raideur douloureuse dans les membres inférieurs. — Tremblement des jambes. — Flexion des genoux involontaire, en marchant.

Tremblement des membres. — Secousse comme électrique à travers la tête et les membres. — Convulsion générale. — Consulsion épileptique. — Accès de catalepsie. — Tétanos. — Contorsion convulsive les membres. — Tressaillement et secousse de la tête. — Renversement de a tête. — Douleur d'excoriation ou de contusion dans différentes parties.

Prurit général, brûlant. — Éruption farulente à la tête, aux oreilles, devant derrière.

Insomnie nocturne avec sueur. — Demi-sommeil avec jactation et rêves confus. — Fréquent réveil avec sueur folente. — Rêves des choses qui ont occupé le jour précédent.

Besoin continuel de se chauffer. — Froid ux jambes, aux bras, avec entraîneuent de fixer les regards sur un point.

Un récit triste affecte profondément.

Gémissements et hurlements. — Méontentement de son sort. — Caracère soupçonneux. — Misanthropie. —
brande disposition à s'effrayer; élancenents dans la tête pendant la frayeur. —
Manie avec danse, rires, et gestes comimes.

## 35. CINA.

UR. D'ACT., 15 jours.—ANTID : Incon.—Puiss., III.

Céphalalgie pressive engourdissante, omme par un poids lourd, surtout en marchant au grand air.—Céphalalgie dénirante, pressive, augmentée par la lectre et la contemplation. — Céphalalgie buse le matin avec fatigue des yeux.—éphalalgie alternant avec une pression ans le bas-ventre.

Pression dans les yeux par les efforts qu'on fait pour lire. — Tressaillement spasmodique des muscles sourciliers. — Vue trouble qui se rétablit en frottant les yeux.

Tressaillement spasmodique dans l'oreille extérieure.

Pâleur de la face avec air maladif autour des yeux.—Face bouffie, bleuâtre, surtout autour de la bouche. — Douleur pressive ou élancement obtus au-dessous de l'apophyse mastoïde; elle est douloureuse au toucher, comme si elle était brisée. — Prurit dans le nez.

Endolorissement des dents par l'air et les boissons froides.

Impossibilité d'avaler les liquides.

Grande faim bientôt après le repas.

Boulimie. — Soif violente.

Vomissement de vers lombrics.

Pincements continuels dans le ventre.—
Tension douloureuse autour du nombril;
il est douloureux à la pression. — Maladies vermineuses.—Douleur comme celles
d'enfantement dans le bas-ventre, ou
comme pour la menstruation.

Selles diarrhéiques de consistance de bouillie.

Fréquente envie d'uriner, urine abondante. — Pissement au lit. — Urine qui se trouble bientôt en se refroidissant.

Éternuement si violent que la poitrine semble devoir éclater, et qu'on éprouve une sensation d'écartement dans les tempes. — Coriza fluent avec ardeur dans les narines. — Écoulement de pus par le nez. — Respiration courte, quelquefois interrompue. — Sifflement dans la trachée-artère en respirant. — Abondance de mucosités dans la trachée-artère le matin, qui se renouvelle après l'expuition.

Toux produite par une respiration profonde. — Toussotement avec un ton enroué, le soir. — Toux avec soubresaut subit et perte de connaissance. — Toux

Cinnabaris.

suivie d'angoisse, de pâleur de la face, de gémissement, et du besoin de chercher l'air. — Coqueluche.

Serrement de poitrine, oppression angoissante. — Oppression de poitrine, comme si le sternum était déprimé.

Douleur de brisure dans le sacrum ou dans le dos, qui n'est pas augmentée par le mouvement. — Déchirement tiraillant dans tout le dos.

Douleur paralytique tiraillante dans les membres supérieurs et inférieurs. - Contraction crampoïde de la main. - Tressaillement dans les doigts. - Extension spasmodique des pieds. — Élancements brûlants ou obtus et pressifs dans différentes parties. — Déchirement crampoïde dans les muscles étant assis; ils disparaissent au grand air. - Sensibilité douloureuse de tous les membres pendant le mouvement et en saisissant quelque chose. - Convulsions avec sensation paralytique. - Convulsions épileptiques avec conservation des sens (éclampsie). - La plupart des symptômes paraissent étant assis et pendant la nuit.

Bâillements fréquents avec tremblement du corps et sensation d'horripilation. — Insomnie nocturne avec grande jactation, cris et pleurs.

Horripilation fréquente avec tremblement, même près du feu. — Fièvre intermillente avec vomissement et boulimie. — Sueur froide aux mains et au front.

Pleurs. — Agitation, inquiétude, désir de posséder différentes choses qu'on repousse bientôt. — Grande angoisse et peur en marchant à l'air libre.

# 36. CINNABARIS.

Dur. n'act., 15 jours.—Antid.: Hep., sul., cal., sulph., camph., op., chin., nitr.-ac., élect.—Puiss., X.

Accès de céphalalgie véhémente frontale et temporale; elle est diminuée par la compression de la tête. — Bruissement dans la

tête, qui rend étourdiaprès le dîner et le soir.

Elancement du dedans en dehors dans les parties extérieures de la tête, seulement pendant la journée. — Le crâne et les cheveux sont douloureux au toucher.

Inflammation des yeux avec douleur, pression élançante et larmoiement quand on fixe quelque chose.

Brûlure avec contraction au palais. — Salivation. — Chaleur et sécheresse pen dant la nuit dans la bouche, avec soi vive. — Mal de gorge pressif, contracti pendant le mouvement de la déglutition.

Défaut d'appétit, avec dégoût pour tous les aliments. — Grand appétit pour le manger et les boissons, avec grande propension au coit. — La nuit, il s'élève une grande chaleur de l'estomac au cou et la tête, ce qui cesse en se redressant.

Pincements dans le ventre, suivis d selles fréquentes et molles.—Diarrhée noc turne chronique, sans mal de ventre.

Douleur vive dans l'urêtre en urinant Gonflement du pénis. — Gonorrhe bâtarde avec rougeur et gonflement du pre puce. — Éruption granuleuse au gland. — Condylômes. — Appétit vénérien tre augmenté. — Forte érection le soir a lit.

Leucorrhée avec pression au vagi pendant l'écoulement.

Violent coriza fluent avec écoulemes d'une eau âcre.

Toux sèche par secousses isolées, étar couché.

Palpitations et élancements dans poitrine, surtout en marchant.

Déchirement dans un côte du dos, nuit, pendant le mouvement, et au bra en écrivant, diminué par la chaleur. — Douleur d'entorse dans les vertebre du cou. — Fort élancement dans le bra

Sueur fétide causant des excoriation entre les cuisses en marchant. — Tre saillement douloureux dans les jambes le soir après s'être endormi. Froid dans les articulations. — Horripilations et tiraillements dans les bras et dans les jambes. — Sensation de ballonnement incommode dans le corps, avec oppression de poitrine et pression sur l'estomac. — Les membres sont perclus, avec faiblesse et somnolence.

Insomnie la nuit; cependant on est sans fatigue le matin. — Cauchemar après minuit.

## 37. CLEMATIS ERECTA.

Dur. p'acr., 6 sem. — Antid.: Camph., bryon. — Puiss., III.

Pesanteur dans la tête et étourdissement le matin. — Térébration aux tempes. — Tension douloureuse au front et dans la partie latérale droite de la tête, comme si elle était dans les os. — Fouillement pressif dans le cerveau. — Martellement dans la tête. — Déchirement brûlant dans la peau du front.

Boutons purulents au front, douloureux au toucher.

Démangeaison dans les yeux et au bord des paupières, surtout enfermant les yeux. Élancements dans les angles des yeux. — Pression sur le globe de l'œil. — Ophtalmie avec fort larmoiement. — Photophobie.

Cuisson à l'oreille extérieure. — Tintement d'oreilles.

Face pâle, maladire. — Ardeur à la peau de la joue gauche. — Douleur incisive dans la lèvre inférieure. — Cancer des lèvres. — Éruption de vésicules à la lèvre. — Boutons suppurants au menton. — Gonflement des glandes sous-maxillaires, qui forme tumeur dure, tendue, avec battement et douleur au toucher. — Boutons qui suppurent à la racine et à la pointe du nez, et qui sont douloureux autoucher.

Douleur d'excoriation aux gencives des dents molaires, en mangeant. -

Odontalgie nocturne qui, étant couché, s'exaspère jusqu'à faire naître le désespoir, et cause grande inquiétude; agitation, faiblesse, anxiété; on ne peut supporter d'être découvert. — Odontalgie élançante ou tiraillements par saccade; elle se propage sur tout le côté de la tête et rend inapte au travail de l'esprit. — Odontalgie augmentée par la fumée du tabac.

Elancements térébrants et obtus dans la racine de la langue. — Le matin langue sèche. — Expuition de salive sanguinolente.

Satiété qui dure long-temps, avec sapidité des aliments.

Malaise pendant qu'on fume du tabac, avec faiblesse des membres.

Douleur de froissement dans la région hépatique, au toucher et en se baissant.

— Contraction incisive dans la région rénale en marchant. — Pression à travers l'anneau inguinal, comme s'il s'y formait une hernie. — Gonflement des glandes de l'aine avec douleur tressaillante. — Induration des glandes de l'aine.

Selles fréquentes, diarrhéiques, sans coliques.

Contraction et rétrécissement de l'urètre avec sortie d'urine par jet entrecoupé ou par goutte. — Ardeur dans l'urètre quand on commence à uriner. — Tiraillement dans le cordon spermatique en urinant. — Augmentation de l'urine. — Emisssion de pus par l'urètre.

Gonflement douloureux et inflammation des testicules. — Induration des testicules. — Epaississement du scrotum. — Tiraillements dans les testicules et les cordons spermatiques, jusque dans l'aine et la cuisse. — Cuisson dans la verge pendant l'écoulement du sperme dans le coît. — Dégoût pour les plaisirs vénériens, comme si on en avait abusé.

Violent coriza fluent avec écoulement abondant.

Coups obtus et forts dans le côté gauche de la poitrine et du ventre. — ElanClematis erecta.

cements dans la poitrine, accrus par la

respiration. — Induration des glandes mammaires. - Cancer des mamelles.

Gonflement des glandes axillaires. -Pression et tiraillements dans les articulations des membres supérieurs. - Nodosités arthritiques des articulations des doigts.

Douleur de déchirement dans les cuisses. - Éruption de pustules autour des lombes. - Dartres écailleuses aux cuisses. - Furoncles aux cuisses.

Tressaillement des muscles dans différentes parties du corps. - Relâchement des muscles .- Grande maigreur. - Faiblesse de tous les membres, surtout après le repas, avec battement dans les artères. - Vibration générale après s'être couché.

Eruption d'ampoules sur tout le corps. -Dartres écaillleuses avec écoulement de sanie jaunâtre rongeante. - Dartres chroniques rouges, humides, avec prurit insupportable à la chaleur du lit. - Cuisson, fourmillement et battement dans les ulcères, avec élancement dans leurs bords quand on les touche.

Grande somnolence pendant le jour, même le matin, après s'être levé. — Insomnie le soir et la nuit. - Inquiétude nocturne avec rêves et agitation.

Fièvre quarte avec horripilation suivie de sueur.-Sueur au réveil, on ne peut supporter d'être découvert.

Humeur morose.—Éloignement pour la conversation. — Tristesse et crainte. — Indifférence.

### 38. COCCULUS.

Dur. D'ACT., 9 jours .- ANTID.: Camph .- Puiss., X-

Vertiges comme par ivresse avec vomiturition en se redressant, ce qui force à se tenir couché.

Étourdissement surtout après avoir mangé ou bu.

Céphalalgie comme si la tête était creuse

et vide. - Céphalalgie comme si les yeux étaient arrachés. — Céphalalgie avec battement tantôt au vertex, tantôt dans les tempes. — Tremblement convulsif de la tête.

Cocculus.

Pression dans les yeux avec impossibilité d'ouvrir les paupières la nuit. - Vue trouble, on voit voltiger des mouches noires devant les yeux.

Chaleur passagère des joues .- Face rouge brûlante. - Le visage est rouge bouffi. - Cercle bleu autour des yeux.

Odontalgie des dents creuses seulement en mangeant. - Ebranlement des dents avec gonflement des gencives. - Gonflement dur des glandes sous-maxillaires.

Sécheresse de la gorge.—Ardeur dans la gorge. - Sensation de constriction et de paralysie dans la gorge.

Sécheresse de la bouche sans soif. -Langue jaune chargée.

Goût métallique. - Goût acide, surtout après le dîner et en toussant. - Soif des boissons froides, surtout pour la bière. -Soif surtout en mangeant. - Dégoût au plus haut degré pour tous les aliments et les boissons. - Le pain a un goût acide.

Renvois fréquents à vide. — Renvois fétides avec vomiturition. - Rapports putrides. - Rapports avec douleur à l'estomac et à la région précordiale.

Accès de malaise jusqu'à l'évanouissement. - Malaise avec envie de vomir. - Malaise et vomissement par le mouvement de la voiture.-Envie de vomir produite par le refroidissement avec forte salivation. --Envie de vomir avec céphalalgie et douleur de meurtrissure dans les entrailles. -Envie de vomir en mangeant.

Crampes violentes de l'estomac. — Contraction de l'estomac.—Pincements dans la region précordiale, avec gêne de la respiration. - Plénitude d'estomac avec oppression. - Anxiété dans l'épigastre. - Crampes d'estomac immédiatement après le repas.

Pincements et contraction dans le haut du ventre qui gêne la respiration,-Douleur pressive au-dessous de la dernière vraie côte droite, augmentée par la toux et en fléchissant le corps. — Douleur pressive comme par une pierre dans la région du nombril et du bas-ventre. — Élancements dans la région hépatique (et entre les omoplates et au sacrum). — Douleur d'ulcération dans le ventre à chaque mouvement. — Ballonnement du ventre par des flatuosités. — Coliques de vents spasmodiques, après minuit. — Crampes du bas-ventre chez les femmes. — Hernie inguinale.

Selles dures difficiles. — Constipation. — Selles molles jaunes qui brûlent l'anus en passant.

Urine aqueuse ( avec fréquente envie d'uriner ).

Prurit au scrotum.—Douleur de froissement tiraillante dans le testicule. — Sensibilité augmentée et sur-excitation des parties génitales avec désir du coît.

Crampes produites par le retard ou la cessation trop prompte des règles. — Menstruation trop hâtive avec crampes dans le bas-ventre. — Leucorrhée. — Leucorrhée séreuse mêlée de pus et sanie; il s'échappe de l'utérus du mucus mêlé de sang pendant la grossesse.

Coriza avec ulcération des narines.

Toux fatigante avec oppression de poitrine qui n'a lieu que pendant la toux.

Toux chaque quatrième nuit de minuit à deux heures, avec sensation de resserrement du larynx, ce qui force à tousser.

La respiration est entrecoupée comme si le larynx était contracté.

Pesanteur sur la poitrine comme par une pierre.—Contraction de la poitrine. —Constriction tensive (du côté droit) de la poitrine avec oppression.—Congestion vers la poitrine avec anxiété.

Elancements douloureux isolés dans les muscles du bras, dans l'articulation axillaire pendant le repos. — Douleur élançante déchirante qui naît d'un ulcère de l'index et s'étend (jusqu'à la poitrine). — Engourdissement des mains.

Contraction spasmodique des doigts.
Tressaillement dans les doigts.

Craquement du genou pendant le mouvement, brûlure dans les pieds. — Gonflement chaud, pruriant des pieds. — Gonflement des pieds le soir. — Sueur froide des pieds.

Goutte aiguë des mains et des genoux avec gonflement et chaleur. - Endolorissement des membres au toucher. LES SYMPTÔMES SE MONTRENT SURTOUT EN ALLANT EN VOITURE. - Mal de mer. -Tous les symptômes, surtout ceux de la TÊTE, AUGMENTENT PAR LA BOISSON, LE MAN-GER, LA PAROLE ET PAR LE SOMMEIL. -Tiraillements sensibles, engourdissements continuels et par secousses dans tous les membres comme dans les os .- LA TRISTESSE EST SOU-VENT COMPAGNE DE CES SYMPTÔMES. - Raideur douloureuse des membres. - Craquements dans les articulations. - La fumée du tabac et le café augmentent tous les symptômes. - Symptômes d'un seul coté.

Élancements douloureux et chaleur au toucher dans l'engorgement froid des glandes. Prurit le soir quand on quitte ses vêtements. — Prurit nocturne fort quand on couche sur la plume.

Crampe quand on touche un ulcère au doigt. — Mouvement convulsif des membres quand on essaie à s'en servir. — Tremblement des membres et secousses électriques à travers le corps. — Douleur crampoïde avec tristesse.

Faiblesse à la suite d'une grande fatigue. — Perte des forces par le plus léger
mouvement et quand on se prive d'une
partie de son sommeil. — Accès d'évanouissement. — Grande faiblesse du
corps, on a de la peine à se tenir debout.
— Disposition à trembler. — Accès d'engourdissement passager, tantôt des pieds,
tantôt des mains. — Paralysie. — Hémiplégie. — Paralysie du bras et du pied gauches avec le sentiment du froid. — Perte
du mouvement du bras droit et de la
jambe avec engourdissement.

Soubresaut dans le sommeil. - Som-

nolence continuelle le matin. — Sommeil interrompu par une très grande anxiété et agitation. — Assoupissement sans sommeil. — Rêves anxieux, effrayants.

On ne peut supporter le Grand air (froid ou Chaud). Transpiration au plus léger mouvement. — Fièvre intermittente avec frissonnement, et cependant la peau est chaude au toucher. — Fièvre lente nerveuse. — Fièvre gastrique nerveuse. — Fièvre bilieuse.

Toutes les idées sont dirigées vers une chose désagréable. — On est plongé dans ses réflexions, sans prendre garde à ce qui se passe autour de soi. — Disposition à s'effrayer. — Peur de la mort. — Grande sensibilité morale. — Disposition à s'offenser de tout, avec irascibilité. — Manie.

#### 39. COFFEA CRUDA.

Dur. D'Act., quelques jours. — Antid.: Acon., nux., cham., ign.—Puiss., X.

Mauvaise suite d'ivresse de vin.

Augmentation d'activité du cerveau; les forces intellectuelles sont plus grandes et l'imagination plus vive.

Hémicranie comme par un clou qui serait enfoncé dans le pariétal.

Céphalalgie comme si le cerveau était froissé ou déchiré. — Congestion vers la tête en parlant. — Pesanteur de la tête.

Ouïe trop sensible. Les sons résonnent trop fortement dans l'oreille.

Épistaxis avec pesanteur de tête.

Odontalgie nocturne ou qui se montre après avoir mangé, avec inquiétude, anxiété et pleurs. — Douleur vive dans la gorge avec gonflement du voile du palais.

Goût dans la bouche comme celui des amandes douces. — Le tabae est particulièrement sapide. — Dérangement de l'estomac par surcharge. — Boulimie.

Anxiété et oppression de la région précordiale avec poids; on est obligé de desserrer ses vêtements. — Crampes donloureuses, pression élancante.

Douleur du bas-ventre chez les femmes avec sensibilité qui va jusqu'à produire le désespoir.

Selles fréquentes diarrhéiques.—Diarrhée pendant la dentition.

Urine abondante surtout après minuit.

— Relâchement des parties génitales.

— Grand appétit vénérien. — Les parties génitales sont très excitées sans émission de sperme.

Grande sensibilité des parties génitales chez les femmes avec prurit violent, forte sécrétion de mucosité et fréquent écoulement de sang. — Métrorrhagie. — Douleur violente d'enfantement. — Lochies douloureuses.

Toux sèche brève avec forte irritation dans le larynx et jactation anxieuse.

Contraction spasmodique des doigts.

—Tremblement des mains quand on veut saisir quelque chose.

Tremblement des pieds. — Crampes dans le mollet quand on étend le jarret. — Crampes dans la plante du pied en courbant le pied.

Les symptômes augmentent en marchant au grand air. — Très grande sensibilité des parties malades. — Grande mobilité du système musculaire. — Facilité de locomotion. — Apoplexie. — Douleur avec pleurs après le refroidissement.

Miliaire pourpré.-Rougeole.

Insomnie. — Besoin de se coucher, de fermer les yeux, sans pouvoir dormir.

Chaleur augmentée, fébrile. — Etoignement pour le grand air. — Fatigue quand on marche à l'air libre. — Frissonnement (avec chaleur du corps).

Exaltation des forces vitales.—Grande sensibilité physique et morale. — Sensibilité chez les femmes en couches. — Suites fâcheuses d'une grande joie. — Hurlements et cris avec jactation pendant les douleurs. — L'at moral penible. — (Ce médicament peut détruire les mauvais effets d'une affection morale survenue pendant

le cours d'un traitement, de manière à ne pas nuire à l'action des médicaments donnés antérieurement).—Pleurs.

#### 40. COLCHICUM AUTUMNALE.

DUR. D'ACT., 3 sem .-- ANTID.: Nux., puls.-- Puiss., V.

Faiblesse de la mémoire. — Oubli facile.

Pression dans l'occiput produite par un travail de l'esprit. — Céphalalgie pressive surtout au-dessus des yeux. — Déchirement dans le côté gauche de la tête. — Fourmillement dans le front ou sur la tête.

Contraction visible dans la paupière inférieure. — Gonflement de la paupière inférieure. — Ulcération des glandes de Meibomius. — Tiraillements fouillants dans la profondeur des yeux.

Étreinte dans l'oreille, déchirante, élancante.—Sensation d'obturation des oreilles. — Fourmillement dans les oreilles comme par l'effet du froid

Face maladive souffrante.—Aspecttriste.

— Tiraillements par secousses dans les muscles et les os de la face. — Sensation d'écartement dans les os de la face. — Contraction des masseters avec difficulté d'ouvrir la bouche.— Douleur de crampe dans l'articulation de la mâchoire. — Déchirement dans la partie (gauche) de la face jusque dans l'oreille et dans la tête. — Fourmillement dans la peau de la face comme par l'effet du froid.

Pesanteur pressive dans les os du nez.

— Très grande sensibilité de l'odorat. —
Douleur d'excoriation dans la cloison des
narines, surtout au toucher.

Lèvres gercées. — Déchirement dans la lèvre inférieure.

Ardeur dans la bouche. — Déchirement dans le pharynx. — Salivation abondante, aqueuse, avec sécheresse de la gorge. — Pesanteur, raideur, insensibilité de la langue.

Sensation de gonflement à l'entrée de l'œsophage. — Fourmillement dans le pharynx. — Inflammation du pharynx. — Constriction de la gorge. — Accumulation de beaucoup de mucosité verdâtre dans la gorge et la bouche.

Déchirement dans les gencives.—Sensibilité des dents en serrant. — Odontalgie déchirante.

A la vue et par l'odorat on se dégoûte des aliments. — Insapidité des aliments. — Soif forte surtont pour le café.

Renvois fréquents d'air. — Hoquet continuel.

Malaise, presque évanouissement par l'odeur des œufs frais et de laviande grasse.

— Malaise pendant le dîner.— Nausée après avoir avalé sa salive. — Vomissement de bile. — Vomissement d'aliments.

Au toucher, sensibilité de la région de l'estomac. — Sensation de froid à l'estomac. — Sensation d'excoriation et de fourmillement dans l'estomac. — Brûlure dans l'estomac.

Plénitude et ballonnement du ventre. — Pression de dedans en dehors dans la partie supérieure du ventre. — Douleurs d'excoriation dans le côté gauche du bas-ventre au toucher. — Brûlure et pression dans la région de la vessie et les parties génitales intérieures. — Hydropisie du ventre.

Constipation. — Selles difficiles insuffisantes. — Selles incomplètes avec envie d'aller. — Selles involontaires. — Diarrhée de mucosités, transparente, gélatineuse. — Selles sanguinolentes avec fausses membranes. — Diarrhée épidémique d'autonne avec beaucoup de symptômes gastriques. — Chute du rectum. — Fourmillement, prurit et ardeur dans l'anus. — Déchirement dans l'anus. — Crampes dans le sphincter du rectum.

Fréquente envie d'uriner. — Urine limpide abondante. — Diminution de l'urine; elle est foncée et cause en sortant brûlure et tenesme. — Ardeur dans les voies urinaires. — Émission avec douleur d'une petite quantité d'urine brûlante. — Urine d'un brun noir. — Douleur déchi-

Colchicum autumnale.

rante, incisive, tiraillante dans l'urètre. Déchirement dans le cordon sperma-

tique.

Règles trop hâtives.

Coriza chronique. -On mouche beaucoup de mucus épais.

Oppression de poitrine, gêne de la respiration. - Fourmillement dans la trachéeartère.

Fourmillement sur la poitrine. — Oppression tensive, pressive. - Oppression périodique. — Crampe de la poitrine. — Hydrothorax. - Elancement dans la poitrine pendant et hors le temps de la respiration. - Déchirements et élancements obtus dans la poitrine. - Douleur d'excoriation dans la poitrine au toucher et pendant ce mouvement. - Forte palpitation de cœur.

Déchirements dans le dos. - Douleur d'écorchure dans le sacrum au toucher. -Tension élançante entre les omoplates.

Déchirements dans les bras, les mains et les doigts. - Douleur de paralysie dans le bras. - Tremblement des mains, contraction des doigts. - Fourmillement dans les doigts comme par l'effet du froid, - Insensibilité des pointes des doigts.

Déchirement dans les cuisses, les pieds et les orteils. — Tiraillement paralytiques dans les cuisses. - Gonflement ædémateux des jambes avec déchirement pendant le mouvement. - Fourmillement des orteils comme par l'effet du froid.

Affections rhumatismales et goutteuses. Déchirements dans les membres et les autres parties. - Tiraillements élançants par secousses dans les muscles et dans le périoste. - Élancements dans les articulations. Faiblesse paralytique des muscles. - Douleurs qui sont suivies d'engourdissement et d'une véritable paralysie; les symptômes sont augmentés par les travaux intellectuels .- Les douleurs sont les plus fortes depuis le commencement de la nuit jusqu'au point du jour. - Douleur (d'excoriation) augmentée par le toucher. - Le toucher, la lumière vive, les contrariétés mettent hors de soi.

On se réveille souvent avec frayeur, on croit avoir des souris dans son lit.

Grand abattement d'esprit avec lassitude. - Un si grand endolorissement qu'on ne peut se mouvoir sans gémir.

#### 41. COLOCYNTHIDIS.

Dur. D'Act., 30 jours. - Antid.: Caust., cham., coff. -Puiss., VIII, X.

Vertiges comme si on devait tomber, en tournant vite la tête, avec faiblesse des genoux.

Céphalalgie comme par un courant d'air; elle disparaît au grand air. - Céphalalgie frontale pressive, aggravée en se baissant et étant couché sur le dos. - Accès de migraine à la tête, dans le côté gauche, qui revient tous les jours à cinq heures du soir.-Hémicranie pressive.-Hémicranie tiraillante. - Céphalalgie violente, déchirante. - Congestion de sang vers la tête. Madada Mad

Douleur brûlante dans la peau du front au-dessus des paupières et au cuir chevelu.

Déchirements brûlants dans les yeux. - Inflammation arthritique des yeux. -Sortie d'humeur âcre des yeux.

Relâchement et pâleur de la face. -Douleur déchirante, tensive à la face.

Battements et fouillements dans l'intérieur du nez.

Odontalgie comme si les nerfs étaient tendus.

Apreté de la langue.

Appétit diminué avec grand désir de boire sans soif et goût fade après avoir bu.

Douleur violente de colique (ces coliques sont déchirantes, incisives, accompagnées de contraction et de serrement comme avec une griffe ) elle force à se fléchir, et cause une agitation générale, du frisson à la face qui paraît s'élever du bas-ventre.-Constriction des intestins, - Pincements et picotements dans le ventre qui diminuent par le mouvement. - Tranchées

comme par des coups de couteau avec froid et déchirement dans les jambes. — Grande sensibilité et brisement dans le ventre. — Gonflement du bas-ventre. — Tympanite av ec de violentes coliques comme si les intestins étaient serrés entre des pierres. — Sensation de vide dans le bas-ventre. — Pression des deux côtés du bas-ventre vers les parties génitales avec émission du sperme.

Déjections alvines diarrhéiques, jaunes, écumeuses, verdâtres d'une odeur acide, fétide ou putride.—Diarrhée muqueuse.
—Selles sanguinolentes.—Constipation.
—Contraction du rectum pendant la selle.
—Hémorrhoïdes gonslées, douloureuses.
—Hémorrhoïdes aveugles. — Écoulement de sang par l'anus.

Sécrétion d'urine diminuée. — Envie inutile d'uriner. — Urine fétide qui bientôt devient épaisse, gélatineuse et collante. — Pendant les douleurs écoulement d'une urine claire et abondante, glutineuse.

Impuissance absolue. — Rétraction du prépuce derrière la couronne du gland.

Toussotement sec produit par irritation de la voix.—Toussotement en fumant du tabac. — Phthisie trachéale. — La nuit accès d'asthme. — Gêne de la respiration produite par compression.—Nœuds douloureux des mamelles.

Tension au cou et aux omoplates. — Gonflement des glandes axillaires avec suppuration. — Traction dans les tendons du pouce. — Douleur de crampe dans la main qui empêche de l'ouvrir.

Douleur tensive élançante dans les lombes et dans les hanches. — Douleur dans les lombes et la région des reins jusque dans les jambes. — Douleur dans la cuisse droite en marchant comme si le psoas était trop court.—Sciatique chronique et aiguë. — Élancements dans différentes parties des jambes, surtout pendant le repos. — Difficulté de fléchir le genou. — Lourdeur comme du plomb et tremblement dans les jambes. — Déchirement dans la plante du pied pendant le jour.

—Raideur dans toutes les articulations. —Élancements déchirants le long de tout le corps. — Contraction dans tous les membres qui force à fléchir le corps. —Raccourcissement général des tendons. — Faiblesse en marchant au grand air. —Évanouissement avec froid des parties extérieures. — Mauraises suites du chagrin.

Prurit désagréable avec grande agitation du corps, surtout le soir au lit, suivi de sueur. — Écaillement général de la peau.

Sommeil agité. — En dormant couché sur le dos, on porte toujours une main sur l'occiput.

Froid et frisson avec chaleur de la face sans soif.—Sueur nocturne à la tête, aux mains, aux jambes, aux pieds, avec odeur d'urine. — Anxiété, abattement moral avec taciturnité. — Anxiété et inquiétude. —Pleurs.

### 42. CONIUM MACULATUM.

Dur. D'ACT., 30 jours. — ANTID.: Éth. nitr., coff. — Puiss., X.

Vertiges tournoyants en se redressant.

— Vertiges en regardant derrière soi, comme si le malade allait tomber de côté.

—La plus petite quantité de liqueur spiritueuse enivre.

Oubli. — Difficulté à comprendre. — Faiblesse de mémoire.

Céphalalgie frontale lancinante chronique.

Élancement au sommet de la tête. —
Accès de céphalalgie déchirante qui oblige
à se coucher. — Céphalalgie étourdissante
quand on marche à l'air libre, pesanteur
de la tête. — Grande sensibilité du cerveau
même par la parole et le moindre bruit.

Sensation de froid dans les yeux en marchant au grand air.—Inflammation de la sclérotique.—Couleur jaunâtre de la sclérotique.—Prurit au-dessous des yeux et cuisson vive quand on les frotte.—Élancements pruriants ou démangeaisons dans les angles internes.—Prurit dans

Aspect terne des yeux.

Chaleur à la face. — Couleur pâle-bleuâtre de la face ( et souvent gonflement ).

—Prurit à la face. — Éruption pruriante à
la face. — Éruption boutonneuse au front.

Élancements dans l'oreille en marchant à l'air libre.—Élancements et déchirement dans et autour des oreilles. — Élancements tiraillants dans les oreilles du dedans en dehors. — Accumulation de cérumen. — Cérumen de couleur rouge de sang.—Bourdonnement, tintement et bruissement dans l'oreille. — Sensibilité douloureuse de l'ouïe. — Induration des parotides.

Sensation de sécheresse pénible dans le nez. — Écoulement de pus par le nez. — Odorat très sensible (épistaxis).

Lèvressèches qui s'exfolient.—Ampoules et ulcères aux lèvres. — Cancer des lèvres.

Tiraillements dans les dents en allant au grand air. — Élancements dans les dents. — Élancements dans les dents creuses en mangeant froid (non en buvant froid).

Gonflement de la langue.—Difficulté à parler.

Déglutition difficile. — Mouvement involontaire de déglutition. — En marchant contre le vent on est obligé d'avaler souvent. — Grattement dans la gorge. — Crampe dans le gosier.

Le pain est sans goût et ne peut être avalé. — Boulimie. — Amertume dans la bouche et dans la gorge.

Fréquents renvois à vide tout le jour. — Renvois bruyants.—Renvois avec le goût des aliments.—Renvois incomplets avec sensation de plénitude dans la fossette du cou. — Sensation comme si une boule

s'élevait de la région précordiale. — Pyrosis qui remonte jusqu'à la gorge après le repos. — Renvois acides après le dîner.

Nausées avec envie de vomir et appétit nul. — Nausées des femmes enceintes.

Pesanteur à l'estomac après avoir mangé. — Constriction douloureuse à l'estomac. — Tension douloureuse autour des hypochondres, qui sont comme serrés par un lien. — Douleur d'excoriation dans l'estomac.

Pression, élancement et déchirement dans la région hépatique. — Torsion et fouillement dans la région du nombril. — Douleur de plaie dans le bas-ventre en marchant sur le pavé. — Contraction pressive du bas-ventre. — Plénitude dans le bas-ventre le matin, au réveil. — Gonflement subit du bas-ventre, après avoir bu du lait. — Borborygmes et grouillement dans le ventre. — Tranchée pendant l'expulsion des vents.

Constipation avec efforts inutiles pour aller à la selle. — Selles dures tous les deux jours. — Déjections alvines avec diarrhée de matières non digérées, et coliques. — Diarrhée affaiblissante.

Urine fréquente et involontaire pendant la nuit. — Pression sur la vessie, comme si l'urine allait s'échapper. — En urinant, le jet s'arrête subitement et ne recommence qu'au bout de quelques moments. — Douleur incisive dans l'urêtre en urinant. — Brûlure dans l'urêtre après avoir uriné. — Urine épaisse, trouble, blanchâtre. — Pissement de sang.

Impuissance avec défaut d'érection. — Érection imparfaite et de peu de durée. — Défaut d'énergie dans l'acte vénérien. — Émission de sperme facile avec érection faible. — Pollutions excessives.

Règles trop hâtives et trop peu abondantes.

— Suppression des règles. — Pression vers en-bas et tiraillements dans les cuisses pendant les règles. — Crampes de l'uterus. — Elancement dans le vagin et pression vers en-bas. — Élancements dans les lèvres. — Fouillement au-dessus

des parties génitales, avec ballounement du ventre et élancements qui s'étendent au côté gauche de la poitrine. — Prurit aux parties génitales. — Stérilité avec suppression des règles. — Leucorrhée acre, brûlante, précédée de coliques.

Obstruction du nez le matin. — Obstruction chronique des deux narines. — Accès de suffocation, comme si la gorge était obstruée. — Affections de la trachée-artère.

Toux seche spasmodique. — Toux suffocante avec chalcur passagère. — Toux avec mal de ventre. — Coqueluche avec crachats sanguinolents ou par accès nocturnes. — Toux produite par un chatouillement dans la gorge. — Toux des femmes enceintes. — Toux chez les sujets scrofuleux.

Oppression de poitrine le matin au réveit.

Respiration courte en marchant.

Gêne de la respiration avec douleur de poitrine le soir au lit. — Pneumonie nerveuse. — Secousses dans la poitrine. — Induration et élancement douloureux des mamelles. — Élancements au sternum.

— Inflammation des mamelles. — Cancer des mamelles. — Squirre des glandes des seins après des contusions. — Palpitations du cœur après avoir bu. — Flétrissure, dessèchement des mamelles.

Serrement et compression au-dessus des hanches. — Douleur dans le sacrum en renversant le trone. — Douleur de plaie dans les vertèbres cervicales inférieures. — Tension de la nuque.

Douleur dans les aisselles, comme écorchées par une pression. — Engourdissement des mains, surtout dans la paume. — Sueur dans la paume des mains. — Dartres humides, croûteuses, brûlantes à l'avant-bras. — Panaris. — Ongles jaunes.

Douleur tiraillante dans les hanches.

— Lassitude dans les genoux. — Gonflement douloureux du pied. — Froid des pieds. — Disposition des pieds à se refroidir. — Taches rouges douloureuses au mollet, comme produites par une con-

tusion; elles deviennent plus tard jaunes ou verdâtres; elles empêchent le mouvement du pied, qui est courbé comme si les tendons étaient raccourcis.

Douleur de brisement dans les articulations pendant le repos. - Accès de symptômes histériques et hypochondriaques après avoir abusé du coît. - Tressaillement convulsif des membres. - Accès d'élancements qui partent de l'estomac sous les côtes gauches et s'étendent jusque dans le dos. - Manque de chaleur vitale. Lassitude universelle, surtout dans les jambes. - Sensation de lassitude maladive le matin au lit. - Accablement subit en marchant. Disposition extrême à se refroidir: - Ce medicament convient aux maladies de la vieillesse. — Les symptômes paraissent surtout dans les repos. - Les symptômes se manifestent plus fortement la nuit et interrompent le sommeil.

Éruption urticaire à la suite d'un grand exercice. Taches rouges pruriantes sur le corps, qui vont et viennent. — Taches brunes sur le corps. — Dartres humides, anciennes. — Fourmillement et élancements dans les glandes engorgées. — Induration des glandes après coups et meurtrissure. — Ulcère noirâtre avec sanie sanguinolente, fétide. — Carie. — Hydropisie. — Chlorose.

Somnolence pendant le jour et même le matin. — Somnolence te soir avec contraction des paupières. — On s'endort tard le soir au lit. — Sommeil plein de rêves fantastiques. — Cauchemar.

Sueur au commencement du sommeil.

— Sueur nocturae.

Disposition à s'effrayer. — Degoût pour le travail. — Anxiété histérique et grand besoin de pleurer. — Indolence hypochondriaque. — Découragement. — Mauvaise humeur, tristesse. — Grande irritabilité et disposition à la colère. — Confusion des idées et manie. — Misanthropie et répugnance à rester seul.

#### 43. COPAIVA BALSAMUM.

Dur. D'ACT., quelques jours. — ANTID.: Inconn. —
PUISS., I.

Envies de vomir. — Symptômes gastriques.

Gargouillement et torsion dans les intestins. — Déchirement de coliques dans le bas-ventre, précédé de douleur tiraillante dans la cavité du fémur. — Brûlure dans le bas-ventre.

Selles involontaires. — Selles blanchés diarrhéiques, surtout le matin, avec frisson et des coliques tiraillantes, déchirantes qui forcent à se courber.

Envies inutiles et continuelles d'uriner.

— L'urine coule par gouttes (strangurie).

— Douleur pulsative dans l'urètre hors le temps où l'on urine, avec gonflement, inflammation de l'orifice de l'urètre qui reste béant. — Prurit et cuisson dans l'urètre avant et après l'émission de l'urine.

— Écoulement d'une matière jaunâtre puriforme. — Douleur de plaie dans l'orifice de l'urètre.

Métrorrhagie.

Hémoptysie. —Palpitations de cœur. Éruption urticaire.

Fièvre quotidienne; avant midi froid et frisson, après midi chaleur générale et soif d'eau. — Pendant le froid de la fièvre, douleur dans le dos du pied dans le mouvement.

## 44. CORALLIA RUBRA.

DUR. D'ACT., Incon.-ANTID.: - Incon.-Puiss., X.

Vacuité de la tête. — Céphalalgie frontale pressive de dedans au dehors qui force à mouvoir la tête et n'est soulagée qu'en découvrant la tête qui est brûlante.

Céphalalgie frontale pressive, comme si le front était comprimé à plat. — Céphalalgie augmentée en se baissant en ayant. — En se baissant, le sang se porte à la tête et à la face. — Sensation comme si l'air passait au travers du crâne quand on remue la tête vite.

Douleur vive des yeux pendant le mouvement. — Sensation de brûlure dans les yeux quand on ferme les paupières, avec la sensation comme si les yeux étaient noyés de larmes. — Douleur pressive dans les yeux du dehors en dedans. — Cuisson des yeux à la lumière.

Diminution de l'ouïe.

Douleur de brisement dans l'os de la pommette gauche, augmenté par le toucher. — Chaleur à la face avec frisson passager quand on met la main sur la face. — Douleur de luxation dans l'articulation gauche de la mâchoire en ouvrant fortement la bouche, en mordant quelque chose et en bâillant. — Gonflement douloureux des glandes sous-maxillaires, (gauche).

Grande sécheresse de la membrane muqueuse du nez et du pharynx.—Gon-flement du côté droit du nez, pulsatif, brû-lant, qui empêche de dormir, avec un ulcère douloureux dans les narines.

Insapidité des aliments, ils ont le goût de paille. — La bière a un goût douceâtre.

Après le dîner (surtout après avoir bu du vin) on est comme ivre.

Constipation.

Forte sueur des parties génitales. — Gonflement du prépuce avec douleur d'excoriation au toucher. — Sécrétion de pus jaunâtre, verdâtre, fétide, entre le prépuce et le gland. — Pollutions fréquentes.

Coriza violent avec sécrétion abondante de mucus sans odeur, ressemblant à du suif.

Toux douloureuse comme si une pierre déprimait la plèvre.

En inspirant profondément, sensation comme si l'air était glacial, avec crachotement pénible du mucus bronchique.

Raideur de la nuque. — Douleur dans

Corallia rubra.

les omoplates comme si la tête de l'humérus était expulsée.

Par le plus léger mouvement au grand air, fatigue de tous les membres.

Taches de couleur au commencement foncée, ensuite cuivreuse au métacarpe et aux doigts séparément.

Les symptômes de chaleur et de froid sont diminués par la chaleur artificielle.

Bâillements violents qui se succèdent rapidement avec douleur dans l'articulation de la mâchoire. — Grande somnolence et envie de dormir même étant debout. — Soubresaut par des rêves anxieux en s'endormant. — Jactation pendant le sommeil, on se découvre.

Chagrin, mauvaise humeur. — Injures par la douleur.

#### 45. CROCUS SATIVUS.

DUR. D'ACT., incon. - ANTID. : Op. - PUISS., II.

Vertiges avec vacillation quand on quitte le lit. -- Vertiges avec évanouissement.

Céphalalgie étourdissante, tensive, avec embarras de la tête comme celui de l'ivresse. — Oubli et distraction. — Souvenir clair.

Le matin pesanteur de tête avec pression sur le vertex. — Coups dans le front et les tempes. — Pulsations dans le côté (gauche) de la face et de la tête. — Céphalalgie frontale tiraillante avec malaise. — Céphalalgie sus-orbitaire avec brûlure et pression surtout le soir à la lumière. — Céphalalgie pendant le mouvement avec ébranlement du cerveau.

Fourmillement dans les paupières. — Prurit et frémissement visible dans les paupières. — Douleur d'excoriation dans les paupières. — Cuisson dans les paupières surtout en les fermant.—Lourdeur et contraction crampoide des paupières. — Crampes nocturnes des paupières. — Besoin continuel de clignoter. — Cuisson et sé-

cheresse des yeux. — Pression cuisante dans les yeux en lisant. — Larmoiement des yeux en lisant. — Sensation de gonflement dans les yeux comme par abondance de larmes. — Collement des paupières pendant la nuit. — Besoin continuel de se frotter les yeux. — Vue trouble comme voilée, surtout le soir en lisant à la lumière. — Le papier paraît être coloré d'un rouge pâle en lisant. — Éclairs devant les yeux. — Dilatation des pupilles.

Serrement de crampe dans l'oreille.— Tintement des oreilles le soir étant au lit.

Chaleur brûlante à la face surtout le matin. — Couleur du visage pâle terreuse.

Alternative de rougeur et pâleur du visage. — Lèvres gercées.

Épistaxis d'un sang épais et noir (quelquefois d'une seule narine) et jusqu'à l'évanouissement.

Grattement dans la gorge et dans la bouche. — Sensation de clôture de la gorge comme si la luette était tombée, pendant et hors le temps de la déglutition. — Accumulation de salive dans la bouche. —Langue humide chargée, blanche, avec érection des papilles.

Goût amer ou douceâtre dans le pharynx.— Goût acide fade dans la bouche.
— Soif continuelle le soir avec malaise dans le ventre après avoir bu. — Manque d'appétit et plénitude après avoir peu mangé.

Renvois à vide le matin à jeun. — Pyrosis après avoir mangé avec plaisir.

Sensation de malaise et de lassitude sous la région précordiale. — Brûlure dans l'estomac. — Gargouillement et fermentation dans la région précordiale. — Remuement comme quelque chose de vivant dans la région précordiale.

Bas-ventre plein, ballonné.—Pincement dans le ventre après avoir bu de l'eau.

Douleur de ventre par refroidissement.

Coliques. — Remuement dans le bas-ventre comme de quelque chose vivant. — Coups au-dessous de l'hypochondre droit.

Crocus sauvus.

Crocus ativus.

-Sensation de pesanteur dans l'hypogastre. Fourmillement à l'anus. - Elancements obtus du côté et au-dessus de l'anus

Pression vers les parties génitales comme quand viennent les règles. — Règles trop hâtives et trop abondantes. — Métrorrhagie d'un sang épais, foncé, noirâtre. - Lochies trop fortes.

Éternuement fréquent et violent. Haleine d'odeur repoussante. - Respiration difficile. - Besoin de respirer profondement produit par une sensation de pesanteur au cœur. - En respirant, sensation dans la gorge comme d'une odeur de soufre. - Voix rauque par beaucoup de mucosité.

Toux seche, violente, penible, qui est soulagée en mettant la main sur la région précordiale. Primy gans an

Sensation de quelque chose de chaud qui s'élève jusqu'au cœur, cause de l'anxiété et gêne la respiration; amélioration par le bâillement. - Élancements dans les côtés de la poitrine. — Coups dans la poitrine qui genent la respiration. - Remuement dans la poitrine comme par quelque chose de vivant.

Gonflement de la partie extérieure du cou.-Sensation de raideur dans la nuque pendant le mouvement. - Tiraillement dans le sacrum avec douleur dans le pudendium.

Sensation dans l'articulation de l'épaule comme si le bras allait se luxer, pendant le mouvement.-Tiraillements fouillants le long de l'humérus. Pesanteur et douleur de brisement dans l'humérus après un léger mouvement. - Engourdissement des bras et des mains, avec difficulté de les mouvoir, surtout la nuit. - Fourmillement brûlant et raideur dans les pointes des doigts comme par un engourdissement après avoir marché au grand air. - Engelures aux mains et aux doigts.

Sensation de faiblesse des cuisses étant assis. - Déchirement nocturne dans les jambes avec inquiétude. - Douleur de courbature aux mollets. - Paresse avec

brûlure et fourmillement dans la plante des pieds. - Engelures aux orteils.

Faiblesse extraordinaire avec accès d'évanouissement pendant le mouvement. Le matin grande lassitude, les symptômes sont en général plus forts. - Changement extraordinaire de tous les symptômes physiques et moraux, qui passent à un état contraire. Remuement comme par quelque chose de vivant dans différentes parties du corps. - A l'air libre tous les symptômes disparaissent. - Chorée. - Tremblement de tous les membres. Toutrois she siver reasons

Rougeur scarlatineuse de tout le corps. Lésions vieilles qui suppurent.

Grande somnolence pendant la journee. Envie continuel de dormir. - Somnolence avec des yeux ternes. - On chante dans le sommeil. - Cris et soubresauts dans le sommeil. - Rêves effrayants ou joyeux.

Fievre avec froid avant la chaleur. - Fermentation générale du sang.

Grande gaîté qui se change quelquefois en tristesse profonde. - Grande envie de rire, de plaisanter, de chanter, même quand on est très faible. - Folie gaie avec pâleur de la face, céphalalgie et obscurcissement des yeux. - La volonte libre est limitée. - Changement de caractère; il passe de la durete à la bienveillance. Caractère violent plein de dépit. - Inclination grande à être triste. - Emportement et bientôt après repentir. Hay of ans not

#### 46. CUPRUM.

DUR. D'ACT., 15 jours. - ANTID.: Cocc., nux., hep., ipéc., merc., bell., dulc., chin. - Puiss., X.

Vertiges tournoyants comme si la tête voulait tomber en avant. - Vertiges en li-

Égarement de l'esprit. - Perte des sens. Tiraillement dans la tête avec vertiges tournoyants, amélioré étant couché. - Céphalalgie assourdissante, déprimante avec fourmillement au vertex, - Pression

Cuprum.

aux tempes augmentée par le toucher.-Encéphalite. - Élancements brûlants dans le côté gauche de la tête, dans les tempes et au vertex.

Gonflement de la tête avec la face rouge. - Douleur à l'occiput et la nuque pendant le mouvement de la tête. - La tête est tournée, vers un côté.

Yeux enflammes, rouges, féroces. -Yeux fermés. -- Yeux fixes, enfoncés. --Yeux proéminents, brillants .- Yeux convulsés se mouvant de droite a gauche. -Pression dans les paupières augmentée par le toucher. - Insensibilité des pupilles.

Couleur pâle de la face cachectique. -Couleur bleue de la face. - Distorsion con-

vulsive de la face.

Pression et déchirement violent dans les oreilles.

Pression à la mâchoire inférieure augmentée par le toucher.—Lèvres bleuâtres.

Accumulation de salive dans la bouche. - Ecume à la bouche. - Mucosités dans la bouche le matin. - Langue blanche muqueuse. — Perte de la parole. — Croassement. - Cuisson dans la bouche; sécheresse dans la gorge comme soif. On entend les liquides tomber dans l'œsophage.

Goût cuivreux ou douceâtre. - Goût aqueux des aliments. — Appétit pour les aliments froids de préférence.

Renvois continuels. — Hoquet.

Envie de vomir. - Malaise du bas-ventre jusqu'au palais, mais plus fortement dans la région précordiale, avec goût putride à a bouche. - Vomissements violents, périoliques. — Vomissements aqueux ou muqueux. - Vomissements de bile. - Vomissenent avec pression sur l'estomac. -- Vonissements avec crampes et diarrhée.—Chotra asiatique.

Malaise extraordinaire dans l'estomac t dans la région précordiale. - Crampes l'estomac. - Pression dans la région préordiale augmentée par le toucher .- Doueur qui produit de l'angoisse dans le basentre. Douleur de meurtrissure dans les

hypochondres au toucher. - Crampes dans le bas-ventre comme colique, avec des cris aigus.-Ulcères élançants, rongeants dans les intestins .- Pression forte dans le ventre augmentée par le toucher.

Violente diarrhée. - Diarrhée sanguinolente. - Constipation avec grande chaleur du corps. - Hémorrhoïdes fluentes.

Envie d'uriner et peu d'urine. Emission fréquente d'urine épaisse, fétide. -Élancements brûlants dans l'urètre, pendant et hors le temps qu'on urine.

Gonflement de la verge avec inflammation du gland.

Avant les règles, bouillonnement de sang, palpitation et céphalalgie.

Coriza fluent violent. - Enrouement chronique, désir d'être couché. - Respiration précipitée, ronflante avec effort convulsif des muscles du ventre.-Râle muqueux dans les bronches en respirant vite.-Respiration prompte avec gémissements. - Asthme suffocant. - Oppression spasmodique. - Oppression en marchant vite et en montant, avec besoin de respirer profondément.

Toux sèche avec respiration entrecoupée. - Toux le matin avec crachats putrides. - Toux sanguinolente, - Coqueluche.

Constriction douloureuse de la poitrine. surtout après avoir bu. - Crampes de poitrine qui coupent la respiration et privent de la voix.—Douleur pressive à la poitrine.

Déchirement pressif et tressaillant dans les membres .- Douleurs dans les os (entre les accès de manie ). - Douleurs rhumatismales. Beaucoup de ces douleurs. surtout les pressives, sont augmentées par le toucher. - Lassitude et relâchement universel .- Convulsions violentes avec grand développement des forces. - Accès d'épilepsie. -Convulsion la nuit pendant le sommeil.-Convulsions pendant le vomissement et les coliques .- Chorée .- Tabes .- Paralysie. - Les symptômes paraissent périodiquement par groupes.

Cuprum.

Éruption cutanée qui ressemble à la gale.-Anciens ulcères.

Sommeil profond avec convulsions.

Forte sueur nocturne. - Sueur froide.

Accès d'anxiété, d'angoisse mortelle. - Accès de manie; on s'imagine vaquer à ses occupations. - Folie gaie ou morose avec dissimulation. - Pendant les accès le pouls est plein, accéléré, et les yeux rouges, enflammés, féroces; après les accès, sueur. - Fureur. - Anxiété, pleurs et facéties alternatives. - Changement de caractère, de doux il devient récalcitrant. -Peu de disposition pour le travail, malgré qu'on ait du dégoût pour l'oisiveté.

## 47. CYCLAMEN EUROPÆUM.

DUR. D'ACT., incon. - ANTID. : Incon. - PUISS., X.

Vertiges comme par un mouvement du cerveau étant debout.

Émoussement de l'esprit, inaptitude au travail .- Changement de la mémoire, de forte elle devient faible.

Elancements continuels dans le cerveau en se baissant .- Élancements dans la région temporale. - Céphalalgie assourdissante avec obscurcissement des yeux.

Elancements pruriants au cuir chevelu; quand on s'est gratté sur un point, ils paraissent sur un autre.

Dilatation des pupilles. - Yeux pâles enfoncés. - Elancements dans les yeux et dans les paupières. - Gonflement des paupières. - Vue trouble comme par un brouillard.

Tiraillements dans l'oreille droite. -Diminution de l'oule comme si l'oreille était fermée.

Odorat diminuė.

Engourdissement de la lèvre supérieure ou comme indurée.

Odontalgie rhumatismale, élançante, térébrante. - Odontalgie nocturne avec tiraillements obtus.

Langue blanche chargée. - Renvois

Cyclamen europæum.

acides surtout le soir, avec nausée. - Le soir, grande sécheresse au palais, avec faim et soif. - Sensation continuelle d'â preté, de mucosité à la bouche.

Goût fade des aliments. - Goût pu tride. - Dégoût pour le beurre et contre tous les aliments froids. - Peu d'appéti au déjeuner et au souper. - Prompte sa tiété et dégoût au commencement du repas

Renvois fréquents à vide ou acides. -Renvois avec hoquet, surtout après avoir man gé. — Grande somnolence après le repas

Nausées et malaise dans la région d l'estomac, comme si on avait mangé de choses trop grasses, après le repas.

Plénitude et pression dans l'épigastre comme si l'estomac était surchargé. -Accès subit de tranchées avec pincements Borborygmes dans le bas-ventre en sortan de table. - Douleur de ventre par le tou cher le plus léger. - Malaise dans l bas-ventre avec nausée.

Sortie fréquente de fèces dures. -Selles de consistance de bouillie.-Pres sion tiraillante dans l'anus et dans le pé rince, comme par une ulceration inte rieure.

Fréquente envie d'uriner. - Émissio fréquente de beaucoup d'urine blanche — Élancements dans l'urètre en urinant

Coriza fluent avec de fréquents éter

Le soir, respiration courte, comm par faiblesse. — Accès de suffocation.

Serrement de poitrine, respiration diffe cite. — Elancements déchirants dans poitrine, avec respiration courte, gênée - Pression dans la région précordiale comme par congestion de sang et palp tation sensible.

Elancements douloureux dans le dos dans la région des reins. - Doulet d'excoriation cuisante à la nuque dans la nuque. - Pression paralytiqu rhumatismale, ou tiraillements à la nu que et au cou.

Pression paralytique forte dans les bro jusque dans les doigts, qui empêche d'é crire. — Tiraillements dans le bras jusque dans les doigts. — Douleur de meurtrissure au bras. — Tiraillements douloureux dans la surface intérieure du coude et dans le poignet. — Contraction crampoïde des doigts. — Après un violent prurit, il paraît des boutons rouges aux articulations des doigts.

Douleur de crampe dans les cuisses. —
Taches rouges, comme par une brûlure,
aux cuisses. — Douleur de foulure dans
les articulations du pied. — Prurit violent
au mollet, aux chevilles et aux orteils.
— Douleur d'excoriation dans les orteils
en marchant, avec engourdissement
après la marche. — Sueur fétide entre
les orteils.

Douleurs pressives, tiraillantes, déchirantes, surtout à la peau qui couvre immédiatement les os. — Pendant le mouvement la plupart des symptômes s'apaisent, excepté la lassitude; mais étant assis le prurit paraît avec beaucoup d'autres symptômes. — Grande lassitude, surtout le soir, avec brisement et raideur des jambes, et pression tiraillante dans les cuisses et les genoux.

Rongement pruriant dans différentes parties de la peau. — Prurit insupportable élançant le soir au lit.

Grande envie d'être couché et de dormir.

On s'endort tard, avec battements sensibles dans le cerveau. — Cauchemar.

Frisson fébrile et froid, suivi d'une chaleur qui vient lentement (elle est générale), sans soif, et surtout à la face, avec rougeur qui augmente après le dîner. — Le soir, frissonnement et crainte d'un plus grand froid, sans soif; après, anxiété et chaleur dans des parties isolées, au dos de la main, à la nuque, non à la face.

Accès de dépit, éloignement pour la conversation. — Dégoût et désir alternatif pour le travail. — Chagrins intérieurs, remords. — Pensées profondes sur le présent et l'avenir. — Mauvaise humeur.

## 48. DAPHNE MEZEREUM.

Dur. D'Act., 6 à 7 sem. — Antid.: Camph., merc. — Puiss., V.

Vertiges à tomber de côté, avec lueur devant les yeux.

On perd souvent connaissance. — Étourdissement comme dans l'ivresse ou par excès de pollution. — Compréhension difficile. — Faiblesse de la mémoire. — Esprit obtus.

Céphalalgie avec sensation d'écartement. — Céphalalgie pressive assourdissante dans la moitié droite du cerveau. — Céphalalgie frontale pressive. — Céphalalgie avec horripilation et frissonnement. — Plus forte au grand air. — Douleur des os pariétaux, qui augmente par le toucher.

Sensibilité du cuir chevelu et des cheveux au toucher. — Démangeaison au cuir chevelu (et dans tout le corps) comme par des insectes.

Prurit dans l'angle interne des yeux.— Pression sur les yeux, comme si le globe était trop volumineux. — Tressaillements convulsifs, violents, des muscles au-dessus de la paupière et à la joue.

Sensation de sécheresse dans le nez, avec diminution de l'odorat. — Excoriation des narines et du pharynx.

Pâleur de la face. — Pression de crampe engourdissante sur l'os de la pommette. — Tic douloureux.

Lèvres gercées, gonflées. — Éruption ulcéreuse sur la lèvre supérieure, avec douleur cuisante au toucher.

Dents émoussées et comme allongées.

— Tiraillements dans la mâchoire supérieure et inférieure. — Odontalgie
élançante qui s'étend jusqu'à l'os de la
pommette et aux tempes. — Élancements
térébrants dans les dents, jusqu'à la
pommette.

Vésicules brûlantes sur la langue et aux gencives. - Difficulté de la parole. - Apreté, excoriation au palais et dans le pharynx.

Brûlure continuelle dans la bouche, gorge, cesophage et l'estomac. — Resserrement de contraction du pharynx.

Dégoût pour la viande. - Faim vive à midi et le soir. - Renvois fréquents à vide.

Nausées avec accumulation de salive dans la bouche, tremblement et horripilation universelle. - Vomissement de mucosité amère, verdâtre, et céphalalgie martelante.

Pression à l'estomac. — Brûlure et sensation de chaleur dans l'estomac et le basventre. - Inflammation de l'estomac et des intestins.

Bas-ventre dur, tendu. - Coliques de vents avec gêne de la respiration et frissonnement.

Selles molles, peu copieuses, fréquentes; évacuation alvine sous forme de bouillie, difficile, avec pression violente.-Horripilation avant et après l'évacuation. Constriction du sphincter après la chute du rectum.

Sécrétion d'urine diminuée. - L'urine dépose un sédiment rouge et contient des flocons en suspension. — Hématurie. — Douleur d'écorchure dans l'urêtre.

Elancements aigus et titillation au bout du gland. - Gonorrhee bâtarde. -Gonflement des testicules.

Leucorrhée aqueuse et comme du blanc d'œuf. - Suppression des règles.

Toux sèche, avec étranglement et vomissement le soir et la nuit. - Toux avec crachement de sang.

Oppression de poitrine. - Élancements dans la poitrine, augmentés par la respiration. - Douleur dans la poitrine, comme si les poumons étaient adhérents ou le thorax trop étroit. — Tension doutoureuse des muscles de la poitrine.

Douleur au sacrum. - Douleur rhumatismale dans les articulations, avec sensation de raideur. — Douleur de bri-

sement et lourdeur dans tous les membres; on marche courbé. - Douleur tiraillante dans une partie du corps, avec frissonnement. - Prédominence des symptômes sur une moitié du corps. - Le soir. les symptômes augmentent. - Tressaillement et fremissement des muscles de tous le corps. - Les douleurs sont augmentées par le toucher de la partie malade et par le mouvement. - Douleur cuisante dans les organes de la digestion. - Brûlure et élancements dans les ulcères enflammés. Le prurit est soulagé par le grattement. mais se renouvelle avec plus de force, et la partie grattée est gonflée. - Douleur d'excoriation rongeante aux membranes muqueuses et dans les ulcères. - Exostose. - Carie. - Desquammation générale de la peau. - Syphilis invétérée, exaspérée par le mercure.

Grande somnolence pendant la journée, avec sommeil agité non réparateur. - Réveil le matin par un cauchemar.

Froid et frissonnement avec soif violente - Frissonnement et horripilation qui se joignent aux autres symptômes. - Susceptibilité à l'air froid.

Mauvaise humeur. - Dégoût pour le travail. - Esprit hypochondriaque. - Agitation quand on est seul et désir d'être en société.

# 49. DATURA STRAMONIUM.

DUR. D'ACT., 36 à 48 h .- ANTID. : Acid. vég., tab. nux. - Puiss., III.

Vertiges comme par ivresse. - Vertiges avec obscurcissement des yeux et céphalalgie.

Egarement de l'esprit. - Imagination faussée. - Emoussement des sens. - Perte de la mémoire.

Céphalalgie avec battement sur le vertex, avec syncope. - Céphalalgie avec obscurcissement de la vue et dureté de l'ouïe. - Elancements dans le front avec vertiges et pesanteur de la tête. — Légèreté incommode dans la tête, avec faiblesse. — Mouvements convulsifs de la tête. — Pupilles dilatées, insensibles. — Yeux fixes, larmoyants. — Yeux brillants. — Yeux gonflés. — Impossibilité de distinguer les objets, le matin — Cécité passagère. — Myopie. — Yue double. — Aberration de la vue. — Paralysie des paupières.

Aspect d'hébétude, de désordre dans les traits. Face vultueuse. Expression de peur. Face gonflée gorgée de sang, exprimant cependant la bienveillance. Visage sillonné de rides profondes.

Envie de grincer des dents.

Balbutiement. — Bégaiement. — Bégaiement avec distorsion de la face. —Difficulté de la parole. —Paralysie de la langue. —Sécheresse de la bouche et défaut de salive. — Écume (sanguinolente) à la bouche.

Constriction et crampe dans le gosier.

— Déglutition difficile. — La sécheresse de la gorge empêche d'avaler.

Soif violente. — Horreur de l'eau et des liquides. — Manque de goût. — Les aliments ont un goût de paille et de terre. — Amertume continuelle de la bouche, goût amer des aliments.

Gonflement du bas-ventre. — Ventre (dur) tendu. — Sensation d'angoisse dans la région précordiale. — Mal de ventre avec vomissement aqueux (et diarrhée).

Constipation. — Excrétion de sang coagulé par l'anus. — Selles d'une odeur cadavéreuse.

Sécrétion d'urine supprimée.

Menstruation plus forte. — Les règles se montrent par des caillots volumineux, avec tiraillemens dans le bas-ventre et dans les cuisses.

Crampes des muscles de la poitrine et asthme qui en dépend. — Soupirs fréquents.

Douleurs tiraillantes au milieu du dos, avec douleur semblable à la partie postérieure de l'estomac. — Douleur tiraillante au sacrum.

Douleur tiraillante dans les cuisses.

Trembtement des membres. — Douleur des membres et des articulations. — Grande facilité d'action musculaire. — Douleur crampoïde tiraillante dans les muscles. — Suppression de toutes les sécrétions de excrétions.

Accès de crampe.—Convulsion.—Chorée.—Catalepsie.—Eclampsie.— Les convulsions se manifestent en voyant de l'eau, une glace, une lumière, et même par le toucher. — La tête est tirée en arrière. — Raideur et immobilité du corps avec conscience entière. — On renverse le corps en arrière, ayant les bras croisés sur la poitrine, et la figure convulsée douloureusement.—Crampes par frayeur ou par les vapeurs mercurielles.

État soporeux avec ronflement. — Sommeil agité avec rêves. — Rêvasserie

effrayante.

Fièvre épidémique, fièvre nerveuse. — Froid des membres avec frissonnement qui parcourt le corps, et secousses des parties isolées. — Les pieds et les mains sont froids et la face rouge. — Chaleur avec soif et vomissement. — Au début, chaleur à la face; après, froid général; ensuite, chaleur et soif.

Hydrophobie. — Mélancolie. — Affectation de grandes manières. — Manie loquace. — Passage d'un air facétieux à un air trop grave. — Au lit, position agenouillée. — Et quand on le touche, il se soulève avec fureur. — Positions comiques, d'autres fois très réservées. — On bat autour de soi avec gémissements et hurlements. — On frappe avec les mains et les pieds. — Fureur extraordinaire avec grand développement des forces. — Rêve bruyant alternant avec des gémissements. — Entêtement. — Remords. — Tristesse et angoisse avec pleurs.

#### 50. DIADEMA.

DUR. D'ACT., incon. -- ANTID .: Merc., vin. -- PUISS., X.

Pression à la tête avec embarras, qui est diminuée en s'appuyant sur la main. —Céphalalgie frontale, diminuée en fumant du tabac au grand air, — Céphalalgie avec cuisson dans les yeux et chaleur à la face.

Chaleur brûlante à la face, au front

et dans les yeux.

Sensation de froid pénible dans les dents incisives, surtout en aspirant; elle revient périodiquement tous les jours à la même heure.

Bouche amère. — Amélioration par la fumée du tabac.

Souffrance dans le bas-ventre avec horripilation le soir. — Plénitude et pesanteur dans le bas-ventre comme s'il y avait une pierre, avec malaise dans la région précordiale. — Borborygmes dans le ventre et pesanteur dans les cuisses tous les jours à la même heure,

Selles liquides qui ne s'effectuent que par intervalles, avec effort et coliques, qui sont diminuées en frottant le ventre avec les mains.

Metrorrhagie.

Coriza avec soif.

Douleur osteocope fouillante dans toutes les parties du corps, surtout dans les bras et dans le calcaneum.

Lassitude et abattement avec soif. — Les symptômes reparaisssent périodiquement tous les jours à la même heure. — Hémorrhagie par toutes les ouvertures du corps et par les plaies.

Symptômes fébriles qui consistent en chaleur. — Soif pendant les symptômes. — Sommeil agité avec réveil fréquent et sensation continuelle d'augmentation de volume, de pesanteur des avant-bras et des mains.

## 51. DIGITALIS PURPUREA.

Dur. D'ACT., plusieurs jours.— ANTID.: Nux., op. —
Puiss., V, X.

Vertiges avec tremblement. — Étourdissement. — Faiblesse de la mémoire.

Bouillonnement dans le cerveau, comme si c'était de l'eau en ébullition,

avec embarras de tête. — Déchirement dans les tempes et les os pariétaux. — Élancements aux tempes et au front. — En se baissant on éprouve la sensation comme si le cerveau tombait en avant. — Tension dans le front en tournant les yeux. — Prurit intérieur dans un côté de la tête. — Propension de la tête à tomber en arrière. — Douleur incisive dans la dernière vertèbre cervicale qui force de renverser la tête.

beaton per par cus

Cuisson et pression aux sourcils avec la vue voilée. — Pression dans les yeux augmentée par le toucher. — Larmoiement avec prurit. — Inflammation des glandes Meibonius. — Collement des paupières avec forte sécrétion de mucosité. — Ophtalmie scrofuleuse. — Aberration de la vue. — Les objets paraissent jaunes ou verts. — Scintillement et coloration des objets. — Amaurose. — Propension à tourner les yeux de côté.

Constriction ettension dans les oreilles. Visage pâle. — Lèvres et paupières bleuâtres.

Apreté dans la bouche avec goût de mucosité. — Salivation. — Salive fétide. Salive douceâtre. — Langue bleue.

Goût amer.—Manque d'appétit, cependant la langue est nette. — Goût comme celui d'amande douce. — Soif surtout pour les acides. — Grand désir des aliments amers.

Renvois acides après le dîner. — Nausee avec dépression et anxiété. — Vomissements de mucosité, d'aliment ou de bile.

Sensation de faiblesse dans l'estomac comme si la vie allait s'éteindre. — Sentiment comme si l'estomac était retiré. — Poids énorme sur l'estomac, la région précordiale, avec douleur pressive.

Mal de ventre (déchirant ou élançant) avec envie de vomir, surtout pendant l'expiration et dans le mouvement. — Torsion et pincement dans les intestins. — Ascite. — Mal de ventre comme par le refroidissement ou par la diarrhée. — Tension et serrement de crampe dans la région inguinale.

Selles involontaires. — Selles blanches comme la craie ou comme les cendres. — Diarrhée de matières et de mucosités, précédée de froid et de tranchées.

Envie inutile d'uriner, même pendant une gonorrhée. — Difficulté d'uriner, comme par le rétrécissement de l'urètre. — Rétention d'urine. — Pissement la nuit. Urine foncée. — Malaise avant et après avoir uriné. — Brûlure et contraction dans l'urètre en urinant. — Inflammation de la vessie.

Douleur de contusion dans les testicules.—Écoulement d'humeur prostatique.

Enrouement et coriza le matin.

Toux sèche avec douleur dans les omoplates et les bras. — Toux avec crachats de sang.

Oppression pénible étant couché et dans le jour étant assis. — Gonstriction suffocante de la poitrine qui oblige le matin au lit à se mettre sur son séant. — Pression dans la poitrine étant assis, courbé. — Constriction douloureuse de la poitrine en se penchant en avant. — Hydrothorax. — L'action du cœur est accélérée; on peut entendre les palpitations, elles causent de l'anxiété et de la contraction sous le sternum. — Horripilation aux mamelles.

Raideur et tension des muscles du cou.

— Tiraillement dans le dos et le sacrum comme après le refroidissement. — Douleur de brisement dans le sacrum en se mouchant.

Tiraillement paralytique dans les bras. — Gonslement nocturne du bras droit et des doigts. — Sciatique chronique — Après s'être assis grande raideur des jambes qui se dissipe par la marche. — Froid des mains et des pieds. — Élancements déchirants, brûlants dans différentes parties. — Elancements dans les membres supérieurs et inférieurs. — Courbature dans les articulations comme après une grande satigue. — Goutte noueuse. — Les forces tombent subitement comme si on allait s'évanouir avec sueur générale. — Evanouissement.

— Grande lassitude et faiblesse des nerfs. — Induration des glandes.

Ictère.—Cyanose. — Prurit aux jambes qui force à se gratter, et par le grattement survient une cuisson avec piqure comme celles d'aiguilles.

Somnolence pendant la journée. — Sommeil nocturne agité; on conserve une demi-connaissance. — Sommeil interrompu par des rêves anxieux, comme si on tombait de haut ou dans l'eau.

Froid du corps, souvent avec sueur froide surtout au front. — Chaleur souvent passagère, suivie de faiblesse. — Forte sueur nocturne. — Frissonnement après midi avec chaleur interne. — Le pouls est très lent.

Grande anxieté, surtout le soir avec pleurs et sensation comme si quelque événement fâcheux devait survenir. — Forte inquietude de l'avenir. — Tristesse avec disposition à pleurer, et sentiment profond de maladie. — Désir particulier pour le travail.

### 52. DROSERA ROTUNDIFOLIA.

Dur. D'ACT., quelq. jo.—Antin.: Camph.—Puiss. X.

Vertiges en marchant à l'air libre à tomber du côté gauche.

Céphalalgie frontale pressive, et aux os des pommettes. — La tête est entreprise douloureusement comme par la fatigue de parler.

Douleur d'excoriation au cuir chevelu.

Presbyopie. — Confusion des lettres en lisant. — Perte de la vue en lisant. — Éblouissement par la lumière du jour ou la lumière artificielle.

Épistaxis.

Odontalgie élançante après les boissons chaudes.

Soif. — Lèvres constamment sèches avec perte du goût des aliments.

Renvois amers. — Vomissements la nuit et après le dîner. — Le matin, vomissement de bile. — Vomissement de sang. — Hoquet fréquent. — Renvois acides désagréables.

Douleurs dans les hypochondres au toucher et en toussant.

Selles fréquentes de mucosités sanguinolentes avec tranchées.

Besoin fréquent d'uriner; on urine peu et par gouttes (urines abondantes).

Éternuement. — Coriza fluent. — Chatouillement dans le larynx qui force à tussiculer et sensation comme s'il s'y trouvait un corps mou. — Élancement fin qui s'étend jusqu'au côté de l'œsophage. — Sensation de sécheresse irritante profonde dans le pharynx qui force à toussoter. — Enrouement. — On ne peut parler qu'avec une voix grave. — Phthisie laryngée et trachéale.

Toux chronique. — Coqueluche. — Toux et enrouement après l'éruption miliaire. — Toux avec douleur dans la poitrine et les hypochondres qui force à soutenir la partie avec la main. — Toux avec soulèvement d'estomac.

Sensation d'oppression de poitrine comme si en toussant ou en parlant la voix était retenue, ce qui empêche l'expiration. — Serrement de la poitrine en parlant.

Douleur paralytique dans l'articulation coxo-fémorale et dans les cuisses en marchant, qui force à boiter.—Élancements et douleur incisive dans les jambes. — Douleur déchirante dans les articulations des pieds comme après une fouture, seulement en marchant. — Raideur dans les articulations du pied.

Douleur rongeante, élançante dans la cavité des os des bras et des jambes, surtout unis aux élancements dans les articulations, plus dans le repos que dans le mouvement. — Élancements douloureux et pression dans les muscles des bras et des jambes également dans toutes les positions. — Douleur de brisement et endolorissement extérieur dans tous les membres. — Sensation de stupeur dans tous les membres. — Faiblesse universelle avec yeux caves et joues déprimées.

# Drosera rotundifolia.

Frisson général avec chaleur à la face, mains froides et absence de soif. — Fièvre intermittente avec envie de vomir.

Agitation, inquiétude; on ne peut s'occuper long-temps du même objet, on est obligé de changer. — Oppression de l'ame, on se croit offensé de tout côté.— Découragement.—Craintes de l'avenir.

La plupart des symptômes se manifestent le matin et par la chaleur,

### 53. DULCAMARA.

Dur. D'ACT., 10 à 12 jours.—Antid.: Incon.— Puiss., X.

Étonnement de la tête. — Pression et assourdissement de la tête qui n'occupe que quelques parties. — Sensation comme si l'occiput était plus développé. — Congestion à la tête avec bourdonnement d'oreilles et dureté d'ouïe.

Pression dans les yeux surtout en lisant. — Sensation dans les yeux comme si du seu en jaillissait. — Ophtalmie scrosuleuse. — Amaurose.

Serrement nocturne des oreilles avec nausées. — Serrement des oreilles par refroidissement.

Epistaxis d'un sang vermeil et brûlant avec sentiment de pression au-dessus du nez.

Mouvement convulsif dans les lèvres et les paupières à l'air froid.— Face pâle avec rougeur circonscrite des joues.— Éruption à la face.

Salivation. — Stomacace après refroidissement. — Difficulté de la parole comme par la paralysie de la langue. — Secheresse de la langue. — Paralysie de la langue.

Inflammation de la gorge après refroidissement. — Pression à la gorge comme si la luette était allongée. — Gonflement des glandes du cou.

Goût fade et savonneux.—Soif violente. — Forte soif avec sécheresse de la langue et sécretion de salive augmentée. — Faim avec dégoût pour les aliments. Nausée et vomissement seulement de mu-

Ballonnement de la région précordiale et du bas-ventre après un repas modéré. — Rétraction de la région précordiale avec brûlure douloureuse.

Endolorissement du ventre dans la région du nombril. — Tranchées autour du nombril. — Élancements et pincements dans la région du nombril. — Mal de ventre comme par la présence d'un ver qui rampe, ronge et pince. — Mal de ventre produit par le refroidissement. — Gonflement des glandes de l'aine. — Ascite.

Diarrhée avec douleur après un refroidissement.—Diarrhée chronique, sanguinolente avec démangeaison à l'anus.— Diarrhée des femmes enceintes et des femmes en couche.— Diarrhée verdâtre, muqueuse.— Constipation.

Urine claire et visqueuse en la rendant; elle devient ensuite trouble et s'éclaircit plus tard en laissant déposer un sédiment muqueux.—Rétention d'urine.—Ecoulement peu abondant d'urine d'une odeur désagréable. — Catarrhe de la vessie.

Blénorrhée chronique. — Dartres aux parties génitales.

Menstruation abondante et retardée.— Stérilité des femmes. — Éruption dartreuse aux grandes lèvres.

Coriza sec qui augmente à l'air froid.
—Catarrhe chronique.

Coquetuche après refroidissement, excitée par de profondes inspirations. — Toux humide. — Toux avec expectoration d'un sang vermeil.

Élancements obtus qui ressemblent à des coups dans les deux côtés de la poitrine. —Sensation d'ondulations douloureuses dans le côté gauche de la poitrine. —Forte oppression en respirant. —Hydrothorax. — Phthisie muqueuse. — Suppression de sécrétion du lait chez les femmes en couche après refroidissement. — La nuit, palpitations de cœur fortes, visibles extérieurement.

Élancements souillants dans les lombes au-dessus de la hanche gauche. — Violente douleur des lombes, surtout dans le repos. — Raideur de la nuque. — Élancements et pression dans le dos et au bras, surtout la nuit et dans le repos.

Paralysie du bras avec froid glacial comme dans une apoplexie. — Douleur paralytique du bras comme par une contusion, surtout dans le repos. —Éruption dartreuse aux mains. — Sueur dans la paume des mains. — Verrues aux mains.

Douleur tiraillante déchirante dans les jambes, surtout dans les cuisses.—Gonflement des cuisses jusqu'au pied.—Brûlure dans les pieds et aux orteils.

Déchirements dans les membres après refroidissement. — Souffrances produites par le refroidissement. — Grande lassitude. — Amaigrissement. — Gonflement subit du corps. — Sécrétions et excrétions anormales des membranes muqueuses. — Gonflement de la face, du corps et des membres comme une hydropisie universelle. — Les symptômes s'aggravent surtout le soir et dans le repos. — Paralysie des membres supérieurs et inférieurs.

Sécheresse et chaleur de la peau. — Éruption urticaire. — Éruption vésiculaire contenant une humeur aqueuse, jaunâtre. — Tumeur froide. — Croûtes dartreuses sur tout le corps. — Éruption dartreuse avec gonflement des glandes. — Induration des glandes. — Eruption qui se manifeste immédiatement après un refroidissement. — Dartre humide qui suppure (dartre farineuse).

Grande somnolence pendant la journée. — Sommeil agité avec chaleur et tressaillement surtout après minuit. — On se réveille trop tôt le matin.

Frissonnement et froid le soir; on ne peut se réchausser près du seu. — Chaleur sèche, brûlante à la peau, avec soif et délire. Sueur générale surtout la nuit. — Sueur sétide avec émission copieuse d'urine. — Fièvre muqueuse après resroidissement.

Délire nocturne avec douleur augmentée. — Grande inquiétude. — Disposition à la querelle sans colère. — Agitation intérieure.

#### 54. EUGENIA JAMBOS.

DUR. D'ACT., 3 jours .- ANTID. : Coff .- PUISS., X.

Ivresse qui se prolonge avec grande loquacité et paresse. — Vertiges, et tous les objets paraissent renversés.

Céphalalgie pressive. — Céphalalgie brûlante avec cuisson dans les yeux, larmoiement, malaise, vomissement et augmentation de douleur le soir. — Céphalalgie nocturne avec ardeur dans les yeux. — Forte soif et abondance d'urine.

Cuisson vive dans les yeux avec un fort larmoiement. — Boutons à la face dont la circonférence est douloureuse.

Salive muqueuse, abondante, écumeuse, épaisse surtout après le repas.

Appétit augmenté. —Plaisir à savourer les aliments, les boissons et la fumée du tabac. — Soif vive. — Grand besoin de fumer du tabac.

Selles diarrhéiques suivies de vomissement. — Selles peu abondantes sous forme de bouillie sablonneuse. — Selle petite, fétide avec brûlure dans le ventre. — Constipation.

Urine foncée. — Horripilation après avoir uriné. — Après avoir uriné, vue plus claire et subitement.

Impuissance.—Éjaculation de sperme retardée ou empêchée.—Après le coit, sueur et soif.

Crachat de mucosité jaune sanguinolente.—Toux humide sans expectoration la nuit et le soir.

Suppuration autour de l'ongle du pouce.

Douleur de serrement et d'engourdissement dans les jambes et le talon.

Crampe nocturne dans le talon.

La plupart des symptômes paraissent le soir et pendant la nuit.

# Eugenia jambos.

Sommeil profond. — Quand on dor dans le milieu de la journée, on a des rê ves confus, on s'éveille comme ivre.

Froid comme si on était nu. — Le mains sont continuellement chaudes.— Sueur matinale avec beaucoup de soif.

Besoin de solitude.—Rien ne plaît; est on assis on veut être couché; quand or est couché on désire être debout.

#### 55. EUPHORBIUM.

Dur. D'ACT., 30 jours.—Antid.: Camph., suc, citr.—Puiss., VIII.

Vertiges tournoyants à tomber de côté. Céphalalgie pressive élançante. — Douleur de brisure dans l'occiput. — Inflammation érysipélateuse du cuir chevelu.

Ophtalmie chronique. — Prurit et sécheresse dans les paupières et dans les angles. — Larmoiement avec démangeaison et la nuit collement des paupières. — Abondance de chassie dans les angles des yeux. — Obscurcissement de la cornée. — Vue trouble. — Myopie. — Diplopie.

Étreinte des oreilles au grand air.

Gonflement érysipélateux des joues, avec des vésicules jaunâtres et douleurs térébrantes, fouillantes. — Gonflement des joues d'un blanc œdémateux. — Face brûlante.

Démangeaison suffocante dans le nez, jusque dans le cerveau, avec sécrétion abondante de mucus.

Odontalgie lancinante pressive. — Odonlalgie augmentée par le toucher et la mastication. — Friabilité des dents. — Au commencement du repas, frisson et odontalgie accompagnés de douleur à la tête et aux pommettes.

Sécheresse à la bouche, sans soif. — Salivation avec horripitation. — Nausée et serrement comme d'une griffe à l'estomac. — Salive salée.

Ardeur dans le gosier jnsqu'à l'estomac, avec chaleur, anxiété, tremblement et renvois d'un acide désagréable. Goût fade, rance ou amer. — Renvois à vide. — Hoquet. — Soif pour les bois-

Brûlure à l'estomac et dans la région précordiale. — Constriction dans l'estomac. — Crampes d'estomac fortement contractives. — Inflammation de l'estomac et de l'œsophage. — Sensibilité douloureuse de l'estomac comme par un coup.

Brûlure dans le bas-ventre. — Coliques de vents spasmodiques avec tendance des vents d remonter, soulagée en tenant la cête dans les mains, le coude appuyé sur le genou. — Sensation de vide dans le ventre. — Coliques constrictives.

Selles diarrhéiques comme de la bouillie, wec tenesme. — Cuisson à l'anus et doucur d'excoriation au ventre. — Évacuaions alvines d'abord liquides, plus tard globuleuses.

Envie d'uriner avec difficulté et diminution de l'excrétion d'urine qui s'échappe par goutte.

Prurit voluptueux au prépuce. — Déchicement dans les testicules. — Élancements ncisifs au gland. — Érections continuelles sans volupté. — Écoulement de l'humeur prostatique.

Éternuements fréquents sans coriza.—
Foux sèche et creuse produite par un chacouillement à la gorge et à la poitrine. —
Jour et nuit, toux sèche comme produite
par la gêne de la respiration, avec crachats copieux le matin.

Serement de la poitrine, avec douleur lensive dans les muscles. — Sensation d'évartement crampoïde de la poitrine. — Sensation comme si les lobes du poumon laient adhérents. — Ardeur dans la poirine. — Élancements pressifs sur le stermum. — Élancements vers le côté gauche le la poitrine pendant le repos, qui se lissipe par le mouvement. — Pression lans les muscles de la poitrine.

Sueur au cou. — Douleur de crampe lans les vertèbres du dos, le matin au lit, tant couché sur le dos.

Stries rouges, scarlatineuses, avec dé-

mangeaison au toucher à Vavant-bras. — Tension paralytique dans l'articulation de l'humérus. surtout dans le repos, amélioration en marchant.—Tiraillement serrant dans la main après avoir écrit.

Sciatique.—Brûlure nocturne dans les os des cuisses. — Grande faiblesse des jambes. — Contraction spasmodique des orteils.

Douleur rhumatismale déchirante, lancinante, pressive des membres, presque seulement dans le repos et se dissipant par le mouvement.—Douleur brûlante dans différentes parties du corps, surtout dans les organes internes. — Maladies des membranes muqueuses. — Maladie mercurielle. —Carie. — Faiblesse paralytique dans les articulations, avec difficulté de se lever de son siège. — Grande lassitude et fatigue. —Les symptômes augmentent dans le repos, surtout assis et par le toucher.

Prurit brûlant qui force à gratter. — Éruption chronique de la peau. — Verrues. — Furoncles. — Ulcères avec torpeur et insensibilité. — Sphacèle.

Somnolence diurne avec beaucoup de bâillements. — Assoupissement après midi.—On s'endort difficilement avant minuit et on éprouve de l'agitation, du tremblement. — Réveil fréquent la nuit.

Frisson et manque de chaleur normale, surtout avec affection des organes intérieurs.—Froid au commencement du repas.—Frissonnement, chaleur de la face et froid des mains sans soif et chaleur après. — Sueur matinale avec chaleur sans soif.

Anxiété.—Ame craintive. — Sévérité. — Ardeur pour le travail.

### 56. EUPHRASIA OFFICINALIS.

DUR. D'ACT., incon.—ANTID.: Incon.—Putss., 1 gutt.

Céphalalgie le soir, la tête est vide comme brisée, augmentée étant couché. — Céphalalgie frontale pressive avec chaleur. - Céphalalgie avec photophobie.

Élancements extérieurs dans les tempes et dans le front.

Compression des paupières. — Forte sécrétion de mucosités des yeux et des paupières. — Contraction dans les yeux et les paupières, qui force à clignoter. — Pression dans les yeux. — Blénorrhée des yeux à perdre la vue. — Inflammation scrofuleuse. — Taches de la cornée. — Inflammation de la cornée. — Cicatrices après ulcères dans la cornée. — Photophobie. — La lumière paraît plus foncée et vacillante. — Larmoiement des yeux. — Démangeaison avec écoulement de larmes âcres.

Térébration dans l'oreille, dans la région du tympan.

Raideur des joues en parlant et en marchant, avec sensation de chaleur et élancements douloureux. — Élancements dans la mâchoire inférieure et au menton.

A l'aile du nez, houtons qui suppurent. Parole difficile, bégaiement.

Fort saignement des gencives.—Odontalgie élançante dans les dents inférieures.

Goût pâteux. — Nausée et goût amer dans la bouche par la fumée du tabac (auquel on est habitué). — Renvois du goût des aliments.

Pression brûlante au travers du basventre. — Pincements dans le ventre par accès courts.

Selles dures, insuffisantes.

Urine fréquente, abondante, claire.

Prurit voluptueux avec élancement au gland et au prépuce. — Fourmillement dans les testicules qui sont rétractés.— Rétraction crampoïde des parties génitales, le soir au lit.

Coriza fluent, violent, avec abondante sécrétion de mucosité. — Tête très vide. — Larmoiement démangeant dans les yeux.

Difficulté de respirer même étant assis.

Toux surtout dans le jour, avec crachats difficiles. — Toux le matin avec abondance de mucus et coriza fluent. — Toux avec respiration entrecoupée.

Douteur de crampe pressive dans le dos.

Douleur d'engourdissement dans les bras et les mains. — Douleur de crampe pressive dans les mains et les doigts.

Elancements dans les membres inferieurs pendant le repos. — Douleurs tensives de raccourcissement dans les tendons du jarret, le tendon d'Achille en marchant. — Sensation de lourdeur et douleur de crampe dans le mollet étant longtemps debout.

Grande somnolence diurne.—Bâillement violent en marchant au grand air.—Èlancements nocturnes, pruriants par-ci el par-là, empêchant de dormir.

On s'éveille fréquemment avec frayeur.

— Rêves effrayants.

Prédominence de frisson. — Forte sueun nocturne.

Paresse et indifférence hypochondriaque.—Éloignement pour la conversation. — Calme.

#### 57. FERRUM.

Dur. D'ACT., plusieurs jours. — Antid.: Chin., hep. puls., verat. — Puiss., II et X.

Vertiges comme si on allait en voiture

Vertiges pour tomber en avant. Vertiges et étourdissement en voyant de l'eau
courante. — Congestion vers la tête.

Céphalalgie périodique; martellemen et battement qui force à se coucher. — Pression sur le vertex, au grand air.

Forte chute des cheveux, avec douleu au toucher.

Couleur terreuse de la face. — Yeur caves, troubles, larmoyants. — Face roug comme le feu. — Taches jaunes ou bleue à la face.

Épistaxis.

Vomissement des aliments immédiate ment après le repas. — Vomissement noc turne des aliments. — Vomissement acide —On ne digère pas la bière; elle mont à la tête ou produit le vomissement.

Renvois et régurgitation des aliments après le repas, même quand on les a pris avec plaisir.—Pression dans l'estomac et le bas-ventre après avoir mangé et bu.

Douleur pressive de crampe après le manger.

Selle diarrhéique non digérée. — Dévoiement aqueux. — Dévoiement liquide qui excorie l'anus. — Hémorrhoïdes. — Ascarides.

Pollutions. - Érections.

Métrorrhagie. — Écoulement par la matrice de sang liquide ou des caillots noirs, avec douleurs dans les lombes et le bas-ventre comme celles de l'enfantement. — Écoulement de sang de l'utérus avec une grande exaltation du système sanguin, avec visage rouge, brûlant. — Leucorrhée laiteuse qui excorie. — Avortement.

Gêne de la respiration avec mouvement presque insensible du thorax et grande dilatation des narines lors de l'expiration. — Chatouillement dans la trachée-artère qui fait tousser. — Apreté. — Enrouement.

Toux seulement pendant le mouvement et en marchant. — Toux sanguinotente la nuit, avec accroissement d'oppression. — Expectoration purulente. — Expectoration verdâtre striée de sang. — Putride.

Crampe contractive de la poitrine augmentée par la marche et par le mouvement. — Douleur de poitrine élançante, tensive jusqu'aux omoplates.

Gonflement des pieds. — Lassitude, pesanteur et raideur dans les jambes.

Douleur d'élancement dans les membres.—Douleur arthritique avec déchirement, élancement surtout la nuit et besoin de mouvoir les parties malades.

Grande lassitude et amaigrissement.— Grande faiblesse déjà produite par la parole; elle alterne avec un tremblement général anxieux. — Grand affaissement par la marche au grand air, quelquefois jusqu'à la syncope, avec obscurcissement de la vue et bruissement dans la tête. — La plupart des symptômes paraissent la nuit, augmentent étant assis, et diminuent par un léger mouvement. — Sueur abondante pendant le mouvement et dans le sommeil. — Maladies produites par l'abus du quinquina. — Suites fâcheuses de l'abus du thé.

Envie de se coucher. — Sommeil agité avec grand besoin de dormir, et quand on s'éveille on ne peut plus s'endormir. — Le soir on s'endort tard.

Frisson fréquent et court. — Le soir tremblement de froid avec frissonnement au lit toute la nuit. — Sueur visqueuse abondante. — Fermentation du sang pendant la journée. — Le soir chaleur surtout aux mains.

Anxiété et battement dans la région précordiale. — Envie de se quereller. — Humeur triste et gaie alternativement d'un jour à l'autre.

#### 58. FILIX MAX.

Dur. D'ACT., - ANTID.: - Puiss.,

Symptômes du tænia.

#### 59. GRAPHITES.

Dur. D'Act., 36 jours. — Antid.: Ars., nux., vin. — Puiss., VI et X.

Comme ivresse le matin en sortant du lit.

— Céphalalgie le matin jusqu'à la sueur froide et à la syncope. — Embarras de la tête avec contraction. — Roulement dans la tête avec compression douloureuse dans le vertex après midi. — Bourdonnement dans la tête. — Céphalalgie en allant en voiture.

Prurit au cuir chevelu. — Teigne humide, croûteuse. — Sueur à la tête en marchant au grand air. — Chute des cheveux, même de ceux de côté.

Les paupières sont lourdes, engourdies et tombantes. — Pression, larmoiement et élancements dans les yeux. — Ophtalmie avec photophobie, les paupières rouges gonflées, et sécrétion abondante de mucus. — Horreur de la lumière du jour. — Confusion des lettres en lisant. — Tout devient noir devant les yeux quand on se baisse.—Lueur devant les yeux.—Myopie.

Dureté de l'ouïe. — Tintement d'oreille — Chant. — Bourdonnement dans les oreilles. — Sécheresse du conduit auditif. — Écoulement sanguinolent des oreilles. — Teigne derrière les oreilles.

Couleur de la face jaune pâle. — Cercle bleu autour des yeux. — Chaleur passagère au visage. — Érysipèle du visage. — Éruption de la face qui rend la peau âpre. — Inflammation érysipélateuse et gonflement de la face. — Sensation continuelle de toile d'araignée sur la face. — Les muscles de la face sont contractés d'un côté vec difficulté de la parole.

Grande sensibilité de l'odorat. — Sécheresse pénible des narines. — Croûtes sèches dans le nez. — Sensation comme de tension dans l'intérieur des narines.

Ulcération aux commissures des lèvres.

— Ulcères à l'intérieur des lèvres. — Gonflement des glandes sous-maxillaires.

Gencives gonflées, douloureuses comme si elles étaient excoriées. — Étancement douloureux des dents après avoir bu froid. — Odontalgie le soir au lit, qui augmente par la chaleur. — Douleur des dents molaires du côté droit quand on mord quelque chose fortement.

Odeur putride comme d'urine dans la bouche. — Sensation comme d'une exèroissance dans la gorge, crampe dans la gorge qui étrangle.

Goût amer. — Faim mmodéré e. — Répugnance pour les aliments cuits. — Le matin et l'après-midi soif vive.

Renvois fréquents. — Le matin nausées. — Nausées après chaque repas.

Faiblesse de l'estomac. — Crampe d'estomac. — Pression à l'estomac. Pesanteur dans le bas-ventre. — Durcté dans le bas-ventre. — Ballonnement après le repas. — Le bas-ventre est très tendu par l'accumulation de flatuosités. — Déplacement des vents. — Sortie immodérée des vers (tœnia).

Constipation chronique, dureté des selles et dureté dans la région du foie. — Selles dures, noueuses. — Selles molles depuis long-temps. — Selles muqueuses, sanguinolentes. — Sortie du mucus par le rectum. — Hémorrhoides douloureuses.

Besoin d'uriner la nuit. — Diminution de la quantité d'urine qui est foncée, devient bientôt trouble et dépose un sédiment blanchâtre ou rougeâtre. —En urinant, douleur au coccix.

Appétit vénérien immodéré.—Sensation voluptueuse dans les parties génitales.—Écoulement de sperme presque involontaire sans érection. — Sommeil de l'appétit vénérien. — Défaut d'érection le matin. — Hydrocèle.

Règles qui sont trop pâles et peu abondantes. — Règles qui sont trop tardives. — Menstruation difficile à l'époque de puberté. — Pendant les règles, spasmes dans le bas-ventre, douleur et faiblesse de poitrine. — Leucorrhée blanche et liquide. — Stérilité et retard des règles.

Obturation des narines. — Coriza tous les jours quand il fait froid. — Coriza sec avec céphalalgie et nausée. — La voix peu juste.

Toux produite par âpreté de la gorge.

— Toux nocturne.

Oppression de poitrine. — Élancement par le plus léger mouvement. — Sensibilité douloureuse et excoriation du mamelon qui est entouré de petits boutons humides. — Induration et gonflement des glandes de la poitrine.

Douleurs arthritiques.—Goutte noueuse aux doigts. — Érysipèle aux mains. — Contraction et raideur des doigts.—Écorchure dartreuse entre les doigts et les orteils.

Excoriation à la face interne des cuisses.

# - Dartres aux cuisses. - Sensation de raccourcissement des tendons du jarret et du tendon d'Achille. - Engourdissement de la cuisse. - Raideur des genoux. - De l'articulation du pied. - Raideur et engourdissement des orteils. - Froid des pieds le soir au lit. - Brûlure des pieds. -Ulcération des orteils. — Les ongles des orteils sont épais et difformes. - Ulcères et ampoules rongeantes sur le côté des orteils. -Gonslement des jambes et des pieds.

# Prurit violent dans tous les membres et sensation de tremblement général. -Tiraillement par tout le corps avec pendiculations. - Engourdissement de l'extérieur de la poitrine, des bras et des jambes. - Crampes aux fesses, aux mollets et dans d'autres parties. - Grande disposition à se donner des tours de reins. - Affaissement maladif; on gémit sans pouvoir spécifier aucune douleur. - Fortes pulsations dans tout le corps, surtout au cœur, qui augmentent à chaque mouvement. - Maigreur surtout après avoir donné avant le lycopodium. - Les symptômes disparaissent en marchant au grand

Inflammation érysipélateuse des différentes parties .- Eruption croûteuse sous laquelle il y a de la sanie âcre. - Dartres croûteuses qui démangent jour et nuit. Éruption de dartres humides. - Steatome. - Parties du corps depourvues de l'épiderme. - Défaut de transpiration chronique.

Grande somnolence diurne, et le soir on s'endort trop tôt.-Difficulté de s'endormir. - Sommeil inquiet; on se réveille souvent. - Soubresaut pendant le sommeil. - Demi-sommeil pendant la nuit. - Sommeil qui n'est pas réparateur. -Assoupissement la nuit avec rêves inquietants et terribles. - Assoupissement le matin.

Frisson matin et soir, suivi ou non suivi de chaleur et de sueur. - Sueur ( quelquefois très fétide) par le plus léger mouvement. - Sueur nocturne. - Sueur fétide.

## 60. GRATIOLA OFFICINALIS.

Dur. D'ACT., incon. - ANTID.: Incon. - Puiss., II on IV

Vertiges tournoyants en fermant les veux. - Vertiges en lisant et étant assis comme si la tête allait çà et là.

Céphalalgie avec envie de vomir et de dormir. - Sensation de plénitude à la tête. - Céphalalgie pressive surtout au front et à l'occiput. - Céphalalgie élancante on battante. - Sensation comme si la tête avait diminué de volume. -Résonnement dans la tête; on perd la vue et l'ouie. - La céphalalgie est plus forte en se levant de son siège et pendant le mouvement au grand air.

Prurit et frémissement dans les paupières avec sentiment de faiblesse. -Brûlure et pression sur les yeux. - Larmojement et faiblesse des veux en lisant. - Vue basse en lisant.

Déchirement et élancement dans les oreilles.

Sensation de gonflement tensif et fourmillement à la face. - Déchirement dans une moitié de la face. - Chaleur brûlante et rougeur de la face.

Déchirement ou térébration pendant la nuit dans les dents molaires. - Sensation de froid dans les dents.

Accumulation de salive dans la bouche.

Pression à la gorge, comme par une mucosité épaisse. - Accumulation de mucosité dans la gorge. — Apreté fourmillante et grattement à la gorge.

Bouche amère, pâteuse. - Odeur fétide de la bouche le matin en se levant.

Renvois douceâtres ou amers. - Efforts inutiles d'éructation avec pression de l'es-

tomac à la gorge qui suspend la respiration. - Regurgitation d'un liquide amer. - Faim avec nausée et dégoût pour les aliments. - Soif augmentée.

Nausée continuelle avec vomiturition. -Nausée avec froid à l'estomac. - Vomissement avec obstruction du nez. - Vomissement amer, bilieux.

Malaise et sensation de plénitude à l'estomac. - Pression à l'estomac après avoir mange, avec nausée. - Fouillement et creusement dans l'estomac avec envie de vomir. - Pression dans la région précordiale comme par une pierre après le repas. - Les symptômes de l'estomac et de la région précordiale sont suivis souvent de malaise, envie de vomir et efforts inutiles d'éructation.

Mal de ventre avec élancement. - Battements dans la région des fausses-côtes gauches. - Mal de ventre pressif avec vomiturition. - Pincements dans le ventre qui obligent à se courber. - Ballonnement dur du bas-ventre. - Coliques pressives venteuses avec nausées et renvois désagréables. - Symptômes d'hypochondrie du bas-ventre.

Envie inutile d'aller à la selle. -Constipation. - Selle dure peu abondante, avec grand effort. - Diarrhée muqueuse nocturne avec tenesme. - Douleur d'excoriation dans le rectum. - Brûlure dans le rectum pendant et après la garde-robe. -Elancements, prurit, cuisson et battements à l'anus. - Hémorrhoïdes aveugles.

Urine diminuée. — Urine rougeâtre qui par le repos se trouble et laisse déposer un sédiment nuageux.

Elancement du cordon spermatique jusque dans la poitrine après les pollutions. - Erection douloureuse.

Règles qui viennent trop tôt et durent trop long-temps. - Nymphomanie des femmes en couches.

Éternuements fréquents avec élancements dans le côté gauche de l'hypochondre. - Obstruction des narines.

Toux sèche avec sensation d'apreté à

la poitrine, surtout le matin ou la nuit. - Toux nocturne avec douleur d'excoriation dans la trachée-artère, oppression et frisson.

Oppression de poitrine avec battement de cœur. - Respiration entrecoupée en montant un lieu escarpé. - Pression sur la poitrine en inspirant. - Élancements dans les mamelles. - Boutons sur la poitrine qui brûlent après avoir gratté.

Déchirement dans les membres. -Élancements dans les jambes et les pieds. - Tétanos avec pleine connaissance. -Hystérie et hypochondrie.

Prurit avec brûlure après s'être gratté. - Éruption qui ressemble à la gale. -Eruption humide rongeante.

Lanuit, étant assis au grand air, la plupart des symptômes paraissent, sont améliorés par le toucher.

Bâillement fréquent avec envie d'être couché. - Grande somnotence après midi.

Grande disposition au frisson.

Anxiété. - Mauvaise humeur et indisposition hypochondriaque. - Humeur hysterique. - Sévérité. - Grande loquacité et gaîté.

# 61. GUAJACUM OFFICINALE.

DUR. D'ACT., incon. - ANTID.: Incon. - PUISS., teint., gut.

Grande faiblesse de la mémoire surtout pour les noms. - Absence d'idées et fixité du regard le matin fréquemment.

Pression douloureuse au front et aux tempes. - Grands et forts élancements dans le cerveau. - Déchirement dans un des côtés de la tête, qui s'étend jusqu'à la joue. - Pulsation douloureuse et sensation à la partie extérieure de la tête comme si les vaisseaux sanguins étaient trop pleins et la tête gonflée.

Sensation dans les yeux, comme si le globe en était gonflé et comme si la paupière ne suffisait pas pour le couvrir. -

Dilatation de la pupille. - Amaurose. -Boutons dans les sourcils.

Déchirements et étreintes dans les oreilles. Élancements dans les os des pommettes

et dans les muscles des joues.

Pression dans les dents en serrant quelque chose. - Odontalgie tiraillante et déchirante qui cesse par des élancements.

Faim vive. - Goût fade dans la bouche avec manque d'appétit. - Dégoût pour tout aliment et expuition muqueuse. - Brûlure dans la gorge. - Renvois à vide.

Sensation de constriction dans la région de l'estomac qui gêne la respiration. -Pincement dans le bas-ventre, comme par le déplacement des vents. - Borborygmes et gargouillement dans le ventre comme s'il était vide. - Douleur dans l'hypogastre comme par une hernie inguinale.-Tressaillements convulsifs dans les muscles du ventre.

Constipation. - Selle dure friable.

Envie continuelle d'uriner avec urine abondante. - Douleur incisive dans l'urètre en urinant. - Envie inutile d'uriner avec élancements au col de la vessie.

Toux sèche avec chatouillement dans

la région précordiale.

Élancements dans la poitrine, augmentés par l'inspiration. - Pression aux vertèbres cervicales. - Raideur de la nuque. - Raideur semi-latérale du dos. - Déchirement semi-latéral le long du dos. - Contraction douloureuse entre les omoplates .- Frissonnement dans le dos.

Déchirements et élancements aux omoplates et aux avant-bras. - Douleur fourmillante pressive dans les os des cuisses, étant assis. - Tension et stupeur dans les cuisses en marchant.

Douleurs rhumatismales des articulations. - Douleurs athritiques élançantes dans les membres. - Engourdissement des membres .- Douleur de courbature et de faiblesse des bras et des cuisses, avec aversion pour le mouvement. - Grande Guajacum officinale.

disposition au bâillement, aux pendiculations par malaise universel. - Étant assis, le matin, et le soir avant de se coucher, la plupart des symptômes se montrent.

Après midi forte somnolence. - Le soir on s'endort tard, et le matin on s'éveille de bonne heure. - Réveil fréquent en sursaut. - Agitation nocturne. -Cauchemar étant couché sur le dos. -Le matin on n'a pas assez dormi.

Frisson et horripilation même près du feu. - Le matin et le soir, frisson sans soif. - Chaleur de la face sans rougeur avec soif. - Sueur tous les matins. -Sueur abondante, surtout à la tête, en marchant au grand air.

Morosité. - Mauvaise humeur. -Grande disposition à tout blâmer et tout mépriser. — Paresse et horreur du mouvement.

### 62. HELLEBORUS NIGER.

DUR. D'ACT., 4 sem. - ANTID.: Camph., vin. -Purss., III.

Émoussement du sens interne. - Hébétude.

Céphalalgie contusive avec embarras de la tête. — Céphalalgie assourdissante pressive. - Pesanteur et chaleur de la tête, avec froid aux doigts et sensation de froid général. - La céphalalgie est plus supportable quand on s'efforce de rester tranquille et qu'en fermant les yeux on tâche d'oublier la douleur en sommeillant.

Céphalalgie contusive à l'occiput. - Secousses dans le cuir chevelu pendant le mouvement, en se baissant, en montant les escaliers, et diminuées par le toucher. - Sensibilité extrême du cuir chevelu au toucher et pendant le mouvement.

La face est pâle, quelquefois jaune.

Susceptibilité des yeux à la lumière, avec pression du haut en bas.

Élancements térébrants, fouillants dans les oreilles, jour et nuit.

Odontalgie avec élancement et déchirement pendant la nuit, avec difficulté de supporter la chaleur et le froid.

Sécheresse pénible du palais, avec douleur incisive, âpre quand on fait le mouvement de déglutition.—Accumulation continuelle de salive dans la bouche.

—Raideur et gonssement de la langue.

Malaise à l'estomac, avec sentiment de faim et dégoût pour les aliments, et cependant le goût est bon. — Vomissement d'une matière noirâtre ou verdâtre, avec mal de ventre.

Goût amer à la gorge, augmenté par l'injection des aliments.

Sensation de rétraction de la région précordiale. — Gonflement de l'épigastre qui gêne la respiration, avec douleur d'une ulcération intérieure. — Pression douloureuse dans la région précordiale à chaque pas. — Douleur inexplicable dans la région précordiale. — Brûlure à l'estomac.

Gargouillement et grouillement dans le bas-ventre. — Borborygmes dans le ventre (surtout en respirant profondément), comme si les intestins étaient pleins d'eau. — Pesanteur dans le bas-ventre. — Pincements dans le bas-ventre. — (Ascite.)

Tenesme avec sortie d'un mucus gélatineux, précédé de pincement dans la région du nombril. — Diarrhée avec mal de ventre et nausée.

Envie fréquente d'uriner, avec émission de peu d'urine.

Appétit vénérien supprimé.

Constriction du nez comme si on devait suffoquer.

(Hydrothorax).—Constriction de la poitrine et du larynx.

Élancements douloureux dans différentes parties, surtout dans celles où les os sont immédiatement sous la peau, augmentés par l'air froid, par des efforts et par le manger et le boire. — Déchirements tiraillants dans les membres. — Élancements douloureux dans les articu-

lations. — Relâchement subit des muscles.

Au grand air on se trouve mieux, avec le sentiment d'être sorti d'une longue maladie et tout ce qui entoure paraît plus jeune et porte à la gaîté.

Peau décolorée.—Intumescence.—Hydropisie aiguë. — Anasarque après la miliaire pourprée.

Envie de se coucher et de sommeiller.

Rêves confus, angoissants dont on perd le souvenir.—Insomnie, jactation dans le lit.

Frisson alternant, avec des élancements douloureux des articulations. — Froid de tout le corps, surtout des membres. — Froid avec tremblement universel. — Chair de poule, sensibilité douloureuse du cuir chevelu pendant le mouvement et au toucher. — Déchirements tiraillants dans les membres. — Elancements dans les articulations, sans soif. — Chaleur générale, brûlante, le soir après être couché, surtout à la tête, avec horripilation. — Froid interne sans soif et dégoût pour la boisson. — Sueur à la fin de la nuit. — Fièvre lente, nerveuse.

Mélancolie taciturne. — Anxiété effrayante presque mortelle (Nostalgie). — Hypochondrie. — Paresse. — Pleurs avec hoquet. — Taciturnité avec opiniâtreté. — Méfiance. — On fixe ses regards sur le même point.

#### 63. HEPAR SULPHURIS.

DUR. D'ACT.. 5 sem. — ANTID.: Camph., chin. — PUISS., I.

Vertiges en branlant la tête et en allant en voiture. — Vertige qui va jusqu'à l'évanouissement, avec perte de la vue.

Céphalalgie comme si on enfonçait un clou. — Pression aux tempes. — Élancements dans la tête après avoir marché au grand air. — Tension au-dessous de la racine du nez. — Térébration dans la tête.

La nuit, douleur de tête comme si on brisait le front, augmentée par le mouvement des yeux.

Chute des cheveux.—Teigne.—Nodosités à la tête qui produisent la sensation d'écorchure quand on les touche.— Boutons au front qui passent au grand air.—Sueur froide à la tête.

Inflammation des yeux et des paupières, qui produisent la sensation d'excoriation par le toucher. — Inflammation érysipélateuse et scrofuleuse des paupières. — Pression sur les yeux, avec exubérance. — Difficulté de mouvoir les yeux. — Les yeux sont fermés spasmodiquement. — Larmoiement et collement des paupières pendant la nuit. — Photophobie. — Le soir vue trouble et claire alternativement. — Ulcères et taches de la cornée. — Boutons au-dessous des yeux et sur les paupières.

Chaleur, rougeur et prurit des oreilles. — Élancement dans les oreilles en se mouchant. — Bourdonnement et battement dans l'oreille. — Éruption croûteuse derrière les oreilles.

Face d'un rouge vif.—Face jaune, avec des cercles bleuâtres autour des yeux.

— Chaleur nocturne de la face. — Gonflement érysipélateux de la face. — Éruption chronique au visage. — Douleur tiraillante, déchirante de l'os de la pommette, dans les oreilles et les tempes.

Inflammation du nez. — Épistaxis. — Douleur d'excoriation du nez au toucher. — Manque d'odorat.

Ulcération des commissures des lèvres.

— Bosses douloureuses au toucher aux lètres, au menton et au cou. — Vésicules au menton. — Élancements dans l'articulation de la mâchoire en ouvrant la bouche.

Gencives utcérées, décollées.—Gencives gonflées et douloureuses au toucher.—
Odontalgie tiraillante par secousses, augmentée par le manger et la chaleur de la chambre.

Salivation augmentée. — Crachotement de mucosité. — Parole brève et enrouée.

Grattement au gosier en avalant la sa-

live. — Sensation pendant la déglutition comme d'une cheville ou d'un gonflement intérieur. — Gonflement des amygdales et des glandes du cou. — Élancements dans la gorge, comme produit par un éclat de bois, en avalant, toussant, respirant et tournant le cou.

Goût imaginaire d'amertume à la bouche, avec goût naturel des aliments. —
Appétit pour les choses acides et piquantes.
—Soif forte.—Renvois avec brûlure dans la gorge. — Le matin nausée, vomissement acide.

Pression à l'estomac après avoir pris peu de nourriture.—Gonflement, pression dans la région précordiale qui empêche de rester assis et force à desserrer ses vêtements.

Tranchées. — Élancements dans la région de la rate. — Sentiment de contraction dans la région ombilicale, avec nausée, angoisse et chaleur des joues. — Douleur de brisement au bas-ventre le matin. — Gonflement et suppuration des glandes inguinales.

Sortie difficile des excréments mous, en petite quantité, avec beaucoup de difficulté et grands efforts. — Selles dures sèches. — Selles muqueuses sanguinolentes. — Diarrhée avec coliques. — Selles verdâtres ou de couleur d'argile.

Retard de la sécrétion d'urine; elle est trouble et laisse déposer un sédiment blanc. — Urine brûlante d'un rouge foncé. — Urine âcre qui rougit le prépuce. — Urine abondante pendant la nuit. — Pissement au lit. — Urine sanguinolente la nuit.

Ulcères au prépuce semblables à des chancres.—Syphilis invétérée.—Blénorrhée chronique.

Coriza d'une seule narine. — Coriza avec grattement dans la gorge. — Respiration courte, sifflante, enrouée, avec anxiété et péril de suffocation étant couché. — Accès de suffocation qui force de renverser la tête. — Croup membraneux. — Enrouement. — Phthisie trachéale.

88 Hepar sulphuris.

Accès de toux sèche, enrouement, angoisse de strangulation et qui se termine quelquefois par des pleurs. — Toux sèche le soir,
quand une partie du corps devient froide.
—Toux profonde avec gêne de la respiration. — Toux violente, suffocante, avec
vomiturition. — Toux après avoir bu. —
Coqueluche.—Toux avec crachats de sang.

Élancements dans la poitrine en respirant et en marchant.—Boutons et furoncles, avec élancements sur la poitrine et douleur d'excoriation au toucher.

Elancements dans le dos et les muscles cervicaux.—Tension dans le dos en se tournant la nuit au lit.—Violente douleur de brisement dans le sacrum jusqu'aux cuisses. — Ulcération des glandes axillaires.

Gonflement arthritique de la main et des articulations des doigts. — Gonflement chaud et rouge de la main, avec douleur de foulure pendant le mouvement. — Éruption comme des grains d'orge sur la main et au poignet. — Panaris.

Douleur de brisure dans les cuisses. — Tension douloureuse dans les jambes qui empêche le sommeil. — Furoncles aux fesses. — Gonflement du genou, — Gonflement du pied autour des chevilles. — Élancements douloureux dans les cors.

Douleur déchirante dans les membres. — Élancements dans les articulations. — En marchant au grand air, faiblesse et tremblement du genou, avec chaleur et anxiété. — Souvent lassitude subite des jambes en marchant. — Le soir évanouissement, avec peu de douleur. — Les douleurs se manifestent la nuit et deviennent plus fortes surtout par le froid. — Symptômes de l'abus du mercure, il est surtout efficace après l'usage de la belladone.

Altérations de la peau qui guérissent difficilement. — Crevasses aux mains et aux pieds. — Ulcères qui saignent facilement. — Ulcères avec élancement et rongement, ou avec pulsation et brûlure (surtout la nuit). — Prurit brûlant au corps Hepar suipnuris. avec vésicules blanches après s'être gratté. Éruption urticaire.

Le matin et le soir, somnolence avec bâillements convulsifs. — Sommeil agité, soporeux, la tête renversée. — Insomnie par l'influence des pensées. — Réveil en sursaut la nuit, comme par manque d'air, avec pleurs et angoisse violente.

Horripilation forte et frisson surtout à l'air libre. — Frissonnement avec claquement des dents. — Froid aux pieds et aux mains, après chaleur, sueur, surtout à la poitrine, au front, et peu de soif. — Après un goût d'amertume prénlable dans la bouche; froid avec soif, une heure après, grande chaleur avec sommeil. — Pendant la fièvre, céphalalgie et vomissement. — Chaleur nocturne sèche. — Sueur nocturne. — Sueur matinale. — Sueur visqueuse d'odeur acide.

Mauvaise humeur et dépit avec emportement facile et la parole précipitée. — (le soir) Angoisse violente jusqu'au suicide. — Tristesse avec pleurs. — Irritabilité. — Grande irritation produite par le mercure.

# 64. HYOSCYAMUS NIGER.

Dur. D'ACT., incon. - ANTID.: Camph., bell. Puiss., IV.

Vertiges comme par ivresse. — Vertiges avec obscurcissement de la vue.

Manie stupide. — Hébétude. — Tous les actes de la volonté sont faussés. — On ne sent aucun besoin excepté le soir. — Perte de la mémoire.

Lourdeur et embarras de la tête. — Céphalalgie frontale pressive, assourdissante. — Céphalalgie frontale contractive, obscurcissante. — Sensation d'ondulation dans le cerveau. — Sensation d'ébranlement dans le cerveau. — Encéphalite.

Dilatation des pupilles (yeux ternes).

Yeux rouges. — Yeux saillants. —

Mouvement spasmodique des yeux. —
Contraction spasmodique des paupières. —
Strabisme. — Diplopie. — Vue trouble.
— Nictalopie. — Amaurose commençante.
Bourdonnement devant les oreilles. —
Dureté de l'ouïe.

Visage rouge, bouffi.—Face d'un rouge vif.

Épistaxis. — Pression crampoïde à la racine du nez et à l'os de la pommette.

Lèvres sèches. — Écume à la bouche.

Odontalgie déchirante pulsative des joues jusqu'au front. — Odontalgie déchirante à l'air froid avec congestion sanguine à la tête.

Cuisson de la langue. — Perte de la parole. — Langue rouge. — Salive sanguinolente.

Constriction du gosier avec impossibilité d'avaler. — Quand on essaie d'avaler des liquides, il survient des convulsions. — Ardeur brûlante à la gorge.

Faim vive, soif forte. — Aversion pour les boissons.

Malaise par la pression sur l'épigastre.

— Vomissement et étranglement. — Vomissement avec tranchées qui forcent à crier. — Hoquet. — Vomissement de sang.

Crampes d'estomac. — Douleur au toucher dans l'épigastre. — Crampes périodiques dans la région précordiale, soulagées par le vomissement.

Bas-ventre tendu. — Tranchées dans le bas-ventre. — Douleur obtuse dans la région du foie. — Crampes dans le basventre qui ressemblent à la colique.

Diarrhée aqueuse. — Diarrhée des femmes en couches. — Selles involontaires. — Envie continuelle d'aller à la selle, et on rend peu de matière.

Envie d'uriner, émission peu abondante. — Émission involontaire d'urine.

Défaut de menstruation. — Suppression des lochies. — Métrorrhagie. — Fièvre puerpérale. — Crampes des femmes enceintes et en couches.

Catarrhe des bronches. — Respiration difficile, râle. — Beaucoup de mucosité

dans le larynx et la trachée-artère, qui rend la parole voilée.

Toux nocturne, spasmodique, sèche. — Crachats verdâtres. — Irritation sèche qui fait tousser.

Crampes de la poitrine qui forcent à respirer lentement en se penchant en avant. — Pneumonie nerveuse. — Phthisie commencante. — Maladies du cœur.

Crampes dans les mollets et la partie postérieure des cuisses qui forcent à les fléchir. — Membres froids, tremblants, comme engourdis. — Tiraillements, déchirements dans les membres et les articulations.

Peau sèche.

Convulsions. — Accès épileptiques; on tombe subitement avec cris, jactation des mains et des pieds; les mains sont fermées et les pouces fléchis, serrement des dents. — Crampes produites par des vers.

Paralysie. — Apoplexie. — Grande lassitude et faiblesse.

Insomnie. — On s'endort tard. — Perte de connaissance et délire où l'on s'occupe de ses affaires. — Carphologie. — Tâtonnement continuel avec les mains. — Soubresauts pendant le sommeil. — Demisommeil. — Épanouissement des traits; rêve.

Chaleur forte, générale, surtout à la tête. — Horripilation des pieds à la tête. — Sueur froide. — Fièvre nerveuse. — Typhus contagieux.

Mélancolie. — Misanthropie. — Défiance. — Pendant la nuit on cherche à s'enfuir. — Hydrophobie. — Crainte d'être empoisonné ou trahi. — Disposition à se moquer de tout. — Symptômes d'hystérie. — Jalousie. — Mauvaises suites de jalousie et d'amour malheureux. — Manie.

#### 65. IGNATIA AMARA.

Dur. D'Act., 9 jours. - Antid.: Coff., puls., chamom., cocc., camph., arn. - Puiss., III, IV.

Vertiges avec voile devant les yeux.

Lourdeur de la tête. — (Céphalalgie augmentée en se baissant. ) - Céphalalgie frontale pressive au-dessous de la racine du nez, qui force de pencher la tête en avant et avec envie de vomir. - Céphalalgie pressive de dedans en dehors. - Céphalalgie pressive, serrante, frontale et occipitale avec obscurcissement de la vue. - Céphalalgie pulsative - Céphalalgie comme par un clou enfoncé. - Déchirement dans le front diminué étant couché. -Déchirement élançant, térébrant, profondément dans le cerveau.

Douleur pressive sur les yeux; les paupières se collent pendant la nuit.-Pression sur les yeux et larmoiement.-Photophobie. - Inflammation scrofuleuse des veux.-Mouvements convulsifs des yeux.

Visage pâle. - Visage rouge. - Face bleue. - Eruption au visage. - Secousses convulsives dans les muscles des joues et des angles des lèvres.

Sécheresse du nez.

Lèvres sèches, fendillées. - Lèvres fendillées, sanguinolentes. - Douleur à la face interne de la levre inférieure, comme si elle était excoriée.

Odontalgie comme si les dents étaient brisées.

Langue humide, chargée, blanche.-En marchant et en parlant on se mord très facilement la langue. - Voix faible, impossibilité de parler à haute voix. Elancements dans la voûte du palais jusqu'à l'oreille interne. - Salive acide, abondante.

Mucus dans la bouche.

Douleur pressive dans les glandes du cou. - Deglutition (des liquides) difficile. - Constriction du gosier. - Douleur à la gorge, avec élancements hors le temps de la déglutition. - Mal de gorge comme par une cheville hors le temps de la dé-

Dégoût des aliments, des boissons et de la fumée du tabac. — Hoquet après avoir fumé du tabac. - Dégoût pour le lait. -Quand le matin on a bu du lait le goût

Ignatia amara. en reste long - temps dans la bouche.

Régurgitation des aliments ingérés. --Régurgitation d'un liquide amer. - Hoquet après avoir mangé et bu.

Malaise avec agitation et anxiété.

Douleur périodique d'estomac. - Douleur d'estomac, qui empêche le sommeil et qui est augmentée par la pression. Brûlure à l'estomac. - Douleur obtuse, pressive dans la région précordiale. -Sensation de faiblesse et sentiment de vide dans la région précordiale.

Crampes périodiques dans le bas-ventre (avec tempérament sensible). - Douleur crampoïde pressive, de dehors en dedans et de dedans en dehors, dans l'hypogastre. - Grouillement et borborygmes dans les intestins. - Pulsations dans le bas-ventre. - Pincements dans le basventre. - Mal de ventre, au début pincement, ensuite élancements dans les côtés du bas-ventre.

Selles rares, avec envie fréquente d'aller à la garde-robe. - Chute du rectum pendant une selle, avec des efforts modérés. - Prurit et sourmillement dans le rectum avec expulsion d'ascarides, -Contraction sans douleur dans l'anus. Contraction avec douleur d'excoriation dans l'anus, comme par des hémorrhoïdes aveugles après avoir été à la selle. ---Elancements profonds dans le rectum.

Sortie fréquente et abondante d'urine aqueuse on down a will be in the last !

Erection pendant l'exonération. - Prurit au pénis et autour des parties génitales le soir après s'être couché et qui disparaît, par le grattement. - Excoriation et douleur d'ulcère au bord du prépuce. - Lascivité avec diminution des forces génitales. - Manque d'appétit véné-

Spasmes utérins. - Contraction pressive dans l'utérus, suivie de leucorrhée puriforme âcre.

Toux nocturne chronique, 13 20 tain

Constriction de la poitrine. Elancements dans le côté gauche de la poitrine. Respiration empêchée, comme par quelque chose qui presse, l'expiration plus facile.

Raideur de la nuque. — Douleur au sacrum étant couché sur le dos le matin au lit.

Douleur de foulure et de stupeur dans les bras, depuis la cavité axillaire jusqu'aux pointes des doigts, comme si la chair était détachée des os.—Douleur insupportable dans la cavité des os et dans l'articulation des bras, diminuée le soir quand on se couche dessus, et le matin augmentée par la même cause.

Pesanteur des membres inférieurs avec tension dans les jambes. — Lourdeur des pieds. — Genoux chauds et le nez froid.

Engourdissement fourmillant des membres. - Douleur dans les articulations comme par une foulure. - Douleur dans différentes parties du corps, qui devient violente par le toucher. - Déchirements dans les membres. - Rhumatisme aigu. Pesanteur des membres avec douleur des articulations. - Suites fâcheuses du café. - Symptômes de l'abus de la noix vomique. — Douleur pressive comme par un instrument dur, pointu. - Douleur d'ÉCAR-TEMENT ET DE CONSTRICTION DANS LES OR-GANES INTÉRIEURS. - Les symptômes paraissent de suite après le dîner, le soir après s'être couché et le matin après le lever. -Les symptômes disparaissent par la position sur le dos, MAIS SURTOUT EN CHANGEANT DE POSITION.

Prurit à la peau qui disparaît par le grattement. — Excoriation chez les enfants. — Engelures.

Accès de crampes et de convulsions.

— Épilepsie (par frayeur et chagrin).

— Crampes épileptiques pendant la dentition.

— Rire sardonique.

— Tétanos.

— Chorée.

— Opithotonos.

— Convulsions des bras et des jambes avec demi-connaissance.

Sommeil profond avec respiration stertoreuse. — Sommeil avec engourdissement. — Sommeil si léger qu'on entend tout. — Tressaillement des membres en s'endormant. — On rêve toute la nuit du même objet. — Bâillements violents, convulsifs, le matin et après le sommeil de l'après-midi, comme si la mâchoire allait se luxer.

Fièvre intermittente, frisson, soif suivie de chaleur. — Vomissement des aliments, de la bile ou de mucosité pendant le froid. — Froid au dos, aux bras avec tremblement et soif d'eau froide.

Chaleur générale (excepté aux pieds) avec horripilation intérieure et rougeur des joues.—Sueur avec sensation de chaleur intérieure. — Fièvre avec froid. — Tremblement suivi de chaleur extérieure, ensuite sueur. — Manque de soif pendant la chaleur et la sueur. — Rougeur et chaleur brûlante d'une oreille et d'une joue. — Accès subit de chaleur passagère et générale; on ne peut supporter la chaleur extérieure. — Sensation de chaleur avec anxiété, comme si la sueur voulait sortir. — Fièvre gastrique. — Fièvre bilieuse.

Grande disposition à s'effrayer. — Tèmérité. — Impatience. — Indécision. — Inconstance des dispositions morales; on est tantôt gai, tantôt triste. — Soupirs. — Ame affectueuse. — Conscience délicate. — Suite de chagrins chez les personnes qui le cachent. — Chagrin chez les femmes en couches. — Taciturnité. — Hystérie. — Accès d'angoisses nocturnes. — Suites fâcheuses d'amour malheureux ou de chagrin taciturne. — Frayeur suivie de chagrin.

## 66. INDIGOFERA TINCTORIA.

Dur. D'ACT., 10 jours .- ANTID.: Incon. -Puiss., X.

La tête paraît plus volumineuse. — Céphalalgie déchirante et élançante dans la profondeur du cerveau. — Bruit et battement dans la tête. — Chaleur et bouillonnement comme de l'eau bouillante à l'occiput.

Inaigojera unctoria.

02 Sensation au vertex comme si on en tirait les cheveux.

Tressaillement et frémissement dans

les paupières qui troublent la vue.

Déchirements dans les oreilles, derrière les oreilles et dans la mâchoire inférieure.

Déchirements térébrants, rongeants, dans les os de la face, surtout dans la mâchoire inférieure. — Congestion au visage avec ardeur des joues.

Épistaxis avec perte de la vue. - Déchirements et douleurs. - Incision dans les os et les cartilages du nez.

Engourdissement de l'intérieur de la bouche le matin au réveil. — Brûlure sur la langue et la partie postérieure du palais. - Crachats de salive sanguinolente.

Renvois à vide. - Renvois avec goût d'encre. - Renvois douceâtres.

Sensation de vide dans l'estomac.

Selles diarrhéiques avec pincements dans le ventre et besoin d'aller à la garderobe.

(Excrétion d'urine augmentée.) (Règles trop hâtives.)

Toux suffocante qui excite à vomir le soir avant et après s'être couché.

Grouillement et bruit dans la poitrine à chaque inspiration. - Élancements douloureux dans et autour des mamelles.

Déchirements dans l'avant-bras, depuis le coude jusqu'aux doigts, et par le mouvement on déplace la douleur. - Tiraillements par secousses dans les bras. -Les veines de la main sont gonflées, rouges, tendues. - Déchirements et élancements douloureux dans les membres supérieurs.

Déchirements dans les membres inférieurs, surtout dans les orteils.

Le soir lassitude dans les membres inférieurs, même après être couché.

Douleurs qui par le frottement ou la pression disparaissent ou diminuent. -Élancements ou déchirements dans les membres; après midi ou le soir furoncles.

Indigofera tinctoria.

Sommeil le soir et sommeil agité la nuit. - Soubresauts nocturnes. - Rêves avec anxiété.

Prédominence du froid.

Indisposition. - Mauvaise humeur et paresse.

#### 67. IODIUM.

DUR. D'ACT., 7 sem. - ANTID.: Incon. - Puiss., X.

Mal de tête à l'air chaud, en allant longtemps en voiture. - Par la marche prolongée, augmenté par le bruit et la conversation. - Céphalalgie comme si la tête était fortement serrée par un lien. — Céphalalgie frontale aiguë, pressive. - Embarras de la tête, avec éloignement pour toute occupation sérieuse.

Gonflement des paupières. - Cuisson aux yeux.-La sclérotique est d'un jaune sale. - Obscurcissement de la vue. -Diplopie. - Sensation de fatigue au-dessus des yeux le soir, comme s'ils étaient enfoncés.

Bourdennement devant les oreilles .--Dureté de l'ouie.

Couleur de la face jaune-pâle qui devient facilement brune. - Taches rouges brûlantes au nez, au-dessous des veux.

Le matin les dents sont jaunes et enduites de mucus. - Douleur pressive dans les molaires.

Mal de gorge pressif, hors le temps de la déglutition. - Le cou devient gros en parlant. - Gonflement extérieur du cou. -Gottre volumineux.-Sensation continuelle de constriction dans le goître.

Boulimie. - Soif augmentée.

Pyrosis après l'usage des aliments indi-

Vomissement de masses muqueuses jaunâtres.

Mal de ventre qui augmente après le manger. - Déplacement des vents. - Tremblement particulier, qui de l'épigastre s'étendàtoute la périphérie du corps, avec augmentation de chaleur. — Gonflement dur de la rate.

Selle dure globuleuse. — Selle molle diarrhéique, blanchâtre, qui alterne avec la constipation.—Le soir brûlure à l'anus.

Urines involontaires. — Besoin d'uriner la nuit. — Sécrétion de l'urine supprimée. — Urine fréquente et abondante. — L'urine est couverte d'une pellicule irisée.

Appétit vénérien augmenté.—Tiraillements douloureux dans la partie antérieure du pénis.—Induration des testicules.

Menstruation tantôt hâtée, tantôt retardée. — Métrorrhagie. — Leucorrhée rongeante.

Fourmillement insupportable dans le larynx, le matin.—Toux chronique du matin.— Enrouement surtout le matin.

Tension brûlante, élançante dans les téguments de la poitrine. — Les mamelles deviennent flasques et s'atrophient. — Palpitations du cœur violemment augmentées par chaque effort.

Déchirements dans les membres, surtout dans les articulations. — Tiraillement rhumatismal, surtout dans les cuisses et les genoux. — Gonflement du genou.

Tiraillements crampoïdes et tressaillements des tendons.—Forts tremblements surtout dans les mains et dans les bras.—Grande faiblesse au point que de parler provoque la sueur. — Amaigrissement jusqu'à l'état de squelette.

Gonflement ædémateux de tout le corps.

— Dartres entre les doigts. — Maladies des glandes à la suite de contusions. — Induration des glandes. — Peau sale avec sueur collante. — Peau âpre, sèche.

Insomnie.

Horripilation même dans un lieu chaud.

— Chaleur passagère. — Vers le matin sueur acide.

Depuis midi jusqu'au soir, grande susceptibilité, envie de pleurer.—Besoin de se mouvoir, on ne peut rester assis ni dormir.—Grande loquacité et gaîté immodérée.

### 68. IPECACUANHA.

Dur. D'Act., deux jours. — Antid.: Arn., ars. —
Puiss., I, III.

Vertiges avec titubation.

Céphalalgie comme si le cerveau et le crâne étaient brisés; elle s'étend au travers des os du crâne, jusqu'à la racine du nez, avec nausée.

Visage pâle, cercles bleus autour des yeux. — Face pâle, bouffie.

Dilatation des pupilles.—Chassie dans les angles des yeux.

Lèvres cuisantes. — Lèvres pleines d'aphtes et de boutons.

Épistaxis.

Odontalgie par accès, comme si les dents étaient arrachées.

Augmentation de salive.

Goût fade, pâteux.

Nausée avec accumulation de salive et renvois à vide. — Vomissement (en se baissant). — Vomissement de mucus. — Vomissement des femmes enceintes. — Vomissement avec diarrhée. — Choléra sporadique. — Choléra asiatique. — Vomissement de bile liquide, verdâtre, ou d'un liquide amer d'une odeur forte, précédé d'une pression sur la région de l'estomac. — Vomissement avec sueur, chaleur. — Respiration fétide et soif. — Vomissement des boissons. — Étranglement avec envie de vomir.

Malaise violent dans l'estomac et la région précordiale.— Sensation de laxité et de vide de l'estomac.

Mal de ventre avec pincement autour des hypochondres et dans la région précordiale. — Tranchées autour du nombril avec horripilation.

Selles diarrhéiques d'odeur acide. — Selle dyssentérique. — Diarrhée chronique. — Diarrhée bilieuse, muqueuse, avec des flocons blancs et suivie de tenesme. —

Ipecacuanha.

Selle sanguinolente, muqueuse.

Métrorrhagie et menace d'avortement.

Catarrhel — Coriza sec chronique. — Obstruction des narines avec perte de l'odorat. — Accès de suffocation.

Toux seche avec chatouillement, astriction dans le larynx et les bronches. —
Toux avec soulèvement d'estomac. —

Toux seche spasmodique et respiration entrecoupée: Toux nocturne seche avec coups douloureux dans la tête et l'estomac, enfin nausée et vomissement.

Toux suffocante. — Coqueluche.

Douleur de brisement dans tous les os.

— Fourmillement dans les articulations comme si les membres étaient engourdis.

Il s'associe aux symptômes une grande faiblesse. — Consomption. — Écoulement de sang par toutes les ouvertures du corps. — Apoplexie sanguine. — Maladies par abus de quinquina. — Esfets dynamiques de l'empoisonnement par l'arsenic. — Gastricité. — Suite fâcheuse de débauches nocturnes. — Refroidissement suivi d'accès de suffocation.

Accès de crampes. — Convulsion des enfants, — Tétanos. — Tressaillement convulsif de tous les muscles de la face, des pieds, du tronc.

Soubresauts dans le sommeil.

Fièvre intermittente avec peu de frisson, beaucoup de symptômes gastriques et oppression constrictive.—Fièvre avec respiration suspireuse.— Fièvre gastrique.— Froid avec horripilation.— Froid des extrémités et de la face.— Frisson précédé de malaise, pendiculations et lassitudes.— Chaleur universelle, la face alternativement pâle et froide, et sueur frontale froide.— Froid des extrémités qui sont couvertes de sueur.

Morosité, dédain pour toutes choses.

— Humeur chagrine. — Anxiété. —
Peur de la mort. — Inquiétude.

#### 69. KALI CARBONICUM.

Dur. d'Act., 40 jours. — Antid.: Camph., coff., éth. nitr. — Puiss., X.

Vertiges le matin ou le soir et après le repas. — Vertiges qui semblent venir de l'estomac. — Étourdissement. — Vertiges avec vacillation. — Vertiges en tournant vite la tête.

Tête étonnée. — Défaut de mémoire. — Perte subite de connaissance.

Céphalalgie en allant en voiture. — Hémicranie avec nausée. — Céphalalgie pressive ou déchirante, tiraillante. — Pression douloureuse à l'occiput. — Douleur comme si quelque chose se remuait dans la tête. — Céphalalgie atroce à travers les yeux. — Congestion de sang à la tête. — Elancements dans les tempes.

Sécheresse des cheveux. — Chute des cheveux. — Grande disposition au refroidissement de la tête. — Bosses douloureuses au cuir chevelu qui finissent par suppurer.

Boutons dans les sourcils. — Gonflement et ouverture difficile des paupières. — Paupières collées le matin. — Larmoiement. — Photophobie. — Aveuglement par la lumière. — Taches qui voltigent devant les yeux. — Disposition à la fixité du regard. — Déchirement et pression douloureuse aux yeux.

Gonflement inflammatoire des oreilles avec écoulement de pus et de cérumen liquide. — Élancements dans les oreilles. — Élancements du dedans au dehors. — Faiblesse de l'ouïe. — Gonflement des parotides, inflammation des parotides.

Jaunisse de la face. — Rougeur forte qui alterne avec la pâleur. — Chaleur passagère. — Cercles bleus autour des yeux. — Éruptions de boutons à la face avec épaisseur et rougeur des joues. — Bouffissure de la face.

Kali carbonicum.

Man car vonccan.

Émoussement de l'odorat. — Épistaxis. — Gonflement douloureux du nez.

Lèvres épaisses et gonflées. — Sensation de spasmes dans les lèvres. — Gonflement des glandes sous-maxillaires.

Odontalgie seulement en mangeant. --

Sensation de sécheresse à la bouche, avec grand afflux de salive. — Rénaclement de mucus. — Odeur désagréable de la bouche.

Goût acide ou amer dans la bouche. — Goût gâté. — Boulimie. — Goût prononcé pour le sucre et pour les acides.

Renvois fréquents. — Renvois acides. — Après avoir mangé quelque chose de chaud, pincements et inquiétudes dans le bas-ventre.

Nausée. — Envie de vomir avec anxiété. — Nausée en mangeant. — Vomiturition après le dîner et après une affection morale.

Tension au-dessus de l'estomac. Pression à la région précordiale el lancements dans la région précordiale et les hypochondres, qui coupent la respiration:

Pression dans le foie. — Douleur en se penchant, comme si le foie se dérangeait. — Inertie et froid du bas-ventre. — Coliques comme les douleurs de l'enfantement. — Fort ballonnement du bas-ventre après le dîner. — Abondance de vents. — Déplacement des vents. — Défaut ou abondante expulsion de vents. — Ascite.

Constipation. — Alternative de constipation et d'évacuations tous les deux
jours. — Selles dures et difficiles. —
Sortie difficile des excréments qui sont
trop volumineux. — Selles enveloppées de
mucus. — Anxiété avant la garde-robe. —
Inertie du rectum. — Pression douloureuse au rectum avant l'expulsion des
vents. — Prurit à l'anus. — Boutons hémorrhoidaux. — Déchirements et élancements dans l'anus.

Urine fréquente jour et nuite Fréquente envie d'uriner et toujours avec

peu d'urine. - Brûlare dans l'arètre en urinant.

Défaut ou engourdissement de l'appétit vénérien. — Répugnance pour le coît. — Défaut d'érection. — Absence des pollutions.

Les règles paraissent trop tôt. — Suppression des règles. — Les règles ne se montrent que difficilement d. l'époque de la puberté. — Éruptions avec prurit et excoriation aux cuisses pendant les règles. — Écoulement de sang chez une femme enceinte. —Leucorrhée jaunâtre avec prurit et cuisson aux parties génitales. — Écoulement leucorrhéique avec douleur violente au sacrum et douleurs du ventre comme celles de l'enfantement.

Obstruction des narines. — Coriza sec. — Enrouement avec éternuement violent.

Toux. — Toux nocturne. — Le soir et la nuit toux sèche, le matin avec expectoration. — Toux avec crachats purulents. — Expectoration difficile.

Respiration gênée. — Sifflement dans la poitrine. — Le matin serrement de la poitrine. — Asthme convulsif. — Crampes dans la poitrine en toussant. — Sensation dans la poitrine comme par contraction du cœur. — Hydrothorax. — Phthisie ulcéreuse. — Battements de cœur.

Douleurs aux reins comme par une chute. — Douleurs aux reins avec douleurs de ventre semblables à celles de l'enfantement. — Douleur tiraillante au dos qui s'élève du sacrum. — Raideur entre les omoplates. — Raideur de la nuque. — Pression sur les épaules. — Faiblesse des muscles de la nuque.

Engourdissement des bras dans le froid et après un mouvement violent. — Engourdissement des bras. — Manque de force dans les bras. — Faiblesse des bras, surtout le matin au lit. — Raideur de l'articulation du coude. — Tremblement des mains en écrivant. — Douleur paralytique dans le poignet. — Ampoules aux doigts. — Brûlure à la pointe des doigts.

90 Nau caroonicum.

Déchirements nocturnes dans les jambes.

—Frisson et fourmillement dans le tibia.

—Froid des pieds le soir au lit.—Raideur de l'articulation du pied. — Douleur de brûlure dans les jambes. — Sueur fétide des pieds. — Le soir agitation dans les jambes.

Déchirements dans les membres pendant le repos, avec gonflement (hydropique). — Sensibilité douloureuse des membres partout où on les comprime. — Engourdissement des membres. — Sensation comme si le corps était creux. — Faiblesse à s'évanouir et tremblement après la promenade. — Facilité à se refroidir; après le mouvement crainte extrême des courants d'air. — Tressaillement des muscles. — Fort bouillonnement du sang. — Facilité de se donner des tours de reins. — Paralysie. — Au grand air on se trouve mieux que dans la chambre.

Maladies des glandes après contusions.

—Dartres.—Douleur de la peau, comme celle d'un abcès.

Somnolence le soir de bonne heure.— On s'endort tard.— Sommeil anxieux, plein de rêves. — Cauchemar.

Frisson le soir et soif, souvent avec mal de dents. — Propension à frissonner pendant la journée. — Le matin au lit chaleur, avec douleur de la poitrine et du sacrum. — Sueur nocturne. — Grande disposition à suer en marchant et par la contention d'esprit. — Défaut de transpiration; on est incapable de suer.

Irritabilité chagrine. — Disposition à s'effrayer. — Crainte avec anxiété.

# 70. KALI HYDRIODICUM.

Dur. D'ACT., -ANTID.: -PUISS., X

Pesanteur de la tête, avec mauvaise humeur. — On ne sait où mettre la tête. — Céphalalgie compressive ou d'écartement, avec sensation de froid sur la parKali hydriodicum.

tie malade quoiqu'elle soit chaude. -Fouillement ou battement d'un seul côt dans le cerveau.

Douleur d'ulcération du cuir chevele en grattant.

Cuisson et démangeaison dans les yeux avec photophobie — Vue trouble. Douleur déchirante, élançante dan

l'oreille, avec grande sensibilité de l'ouïe Douleur déchirante à la face, avec gon flement des joues.—Face pâle.—Dartre

sèches pruriantes sur les joues.

Sensibilité des narines. — Déchiremen brûlant dans les narines. — Épistaxis.

Lèvres sèches fendillées, couvertes le matin d'un mucus visqueux.

A minuit douleur d'ulcération dans les dents. — Douleur des dents, augmentée par le froid et soulagée par le chaud. — Gencives gonflées, avec élancements douloureux.

Boutons brûlants douloureux sur la langue. — Salive sanguinolente avec mauvais goût à la bouche. — Odeur fétide de la bouche, comme celle que donne l'ognon.

Mal de gorge avec élancement en avalant.—Tantôt avec pression, tantôt avec douleur d'ulcération.

Goût amer, ou amer-douceâtre. — Goût rance après avoir mangé et bu.— Insapidité des aliments. — Disposition continuelle à des rapports de liquide désagréable, avec dégoût pour tous les aliments.

Sensation de vide dans l'estomac, qui ne cesse pas en mangeant. — Grouillement. — Cris dans l'estomac. — Pression brûlante à l'estomac qui n'est pas soulagée par des renvois.

Malde ventre déchirant, brûlant autour du nombril, avec malaise à l'estomac; renvois en entrant dans l'appartement.— Gonflement douloureux du bas-ventre. — Bruit dans le ventre comme par quelque chose de vivant. — Pression vers le bas, comme si quelque chose devait s'é-

chapper par les parties génitales. - Ti-

raillements dans la région de l'aine, comme s'il y avait quelque chose de vivant.

Selles dures et difficiles.

Envie fréquente d'uriner, urine abondante jour et nuit.

Menstruation plus forte.—Leucorrhée acré qui excorie la peau.

Obstruction des narines, avec écoulement d'un liquide brûlant, qui excorie.

Toux sèche produite par une irritation continuelle dans la trachée, avec apreté.

Douleur de brisement dans le dos, ou comme celle qui précède les règles, avec diarrhée.

Déchirement dans les membres.—Contraction des doigts.—Douleur de tension comme gonflement dans les bords de l'aisselle, pendant le mouvement et au toucher. — Élancements douloureux à la hanche, qui force à boiter.—La plupart des symptômes paraissent dans le repos et disparaissent dans le mouvement.

Bâillements très fréquents.—La nuit, inquiétude, insomnie avec soubresaut.

Prédominence du froid, de frisson, avec soif.

Le soir anxiété et envie de pleurer, comme s'il devait arriver quelque chose de malheureux.—Caractère violent, plein de dépit. —Disposition à la querelle, à la frayeur.

# 71. LACHESIS.

Vertiges étant assis, après avoir mar-

Accumulation des idées.—Congestion vers la tête.

Face bouffie. The book of the grant of

Le matin manque d'appétit.—Le goût du tabac est perdu.—Grand désir du vin, ses effets sont moins intenses qu'à l'ordinaire.—Appétit diminué, avec douleur dans la région précordiale, par la pression.

Constriction du sphincter de l'anus qui empêche les matières de s'échapper; il ne sort que des vents. — Selle insuffisante, avec pression. — Le soir diarrhée, avec un fort battement dans l'anus après l'évacuation.

Émission fréquente d'urine claire. Écumeuse.—Après avoir été à la garderobe, il y a encore, comme après avoir uriné, une deuxième émission d'urine.

Fort appétit vénérien avec grande lasciveté. — Grand appétit vénérien; si on le surmonte on a beaucoup de disposition au travail intellectuel.

Enrouement avec aphonie, parce qu'il y a quelque chose dans le larynx dont on ne peut se délivrer par l'expectoration.

— Sensibilité douloureuse du larynx au toucher, jusqu'à la suffocation.

— Envie continuelle de respirer profondément

Étant assis, douleur dans le dos, comme si quelque chose était enfoncé dans l'épine entre les omoplates, avec besoin de respirer profondément et de se pencher en avant.

quand on est assis.

Éruption pruriante de boutons aux doigts. — Douleur dans les mains, avec élancements dans les os et les cartilages, dans certains mouvements.

Prurit général qui force à gratter; après le grattement la peau s'épaissit.

Le soir grand besoin de dormir, le lendemain insomnie. — Rêves lascifs, désagréables. — Rêves poétiques dans le sommeil de l'après-midi.

Grande agitation qui force à s'occuper toujours et d'aller au grand air. — Anxiété en allant en voiture, avec pressentiment de quelque malheur. — Jalousie jusqu'à la folie (le soir). — Grande disposition à s'effrayer le soir. — Grande loquacité (pendant la somnolence); on est très sensible et facile à émouvoir. — Grande disposition à l'expansion et grande facilité d'exposer quelque chose. — Mau-

98 Lachesis.

vaise humeur avec grande disposition à la satire et aux choses bouffonnes.

## 72. LAMIUM ALBUM.

DUR. D'ACT., - ANTID.: - Puiss.,

Céphalalgie profonde dans le cerveau, surtout quand on se redresse après s'être baissé. — Céphalalgie; en quittant son siège aggravation, étant assis amélioration. — Céphalalgie comme si le cerveau était comprimé dans tous les sens, et les douleurs sont plus fortes au toucher. — Le cuir chevelu extrêmement tendu, surtout dans la région de la suture coronale.

- Grande mobilité de la tête.

Diminution de l'ouïe et de l'odorat. Renaclement de mucosité épaisse, acide, du pharynx.

Après avoir mangé ou bu, brûlure au milieu de la poitrine ou dans l'œsophage.

Malaise et vomissement des aliments ingérés, avec chaleur. — Grande faiblesse, abattement et trouble de la vue.

Fort gonflement du bas-ventre.—Mat de ventre pinçant, comme par des flatuosités, et qui n'est pas diminué par leur expulsion.

Selles en bouillie ou dures, avec sortie de sang.

Envie d'uriner, avec émission peu abondante d'urine.

Excrétion muqueuse par l'urêtre.

Règles trop hâtives. — Leucorrhée, quelquefois avec démangeaison aux parties génitales.

Voix faible, mal assurée, comme chez une personne qui est dans l'angoisse. — En parlant la respiration manque, avec sensation de faiblesse dans la poitrine.

Pression sur la poitrine, qui produit du malaise jusqu'à l'angoisse.

Fourmillement avec engourdissement du dos de la main et de la base du pouce, augmenté par le toucher et avec douleur violente dans le mouvement de la main. Lamium album.

Déchirements tiraillants dans les doigts.

Déchirements tiraillants dans les membres supérieurs et inférieurs. — Ulcères avec douleur élançante, cuisante.

Grande agitation physique et morale, avec tremblement des membres.

Froid avec faiblesse générale ou avec anxiété. — Chaleur brûlante des deux joues, sans rougeur et sans soif. — Soif continuelle, excepté pendant le froid.

Grande tristesse avec envie de pleurer.

Grande agitation et anxiété qui ne laisse reposer nulle part.

## 73. LAUROCERASUS.

Dur. D'Act., 6 à 8 jours. — Antin. : Camph., coff., ipéc. — Puiss.,

Vertiges avec la sensation comme s'il y avait un voile devant les yeux et comme si les objets environnants étaient en mouvement. — Vertiges en se redressant ou en quittant son siège.

Hébétement.—Perte de connaissance.

— Faiblesse de la mémoire.

Céphalalgie assourdissante, avec la sensation comme si le cerveau heurtait contre le crâne en se baissant.—Pesanteur de la tête, avec sensation de pression vers en-bas en se baissant.—Géphalalgie pressive très violente, dans la chambre.—Chaleur à la tête.—Froid continuel dans la tête.—Sensation de froid glacial au vertex, dans le front, à la nuque, jusque dans le sacrum, avec cessation des douleurs de tête.

Obscurcissement de la vue.—Tous les objets paraissent plus grands; on éprouve de l'anxiété. — Les yeux sont dilatés et demi-ouverts. — Convulsion ou raideur des yeux.—Pupilles dilatées, immobiles.

Figure hâve. — Couleur pâle, grisâtre du visage. — Face gonflée, bouffie.

Sensation de froid sur la langue. — Perte de la parole après une attaque d'apoplexie.

Déglutition difficile. — Impossibilité d'avaler avec perte de connaissance. — Crampe dans le pharynx et l'æsophage. — Les boissons tombent avec bruit. — Chaleur et brûlure dans le cou et dans le pharynx. — Tiraillements douloureux dans la gorge pendant la déglutition et hors le temps de la déglutition.

Goût douceâtre, âcre, à la bouche.— Soif violente avec sécheresse de la bouche. — Vomissement d'un liquide noir.

Douleur à l'estomac augmentée jusqu'à l'évanouissement. — Brâlure à l'estomac. — Brûlure dans la région précordiale et dans les hypochondres.

Sensation d'un gonflement de la grosseur d'une noix dans le côté gauche du ventre. — Mal de ventre comme coliques avec contraction et tranchées. — Brûlure dans le ventre. — Borborygmes et grouillements dans l'estomac et le bas-ventre. — Coliques venteuses.

Constipation. — Selle diarrhéique avec tranchée, tenesme et cuisson à l'anus. — Diarrhée de mucus liquide, verdâtre, avec contraction dans l'hypogastre.

Rétention d'urine. — Paralysie de la vessie. — Sortie involontaire de l'urine.

Règles trop hâtives et trop fortes.

Constriction crampoide de la trachéeartère. — Enrouement et voix basse, grave. — Respiration avec râle et ronflement.

Serrement de la poitrine comme si les poumons ne pouvaient s'épanouir. — Expectoration abondante, gélatineuse, avec des points sanguinolents. — Phthisie inflammatoire.

Douleur d'élancements dans la poitrine. Pression à la nuque qui force à tenir la tête penchée en avant avec tension en redressant ou en remuant la tête.

La peau est âpre, écailleuse entre les doigts.

Faiblesse subite avec affaissement extraordinaire des nerfs. — Apoplexie. — Paralysie des membres. — Grand affaissement avec bâillements fréquents et

envie de dormir. — Crampes et convulsions. — Tremblement des mains et des genoux pendant le mouvement au grand air.

Baillements fréquents, souvent avec horripilation et chair de poule. — Envie continuelle de dormir.

Frissonnement et froid avec tremblement qui n'est pas diminué par la chaleur du feu ou du lit.—Horripilation avec chair de poule, suivie de chaleur brûlante.—Froid général, surtout aux pieds au grand air.

Découragement. — Anxiété grande qui ne permet pas le repos et met obstacle au sommeil; elle cesse à l'air libre.

#### 74. LEDUM PALUSTRE.

Dur. D'ACT., 5 à 6 sem. dans les mal. chron.—ANTID. : Camph.—Puiss., V.

Vertiges étourdissants comme par ivresse, avec disposition à tomber en avant ou en arrière, plus fort en se baissant.

Embarras de la tête avec ébranlement douloureux du cerveau quand on fait un faux pas. — Céphalalgie pressive comme par un poids sur le cerveau. — Céphalalgie déchirante avec déchirement dans les yeux. — Inflammation et collement des paupières et fièvre le soir.

Fourmillement et prurit sur le cuir chevelu et au front, comme par des poux.

Dilatation des pupilles. — Faiblesse de la vue avec frémissements et lueurs devant les yeux. — Ophtalmie avec des larmes âcres et collement des paupières sans douleur.

Bruit dans les oreilles comme son de cloches et bruissement de vent. — Surdité comme s'il y avait quelque chose placé devant les oreilles.

Dartres sèches, farineuses qui, au grand air, causent de la cuisson. — Eruption boutonneuse, rouge, douloureuse, élan100 Leaum patustre.

cante au toucher à la face. — Éruption boutonneuse sur le front comme chez les personnes qui abusent de l'eau-de-vie. — Petits boutons et furoncles au front.

Brûlure dans le nez comme par des charbons enflammés, avec douleur au toucher. — Épistaxis.

Élancements douloureux à la gorge pendant et hors le temps de la déglutition, avec le sentiment comme d'une cheville à la gorge.

Accumulation d'eau à la bouche avec des coliques fouillantes. — Malaise et envie de vomir quand on crache.

Tranchées le soir.—Mal de ventre dyssentérique comme s'il devait paraître une diarrhée. — Ascite.

Constipation. — Diarrhée avec des mucosités et du sang.

Excrétion augmentée de l'urine. — Diabète. — Gonflement de l'urètre.

Érections violentes. — Pollutions noeturnes de semence aqueuse ou sanguinolente.

Règles plus fortes et trop précoces.

Toux précédée d'asthme suffocant. —
Toux avec crachat de sang vermeil. — Hémorrhagie de poitrine. — Crachats de sang.
— Expectoration verdâtre, fétide, pendant
la toux. — Toux nocturne ou matinale
avec crachats purulents. — Toux fatigante asthmatique. — (Coqueluche.)

Inspiration spasmodique, sanglotante comme chez les enfants après avoir pleuré fortement. — Respiration gênée et douloureuse. — Constriction asthmatique de la poitrine, augmentée par le mouvement et par la marche. — Asthme en montant un escalier. — Suppuration des poumons. — Élancements dans la poitrine, surtout dans le mouvement des bras. — Démangeaison sur la poitrine comme par des poux, avec des taches rouges miliaires.

Douleur au dos et aux lombes avec raideur après avoir été assis.

Élancements douloureux dans les omoplates et l'humérus en levant et mouvant le bras. — Douleur pressive dans l'articulation scapulaire, augmentée par le mouvement. — Tremblement des mains (comme chez les vieillards) pendant le mouvement ou quand on veut saisir quelque chose.

Ledum palustre.

Douleur de foulure pressive aux cuisses, surtout au toucher et pendant la marche.-Tremblement des genoux étant assis et en marchant. - Faiblesse dans l'articulation du genou avec pression déchirante en marchant. - Douleur dechirante du genou avec gonflement dur et dureté de toute la jambe. - Gonflement tensif du genou. - Raideur et tension dans le genou. - Gonflement chaud des cuisses au-dessus et au-dessous du genou avec tiraillement et élancement douloureux. - Gonflement opiniâtre du pied. - Tension crampoïde dans le genou, le mollet et le calcaneum. - Raideur des pieds. - Douleur au talon en marchant, comme s'il y avait échymose. - Mollesse et gonflement du gros orteil avec douleur en s'appuyant. - Goutte doulou-

Douleur pressive, ou pressive déchirante dans les membres supérieurs et inférieurs. - Sensation d'engourdissement et engourdissement dans les membres. Douleur de goutte dans les membres, le plus fort le soir quand le malade s'est réchauffé au lit, jusqu'à minuit. - Goutte noueuse des articulations. - Douleur dans les articulations, élançantes, déchirantes, battantes et paralytiques, surtout pendant le mouvement. - Les douleurs des articulations seules sont augmentées par le mouvement. - On ne peut supporter la chaleur du lit; elle produit de suite chaleur et brûlure dans les membres. --Froid et manoue de chaleur animale dans LES AFFECTIONS CHRONIQUES.

Anasarque général. - Furoncles.

Le matin et avant midi grande somnolence, besoin de se coucher. — Somnolence pendant le jour comme d'ivresse. — Insomnie la nuit avec jactation, soubresauts et rêvasserie quand on ferme

les yeux.

Violent frisson, horripilation avec froid des extrémités. - En marchant on transpire facilement, surtout au front; la sueur a une odeur acide. - Le soir chaleur aux mains et aux pieds.

Mécontentement jusqu'à la misanthropie. - Disposition à la colère, au dépit. - Grande sévérité.

### 75. LYCOPODIUM.

DUR. D'ACT., 7 à 8 sem. - ANTID.: Camph., puls. -Puiss., VIII, X.

Vertiges en se baissant. - Vertiges tournoyants avec envie de vomir, dans un appartement chaud. - Faiblesse de la mémoire.

Confusion des paroles. — Chaleur à la tête. - Congestion vers la tête. - Pesanteur de la tête. - Accès de douleurs déchirantes à la partie supérieure de la tête, au front, aux tempes, aux yeux, au nez jusques à une dent, qui forcent à se coucher .- Déchirement dans le front çà et là chaque après-midi. - Céphalalgie pressive, tensive. - Résonnement dans la tête à chaque pas. - Sensation d'évanouissement et grande inquiétude pendant la céphalalgie. - Hémicranie le soir, qui, par le travail d'esprit, augmente à devenir insupportable. — Céphalalgie battante le soir après s'être couché. - Céphalalgie au-dessus des yeux, de suite après le déjeuner.

Déchirement nocturne, térébration et sensation de raclement à la surface du crâne. - Calvitie. - Les cheveux deviennent gris. - Grande disposition au refroidissement de la tête. - Eruption à a tête qui suppure fortement.

Élancements dans les yeux, le soir à a lumière. - Pression sur les yeux. -

Cuisson aux yeux. - Collement des paupières. - Sensation de froid dans les yeux le soir. - Ophtalmie avec agglutination le soir et larmoiement pendant le jour. -Inflammation des paupières. - Fongus hémotode des yeux. - Eblouissement et irritation des yeux le soir à la lumière. -Presbyopie. - Vue trouble comme par des plumes devant les yeux. - Lueur et obscurcissement devant les yeux. - Orgelet.

Étreintes des oreilles au grand air. -Suppuration et écoulement des oreilles. - Extrême sensibilité de l'ouie. - Susceptibilité pour la musique. - Tintement d'oreilles. - Durete de l'ouie.

Accès de chaleur passagère à la face. - Couleur terreuse, jaunâtre, pâle de la face, avec des rides profondes, des lèvres bleuatres et cercles bleus autour des yeux. - Rougeur circonscrite des joues. -Éruption pruriante à la face. - Gonflement et tension dans la face. - Ephélides.

Épistaxis. — Obstruction par suppuration des narines pendant la nuit. -Narines ulcérées, pleines de croûtes. -L'odorat devient très fin.

Lèvres pâles et lèvres bleues. - Gonflement de la lèvre supérieure.

Odontalgie rémittente par les boissons chaudes et par la chaleur du lit.-Odontalgie seulement la nuit. - Les dents deviennent jaunes.

Gouflement dur d'un côté du cou. -Raideur d'un seul côté du cou. — Mal de cou chronique. - Glandes du cou gon-

Sécheresse dans la bouche de manière que les parties intérieures de la bouche sont tendues; la langue est difficile à mouvoir, la parole indistincte et manque de soif. - Engourdissement de l'intérieur de la bouche et de la langue. - Perte du goût. - Langue sale, chargée. - Crachotement de mucus. - Renvois d'un liquide désagréable.

Le matin, goût amer avec nausées. -

Le matin, goût de mucosité à la bouche.

— Grande appetence pour les choses douces.

— Faim immodérée — Boulimie. —

Manque de soif. — Absence de l'appetit.

— A la première bouchée, on perd l'appétit. — Aversion pour les aliments cuits et chauds, pour la viande et pour le pain bis

Rapports acides et gras. — Pyrosis. — Hoquet violent par accès. — Diarrhée produite par le lait. — Après le manger, oppression de la poitrine et plénitude.

Malaise le matin à jeun en quittant la chambre. — Malaise très fréquent. — Le matin, malaise à l'estomac. — Vomissement de sang.

Pression à l'estomac avec goût d'amertume à la bouche après le repas. — Après un léger refroidissement, douleur à l'estomac avec frissonnement et les mains comme engourdies. — Gonflement à l'epigastre avec douleur au toucher. — Cancer de l'estomac.

Plenitude de l'estomac et du bas-ventre.

— Ballonnement penible du ventre. — Ascite. — Defaut d'expulsion des vents. —
Flatuosités qui s'échappent par le haut.
Gargouillement dans le ventre. — Induration dans le bas-ventre. — Tranchées dans la partie supérieure du ventre. —
Brûlure dans le bas-ventre. — Douleur pressive dans le bas-ventre. — Contraction douloureuse du ventre. — Tension autour des hypochondres comme par un cerceau. — Douleurs hépatiques après avoir mangé à satiété. — Hépatite chronique. — Hernie inguinale.

Selles difficiles qui nécessitent de grands efforts. — Selles dures. — Constipation pendant plusieurs jours. — Diarrhée des femmes enceintes avec couleur pâle, terreuse, de la face. — Douleur à l'anus après avoir mangé et après la selle. — Tranchées dans le rectum et dans la vessie. — Nœuds hémorrhoïdaux. — Sortie du sang pendant la selle.

Envie fréquente d'uriner. — Urine trop fréquente et envie continuelle. — Gravier

# Lycopodium.

des reins. — Urine foncée avec un sédiment jaunâtre ou rougeâtre. — Écoulement de sang par l'urètre. — Prurit dans l'urètre pendant et après l'émission de l'urine.

Défaut ou faiblesse d'érection. — Absence de pollutions et défaut d'appétit vénérien. — Impuissance depuis plusieur années. — Répugnance pour le coît. — On est trop facilement porté au coît. — Toutes les nuits, appétit vénérien effréné. — Éjaculation trop prompte. — Blénor-rhée chronique.

Règles de trop longue durée. — (Trop tôt) et en trop grande abondance. — Règles supprimées depuis long-temps par une frayeur. — Leucorrhée (rougeâtre) — Leucorrhée rongeante. — Leucorrhée jaunâtre, précédée de tranchées dans la profondeur du bas-ventre.

Coriza fluent. — Coriza avec toux. — Coriza sec, avec embarras de la tête et brûlure au front. — Obstruction des deux narines.

Toux après avoir bu. — Toux sèche jour et nuit. — Toux matinale sèche chronique. — Toux avec crachats salés gris-noirâtres. — Toux avec crachats sanguinolents. — Toux avec forte expectoration purulente. — Phthisie ulcéreuse.

Elancements dans le côté gauche de la poitrine. — Tension sur la partie antérieure gauche de la poitrine. — Ardeur dans la poitrine comme par le pyrosis. — Pression continuelle au-dessous de la dernière côte gauche. — Plénitude et oppression de la poitrine au grand air après le repas. — Respiration courte des enfants. — Respiration courte pendant le travail. — Oppression continuelle de la poitrine. — Pneumonie négligée ou qui paraît menacer d'une fâcheuse terminaison. — Hydrothorax. — Croûtes humides sur le mamelon. — Palpitation du cœur pendant la digestion.

Élancements dans le sacrum quand on se redresse après s'être baissé. — Douleur violente au sacrum qui empêche Lycopoutum.

l'être assis sans être fléchi. — Douleur lorsale nocturne. — Déchirements dans les omoplates. — Tiraillements et contrac-

tion dans la nuque, jusqu'à l'occiput, jour et nuit. — Raideur de la nuque.

Douleurs tiraillantes dans les bras. — Douleur ostéocope nocturne dans les bras. — Faiblesse des bras. — Raideur goutteuse lans l'articulation de la main. — Engour-lissement des mains. — Raideur des doigts pendant le travail — Déchirements dans es articulations des doigts. — Rougeur, conflement, déchirement arthritique dans es articulations des doigts. — Raideur des loigts, produite par des nodosités gouteuses. — Verrues aux doigts. — Sécheresse le la peau des mains. — Brûlure dans la

paume des mains. Déchirement nocturne dans les jambes. -Tumeur blanche des jambes. - Déchiements dans les genoux. - Raideur des genoux. - Gonslement des genoux. -Ulcères chroniques des jambes, avec déchirements nocturnes et brûlure. - Chaeur brûlante des jambes. - Contraction louloureuse des mollets pendant la marche. Gonflement des malléoles. Crampes lans les pieds. - Tous les quatre jours une douleur de l'articulation coxo-fémorale jusqu'au pied. - Gonflement des pieds qui s'étend jusqu'à produire hydropisie de poitrine, avec gonssement des parties génitales .- Pieds froids .- Sueur froide des pieds jusqu'à l'excoriation. Forte sueur des pieds. — Douleur de la plante des pieds en marchant.-Renversement des orteils en marchant. - Crampes dans les orteils. - Élancements douloureux dans les cors aux pieds.

Douleur déchirante dans les extrémités, surtout la nuit et dans le repos. — Firaillements dans les membres, chaque troisième jour après midi. — Crampes et contraction des membres, surtout dans les doigts et les orteils. — Raideur dans tous les membres et articulations, surtout avec engourdissement et perte du sentiment. — C'est dans l'état de repos

qu'on sent le plus la faiblesse, et cependant on a de la répugnance pour le mouvement. — Bouillonnement du sang le soir, avec inquiétude et tremblement. — Sensation comme si la circulation était suspendue. — Les symptômes augmentent l'après-midi vers quatre heures, mais vers huit heures du soir on se trouve mieux, la faiblesse exceptée. — Manque de Chaleur du corps. — Grande disposition à se refroidir.

Gonflement inflammatoire de différentes parties du corps. - Fendillement et fissures de la peau. - Prurit en s'échauffant pendant le jour. - Prurit le soir avant de se coucher. - Eruption douloureuse au cou et à la poitrine. Eruption urticaire. - Fort furoncle. - Ulcères saignants, avec cuisson pendant le pansement. -Grandes taches rouges sur la peau. -Taches hépatiques sur la poitrine, la nuque et aux bras. — Éphélides nombreuses .- Ecorchure chez les enfants .- Dartres avec gerçures profondes et croûtes épaisses. - Dartres humides avec suppuration. - Varices. - Varices chez les femmes enceintes. - Gonflement des glandes. - Affections scrofuleuses. Inflammation des os. - Carie. - Rachitis.

Engourdissement des membres. — Insensibilité des bras et des pieds. — Après une courte promenade l'assitude et brûlure à la plante des pieds. — Manque de force intérieure. — Lassitudes dans les membres. — Lassitudes en se réveillant. — Envie continuelle d'être couché. — Ce médicament est surtout applicable après la calcaire.

Bâillements fréquents et somnolence.

— Envie de bâiller qu'on ne peut effectuer.—Le jour et le soir somnolence. —
On s'endort très tard. — Sommeil agité, plein de rêves esfrayantset avec réveil fréquent.

— Difficulté de s'endormir par le nombre des idées qui vous assiégent.—Pendant la journée on s'endort aussitôt qu'on se couche. — On s'endort pendant le coît. — Cauchemar.

Magnesia carbonica. vement. - Tension de la face, comme Frisson le soir, quelquefois d'un seul produite par du blanc d'œuf desséché. Gonflement de la face et bouffissure tubéreuse. - Couleur terreuse de la face. -

côté, quelquefois revenant tous les deux jours, suivi de chaleur ou de sueur sans chaleur. - Fièvre tierce avec vomissement acide; après le frisson bouffissure de la face et des mains. - Chaleur passagère. - Chaleur brûlante et courte haleine. - Sueur par le plus petit mouvement, pendant le jour, surtout à la face. - Sueurnocturne, souvent fétide, surtout à la poitrine et sur le dos. - Sueur nocturne visqueuse. - Fièvre nerveuse.

Anxiété dans la région précordiale, avec envie de pleurer et affliction, surtout après chagrin, et on craint l'approche des personnes. - Crainte de la solitude. -Irritabilité et susceptibilité qui produit facilement des pleurs .- Humeur chagrine .-Entêtement. - Indifférence absolue. -Manie et fureur qui se manifestent par un caractère ennuyeux. - Préoccupation. - Reproches et commandement. - Misanthropie. - Caractère doux, complaisant.

## 76. MAGNESIA CARBONICA.

DUR. D'ACT., 40 à 50 j .- ANTID. : Incon. Puiss., X.

Embarras de la tête par le travail d'esprit. - Pression douloureuse dans la tête par le travail d'esprit et dans la foule. -Céphalalgie tiraillante frontale, avec malaise. - Tension et tiraillement dans l'occiput, comme par raideur de la nuque.

Ophtalmie scrofulcuse. - Ophtalmie avec obscurcissement de la cornée. - Cataracte. - Taches noires devant les yeux. -Collement des paupières.

Grande sensibilité de l'ouïe au bruit. - Durete de l'ouie. - Diminution de l'ouïe, avec bourdonnement des oreilles qui augmente dans la chambre.

Chaleur et pâleur de la face alternati-

Expression de mauvaise humeur. Épistaxis le matin. - Éruption de vésicules dans le nez, avec douleur d'étreintes.

Éruption de boutons dans la bouche et sur la langue. - Petits boutons dans la bouche, qui saignent et brûlent au moindre attouchement, en mangeant. - Parole subitement et fréquemment arrêtée. -Salive sanguinolente.

Odontalgie en voiture.-Brûlure dans les dents, plus forte le soir et la nuit dans le lit. - Élancements dans les dents après avoir mangé. - Odontalgie augmentée par le froid. - Odontalgie avec grande inquiétude. - Odontalgie des femmes enceintes.

Brûlure dans la gorge et le palais, avec âpreté, comme s'il y avait des barbes

Goût amer avec langue blanche, couverte de mucus épais, ainsi qu'aux dents. - Goût perdu des aliments; ils ont la saveur de paille. - Goût prononcé pour les légumes. - Soif vive pour l'eau. -Goût acide à la bouche.

Renvois acides. - Nausées et vertiges pendant le dîner, suivi d'étranglement et de vomissement d'eau salée et amère.

Contraction et pression à l'estomac.-Crampe d'estomac.

Ballonnement et pesanteur dans le bas-ventre. - Pincements dans le basventre. - Tranchées dans les intestins, avec pression vers le bas, comme à l'approche des règles.-Hernie inguinale.-Crampes dans le bas-ventre, suivies de leucorrhée.

Dureté et rétention des selles.—Selles diarrhéiques, vertes, écumeuses, et avec tranchées. Diarrhée chronique des enfants, d'une odeur acide.

Urines abondantes et très pâles. -- (Diabétès.) -- Pissement involontaire. -- Brûlure et cuisson dans l'urètre en urinant.

Diminution d'appétit vénérien. — Manque d'érection.

Retard des règles ou suppression entière. — Douleurs pendant les règles. — Leucorrhée blanchâtre, muqueuse, avec démangeaison.

Obturation du nez. — Coriza sec qui force à respirer par la bouche.

Toux produite par chatouillement, avec crachats ténus et salés. — Toux matinale avec crachats purulents.

Raideur de la nuque.—La nuit douleurs violentes du dos et du sacrum, comme s'ils étaient brisés.

Accès de douleur déchirante dans l'aisselle, qui dure la nuit, avec fourmillement jusqu'au bout des doigts et impossibilité absolue de mouvoir les bras.—Douleur tiraillante dans les bras et les mains.—Gonflement et rougeur inflammatoire des doigts. — Vésicules rongeantes aux mains et aux doigts.—Tension spasmodique dans les phalanges des doigts.—Chaleur aux doigts.

Douleur tiraillante dans les jambes et les pieds. — Furoncles aux jambes. — Prurit aux fesses, avec taches rouges après le grattement.

Tressaillement douloureux dans différentes parties du corps.—Douleur générale du corps.—Lassitudes dans les pieds, surtout étant assis.—On tombe subitement et fréquemment à terre en marchant et quand on est debout, avec connaissance.—On se fatigue facilement en se promenant. — Inquiétude dans les membres, le soir lorsqu'on reste long-temps assis.— Les douleurs qui se sont manifestées étant assis diminuent en marchant.

Nodosités volumineuses à la peau, avec élancements. — Petites dartres rouges, insensibles, qui s'écaillent plus tard. —Petits furoncles.—Prurit violent et sécheresse de la peau.

Bâillements violents et fréquents. — Somnolence pendant le jour. — La nuit rêves qui produisent de l'anxiété. — Sommeil qui n'est pas réparateur. — Le matin

en s'éveillant on se trouve plus fatigué que le soir. — Insomnie produite par un serrement du bas-ventre, pendant la nuit.

Frisson le soir, le matin sentiment de chaleur sans soif et sans sueur. — Sueur nocturne, visqueuse et souvent fétide. — Sueur acide.

Anxiété et peur, avec tremblement et chaleur. — Mauvaise humeur le soir.

### 77. MAGNES ARTIFICIALIS.

Dur. D'Act., 10 à 12 jours. — Antid.: Les pôles opposés.

Vertiges, surtout le soir, après être couché, ou secousse subite à travers la tête. —Vertiges avec titubation, et la sensation comme si tous les objets étaient va cillants.

Céphalalgie par les efforts de la mémoire. — Céphalalgie fouillante, assourdissante, qui s'apaise par le mouvement des flatuosités. — Céphalalgie comme d'un clou enfoncé, surtout après le chagrin. — Déchirement à la tête qui vient par secousse.

Frémissement de lueurs blanchâtres devant les yeux au crépuscule.

Diminution de l'ouïe. — Bruit dans les oreilles et dans la tête.

Sueur à la face le matin, sans chaleur.

— Élancement brûlant, insupportable, dans les muscles de la face, le soir.

Aberration de l'odorat. — On sent comme l'odeur du fumier ou des vêtemens qui ont été long-temps renfermés.

Boutons aux lèvres qui produisent une douleur d'écorchure.—Salivation le soir avec lèvres gonflées.

Déchirement tressaillant dans les os de la mâchoire supérieure. — Odontalgie après avoir bu froid, ou quand on respire l'air froid. — Odontalgie pressive, tirail-

wrug nes ar tipicans.

100 magnes arrepetatis.

lante, par secousses isolées. — Odontalgie dans les dents creuses, avec gonfle-

ment de la gencive.

Odeur fétide continuelle de la bouche, dont on ne s'aperçoit pas soi-même. — Goût métallique à la bouche. — Insipidité du tabac et de la bière. — Goût de moisissure. — Satiété prompte. — Forte soif le soir.

Renvois qui avortent. — Renvois d'odeur, de goût et saveur de ratissure de corne. — Régurgitation acide en se baissant.

Pression dans l'estomac avec crampe, qui monte vers les parties supérieures.— Inquiétude qui empêche le repos.—Lourdeur de la langue, pâleur de la face et froid du corps.

Pression et plénitude avec anxiété à l'épigastre, surtout par des efforts de méditation. — Bruit et gargouillement dans le ventre. — Beaucoup de flatuosités. — Coliques venteuses. — Sortie de flatuo-

sités avec douleur pressive.

Diarrhée sans douleur avec flatuosité.—
Constipation qui semble être produite par
un resserrement du rectum. — Douleur
cuisante hémorrhoïdale après la garderobe, avec constriction au rectum.—Hémorrhoïdes aveugles et chute du rectum.

Brûlure dans la région des vésicules séminales qui porte au coït. — Aversion pour le coït. — Érection sans idées voluptueuses.—Rétraction du prépuce derrière le gland. — Gonflement de l'épididyme avecdouleur pendant le mouvement et au toucher.

Règles trop hâtives, trop fortes et trop prolongées.

Accès nocturnes de toux sèche. — Toux spasmodique, surtout après minuit, avec insomnie et méditation.

Oppression nocturne produite par des mucosités dans la trachée-artère, qui s'expectorent facilement le matin. — Élancements brûlants, insupportables dans les muscles de la poitrine.

Tiraillement dans l'épine dorsale com-

me par quelque chose de vivant. —Douleur de l'épine dorsale à sa jonction au sacrum, le matin au lit, étant couché sur le côté, ou pendant la journée en se baissant.

Douleur de foulure dans l'articulation de l'épaule, ou comme si un tendon tressaillait au poignet. — Douleur tiraillante dans les articulations et muscles des bras; quelquefois de la tête aux doigts.—Tressaillement déchirant des muscles des bras par un long séjour au froid. — Taches rouges dans les paumes des mains, qui ressemblent à des ampoules pleines d'eau.

Accès de crampe aux mollets et aux orteils le matin après le réveil. — Élancement brûlant au calcanéum et dans les cors.

Brûlure dans les membres et dans les articulations.—Élancement brûlant dans les parties charnues. — Douleur de foulure dans les membres.—Douleur de brisure dans les articulations, surtout le soir et le matin au lit; plus fort pendant le mouvement. —Fusées brûlantes parcourant diverses parties du corps, avec directions diverses. — Horripilation qui parcourt le corps. — Ébranlement du corps comme par frayeur ou secousses qui le forcent à fléchir ou à se redresser brusquement, quelquefois avec perte de connaissance.

Les anciennes plaies saignent très facilement. — Ulcères douloureux. — Petits furoncles. — Vésicules avec douleur tiraillante, élançante.

Sommeil agité avec parole, ronflement et jactation continuelle.— On se réveille après minuit, et ce n'est que le matin qu'on tombe dans l'assoupissement.— On est couché sur le dos, la main sous l'occiput, les genoux écartés, la bouche demi-ouverte et avec respiration ronflante. — Rêves voluptueux. — Tressaillements avant de s'endormir. — Après le réveil, le matin, céphalalgie avec brisement dans toutes les articulations, qui force à changer de position.

La nuit et le matin au lit, chaleur sèche avec besoin de se découvrir.

Précipitation avec zèle. — Distraction. —Caractère inconstant. —Inadvertance. — Grande disposition à la colère. — Après le chagrin, céphalalgie avec douleur d'excoriation, ou celle que produirait un clou enfoncé.

# 78. MAGNETIS POLUS ARCTICUS.

Dur. D'ACT., 10 à 12 jours.—ANTID.: Le pôle opposé.

Vertiges comme par ivresse, avec chancellement en marchant au grand air, et la station est mal assurée. —Tiraillement semi-latéral vertigineux du centre de la tête vers les oreilles, comme le balancier d'une pendule.

Perte de connaissance avec pression vers en-bas dans le cerveau, à travers les yeux. — Faiblesse de la mémoire. — On écrit un mot pour l'autre.

Céphalalgie pendant le mouvement et en levant les yeux. — Céphalalgie dépressive comme par un poids. — Céphalalgie comme si le crâne allait éclater.

Tension des téguments de la tête comme si la peau était trop adhérente.

Proéminence des yeux qui sont fixés sur un objet. — Froid glacial des yeux. — Mouvement irrégulier des yeux. — Élancement, prurit et tiraillement par secousses dans les paupières avec larmoiement. — Sensation de sécheresse douloureuse des paupières, le matin au réveil.

Chaleur et bruit dans les oreilles, comme celui d'eau en ébullition. — Surdité, comme si on avait une peau placée devant les oreilles.

Aberration de l'odorat; il semble qu'on a l'odeur d'œufs pourris ou de poussière. —E pistaxis à la suite d'une céphalalgie frontale pressive. — Le bout du nez est rouge, brûlant, avec des taches rouges, chaudes et fortement circonscrites sur les joues.

Serrement douloureux dans les muscles du cou, dans l'articulation de la mâchoire, qui, pendant le mouvement, semble être luxée.

Odontalgie dans les dents creuses, par secousses, comme si on les arrachait. -Odontalgie rhumatismale dans les dents creuses avec les gencives gonflées, douloureuses au toucher. - Odontalgie (dans les dents creuses) après le dîner et augmentée par la chaleur, améliorée au grand air et pendant la marche. - Odontalgie avec les joues gonflées, rouges, brûlantes. -Odontalgie par secousses avec douleur de fouillement, déchirement, brûlure, élancement, comme d travers le périoste. --Douleur des dents incisives pendant la respiration .- Engourdissement et insensibilité des gencives quand l'odontalgie cesse.

Insapidité des aliments. — Goût acide à la bouche. — Goût amer du tabac.

Renvois d'air fréquents. — Pyrosis continuel, surtout après le souper.

Fort développement et déplacement de vents.— colique venteuse pressive.— Secousses dans le bas-ventre, comme s'il y tombait quelque chose en-bas, ou des coups qui partent du ventre et montent au travers de la poitrine jusqu'à la gorge.—Ballonnement du ventre.—Une pression à travers l'anneau inguinal, comme s'il devait se former une hernie avec relâchement de l'anneau.— Hernie inguinale.

Selles dures depuis long-temps et constipation. — Selle dure, difficile qui souvent n'a lieu qu'après une douleur dyssentérique tiraillante dans le bas-ventre.

Sécrétion augmentée d'urine.—Urine couleur foncée.

Érection immodérée avec beaucoup de pollutions. — Désirs du coît.

Règles trop faibles. — Suppression des règles.

Asthme sec, profond, augmenté par la

Magnetis polus arcticus.

marche au grand air. — Toux spasmodique ébranlante, le soir, quand on veut s'endormir, qui trouble le sommeil. — Toux spasmodique suffocante à minuit, qui ébranle la tête et tout le corps et produit une chaleur; elle ne cesse qu'après une sueur générale.

Douleur de brisement dans le dos en se renversant. — Craquement dans les vertèbres cervicales pendant le mouve-

ment.

Inflammation du dos de la main avec douleur pulsative. — Pesanteur dans les bras, les mains et les doigts.

Douleur de brisement dans l'articulation coxo-fémorale et des membres inférieurs. — Grande lassitude dans les membres inférieurs; ils semblent toujours fléchir en marchant. — Douleur vive aux orteils et aux cors.

Grande lassitude et courbature universelle avec découragement, surtout le ma-

tin et au grand air.

Sensation tiraillante dans le périoste de tous les os, comme au début des accès des fièvres intermittentes. — Douleurs élançantes, fouillantes, dans différentes parties du corps; elles sont d'autant plus fortes qu'elles sont plus profondes. — Dans les parties qui sont touchées par l'aimant, une sensation de congestion de sang, de secousses élançantes, battements, tremblements, sensation de froid. — Extrême irritabilité avec tremblement, agitation continuelle dans les membres et grande faiblesse des nerfs.

Fourmillement et prurit élançant à la peau. — Cuisson et déchirement brûlant dans les dartres.—Panaris.

Bâillement violent spasmodique, avec douleur dans l'articulation de la mâchoire, comme si elle allait se luxer. — Grande somnolence pendant le jour. — Besoin continuel de dormir. — Sommeil profond la nuit, couché sur le dos. — Rêves vifs (voluptueux); on chante pendant le sommeil. — Réveil par secousse violente dans les muscles du cou. — Jac-

tation pendant le sommeil avec chaleur incommode sans soif, qui force à se dé-

Froid et sensation de froid général. —
GRANDE DISPOSITION A FRISSONNER. — Fraîcheur dans les mains avec sueur froide dans cette partie ou dans tout le corps. — Horripilation suivie d'une chaleur passagère et gonflement des veines des mains. — Sensation de chaleur générale avec les mains et les pieds froids.

Mauvaise humeur. — Caractère pleureur avec disposition au froid. — Caractère doux, soumis. — Paresse; on reste assis comme immobile. — Indécision qui passe à une brusque exécution des projets. — On parle seul. — Humeur changeante. — Caractère soucieux.

## 79. MAGNETIS POLUS AUSTRALIS.

Dur. D'ACT., 10 à 12 jours.—Antid.: Le pôle opposé.

Vertiges comme par ivresse avec chancellement en marchant.

Inconstance des idées.

Pesanteur à la tête avec fourmillement et fouillement dans l'intérieur. — Coups dans la tête, quelquesois avec déchirement.

Sécheresse cuisante des paupières, surtout pendant le mouvement, le soir et le matin. — Larmoiement. — Vue trouble.

Odontalgie déchirante, tressaillante, augmentée par la chaleur.

Salive aqueuse abondante. — Parole difficile comme par gonflement de la langue.

Brûlure dans le gosier.

Goût métallique tantôt douceâtre, tantôt acidule. — Goût peu sensible des aliments. — Grande indifférence pour le Magnetis polus australis.

manger, la boisson et la fumée du tabac. — Faim vive à midi et le soir, et même

pendant le froid de la fièvre.

Pression dans la région précordiale produite par les efforts du travail d'esprit.

Pincements dans le ventre produits par un courant d'air. — Grouillement et borborygmes dans le bas-ventre. — Coliques venteuses avec pincement, pression et ballonnement du ventre. — Sensation de dilatation de l'anneau inguinal comme si une hernie devait se former avec une dilatation douloureuse de cette partie à chaque secousse de toux.

Selle diarrhéique molle précédée de tranchée. — Selle liquide avec sensation comme pour rendre un vent. — Resserrement et constriction de l'anus.

Sortie involontaire de l'urine par paralysie du sphincter de la vessie; on urine fréquemment la nuit.

Grand appétit vénérien.—Impuissance.

— Dans le point le plus élevé de l'érétisme la sensation de volupté se perd. — Douleur dans la verge comme si les fibres en étaient déchirées. — Rétraction des testicules pendant la nuit. — Gonflement des testicules avec secousses déchirantes.

Règles trop tôt et trop fortes. — Métrorrhagie.

Coriza fluent, fort. — Coriza et toux avec crachat de mucosité verdâtre et respiration courte. — Accès de toux fétide avec haleine fétide pendant la nuit.

Grand besoin de faire de profondes inspirations comme des soupirs. — Oppression de la poitrine avec respiration tremblotante et haleine froide. — Pression tiraillante du côté du sternum avec anxiété qui ne permet pas le repos. — Fortes palpitations de cœur. — Battements près du cœur.

Douleur pressive brûlante au sacrum pendant le repos et le mouvement. — Douleur de brisement et de luxation de l'articulation de la dernière vertèbre lombaire avec le sacrum. Fourmillements le long du bras comme des petits ébranlements. — Tressaillements douloureux dans le bras. — Fourmillements et battements dans les pointes des doigts. — Pesanteur et lassitude dans les bras. — Mouvement dans les bras et dans les veines du bras de haut en bas. — Panaris.

mugnetts poras austrans. 109

Battements tressaillants dans les tendons du jarret avec contraction des muscles des jambes, surtout pendant le mouvement. — Déchirement pressif dans la rotule. — Battements dans les muscles du pied après avoir marché. — Les genoux fléchissent pendant le mouvement. — Grande facilité à se faire des entorses. — Douleur d'écorchure et grande sensibilité de l'ongle du gros orteil. — Les ongles se recourbent et s'enfoncent dans

la chair. — Varices.

Tiraillements dans l'articulation des doigts, des pieds et dans les malléoles. —
Douleur élançante, battante, aux racines des ongles. — Douleur pinçante, élançante, brûlante dans différentes parties du corps. — Douleur de brisure dans les articulations des membres comme si on était couché sur des pierres. — Grande disposition à se refroidir. — Le nez, les oreilles, les pieds, les mains gèlent à un froid peu intense.

Lassitude subite en se promenant, avec anxiété. — Chaleur et besoin pressant de dormir.

Grande somnolence le matin; le soir, les paupières tombent et cependant on ne peut dormir. — Insomnie avant minuit. — Rêves confus effrayants. — Rêves dans lesquels on croit faire avec effort un travail de l'esprit. — Avant minuit l'inspiration est lente, ronflante, et après minuit l'expiration. — On est couché sur le dos pendant le sommeil. — Le matin la congestion vers la tête force d'être couché, cette partie étant très élevée.

Grande aversion pour le grand air; il produit une impression désagréable, même quand il est chaud. — Envie de pleurer 110 magnetts potus australis.

comme par dépit. - Horripilation avec obscurcissement devant les yeux. -Tremblement et jactation des membres sans froid, suivi de chaleur à la tête et à la face.

Mauvaise humeur avec éloignement pour la conversation. - Aversion pour la société et les personnes gaies. - Caractère violent et colère.

#### 80. MANGANUM.

DUR. D'ACT., 40 jours .- ANTID.: Café .-Puiss., X.

Céphalalgie élançante, tiraillante au grand air; dans la chambre amélioration. - Céphalalgie brûlante pressive dans les parties latérales de la tête (et l'occiput) qui passe au grand air. - Congestion vers la tête. - Ébranlement douloureux du cerveau pendant le mouvement. Battement et heurtement dans la tête comme si le cerveau suppurait. - Amélioration au grand air. - Les douleurs de tête qui se sont manifestées dans la chambre s'apaisent au grand air et vice versâ.

Dilatation et resserrement des pupilles. - Forte myopie. - Pression douloureuse sur les yeux produite par la lumière artificielle et par l'application. - Grande chaleur et secheresse des yeux. - Les yeux sont gonflés et douloureux dans leur mouvement.

Élancements douloureux dans l'oreille, en parlant, en riant, en avalant et en marchant vite. - Etreintes des oreilles. -Douleur tiraillante dans l'oreille qui part des parties voisines. — Dureté de l'ouïe comme si les oreilles étaient obstruées.

Couleur pâle et maladive de la face. - Serrement de crampe dans les mâchoires après le dîner. - Déchirement violent entre la racine du nez et le sourcil, comme si la peau était pincée.

Manganum. Lèvres sèches. - Éruption et ulcère

aux commissures des lèvres. - Boutons et vésicules brûlantes à la langue.

Sensibilité douloureuse des dents. -Douleur violente et déchirante dans les dents molaires, qui s'étend aux parties voisines, avec grand affaissement et inquiétude; la plus forte douleur a lieu de dix heures à midi et dans la soirée. -Odontalgie augmentée par le froid à devenir insupportable.

Élancements obtus des deux côtés du larynx jusqu'à l'oreille, pendant la déglutition. - Quand on rit, on éprouve des secousses élancantes du côté droit de la mâchoire inférieure jusque dans les tempes. - Crampes dans les mâchoires après le dîner. - Sécheresse avec grattement dans la gorge avec la sensation comme si la trachée était fermée par une petite membrane.

Goût pâteux, huileux dans la bouche. - Le matin, odeur imaginaire d'argile dans la bouche. - Aversion pour le manger, produite par un sentiment de satiété. - Renvois acidules de l'estomac comme le pyrosis. - Absence de soif.

Chaleur et brûlure dans l'estomac, souvent avec grande inquiétude; elle remonte jusqu'au bout de la poitrine. -Tiraillement dans la région de l'estomac avec nausée comme si la région précordiale se dilatait tout à coup.

Pression dans les hypochondres. -Contraction avec nausées qui s'étend du milieu du bas-ventre jusque dans la poitrine. - Douleur pressive d'excoriation dans l'épigastre et la région précordiale.

Constipation. - Selles sèches difficiles. Fréquente envie d'uriner. - Élancements dans l'urètre pour uriner.

Tiraillements prurigineux dans les cordons des vaisseaux spermatiques, avec sentiment de faiblesse aux parties génitales. - Prurit à la couronne du gland.

Règles qui avancent.

Coriza sec. — Obstruction des deux narines. - Voix raugue enrouée le matin et au grand air, provenant d'une maladie habituelle de la trachée-artère. — Phthisie trachéale. — Enrouement et coriza.

Toux sèche produite par la lecture à haute voix et la parole, avec sécheresse et âpreté dans la gorge. — Le matin, expectoration abondante de mucosité pâle, jaunâtre, verdâtre, grumeleuse et presque sans toux. — Expectoration sanguinolente.

Élancements dans la poitrine et le sternum qui montent et descendent. — Chaleur désagréable à la poitrine avec haleine chaude qui brûle dans la trachée. — Heurtement dans la poitrine ou coups subits dans les côtés de haut en bas.

Raideur à la nuque. — Déchirement le long de l'épine dorsale dans le repos et pendant le mouvement.

Tiraillements et déchirements qui commencent à l'omoplate et s'étendent dans tout le bras. — Dartres pruriantes à l'avant-bras.

Élancements par secousses dans les cuisses. — Gonflement et inflammation des malléoles, avec élancement jusque dans les jambes. — Tressaillement des muscles dans les membres inférieurs par le plus léger mouvement.

Tiraitlements et déchirements dans les membres superieurs et inférieurs. - Douleur tensive dans les articulations et dans les membres, surtout dans leur extension, comme si les tendons étaient trop courts. - Elancements par secousses dans les différentes parties du corps. — Douleur nocturne insupportable dans le périoste et les articulations. - Lassitude et tremblement dans les articulations. - Gonflement des articulations après le refroidissement. - Goutte dan s les articulations avec élancement, tiraillement, fouillement, plus forts la nuit, souvent d'un seul côté et en se croisant. -Gonflement goutteux des articulations qui sont d'un rouge luisant. - Malaise universel, surout dans l'estomac, avec mauvaise humeur. - La peau guérit dissicilement.-

Ardeur à la peau de tout le corps, le soir et en sortant du lit.

Le soir, à huit heures, déjà somnolence et fatigue. — Beaucoup de rêves vifs, dont on conserve parfaitement le souvenir.

Froid avec tremblement le soir, céphalalgie élançante et sans soif.— Froid avec chaleur fugace à la tête. — Chaleur fébrile dans la poitrine et sur les joues avec endolorissement de toutes les parties du corps, qui ne permet pas le plus léger attouchement. — Sueur nocturne, quelquefois seulement à la gorge et aux jambes, qui force à se gratter.

Morosité taciturne.

## 81. MENYANTES TRIFOLIATA.

Dur. D'Act., incon. - Antid.: Op. - Puiss. tinct., I.

Pesanteur continuelle de la tête. — Céphalalgie compressive avec la sensation, quand on monte un escalier, comme si un poids pressait sur le cerveau. — Embarras de la tête dans l'appartement, avec difficulté de penser; amélioration au grand air. — Céphalalgie tensive.

Rongement extérieur sur le vertex. — Douleur brûlante dans la peau du front.

Obscurcissement de la vue en lisant.

Raideur spasmodique des paupières.

Tintement d'oreilles. —Tressaillement visible sans douleur des muscles de la face et des paupières.

Odeur pénible, comme celle des œufs pourris. — Tension dans la racine du nez.

Sensation comme de paralysie dans le côté gauche du palais en bâillant et en toussant.

Sécheresse et âpreté à la gorge, qui rend la déglutition difficile.

Goût douceâtre amer à la bouche.— Renvois fréquents à vide.— Après le dîner vacuité douloureuse dans la tête. Contraction douloureuse à l'estomac.

— Grouillement continuel dans la région de l'estomac, comme s'il était vide.

Sensation de froid dans le bas-ventre, surtout quand on y applique la main. — Douleur d'excoriation aux téguments du ventre. — Bas-ventre ballonné par des vents. — Pincements dans le ventre.

Constipation. — Selles dures avec douleur de pincement dans le bas-ven-

Envie fréquente d'uriner, avec diminution d'urine.

Envie continuelle du coît sans excitation et sans érection.

La voix rauque, enrouée, avec obstruction des oreilles, comme s'il y avait quelque chose de placé devant elles. — Resserrement spasmodique du larynx avec chatouillement qui fait tousser dans l'inspiration.

Compression élançante sur les deux côtés de la poitrine.

Douleur de brisement dans le sacrum etant assis et en se baissant. — Élancements térébrants obtus au côté gauche de l'omoplate. — Déchirement entre les omoplates. — Raideur et lourdeur dans les muscles du cou et de la nuque.

Déchirements spasmodiques et tiraillements dans les bras, les mains et les doigts. — Raideur crampoide des bras avec contraction involontaire des doigts. —Tressaillement douloureux dans le bras et le petit doigt.

Douleur de brisement dans les cuisses.

Élancements douloureux dans les membres supérieurs et inférieurs. — Affection goutteuse. — Tressaillements musculaires dans différentes parties, surtout pendant le repos. — Douleur d'élancement et de pincement. — Grande faiblesse générale, surtout en marchant, quelquefois avec frisson.

Prédominence du froid. — Horripilation et hérissement des cheveux, comme quand on entend des récits effrayants. — Sensation de froid surtout dans les doigts. Menyantes trifoliata.

- Fièvre intermittente avec froid dans l bas-ventre.

Sommeil agité avec des rêves dont or ne conserve pas le souvenir.

Esprit craintif, anxieux. — Tristesse avec pleurs.—On n'est touché par aucun chose. —Gaîté bouffonne.

## 82. MERCURIUS SOLUBILIS.

Dua. n'Act., 3 ou 4 sem. — Antid.: Asa, Camplehina, daph., élect., hép. sulph., acide nitr., opsals., sulph.— Puiss., X.

Vertiges le soir avec obscurcissement de la vue et nausée.

Perte de la pensée. — Faiblesse de mémoire. — Distraction.

Céphalalgie frontale pressive, comms i la tête était serrée par un bandeau. Plénitude au cerveau avec douleu comme si la tête allait éclater. — Céphala gie déchirante, brûlante aux tempes. — Cephalalgie nocturne térébrante ou déclirante. — Déchirement dans le côté gaude la tête jusque dans les dents, les mucles du cou avec élancement dans l'orei gauche.

Croûtes pruriantes sèches à la tête. Éruption humide à la tête qui détruit cheveux. — Chute des cheveux.

Brouillard et points noirs devant yeux qui troublent la vue. — Perte priodique de la vue. — Amaurose comme cante. — Ophtalmie aiguë. — Démange son brûlante dans les yeux surtout au gra air. — Douleur incisive dans les yeux dessous des paupières. — Fort larmoiem (le soir). — Ophtalmie douloure quand on fait effort pour voir. — Ye ternes. — Photophobie. — Petites pus les sur la conjonctive. — Difficulté d'e vrir les yeux. — Contraction forcée paupières. — Paupières gonflées dont

bords sont ulcerés. — Croûtes autour des yeux. — Ophtalmie scrofuleuse.

Dureté de l'ouie. — Tout résonne dans l'oreille. — Bruissement dans les oreilles. — Serrement avec élancements et déchirement. — Écoulement de sang des oreilles. — Écoulement de pus des oreilles avec utcération de la conque. — Excroissance fongueuse dans l'oreille avec déchirement dans le conduit auditif et dans le côté de la tête. — Parotidite.

Face pâle terreuse avec yeux ternes. — Gonflement de la face. — Éruption croûteuse d'un jaune sale à la face avec sécrétion d'une humidité fétide. — Prurit continuel et saignement après avoir gratté. — Croûtes laiteuses malignes.

Gonflement de la racine du nez. — Douleur au toucher des os du nez. — Gonflement rouge luisant et avec prurit du nez. — Epistaxis surtout pendant la nuit et pendant le sommeil.

Lèvres âpres, sèches, douloureuses au toucher et brûlantes.—Lèvres noirâtres.
— Lèvres gonflées, rouges, molles, avec des gerçures profondes, ulcérées, pleines de matière aqueuse jaunâtre, fétide. — Vésicules brûlantes pruriteuses avec des croûtes jaunâtres aux lèvres. — Ulcération des commissures des lèvres.

Tension dans l'articulation de la mâchoire, qui ne permet d'ouvrir la bouche qu'avec de fortes douleurs.—Gonflement dur des glandes sous-maxillaires, avec des élancements douloureux.

Gencives décollées avec cuisson la nuit et douleur d'écorchure pendant la mastication.

La nuit les gencives se gonflent avec des vords blancs ulcérés. — Gencives fongueuses et saignantes. — Odontalgie déchirante qui s'étend à tout le côté de la face. — Élancement douloureux dans les dents creues avec déchirement dans les racines des lents saines et les joues gonflées, douloueuses au toucher. — Odontalgie aggravée ar le manger, par les boissons froides et haudes. — Odontalgie, le soir et la nuit, ui ne permet pas de supporter la chaleur

du lit. — Odontalgie nocturne pulsative et par secousses qui s'étendent à l'oreille et dans la tête et ne diminuent que quand on s'endort. — Ébranlement dans les dents et sensation d'ébranlement.

Langue humide, chargée de mucosités.

Langue dure, sèche, avec enduit noir.

Gonflement et suppuration de la langue. Glossité avec gonflement inflummatoire de l'intérieur de la bouche. Ulcère brûlant de l'intérieur des joues. Aphtes des enfants. Stomacace. Salivation fétide. Aphonie complète. Ulcères syphilitiques dans le pharynx.

Gosier rouge douloureux. - Inflammation erysipélateuse de toutes les parties molles du gosier. - Inflammation de la gorge avec elancements douloureux en avalant à vide, surtout la nuit, et améliorée à Pair libre. Elancements douloureux de la gorge, augmentés par la déglutition. Mal de gorge avec élancements dans les amygdales, dans les glandes sousmaxillaires, surtout pendant la déglutition. - Sensation en avalant comme si on avalait un corps étranger. - Douleur vive du cou avec brûlure à la gorge. Besoin continuel d'avaler. - Le soir sécheresse dans la gorge. - Sensation comme si une vapeur chaude s'elevait du corps dans la gorge, avec sécheresse pressive en avalant, envie continuelle d'avaler, et accumulation de la salive dans la bouche. - Douleur dans les muscles du côté du cou et dans les parotides. Gonflement douloureux des glandes du

Goût putride à la bouche. — Goût amer le matin à jeun. — Goût métallique et salé. — Goût douceûtre. — Faim ardente, même après le repas. — Dégoût pour les aliments. — Forte soif

Renvois âcres, amers.

Envie de vomir avec goût douceâtre dans la gorge. — Nausée la nuit et vomissement amer. — Nausées qu'on sent dans la poitrine avec pression.

Faiblesse de l'estomac; les aliments même

114 Mercurius solubilis.

les plus faciles à digérer pesent. - Brûlure dans la région précordiale.

Hépatite. — Élancements dans la région du foie. — Déchirements et pincements dans le bas-ventre. — Tranchées par refroidissement. — Tranchées et déchirements nocturnes du bas-ventre. — Ballonnement pressif du ventre. — Gonflement inflammatoire et douleur des glandes inguinales. — Sensation de faiblesse dans les intestins.

Envie et efforts inutiles pour aller à la selle avec tenesme. — Envie d'aller à la selle avec déchirement d'entrailles, et après de grands efforts il sort très peu de mucosité sanguinoiente suivie de tenesme. — Tenesmes pendant ta nuit. — Diarrhée. — Dyssenterie automnale. — Selles acides, visqueuses. — Selles âcres, muqueuses, verdâtres. — Selle sanguinolente comme du goudron qui écorche t'anus. — Sortie de sang clair pendant la selle. — Selles de matières non digérées. — Diarrhée avec tranchée avant l'evacuation. — Diarrhée dyssentérique chez les enfants à la mamelle. — Chute du rectum après la garde-robe.

Envie extraordinaire et presque continuelle d'uriner en petite quantité et par un jet ténu. — Envie pressante d'uriner. — Écoulement involontaire de l'urine. — Urine immodérée. — Urine fétide d'un rouge fonce qui bientôt se trouble. — Écoulement de sang par l'urètre. — Cuisson ct élancement dans l'urètre pendant et après l'émission de l'urine.

Idées lascives avec beaucoup d'érection.

— La nuit érections douloureuses. — Pollutions sanguinolentes. — Gonflement des raisseaux lymphatiques le long de la verge.

— Gonflement inflammatoire douloureux du gland et du prépuce. — Chancres syphilitiques. — Gonorrhée bâtarde. — Écoulement verdâtre, grisâtre ou épais et jaunâtre par l'urêtre qui ressemble à la blénorrhagie, surtout la nuit.

Règles trop abondantes avec anxiété et douleurs de ventre. — Prolapsus du vagin. — Stérilité avec des règles trop formercurius soldouis. tes. — Hydropisie des ovaires. — Leucorrhée puriforme rongeante avec démangeaison du vagin.

Éternuements fréquents sans coriza.— Coriza fluent, violent, qui excorie les narines.— Voix enrouée avec brûlure et chatouillement dans le larynx.

Toux sèche, nocturne, fatigante, ébranlante, quelquefois avec envie de vomir. — Crachats sanguinolents. — Toux sèche, chatouillante, le soir avant de s'endormir.

Oppression en montant avec douleur d'élancement au-dessous des fausses côtes.

— Phthisie tuberculeuse commençante.

— Gonslement dur ou suppuration du sein, surtout des mamelons. — Pneumenie

Elancements douloureux avec la sensation de faiblesse dans le sacrum. — Tiraillements brûlants dans la nuque et dans le dos. — Gonflement de la nuque et du cou à l'extérieur avec raideur rhumatismale.

Déchirements dans les aisselles et dans l'humérus, surtout la nuit pendant le mouvement. — Gonflement chaud arthritique de l'articulation du coude jusqu'au poignet. — Dartre écailleuse, brûlante, sur l'avant-bras et au poignet. — Raideur dans la main et ses articulations. — Contraction des doigts. — Gonflement des articulations des doigts. — Gerçures profondes, douloureuses dans la peau des doigts. — Exfoliation des ongles.

Etancement tiraillant dans les jambes, surtout la nuit et pendant le mouvement, et sensation de froid dans les parties malades.

— Déchirements dans l'articulation coxofémorale, la cavité des os des cuisses et dans le genou, la nuit et pendant le mouvement. — Gonflement luisant, transparent, des cuisses et des jambes. — Gonflement hydropique des jambes. — Grande faiblesse, pesanteur et douleur de brisement dans les cuisses et les jambes. — Pieds froids le soir au lit. — Sueur froide

aux pieds.—Gonflement du calcaneum et du dos du pied. — Gonflement douloureux du métatarse. — Dartres aux cuisses et aux jambes.

Tiraillements déchirants dans les membres pendant la nuit. - Douleur rhumatismale des membres. - Douleurs arthritiques avec gonflement (rouge luisant) des parties malades .- AGGRAVATION DES SYMP-Tômes le soir et LA NUIT. - Le soir grande agitation dans les membres; on ne peut être tranquille, même au lit. - La chaleur du lit augmente les symptômes à les rendre insupportables. - Grande courbature avec endolorissement de tous les os. -- Engourdissement de presque toutes les parties étant assis, avec fourmillement pendant le mouvement. — Grand affaissement et faiblesse. — Peu de travail produit tremblement et bouillonnement du sang. -Maladivité avec malaise inexprimable, physique et moral. — On se trouve mieux étant couché qu'assis. - Ecoulement de sang de différents organes. - Congestion veineuse vers la poitrine, la tête et le bas-ventre.

La peau est âpre, sèche, d'un jaune sale. - Ictère. - Taches hépatiques. -Dartres brûlantes, seches, aux extrémités. - Pustules suppurantes et taches dartrenses sur la peau avec prurit augmenté par la chaleur du lit. - Dartres syphilitiques, rongeantes, farineuses. - Eruption miliaire, pruriante, aux extrémités. -Gale qui saigne facilement, sèche et de forme miliaire. - Inflammation érysipélateuse des parties extérieures. - Éruption urticaire en forme de taches rouges. - Prurit nocturne, élançant dans les articulations. - Disposition des organes enflammes (internes ou externes) à la suppuration ou au suintement. - Les plaies ou autres lésions extérieures passent facilement à la suppuration. - Les os se courbent. - Rachitis. - Carie des os.

Grande somnolence pendant la journée. — On s'endort tard. — Sommeil nocturne troublé par des rêves esfrayants, et angoisses. — Anxiété nocturne avec sermentation du sang et chaleur. — Des images effrayantes se présentent à l'imagination avant qu'on s'endorme.

Froid et horripilation comme si on avait été arrosé d'eau froide. — Horripilation entremêlée d'accès de chaleur. — Froid à l'intérieur et à l'extérieur, avec ardeur aux joues. — Sueur nocturne abondante, d'une odeur acide, quelque sois grasse, huileuse. — Soif continuelle pour les boissons froides, jour et nuit.

Agitation. — Anxiété morale qui ne permet pas le repos. — Anxiété et crainte de perdre la raison. — Grande indifférence pour toutes choses. — Humeur fâcheuse qui cherche les querelles.

#### 83. MERCURIUS SUBLIMATUS.

Dur. D'ACT., 3 à 4 sem. — ANTID.: Ceux qui précèdent. — Puiss., X.

Ophtalmie avec saillie des yeux hors de l'orbite.

Distension des traits.

Gonflement de la lèvre inférieure avec déversement. — Gonflement des lèvres, de la langue et de la gorge. — Salivation avec goût salé.

Brûlure douloureuse de la bouche jusqu'à l'estomac. — Fort ballonnement douloureux du bas-ventre.

Sortie d'une petite quantité de mucosités sanguinolentes avec tranchées continuelles et insupportables; pression douloureuse presque inutile et avec tenesme. — Diarrhée automnale. — Évacuation de matières mêlées de mucus et de sang rouge coagulé.

Tenesme urinaire. — Blénorrhée de l'urètre, au commencement ténue, liquide, ensuite plus épaisse, avec prurit en urinant, et élancements dans l'urètre.

Leucorrhée d'un jaune pâle, d'une odeur douceâtre dégoûtante.

116 Mercurius sublimatus.

Coriza. Toux sèche creuse, fatigante. Elancements la nuit à trayers la poitrine. Gonflement douloureux des glandes qui entourent les mamelles.

Élancements dans l'articulation coxofémorale pendant le mouvement et dans

le repos. - Pieds glacés.

Sensation dans le périoste de tous les os comme celle qui précède un accès de sièvre, avec sensation de chaleur à la tête.

Soubresauts violents quand on s'endort, avec ébranlement de tout le corps.

On sent facilement le froid à la tête; le plus petit mouvement, le grand air, même chaud, produit le frisson.—Tranchées (et tenesme).

Très souvent mauvaise humeur, al-

ternant avec l'hilarité.

#### 84. MOSCHUS.

Dur. D'ACT., 24 heures. — ANTID.: Camph. — Puiss., X.

Vacillement des objets avec vertiges par le plus petit mouvement de la tête.

Céphalalgie assourdissante compressive, surtout au-dessus de la racine du nez. — Tiraillement tensif dans l'occiput, jusque dans la nuque. — Céphalalgie spasmodique tiraillante. — Congestion vers la tête. — Pesanteur de la tête. — Céphalalgie avec nausée qui force à secoucher.

Saignement de nez, \_\_ Fourmillement dans la pointe du nez.

Malaise à l'épigastre, avec rétraction du nombril et une sensation spasmodique. — Malaise par accès subit.

Sensation de plénitude dans la région de l'estomac et précordiale. — Les vête-ments paraissent trop serrés, avec sensation d'excoriation brûlante après le dîner. — Pression dans la région précordiale avec malaise.

Contraction par secousses au-dessous du nombril, avec gêne de la respiration. — Sensation dans le bas-ventre comme s'il était trop étroit, avec anxiété qui ne laisse pas de repos et force à se mouvoir.

W oscnus.

Rétention des selles.

Forte excitation de l'appétit vénérien.
Menstruation trop hâtive, trop forte.
— Pression et tiraillement dans les parties génitales, comme si les règles voulaient paraître.

Serrement du larynx comme par la va-PEUR DU SOUFRE. — Contraction suffocante spasmodique de la poitrine.

Tiraillements violents dans la nuque et le dos. — Tiraillements dans les membres supérieurs et inférieurs, surtout au poignet, comme s'il devait s'y manifester une crampe. — Brûlure dans les phalanges des doigts.

Inquiétude dans les jambes avec sensation d'engourdissement qui force à les remuer continuellement.—Faiblesse paralytique dans les genoux quand on s'asseoit, après avoir marché.

Fourmillement dans tous les muscles.

— Prurit qui force à gratter. — Élancements et pincements dans différentes parties du corps. — Tétanos. — Convutsions. Évanouissement des femmes hystériques. — Hystérie. — Hypochondrie qui prend sa source dans des dispositions particulières du système génital.

Grande somnolence pendant la journée, avec bâillements fréquents et profonds.

— Envie de dormir. — Impossibilité d'être couché long-temps la nuit dans la même position, car la partie sur laquelle on est couché est douloureuse, comme brisée. Rêves vifs, voluptueux.

Circulation accélérée. — Sensation fréquente comme si on était frappé d'un air frais aux parties qui ne sont pas couvertes. — L'air extérieur paraît froid; on cherche le feu. — Horripilation légère qui s'étend de la tête à tout le corps, alternativement avec une sensation agréable de chaleur naturelle. —Le soir, accès

d'une chaleur brûlante. — Tous les matins sueur.

Battements de cœur comme quand on attend quelque chose avec anxiété.

Anxiété.

#### 85. MURIATICUM ACIDUM.

Dur. D'Act., 5 sem. - Antid. . . . Puiss., I.

Vertiges tournoyants avec marche vacillante.

Pesanteur d l'occiput, avec obscurcissement des yeux. — Céphalalgie comme si le cerveau était déchiré. — Céphalalgie augmentée par le mouvement des yeux et en se redressant dans le lit; elle cesse par l'exercice. — Céphalalgie déchirante et se montre par secousses isolées.

On ne voit que la moitié des objets verticalement. — Tuméfaction des paupières.

Serrement de crampe dans les oreilles.

— Dureté de l'ouïe. — Éruption aux oreilles et aux lèvres.

Éruption de boutons au front et aux tempes. — Joues rouges brûlantes en marchant à l'air libre et sans soif.

Éruption croûteuse aux levres. — Ulcération des narines. — Odontalgie qui augmente par les boissons froides. — Fourmillement aux dents.

Odontalgie avec sensation d'écartement.

Grande sécheresse de la bouche avec paralysie de la langue. — La langue est lourde en parlant. — Ulcère profond et vésicules sur la langue. — Consomption de la langue.

Goût putride acerbe à la bouche. — Goût rance à la gorge.

Vomissement des aliments ingérés.

Sensation de vide dans l'estomac et dans e bas-ventre. — Sensation pénible, maadive, dans l'estomac et le bas-ventre. — Pincements violents depuis la région du nombril jusque vers la poitrine avec gargouillement. — Pression spasmodique et tension au-dessous des fausses côtes.

Diarrhée. — Sortie involontaire d'une selle liquide, aqueuse, pendant qu'on urine. — Gonflement d'hémorrhoïdes avec douleur brûlante d'excoriation. — Gonflement bleuâtre des hémorrhoïdes. — Hémorrhoïdes fluentes.

Envie fréquente d'uriner, sécrétion abondante d'urine. — Écoulement très abondant d'urine aqueuse. — Faiblesse paralytique de la vessie et de son col. — Tenesme de la vessie.

Sommeil de l'appétit vénérien. — Impuissance.

Pression dans les parties génitales comme pour avoir les règles.

Enrouement continuel. — Toux avec crachats de sang.

Tension douloureuse au sternum. — Au milieu et en dedans du sternum, des coups tranchants avec pression obtuse à la partie postérieure de la poitrine et oppression. — La nuit battements de cœur si violents qu'on les sent dans la face.

Douleur pressive au dos comme quand on est resté long-temps fléchi ou après un effort des reins. — Serrement de crampe dans l'épaisseur de la base du pouce en écrivant.

Déchirements tiraillants dans les membres supérieurs et inférieurs dans le repos, et améliorés par le mouvement. — Douleur de courbature dans toutes les articulations. —Endolorissement du périoste de tous les os comme dans la fièvre intermittente. — Faiblesse excessive au point que les paupières tombent quand on s'assied. — Marche vacillante par faiblesse des cuisses.

Éruption croûteuse sur le dos des mains et des doigts. — Ulcères putrides aux jambes. —Ulcère avec cuisson à leur circonférence. — Pustules noires. — Prurit voluptueux et élançant dans la paume de la main qui force à gratter.

Murias magnesia.

Grande somnolence pendant le jour et se perd par le mouvement. — Insomnie avant minuit. — Avant minuitronslement, gémissement, jactation; on glisse continuellement vers le bas du lit. — Réveil fréquent par des frissons.

Prédominence du froid. — Froid avec tremblement, bâillement et pendiculations sans soif et non suivi de chaleur. — Chaleur sans soif avec agitation générale et désir de se découvrir. — Sueur nocturne. — Fièvre nerveuse.

Concentration en soi-même avec crainte et anxiété. — Tristesse. — Irrésolution anxieuse en travaillant; on est préoccupé des derniers événements.

#### 86. MURIAS MAGNESIÆ.

Dur. b'Acr., 40 à 50 jours. - Antid.: Camph. - Puiss., I, VI.

Vertiges le matin en sortant du lit et pendant le dîner; ils se dissipent à l'air libre.

Sensation d'engourdissement au front.

Céphalalgie quotidienne. — Fermentation douloureuse et bruissement dans la tête, semblable à celui de l'eau qui bout.

Le soir dans le lit, battements et serrement de crampe dans les tempes, avec sensation de vertiges ou de défaillances prêts à survenir. — Sensation de pesanteur à la tête, avec titubation à tomber. — Soulagement de la douleur en enveloppant la tête.

Cuisson dans les yeux en fixant la lumière du jour, avec rougeur de la conjonctive. — Le blanc des yeux est jaune. — Ophtalmie avec collement des paupières ta nuit.

Dureté de l'ouïe comme si quelque chose était placé devant les oreilles. — Pulsation dans l'oreille.

Tension dans la face et douleur pres-

sive dans les os. — Couleur pâle jaune de la face.

Gonflement des ailes du nez. — Absence de l'odorat, avec croûtes dans les narines et douleur au toucher.

Grosse ampoule transparente sur la partie rouge des lèvres.—Rudesse de la partie interne des lèvres, au toucher par la langue.

Gonflement douloureux des gencives.

Odontalgie qui, par le contact des aliments, est fortement augmentée.—Saignement facile des gencives.

Brûlure sur la langue. — Sensation comme si tout l'intérieur de la bouche était brûlé. — Accumulation de beaucoup d'eau claire dans la bouche.

Mucus épais dans la gorge souvent mêlé de sang; il est difficile à expectorer.

Faim vive suivie de nausées. — Appétence pour quelque chose indéterminé. — Soif fréquente.

Hoquet violent pendant et après le dîner avec douleur d'estomac. — Nausées fréquentes avec évanouissement jour et nuit.

Douleur ébranlante dans l'estomac en marchant ou en appuyant le pied. — Douleur tensive et de brisement à l'estomac avec sensibilité au toucher.

Sensation d'une boule qui s'élève du basventre jusque dans la gorge; elle cesse par une éructation.—Douleur pressive au foie, même en marchant, et au toucher, plus forte étant couché sur le côté droit. —Hépatite chronique.—Ballonnement fort et continuel du bas-ventre, avec constipation.—Dureté chronique douloureuse dans le côté droit du ventre. — Crampes hystériques de la matrice et du bas-ventre.

Selles globuleuses, dures, difficiles, insuffisantes, retardées.—Selles muqueuses et sanguinolentes.—Diarrhée violente, avec mucus et sang.—Prolapsus du rectum, pendant la diarrhée.

Fréquente envie d'uriner, avec écoulement faible d'urine.

Les règles viennent trop tôt ou trop fort

mus mus mus mesite.

avec violentes douleurs au sacrum. — Suppression des règles.—Leucorrhée qui

coule pendant le mouvement.

Coriza avec diminution de l'odorat et du goût, et mucus nasal, jaune, d'une odeur insupportable.

Toux sèche le soir et la nuit. — Toux nocturne spasmodique, avec violent cha-

touillement à la gorge.

Pesanteur subite sur la poitrine, avec gêne de la respiration pendant le repas. — Battements du cœur étant assis, qui cessent par le mouvement.

Déchirements dans le dos et les membres.—Engourdissement des bras le matin au réveil. — Grande lassitude dans les jambes, même étant assis. — Sueur aux pieds.

Seusation générale de courbature, avec grande susceptibilité pour le bruit. — Accès hystérique. — La plupart des symptômes paraissent étant assis et se dissipent en général par le mouvement.

Grande somnotence pendant te jour avec paresse et bâillement; on s'endort tard.

—Agitation nocturne. — Sommeil qui ne

délasse pas.—Cauchemar.

Frisson le soir qui se dissipe en se mettant au lit. — La nuit, au lit, chaleur avec grande agitation et soif. — Sueur après minuit. — Anxiété avec pleurs. — Mauvaise humeur. — Morosité.

#### 87. NATRUM CARBONICUM.

Dur. D'ACT., 40 à 50 jours.—Antid.: Camph.—Puiss., IV.

Vertiges après avoir bu du vin et après un travail d'esprit.

Obscurcissement de la tête qui rend impropre aux travaux d'esprit, plus fort dans le repos qu'au grand air. —Fatigue par le travail de l'esprit, — Tous les matins battement au vertex. — Céphalalgie quand on est exposé au soleil. — Cé-

phalalgie avec élancements au travers des yeux.

Déchirement extérieur à la partie antérieure de la tête qui se renouvelle tous les jours à heure fixe.

Gonflement inflammatoire des paupières. — Élancements à travers les yeux. — Obscurcissements de la vue avec des taches noires qui voltigent et des éclairs éblouissants devant les yeux. — Impossibilité de lire les petits caractères. — Voltige des plumes devant les yeux.

Dureté de l'ouie. — Assourdissement, comme si les oreilles étaient bouchées. — Sensibilité au bruit.

Taches jaunes au front et à la lèvre supérieure. — Éphélides à la face. — Éruption au nez et à la bouche.

Sensibilité du nez avec desquammation sur le dos et au bout. — Ulcération des narines.

Odontalgie, surtout après le dîner. — Odontalgie nocturne avec gonflement de la lèvre inférieure et des gencives. — Grande sensibilité des dents inférieures.

Gonflement dur de la glande thyroide.
Bégaiement en parlant, produit par une lourdeur de la langue.

Bouche amère. —Goût à la bouche qui dure jusqu'au lendemain. — Soif. — La boisson froide fait mat. — Mauvaise humeur après le dîner.

Nausées continuelles avec défaillance.

Grande faiblesse de la digestion qui engendre une hypochondrie; de légers écarts de régime entretiennent déjà la mauvaise humeur et un malaise universel. — Pression à l'estomac après le dîner. — Grampes, contraction de l'estomac. — La région précordiale est douloureuse au toucher. — Gonflement de l'estomac et de la région précordiale pendant la digestion.

Ballonnement du ventre. — Abondance de flatuosités qui se déplacent. — Hépatite chronique.

Fréquentes et inutiles envies d'allerà la selle. — Selle insuffisante. — Selle sanguinolente.

120 Natrum caroonicum.

Fréquente et forte envie d'uriner. — La nuit on urine fréquemment. — Urine fétide, trouble avec un sédiment muqueux. — Cuisson dans l'urêtre après avoir uriné.

Appétit vénérien augmenté jusqu'au priapisme. — Douleur dans les testicules. — Écorchure au scrotum.

Règles trop tôt. — Douleur péndant les règles. — Leucorrhée forte, précédée de mal de ventre.

Obstruction des narines par du mucus dur et fétide. — Coriza alternatif chaque troisième jour. — Coriza qui se renouvelle continuellement par un léger courant d'air; il ne se dissipe que par la sueur. — Coriza fluent avec enrouement et frissons.

Oppression avec respiration courte. — Difficulté à respirer. — Crachats salés purulents. — Frisson continuel dans le côté gauche de la poitrine. — Battements du cœur pendant la nuit, étant couché sur le côté gauche.

Elancements dans le sacrum, étant assis. — Douleur incisive aux mains et aux pieds. — Crampes aux mollets. — Raccourcissement des tendons des jarrets. — Les jambes sont enflées, enflammées, rouges et couvertes d'ulcères. — Froid des pieds. — Gonflement des pieds. — Facilité à se fouler le pied. — Gonflement avec élancements dans la plante des pieds en marchant. — Le soir brûlure dans les articulations des mains et des pieds.

Tressaillement fréquent, involontaire, des membres. — Grande disposition aux luxations et à se donner des tours de reins. — Le matin grande faiblesse dans les membres. — Aversion pour le grand air. — Grande disposition à se refroidir. — Le refroidissement est suivi de tranchées et de diarrhée.

Sécheresse de la peau, cependant par un léger travail on sue abondamment. — Verrues. — Les dartres s'agrandissent et suppurent. — Éruption dartreuse aux mains et aux fesses. Faiblesse qui dure depuis long-temps.

— Flaccidité de tout le corps. — Après un léger exercice lassitude à tomber. — La plupart des symptômes paraissent étant assis et se dissipent par le mouvement, les frictions et la pression. — Le soir, grande agitation du corps quand l'esprit n'est pas occupé. — Anxiété, tremblement et sueur pendant les douleurs.

tyairum caroonicum.

Somnolence invincible pendant la journée; le soir on s'endort tard et le matin on s'éveille difficilement. — La nuit forte agitation et cauchemar. — Sommeil plein de rêves. — Horripilation avec les mains froides et les joues chaudes, ou vice versû; mais toujours sans soif. — Sueurs nocturnes. — Sueur froide d'angoisse.

Moral susceptible, au point que le son du piano produit du tremblement.—Inquiétude avec accès d'anxieté. — Palpitations de cœur avec anxiété. — Éloignement pour les hommes et la société. — Humeur hypochondriaque. — Découragement.

## 88. NATRUM MURIATICUM.

DUR. D'ACT., 50 j. - ANTID.: Camph., eth. nitr. - Purss., X.

Vertiges avec secousses dans la tête et étourdissements. —Vertiges à tomber en avant, dans lesquels tous les objets paraissent tourner.

Impossibilité de penser.—Distraction. —Grande faiblesse de la mémoire.

Céphalalgie étourdissante.—Pesanteur à l'occiput, quotidienne, avec contraction des yeux.— Céphalalgie comme si la tête allaitéclater.—Céphalalgie élançante, déchirante, qui force à se coucher.— Élancements qui traversent la tête.— Céphalalgie le matin au réveil.—Tiraillements et battements dans le front.— Céphalalgie après chagrin.— Battement

et martellement dans la tête. — Elancements ou douleur pressive au-dessous des yeux. — Céphalalgie déchirante, élancante, avec obscurcissement de la vue. — Céphalalgie avec nausées (migraine).

Croûtes sur le cuir chevelu. — Facilité à se refroidir la tête. — Chute forte des cheveux, même des favoris. — Chute des cheveux chez les femmes en couches.

Le soir, clôture des paupières. — Fort larmoiement. — Cuisson dans les yeux. — Ophtalmie et ophtalmie scrofuleuse. — Matière collante dans les angles externes des paupières. — Paupières rouges, ulcérées. — La nuit, agglutination des paupières. — Obscurcissement de la vue en se baissant et en marchant. — Voile devant les yeux qui empêche tout-à-fait la vue. — Amaurose commençante. — Plumes qui voltigent devant les yeux. — Points noirs et lignes lumineuses devant les yeux. — Presbyopie. — Canfusion des lettres en lisant. — On ne distingue que la moitié des objets.

Gonflement et chaleur des oreilles, élancements dans l'oreille. — Murmure et braissement dans les oreilles. — Écoulement par les oreilles.

Face jaune, terreuse. Face luisante, huileuse. Gonflement de la face. Éruption de boutons au front et à la face.

Sécheresse des narines. — Inflammation d'une aile du nez. — Insensibilité et engourdissement d'une moitié du nez. — Térébration dans les os du nez. — Absence d'odorat.

Gonslement de la lèvre supérieure. — Cuisson dans la lèvre supérieure. — La lèvre supérieure est fendillée. — A la face interne de la lèvre supérieure, vésicules douloureuses au toucher. — Gonslement fréquent des glandes sous-maxillaires. — Douleur des os de la pommette en marchant comme s'il y avait une suppuration interne.

Gonflement des gencives qui salgnent facilement. — Grande susceptibilité des dents au toucher et à l'air. — Fistule dentaire.

Vésicules sur la langue. — Difficulté de la parole par la lourdeur de la langue. — Engourdissement d'une moitié de la langue. Modificate de la langue.

Mal de gorge chronique, comme si la déglutition était gênée par une grosseur.

Le matin, crachement glaireux, —
Goître volumineux, matini)

Amertume à la bouche. — Défaut d'appétit. — Appétit perdu pour le pain. — Appétit immodéré à midi et le soir. — Faim ardente avec sentiment de plénitude et satiété après avoir peu mangé. — Soif continuelle.

Renvois désagréables après avoir mangé du lait ou des choses grasses. — Renvois acides. — Pyrosis. — Brûlure qui remonte de l'estomac. — Sueur à la face en mangeant. — Après le dîner, renvois à vide. — Nausées et pyrosis.

Dégoût pour les aliments. — Malaise même le matin. — Régurgitation d'un liquide âcre, désagréable, avec torsion dans l'estomac. — Vomissement, au début, d'aliments, ensuite de bile. — Vomissement des femmes enceintes.

Pression à l'estomac. — Crampes de l'estomac. — Pression à l'estomac avec nausée et chute des l'orces. — Douleur au toucher dans la région prêcordiale. — Pression dans la région du cœur comme si l'estomac renfermait quelque chose de compact. — Gonflement de la région précordiale, douloureux au toucher comme s'il y avait une ulcération intérieure. — Serrement de griffe dans la région précordiale.

Crampes dans le diaphragme en se baissant. Tranchées quotidiennes. — Ballonnement du bas-ventre. — Déplacement des vents. — Gargouillement dans le bas-ventre. — Gonflement de ventre. — Raideur dans la partie gauche du ventre. — Hépatite chronique.

Selles trop fréquentes. Mollesse chronique des selles. — Constipation alternativement chaque second jour. — Constipation chronique. — Selles involontaires. — Envie inutile d'aller à la selle. — Sortie difficile des selles avec douleurs lancinantes, déchirantes, à l'anus et au rectum. — Boutons hémorrhoïdaux. — Brûlure au rectum pendant la selle. — Cuisson et battements au rectum.

Fréquente envie d'uriner avec urine abondante.—(Diabétès.) Urine fréquente la nuit. — Émission involontaire des urines en marchant, toussant et en éternuant. — Après avoir uriné, écoulement de mucus par l'urêtre. — Urine claire avec un sédiment briqueté.

Excitation immodérée des organes génitaux et de l'imagination pour le coît.

— Impuissance. — Effets nuisibles de l'onanisme. — Gonorrhée bâtarde. — Gonorrhée chronique.

Règles tardives, trop peu abondantes.—
Règles hâtives et trop abondantes. — Règles
trop prolongées. — Suppression des règles.
— Les règles se montrent très difficilement à l'époque de puberté. — Céphalalgie avant, après et pendant les règles.
— Avant les règles, tristesse et humeur
chagrine.—Leucorrhée avec visage jaune.
— Prurit dans le vagin. — Stérilité avec
règles trop tôt et trop fortes.

Éternuement et coriza. — Éternuements qui avortent le matin. — Coriza sec. — Le matin coriza violent avec perte de l'odorat et du goût. — Enrouement et sensation de sécheresse dans le larynx. — Accumulation de mucosité dans le larynx le matin. — L'haleine paraît être brûlante.

Embarras de la poitrine avec toux. — Toux le matin. — Toux chronique brève. — Jour et nuit toux par chatouillement dans la région précordiale. — Toux chatouillante en marchant et en respirant profondément. — En toussant, céphalagie comme si la tête allait éclater.

Douleur vive à la poitrine. — Ronssement dans la poitrine. — Respiration courte en marchant vite. — Oppression de la poitrine par le travail manuel. — Serrement de la poitrine soulagé au grand air. — Douleur tensive dans la poitrine. — Élancements dans la poitrine en respirant profondêment. — Élancements dans la poitrine en toussant. — Élancements dans une des mamelles. — Battements de cœur forts, anxieux; plus forts étant couché sur le côté gauche. — Trémoussement du cœur. — Palpitations irregulières.

Douleur incisive au sacrum. — Elancements à travers les hanches et le sacrum. — Fortes pulsations dans le sacrum. — Courbature, surtout le matin. Douleur tensive dans le dos. — Pression à la nuque.

Fouillement dans l'humérus. — Lassitude des bras. — Lourdeur et raideur des bras. — Élancements dans l'articulation de la main. — Engourdissement et fourmillement dans les doigts; difficulté à fléchir les doigts. —Taches dartreuses rondes, pruriantes, sur les bras. — La peau des mains est sèche, fendillée, surtout autour des ongles, avec production d'envies. — Sueur aux mains. — Panaris.

Douleur dans la hanche comme si elle était luxée. — Douleur tiraillante dans les extrémités inférieures. — Dartres dans les jarrets. — Raccourcissement douloureux des tendons des jarrets. — Lassitude dans les genoux et dans les mollets. — Douleur d'ulcération à la malléole en appuyant le pied et au toucher. — Gonflement du pied. — Grande pesanteur des jambes et des pieds. — Douleurs aux cors.

Tiraillement pressif dans les membres.

— Tressaillement dans les muscles et les membres. — Douleur de brisement dans les membres. — Horreur pour le mouvement. — Disposition à se refroidir.—Facilité de se donner des tours de reinset de se faire des entorses.—Grand

affaissement physique et moral après un effort. - Chaque mouvement excite la circulation de telle manière qu'on sent le pouls dans tout le corps. — Grande maigreur. - Fatigue par une conversation prolongée. - Suite fâcheuse de chagrin. - Les aliments acides et le pain font mal. — Paralysie et en même temps selles et urine involontaires. - Les douleurs pendant la nuit coupent la respiration et produisent une espèce d'hémiplégie. — Le matin grand malaise. — On est plus faible le matin au lit et étant assis. - Paresse le matin quand on vient de se lever. - Lassitude et lourdeur du corps. — Intermittence du pouls et des battements du cœur.

Éruption urticaire après un fort mouvement. — Boutons prurians. — Furoncles. — Éruption miliaire picotante. — Verrues surtout à la paume des mains.

Le matin on est fatigué et on a encore envie de dormir. — Sommeil pendant la journée. — Sommeil avec révasseries. — Rêves penibles avec pleurs. — Soif nocturne. — Rêves lourds et réveil qui se prolonge plusieurs heures. — Quand on s'éveille la nuit on se rendort très difficilement. — Somnambulisme.

Frisson intérieur fréquent. — Froid continuel et manque de chaleur vitale. — Horripilation et envie de vomir suivie d'une légère transpiration. — Froid avec ou sans soif. — Alternativement froid et chaleur avec céphalalgie. — Chaleur avec beaucoup de soif. — Sueur le matin. — Fièvre nerveuse avec faiblesse, sécheresse de la langue, et forte soif. — Pouls irrégulier. — Fièvre intermittente.

Irritabilité et humeur chagrine. — Précipitation, impatience, disposition à s'effrayer. — Anxiété. — Tristesse avec pleurs qui augmente par les efforts de consolation.

#### 89. NATRUM SULPHURICUM.

Dur. D'act., 50 jours.—Antid.: Camph., eth. nitr.—

Vertiges tournoyants avec bourdonnement dans la tête après le dîner.

Céphalalgie en lisant avec chaleur et sueur. — Céphalalgie térébrante. — Céphalalgie, comme secousses électriques à la tête. — Céphalalgie frontale avec grande somnolence après le dîner.

Sensibilité douloureuse du cuir chevelu en se peignant.

Pression douloureuse dans les yeux, en lisant le soir à la lumière, avec pesanteur des paupières. — Agglutination des paupières. — Douleur de meurtrissure autour des yeux.

Douleur aux oreilles, comme si le tympan était poussé en dehors.

Visage pâle, altéré, comme après une débauche nocturne, et disposition à la querelle.

Mal de gorge, avec gonflement de la luette, des amygdales, et difficulté douloureuse d'avaler.

Forte soif le soir.

Élancements dans les hypochondres.

— Accumulation de vents dans le basventre. — Coliques venteuses, avec pincements. — Expulsion de flatuosités fétides
abondantes.

Selle dure on the file of the many and apply

Fréquente émission d'urine, avec sédiment jaune ou briqueté. — Ardeur dans l'urètre pendant et après avoir uriné.

Augmentation d'appétit vénérien. Prurit aux parties génitales. — Sueur au scrotum la nuit.

Élancements dans la poitrine.

Faiblesse et tremblement des mains; elles laissent facilement échapper les choses un peu lourdes.

## 124 Natrum sulphuricum.

Douleur et lourdeur des pieds le matin au réveil. — Prurit fort aux pieds et aux orteils.

Douleur dans les membres comme celle d'une courbature après une fatigue.—Tremblement du corps, avec mouvement visible, spasmodique des muscles, avec crainte et anxiété.

Grande somnolence avant midi; même en lisant et en écrivant, on s'endort. — Sommeil agité, avec rêves désagréables, anxieux.

Froid interieur avecpendiculations et bâillement. — Frissonnement, froid. — Horripilation avec soif.

Mauvaise humeur, éloignement pour la conversation.

## 90. NICOLUM CARBONICUM.

DUR. D'ACT., incon. - ANTID.: Incon. - PUISS., X.

Vertiges avec titubation comme par faiblesse, surtout le matin en quittant le lit.

Pesanteur douloureuse et plénitude à la tête, surtout au front, avec chancellement. — Céphalalgie sur les deux côtés, comme pour éclater. — Céphalalgie déchirante, élançante. — Céphalalgie surtout dans la chambre et après la marche à l'air libre.

Ardeur fréquente dans les yeux, surtout vers le soir. — Tressaillement douloureux dans les yeux, avec la sensation de renversement des yeux. — Grande faiblesse des yeux, surtout le soir. — Par de petits efforts on perd la vue. — Les objets qui sont éloignés paraissent plus grands.

Élancements dans les oreilles. — Surdité subite, avec bruissement et bourdonnement dans l'oreille, le soir.

Rougeur et gonflement du nez, avec brûlure et douleur de déchirement.

Éruption au nez et aux lèvres Large

### Nicolum carbonicum.

vésicule dans la partie rouge de la lèvre inférieure.

Lourdeur à la face comme si elle était gonflée. — Douleur et crampe dans l'articulation de la mâchoire, qui rend l'ouverture de la bouche difficile.

Gonflement des gencives.—Odontalgie rongeante le soir. — Odontalgie avec douleur d'oreille, et par la succion il s'échappe des dents molaires une eau acide, félide.

Accumulation de salive douceâtre dans la bouche. — Odeur désagréable de la bouche qu'on ne reconnaît pas soimême.

Le soir, douleur à la gorge, surtout en parlant, en bâillant. — Douleur élançante à la gorge pendant la déglutition. — Inflammation au gosier, avec gonflement de l'amygdale droite et d'un côté de la face, et sensibilité au toucher. — Étranglement spasmodique.

Goût de farine à la bouche, le matin au réveil. — Pendant les renvois, goût de farine brûlée.—Défaut d'appétit.—Soif le soir.

Hoquet violent, surtout le soir.

Sensation de vide dans l'estomac.— Douleurs incisives dans les hypochondres et dans la région précordiale.

Tranchées avec diarrhée.

Selles dures, compactes, retardées.— Constipation. — Diarrhée avec cuisson à l'anus et tension quelquesois précédée de tranchées.

Urine augmentée, aussi la nuit.—Urine brûlante.

Règles trop hâtives, mais trop peu abondantes et de trop courte durée. — Leucorrhée.

Éternuement fréquent sans coriza. — Obstruction des narines.

Elancements dans la poitrine, douleur d'excoriation dans la poitrine. — Elancements dans la poitrine en riant.

Douleur de luxation, avec craquement dans la nuque en se redressant.

Douleur déchirante, élançante dans

les membres et autres parties du corps.— Serrement de crampe aux orteils. — Au grand air on se porte mieux que dans la chambre. —Le soir et la nuit, les symptômes sont plus forts.

Dartres pruriantes aux joues et aux hanches.

Réveil fréquent la nuit, par inquiétude.

Rêves effrayants, pleins de querelles.

Le malade a plutôt chaud que froid. — Chaleur avec soif violente, surtout le soir et la nuit.

Anxiété et tristesse. — Éloignement pour la conversation.—Tremblement et timidité, avec besoin de solitude.— Méchanceté et goût de la querelle. — Contradiction.

#### 91. NITRUM.

Dur. D'ACT., 6 sem. — ANTID.: Spir., nitr., dulc.—Puiss., X.

Céphalalgie avec contraction des paupières, qui dure d'un soir à l'autre, et
qui est insupportable en baissant la tête.
— Céphalalgie après avoir mangé du veau.
— Congestion vers la tête. — Douleur à
l'occiput qui diminue en déliant les cheveux. — Le matin pesanteur assourdissante de la tête comme à la suite de l'ivresse. — Douleur compressive dans
l'occiput, qui le rend tout raide. — Tiraillement crampoïde à l'occiput et à la
nuque, qui force à renverser la tête.

Sensibilité douloureuse du cuir chevelu.

Cercles colorés devant les yeux. — Le soir, auréole iridée autour de la lumière. — L'odeur du camphre produit l'obscurcissement de la vue.

Rougeur des joues avec tension et aggravation de la céphalalgie.

Contraction douloureuse dans le front et les yeux qui se concentre dans le bout du nez. — Brûlure au nez avec fouillement et griffement, augmentée par le toucher. — Gonflement dans l'intérieur du nez. — Inflammation avec élancement du bout du nez. — Épistaxis dont le sang est âcre comme du vinaigre.

Tension au larynx; douleur incisive dans le larynx avec déglutition empêchée.

Langue blanche chargée.

'Appetit marqué le soir. - Forte soif continuelle.

Contraction crampoide de l'estomac.

Tranchées qui passent le soir. — Douleur violente du bas-ventre, surtout au côté droit, après avoir mangé du veau. — Douleur aux reins.

Selles difficiles, lentes, dures, qui exigent beaucoup d'efforts.— Selle diarrhéique.

Urine fréquente, abondante, claire.

Accroissement d'appétit vénérien.

Règles trop hâtives, trop fortes de sang noir. — Avant les règles et pendant, douleur violente au sacrum. — Leucorrhée blanche liquide, qui rend le linge raide et s'échappe avec douleur au sacrum.

Toux sèche, surtout le matin. — Toux avec céphalalgie engourdissante qui réveille à trois heures du matin. — Douleur dans la poitrine en toussant, jusqu'au moment où l'expectoration a lieu. — Toux avec élancements dans la poitrine et crachement de sang pur.

Élancements dans la poitrine. — Oppression en montant un escalier. — Tension et pression douloureuse dans la poitrine, avec grattement sous le sternum qui provoque une toux forte. — Contraction dans la poitrine comme si les poumons étaient serrés d'arrière en avant. — Phthisie ulcéreuse avec sueur colliquative.

Forte douleur au sacrum le matin en s'éveillant. — Douleur dans le dos en se baissant. — Pression dans la région lombaire pendant le repos, augmentée surtout par la toux. — Tiraillements dans la nuque comme si on était tiré par les

126

Déchirements et élancements dans les articulations des membres supérieurs, avec gonflement des doigts et sentiment de pesanteur de la main, et comme si elle devenait plus grande. - Déchirements et tiraillements de l'aisselle jusqu'aux doigts? Tiraillements crampoïdes dans les articulations des doigts, alternant avec douleur à la tête. - Faiblesse dans les mains, dans les doigts; on ne peut rien tenir solidement.

Sentiment de lassitude, de faiblesse dans les jambes, après une courte promenade.

Sensation de chaleur à la face, chaleur brûlante au front, et affaissement le soir. - Lassitude plus grande assis que pendant le mouvement. - Le camphre augmente les symptômes.

Elancements à la peau comme des piqures d'aiguilles, suivis de cuisson surtout à la face: - Vésicules brûlantes avec un liquide jaunâtre; elles se rompent par le grattement et la cuisson cesse. -- Enflure rapide de tout le corps.

Somnolence le jour. - La nuit sommeil très agité avec réveil fréquent. Cauchemar. — Assoupissement.

Le soir frisson avec douleur. - Après midi, froid avec soif, ou froid sans soif après la céphalalgie, ou chaleur nocturne sans soif et sans sueur. - Sueur du matin, surtout de la poitrine.

Agitation et anxiété.

#### 92. NITRI ACIDUM.

DUR. D'ACT., 7 sem .- ANTID: : Camph., sulph. pot.-Puiss., VI, X.

Vertiges qui forcent à se coucher. Faiblesse de la mémoire avec aversion pour le travail de l'esprit.

Grande chaleur et congestion à la tête. Céphalalgie pulsative. -- Céphalalgie

avec grande sensibilité au bruit des voitures et la marche bruyante dans la chambre. - Tension, plénitude et pres-

Nitri acidum.

Sensibilité douloureuse pressive du cuir chevelu. - Chute des cheveux. Éruption humide à la tête.

Paralysie de la paupière supérieure. Pression sur les yeux .- Elancements dans les yeux. - Agglutination des paupières. - Ophtalmie syphilitique. - Des points noirs voltigent devant les yeux. - Myopie. - Diplopie. - Taches de la cornée. -Éblouissements par la lumière du jour. -Les yeux, entourés d'un cercle jaunâtre, s'ouvrent difficilement le matin. Yeux caves.

Sécheresse de l'intérieur des oreilles. - Bruissement. - Battement dans les oreilles. - Obturation des oreilles. Durete de l'ouie.

Éruption boutonneuse à la face. -Serrement de crampe dans les joues et les os des pommettes. — Gonflement des joues, des lèvres, et des glandes sous-mawillaires; motinguino a coma orginiando.)

Sécheresse du nez. - Saignement de

Odontalgie tiraillante ou pulsative le soir au lit. - Jaunissement des dents.

Ulcère à la partie rouge des lèvres. Excoriation de la langue, du palais, de la partie interne des gencives, avec forte douleur. -- Odeur fetide et putride de la bouche. - Stomacace. - Salivation. Ulcères syphilitiques et mercuriels au pharynx: at anywarmer a chart top, eapun

Brûlure à la gorge. - Douleur d'excoriation dans la gorge. - Inflammation de la gorge. and hunzan sounded spigned

Goût acide avec brûlure à la gorge.-Goût amer à la bouche. - Dégoût pour les viandes.

Soif (avec suppuration du poumon).

Désir de manger de la terre, de la craie, de la chaux. Manh nulliante :

Renvois d'une matière désagréable après avoir bu précipitamment. - IndiTACTIC CECETICIES.

tude, chaleur et sueur générale.

Douleur au cardia en avalant les ali-

gestibilité du lait. - Après le dîner, lassi-

ments. - Crampe de l'estomac.

Accumulation des vents. - Déplacement des vents, matin et soir tranchées. Elancements dans le ventre au toucher. - Douleur d'ulcère dans le bas-ventre. --Borborygmes. - Fort gonflement du ventre le matin par des vents. - Gonflement des glandes inguinales. - Bubons qui suppurent.

Setles diarrhéiques, souvent muqueuses ou avec odeur fétide. - Pression pour aller à la garde-robe. - Hémorrhoïdes gonflées qui saignentà chaque évacuation.

Envie fréquente d'uriner avec sécrétion d'une petite quantité d'urine fétide, brun foncé. - Douleur en urinant. - L'urine sort froide. - Incontinence d'urine. -Urine fétide.

Appétit vénérien augmenté. -- Condylomes. - Gonorrhée sycosique. - Syphilis mercurielle. - Gonflement inflammatoire des testicules avec tiraillements dans le cordon spermatique et douleur dans le côté droit du bas-ventre.

Les règles viennent trop tôt. - Suppression des règles. - Leucorrhée muqueuse, fétide, rougeâtre. - Leucorrhée rongeante.

Coriza sec. — Obstruction des narines. Toux avec douleur d'excoriation dans la gorge et la poitrine.-Toux brève avec expectoration de sang noir et coagulé.

Respiration haletante. Asthme. Congestion vers la poitrine, avec agitation, anxiété, chaleur et palpitation de cœur. Phthisie ulcerée, surtout après l'usage du kali.

Douleur au dos et au sacrum après le refroidissement. - Raideur, de la nuque. Élaucements dans les épaules. Élancements au sacrum en toussant.

Douleur dans les cuisses en se relevant de son siége. - Faiblesse des genoux. -Douleur dans la rotule gauche qui empêche d'appuyer le pied. En Crampes dans les mollets quand on marche après avoir été assis. - Froid des mains et des pieds jusqu'au mollet. - Engelures aux doigts, aux mains et aux orteils. - Élancements dans le calcanéum en marchant. - Gonflement des glandes axillaires.

LY III I WIWWIII. XZ

Déchirement dans les membres. -Facilité de se refroidir, suivie de tiraillements dans les membres. - Faiblesse. -Grande fatigue le matin. - Grande maigreur. - Par un léger mouvement après le dîner, chaleur, sueur et palpitations. - La plupart des symptômes disparaissent en allant en voiture. - Souffrances par l'abus du mercure. - Il ne convient pas aux personnes blondes.

Tannes noires. - Le plus léger froid produit des engelures avec prurit, inflammation et gerçures. - Dartres pruriantes. - Taches brunes, rougeâtres à la peau. - Verrues. - Eruption urticaire. - Gros furoncles aux jambes. - Ulcères qui saignent beaucoup avec élancements et brûlure. - Carie des os. - Ulcères mercuriels .... Almo white

Somnolence vertigineuse par faiblesse. - Le soir on s'endort tard. -- Le matin, réveil de bonne heure, - Agitation nocturne avec réveil fréquent. - Cauche-

Froid général de la peau. - Après midi fièvre, froid et chaleur par accès ou continuellement. - Chaleur interne sans soif. - Chaleur nocturne, sèche, avec beaucoup de soif. - Sueur la nuit.

Tristesse. — Inquiétude sur l'issue de la maladie. - Dégoût pour le travail. -Humeur chagrine. - Irritabilité excessive, surtout après l'abus du mercure.

#### 93. NUX VOMICA.

DUR. D'ACT., 3 à 4 sem. dans les mal. chron.—ANTID., Acon., eamph., cham., coc., coff., vin .- Puiss .:

Fréquents accès de vertiges. - Vertiges chroniques. - Vertiges tournoyants avec 120 Ivax vomicu.

1 un comica.

vacillement, obscurcissement de la vue et perte de connaissance. — Verti ges le matin. — Vertiges le matin, comme celui de l'ivresse. — Vertiges après le dîner. — Vertiges le soir au lit, comme s'il tournait en rond.

Embarras de la tête comme si l'on était ivre. — Vacuité de la tête comme par une débauche nocturne. — Suites d'une ivresse de la veille. — Étourdissements après le dîner. — Fatigue de la tête par le travail de l'esprit.

Congestion vers la tête. - Lourdeur de la tête, surtout le matin, avec vertiges. Pesanteur pressive de la tête pendant le mouvement des yeux. - Céphalalgie pressive le matin, augmentée par le grand air. - Céphalalgie pendant la méditation comme si la tête allait éclater. - Céphalalgie tiraillante, déchirante. - Céphalalgie; on a la tête comme brisée. Céphalalgie, surtout après le dîner ou le matin, aggravée par le mouvement, comme par un clou enfonce. - Céphalalgie semilatérale, après l'abus du café. — Céphalalgie tensive et serrante. - Ebranlement dans le cerveau en marchant. - Secousses élancantes dans un côté de la tête après le dîner, avec malaise et vomissement acide. - Céphalalgie périodique. - Céphalalgie augmentée en se baissant.

Douleur du cuir chevelu, surtout au toucher. — Douleur d'excoriation à l'extérieur de la tête pendant un vent apre.

Ophtalmie aiguë et chronique. — Ophtalmie scrofuleuse. — Paupières rouges, gonflées, collées par la chassie. — Paupières brûlantes, prurigineuses. — Contraction des paupières comme par pesanteur. — Douleur d'excoriation aux angles et aux bords des paupières, surtout au toucher et le matin. — Suppuration des angles des yeux. — Agglutination des paupières la nuit, surtout le matin. — Démangeaison dans les yeux comme par du sel, avec larmoiement. — Déchirement nocturne dans les yeux. — Pression dans les yeux en les ouvrant et en

fixant la lumière. — Photophobie. — On ne peut supporter la lumière du jour, surtout le matin. — Le blanc des yeux est rouge injecté. — Échymose et saignement des yeux. — Taches dans le globe. — Clarté frémissante hors du rayon visuel, comme un faux vertige. — (Presbiopie.)

Tintement dans l'oreille. — Déchirement et élancements dans l'oreille.

Visage pâle, maladif, jaune terreux.—
Face rouge gonflée. — Fourmillement
pruriant à la face, comme par des puces.
— Tressaillement à la face le soir. —
Douleur à la face.

Épistaxis. — Douleur d'excoriation ou d'ulcères aux narines. — Aberration de l'odorat, comme si on sentait du soufre, du fromage gâté ou un lumignon.

Desquammation douloureuse des lèvres.

—Petit ulcère brûlant, élançant, dans le côté interne et au bord de la partie rouge des lèvres.

— Dartres au menton.

Odontalgie des buveurs de café. — Odontalgie térébrante, fouillante, augmentée par les efforts dans le travail d'esprit. — Odontalgie tiraillante par les boissons froides. — Odontalgie avec déchirement obtus dans les dents et les mâchoires, toujours augmentée par la boisson froide et améliorée par la chaleur. — Odontalgie déchirante à travers l'os de la face, qui remonte jusqu'à la tête. — Dents vacillantes. — Gonslement saignant putride des gencives.

Difficulté de la parole, causée par la pesanteur de la langue. — Bouton dou-loureux au palais et sur la langue. — Inflammation de la cavité de la bouche. — Gonflement inflammatoire du voile du palais et des gencives du côté gauche, avec difficulté d'avaler et d'ouvrir la bouche. — Aphtes. — Stomacace. — Sécheresse de la bouche sans soif, comme après avoir bu des spiritueux. — Salive sanguino-lente.

Apreté et douleur d'excoriation à la gorge en inspirant de l'eau froide et en avalant. — Gonflement pressif douloureux du voile du palais, de la luette, avec pression en avalant la salive. — Mal de gorge comme s'il y avait une cheville, plus particulièrement hors le temps de la déglutition.

Gout acide. — Le matin goût felide acide. — Goût métallique, herbacé. — Goût amer, surtout pendant l'expuition. — Goût herbacé de la bière. — Goût fuligineux du pain. — Insipidité complète des aliments, — Aversion pour tous les aliments, surtout pour le pain, le tabac, le café. — Soif avec dégoût pour l'eau et pour la bière. — Faim avec dégoût pour les aliments. — Boulimie, surtout après avoir bu de la bière.

Renvoisamers, putrides et acides. — Renvois spasmodiques comme si l'œsophage était contracté. — Hoquet fréquent. — Hoquet violent, qui empêche de boire, de manger et qui repousse les aliments. — Les liquides pèsent sur l'estomae et produisent un malaise à vomir. — Malaise et fatigue hypochondriaque après le diner. — Tête entreprise, obscurcie avec chaleur à la face, les yeux rouges après le dîner.

Malaise. — Nausées périodiques. — Nausée continuelle et envie de vomir, surtout le matin et après midi. — Efforts inutiles de vomissement, surtout chez les ivrognes. — Vomissement chronique de tous les aliments ingèrés. — Vomissement des aliments. — Vomissement de sang. — Vomissement de mucosité acide. — Vomissement et malaise chez les femmes enceintes. — Accès périodique de vomissement.

Grande sensibilité dans la région de l'estomac par une pression extérieure.—
Pression de l'estomac. — Pression à l'estomac après le diner. — Crampes d'estomac après le diner et à jeun. — Contraction dans l'estomac. — Crampes d'estomac chez les buveurs de café. — Pression dans la région précordiale après le diner avec ballonnement. — Gonflement de la région précordiale avec douleur au toucher. — Pression dans la région précordiale qui

produit l'oppression de la poitrine après avoir bu. — Brûlure dans la région précordiale et au cardia.

Pression d l'épigastre comme par une pierre. - Douleur contractive dans les hypochondres et dans le bas-ventre. Serrement autour des hypochondres comme par un lien ou des vêtements trop serrés. — On ne peut supporter des vêtements autour des hypochondres. - Pres-! sion tensive et élancements dans la région hépatique augmentée surtout par le toucher et le mouvement. - Battement dans la région hépatique comme s'il s'y formait un dépôt. - Hépatite aigue et chronique. Plénitude dans le bas-ventre. même après avoir peu mange. - Forte pesanteur dans le bas-ventre. - Bas-ventre gonfle. - Accumulation et deplacement de vents dans le bas-ventre. - Coliques tenteuses avec pression comme par des pierres. - Mal de ventre comme par refroidissement, comme s'il devait se manifester une diarrhée -- Mal de ventre avec tranchée et envie de vomir. - Mal de ventre tiraillant, déchirant, qui ressemble aux coliques. .... Crampes du bas-ventre. Pression dans le bas-ventre vers tes parties genitales. - Mal de ventre qui revient periodiquement. - Hernie ombilicale. - Hernie inguinale. - Hernie erurale. - Etrangloment des hernies.

Constipation. — Durete chronique des garde-robes. — Envie d'aller à la selle! — Sette dure, difficite. — Diarrhée aqueuse avec tranchées (après refroidissement). — Diarrhée dyssentérique avec tranchées dans la région du nombrit. — Pression, tenesme et sortie de mucosité sanguinolente. — Pression sur le rectoin avant et après la selle. — Expulsion d'ascarides avec les matières. — Hémorrhoides aveugles avec constipation douloureuse et selles dures qui produisent de la douleur.

Effort inutile pour uriner, avec peud urine. — Rétention d'urine.

Appetit vénérien fort et facile il exciter.

— Fréquentes érections, surtout le mating

130 IVux vomica.

Nux vomica.

elles sont douloureuses. — Pollutions. —
Gonflement inflammatoire des testicules. —
Douleur d'élancement et de constriction
— Gonflement des testicules avec étranglement du cordon spermatique. — Dureté
et rétraction des testicules. — Hernie scrotale. — Suites fâcheuses de l'onanisme.

Règles trop hâtives et trop abondantes.—
Coliques menstruelles. — Chaleur et brûlure des parties génitales chez les femmes.
— Douleurs violentes par l'expulsion des
dochies. — Abaissement de l'utérus. — Memace de fausse-couche.

Obstruction des narines. — Coriza sec. — Coriza sec le soir avec grande sécheresse de la bouche, et coriza fluent pendant la journée. — Coriza des nouveau-nés. — Écoulement âcre des narines avec leur obstruction. — Enrouement catarrhal avec mucosités épaisses au larynx et sur la poitrine. — Chatouillement pruriant dans le larynx qui excite à tousser, et grattement dans la trachée. — Contraction périodique et suffocante du larynx. — Accès de suffocation oprès minuit.

Toux qui se manifeste en lisant, par le mouvement du corps, par la méditation, ou est augmentée par ces causes.—Toux sèche, satigante, le soir en se couchant et la nuit. — Toux avec céphalalgie comme si le crâne allait éclater, ou avec douleur de brisement dans la partie supérieure du ventre.

Toux avec chatouillement au-dessous du larynx. — Toux après la rougeole.

Oppression de la poitrine, surtout le soir étant couché. — Serrement de poitrine pendant le mouvement, surtout en marchant et en montant un escalier. — Oppression de poitrine avec anxiété la nuit, le matin et après le dîner. — Tension et pression sur la poitrine comme par un poids. — Bouffée de chaleur dans la poitrine avec anxiété. — Battements du cœur.

Douleur au sacrum la nuit qui empêche de se mouvoir dans le lit. — Sensation de courbature dans le sacrum et dans le dos. — Douleur au dos, brûlante ou déchirante. — Le soir, accès de déchirement à la nuque. — Pesanteur tiraillante et raideur à la nuque.

Douleur rhumatismale paralytique dans l'aisselle et l'humérus augmentée par le mouvement. — Le matin, sensation d'une faiblesse subite des bras. — Douleur tiraillante dans le bras, des omoplates jusqu'aux doigts, avec sensation d'engourdissement et impossibilité de mouvoir le bras, surtout la nuit. — Facilité d'engourdissement des mains. — Mains froides. — Sueur (froide) des mains, quelquefois avec le bout du nez froid. — Facilité d'entorse au pouce pendant le mouvement. — Contraction crampoïde des doigts en bâillant, et crampes après minuit.

Engourdissement des jambes. - Paralysie des jambes et des pieds, - Chancellement par faiblesse des jambes. - Lourdeur des extrémités inférieures, surtout des cuisses, qui ne peuvent se réchauffer au lit.-Chancellement et flexion des genoux, quelquesois avec faiblesse tremblante. - Raideur et tension au jarret comme si les tendons étaient trop courts, surtout en se levant de son siège. - Sensation de sécheresse et craquement dans l'articulation du genou pendant le mouvement. -Crampes dans les mollets la nuit. Tension dans les mollets en marchant. Facilité d'engourdissement et d'insensibilité des pieds.

Élancements comme des tressaillements qui traversent et ébranient tout le corps. Raideur et tension dans les membres. -Déchirement et tiraillement rhumatismal dans les membres. - Douleur des membres et de leurs articulations; le matin au lit, on est comme brisé. - Accès de convulsion et de crampe, même épileptique. - Accès d'évanouissement le matin et après le dîner. - Lassitude surtout après s'être promené au grand air AVERSION POUB LE MOUVEMENT ET POUR LE grand air. — Grand désir de se coucher. -Tout le système nerveux ébranle avec surexcitation de tous les sens. - Amaigrissement chez les enfants.

Suite des efforts pour les travaux d'esprit et de l'usage des spiritueux. - Suite de l'usage du café ou d'un long travail sédentaire. - Suites fâcheuses de refroidissement. -Effets trop violents du tabac. - Suites du chagrin .- Symptômes gastriques et bilieux. - Grippe. - Hypochondrie et hystérie. -Disposition aux hémorrhoides .- Maigreur, étiolement. -- LE MATIN ON SE TROUVE LE PLUS MAL. - LE TOUCHER ET LE MOUVE-MENT AUGMENTENT LE PLUS LES SYMPTÔMES, ET CEUX QUI SE SONT MONTRÉS PENDANT QU'ON EST ASSIS S'AMÉLIORENT PAR LE MOUVEMENT A L'AIR LIBRE. - LES SYMPTÔMES S'AGGRA-VENT LE MATIN, DE SUITE APRÈS LE RÉVEIL, APRÈS LE DÎNER, APRÈS LES EFFORTS DES TRA-VAUX INTELLECTUELS. -- Ce médicament convient surtout au sexe masculin.

Ictère. - Eruption miliaire. - Engelures aux mains et aux pieds. - La peau est bleue. - Cuisson élancante et pruriante à la peau.

Grande somnolence dans le jour, surtout avant midi et après le dîner. -- On s'ENDORT TARD, QUELQUEFOIS SEULEMENT VERS LE MA-TIN A CAUSE D'UN GRAND AFFLUX D'IDÉES. -Sommeil vers le matin, rempli de rêves FATIGANTS. -- ON SE RÉVEILLE A TROIS HEURES DU MATIN, AVEC AUGMENTATION DE TOUS LES symptômes. - Le sommeil du matin est doux, agréable, prolongé. - On dort couché sur le dos, avec les mains derrière la tête et la respiration sifflante.

Fièvre avec pendiculation des membres ou bâillements.-Fièvre avec chaleur avant le froid ou entremêlée de frissons. -Froid le soir et la nuit. - Froid avec tremblement, douleur de la main et engourdissement des membres. - Froid après avoir bu ou après chagrin, ou après mouvement ou séjour au grand air. -Froid avec peau bleuatre. - Chaleur dans quelques parties isolées, avec horripilation et froid du reste du corps. - Endolorissement des membres sur lesquels on est couché. - Fièvre gastrique, bilieuse, nerreuse, catarrhale, hectique, intermittente, puerpérale.

Grande pesanteur de la tête qui empê-

Le soir grande anxiété et agitation, quelquefois avec palpitation de cœur et pensée de suicide. - Irrésolution: - Tristesse inconsolable. - Caractère chagrin qui cherche la querelle. - Méticuleux. - Violences colériques .- Paresse hypochondriaque pour tous les travaux. - Excès de sensibilité à toutes les impressions. - CARAC-TERE SOUCIEUX, ARDENT, ZÉLÉ. - Méchanceté cachée. - Caractère rétif.

#### 94. OLEANDER.

DUR. D'ACT., incon.-ANTID.: Incon.-Puiss., II.

Vertiges où tous les objets sont confondus, avec obscurcissement de la vue et des éclairs devant les yeux.

Perte de connaissance. - Grande distraction. - Emoussement de l'esprit et diminution de la conception. - Les idées se portent toujours sur des choses étranges. Faiblesse de la mémoire. le printeres

che de la soutenir, force à se coucher et par la céphalalgie est diminuée. Pression assourdissante à travers le front avec la sensation comme si la tête allait éclater. Prurit rongeant comme par des poux

sur le cuir chevelu, même pendant la nuit. -Desquammation de la peau sur le cuir chevelu. - Teigne avec desquammation, ensuite humidité à l'occiput, avec prurit nocturne violent et cuisson après le grattement. - Céphalalgie extérieure pressive.

Accès d'obcurcissement des yeux en regardant de côté. - Brûlure et tension dans les paupières.

Face pale, traits altérés, avec des cercles bleus autour des yeux et les joues enfoncées. - Pression profonde engourdissante dans les os de la face, surtout ceux de la pommette et qui s'étend de la à la tête et à la racine du nez.

Sensation obtuse, comme une pression

sans douleur, sur le dos et la racine du

Sensation dans la lèvre supérieure, comme si elle était épaisse, engourdie. — Lèvres brunes. — Tressaillement convulsif de la commissure gauche des lèvres.

Déchirements tiraillants dans les dents, la nuit dans le lit, avec anxiété mortelle, mais qui se dissipe de suite en sortant du lit. — Sensation de creux et d'ébranlement dans les dents, avec les gencives blanches bleuâtres.

Langue âpre, par érection des papilles.—Perte presque entière de la parole; on peut produire des tons, mais non des paroles.

Boulimie violente, avec tremblement des mains, tant on désire des aliments, quelquefois avec manque d'appétit. — Le goût des aliments est incertain le soir. — Soif surtout pour l'eau froide.

Vomissement d'un liquide amer, acidule, même des aliments.

Battement dans la région précordiale, comme si on sentait les pulsations du cœur au travers de tout le corps.

Sensation de froid dans le côté droit du ventre. — Colique comme quand on a la diarrhée. — Gargouillement et bruit dans le ventre, avec expulsion de vents d'odeur fétide. — Sensation de vide et de faiblesse dans les entrailles.

Efforts inutiles pour aller à la selle. Selle ténue, molle. Sortie presque involontaire d'une selle de matières non digérèes. Cuisson à l'anus avant, après et hors le temps de la défécation.

Excrétion d'urine augmentée.

Toux seche, ebranlante, produite par un chatquillement dans le larynx.

Douleur sourde tirak!ante dans la poitrine, au-dessous du cœur, plus violente en se baissant et continuant par l'expiration. — Palpitations anxieuses du cœur, avec sensation de vide et de dilatation de la poitrine.

Pression obtuse dans les bras et les jambes qui sont comme foulés, ou comme par un violent coup.—Faiblesse dans les cuisses, jambes et pieds, surtout dans les talons qui sontengourdis en marchant.
—Faiblesse paralytique des pieds. — Paralysie des membres inférieurs.

Forte pression, serrement dans les membres, comme si les os étaient écrasés. — Lassitude extrême. — Faiblesse et abattement de tout le corps à ne pouvoir marcher seul, avec découragement pour tout travail. — Évanouissement. — Pendiculations qui soulagent les membres et un 2000 de

La peau est extrêmement délicate.

Un léger frottement l'excorie. Prurit qui force à se gratter quand on quitte ses vêtements.

Bâillements fréquents avec horripilation dans tout le corps et tremblement de tous les muscles. — Sommeil agité. — Rêves voluptueux avec pollutions.

Frisson subit, général, sans soif et sans chaleur. — Sensation de chaleur avec frisson universel en même temps, sans soif. — Chaleur passagère quand on fait quelque chose avec activité.

Éloignement pour le travail. — Manque de confiance en soi-même. — Colère suivie de regret. — On ne peut supporter la contradiction.

## 95. OLEUM ANIMALE.

Dur. D'act., —Antid.: —Puiss., V, X-

Vertiges tournoyants en se baissant, au grand air. — Distraction, perte de la mémoire.

La tête est entreprise.—Tiraillements, déchirements comme par refroidissement:—Pression à la tête, qui passe par le frottement.—Pression frontale par de légers efforts de l'intelligence.—Térébration et élancements violents au-dessus des yeux, comme si le crâne était perforé; elle se dissipe par le frottement.

Déchirement à l'extérieur de la tête, avec tension et douleur d'écorchure.

Démangeaison dans les yeux et les paupières qui se dissipe par le frottement. - Frémissements et tiraillements fréquents dans les sourcils et les paupières. Myopie.

Bourdonnement dans les oreilles augmenté par le bruit. - Déchirement dans les oreilles. mun . nann

Tension crampoïde, paralytique, et tiraillements à la face comme si les os de la pommette étaient tirés en haut, et qui se passe par le frottement. -- Crampe dans la mâchoire inférieure qui ne permet presque pas d'ouvrir la bouche.

Tiraillements et battements par saccade, comme d'un ulcère dans les dents, avec la sensation comme si un froid glacial sortait des pointes des dents.

Sécheresse continuelle à la gorge, surtout remarquable en avalant à vide. -Sensation comme s'il venait de l'eau fraîche dans la gorge, avec nécesité de l'avaler, quoique la déglutition en soit dif-

Goût acide à la bouche. - Dégoû tpour la viande.

Renvois brûlants.

Nausées surtout en mangeant et après avoir mangé. - Nausée avec douleur contractive des intestins qui remonte jusqu'à l'estomac. - Malaise et pression surl a poitrine, comme si on avait avalé une forte bouchée: austal - . . . . . . . . . . .

Grande sensibilité de la région de l'estomac. Etranglement dans l'estomac comme s'il se retournait. - Sensation de froid à l'estomac.-Chaleur et brûlure à l'estomac.-Pression dans la région de l'estomac après avoir bu de l'eau froide.

Tranchées autour du nombril, jusqu'à la région précordiale, surtout après avoir mangé et bu, quelquefois suivi de diarrhée. - Gargouillement et production de vents dans le ventre.

Constipation. - Selle dure ou sous forme de bouillie et qui n'est rendue qu'après de grands efforts. - Diarrhée avec tranchée avant, pendant et après l'évacuation. - Douleur de meurtrissure des entrailles après la garde-robe, avec cuisson à l'anus.

Diminution de sécrétion d'urine; après de longs efforts il ne s'en échappe que quelques gouttes.

Testicules gonfles, douloureux au toucher .- Érections fréquentes et pollution.

Règles tropetôt.

Éternuements avec douleur d'excoriation à la poitrine et d'écartement. Coriza avec mucosité épaisse, qui produit une tension douloureuse dans le nez. - Voix âpre, enrouée. - Contraction nocturne dans la trachée qui trouble le sommeil. - Le matin un serrement du larynx qui gêne la respiration, étant couché sur le dos, et qui ne cesse qu'en chan-

Bouillonnement et anxiété dans la poitrine, avec brûlure et un sentiment de chaleur qui s'élève du bas-ventre.

Douleur rhumatismale dans le dos et la nuque. - Tension pressive dans la nuque, qui force à fléchir la tête en avant et qui empêche de la tourner.

Déchirements et tiraillements dans les membres. - Fourmillement comme par des insectes dans les membres. Tension dans les jarrets, comme si les tendons étaient trop courts ou comme pendant la croissance. - Faiblesse paralytique dans les membres, surtout dans les pieds, qui tremblent par faiblesse.

Tiraillements crampoïdes dans différentes parties du corps. - Malaise et faiblesse universelle, comme par une syncope. -- sinsmit of -- sinsmit ast

Fréquentes pendiculations et bâillements, avec grande envie de dormir pendant le jour, surtout après le dîner.

Prédominence du froid, horripilation. Sueur passagère, surtout en man-

Caractère triste, renfermé en soimême.

#### 96. OPIUM.

Dur. D'ACT., quelq. h.—ANTID.: Camph., coff., ipéc.
—Puiss., X.

Vertiges d'ivresse, avec envie de se coucher.

Étourdissement. — Pesanteur et embarras de la tête, comme après l'ivresse. — Grand afflux d'idées avec gaîté et disposition pour des réflexions sublimes, profondes. — Erreur de l'imagination! — Congestion vers la poitrine. — Obscurcissement de la tête avec chaleur dans les yeux, et besoin de les fermer. — Hébetement. — Idiotisme.

Les yeux sont demi-ouverts, raides, convulsés. — Obscurcissement de la vue. — Chute des paupières, comme paralysées. — Dilatation, immobilité des pupilles.

Visage pâle, terreux, creux, yeux caves. — Face rouge, foncée, brûlante, avec des yeux féroces saillants. — Fréquente alternative de chaleur et de rougeur de la face. — Face rouge gonflée. — Relâchement de tous les muscles de la face, avec lèvres et paupières tombantes. — Mouvement spasmodique et tremblement de tous les muscles de la face, avec tressail-lement aux commissures des lèvres.

Distorsion de la bouche.—Trismus.—
Paralysie de la langue.— Parole faible,
difficulté de parler à haute voix.— Sécheresse à la bouche et à la gorge, avec
grande soif.—Salivation abondante.

Défaut d'appétit avec dégoût pour tous les aliments. — Boulimie par accès.

Ballonnement tympanique du ventre.

— Ballonnement dur du ventre. — Pression comme par un poids dans le bas-ventre,

Constipation. — Constipation chronique avec dureté et ballonnement sans douleur du bas-ventre. — Constipation avec vomissements d'excréments: — Selles involontaires.

Rétention d'urine, comme si l'urètre était fermé.

Appétit vénérien augmenté, érections fréquentes, pollutions nocturnes et rêves voluptueux.

Douleurs d'enfantement suspendues.

Obstruction des narines. - Respiration bruyante, ronflante. - Respiration difficile, lente, intermittente.

Toux creuse, sèche, augmentée après le repas. — Asthme avec couleur bleue de la face, par les efforts de toux.

Tressaillement et tremblement convulsif des membres. — Pesanteur dans tous les membres.

Amaigrissement. — Gonflement hydropique général. — Peau blanche avec taches bleues. — Tétanos. — Convulsions. — Grande inquiétude dans les membres. — Tremblement universel, avec secousses et tressaillement dans les membres et froid extérieur général. — Grande faiblesse. — Maladies des vieillards. — Paralysie. — Delirium tremens des buveurs. — Insensibilité de tout le système nerveux. — Diminution de la réaction contre les médicaments.

Cataphora avec ronflement, la bouche ouverte et les yeux ouverts convulsés. — Carpologie pendant le sommeil. — Sommeil avec demi-connaissance, difficulté à s'éveiller. — Soubresauts pendant le sommeil.

Froid extérieur des extrémités. — Chaleur brûlante du corps avec rougeur vive de la face. — Chaleur avec anxiété, délire et agitation. — Fièvre nerveuse.

Repos de l'esprit avec imagination riante et oubli des souffrances.—Regard téméraire, féroce.—Insouciance.— Imagination bizarre.—Manie.—Suites fâcheuses de la frayeur.

### 97. PARIS QUADRIFOLIA.

Dur. D'act., incon.-Antid.: Incon.-Puiss., III.

Verlige après avoir lu à haute voix, avec difficulté de parler et de voir.

La nuit, céphalalgie pulsative avec inquiétude qui empêche de se rendormir.—
Douleur pressive dans la région temporale droite, qui cesse par la compression.
— Augmentation des symptômes par la méditation. — Sensation comme si la tête était boursouflée, les tempes et les yeux chassés en dehors. — Céphalalgie pulsative, surtout en montant un escalier. — Tension dans le cerveau et dans les téguments du front.

Éruption de boutons au front avec douleur d'excoriation à l'extérieur du vertex au toucher.

Sensation dans les yeux comme s'ils étaient trop volumineux ou gonflés, l'orbite trop étroit, et le regard incertain. — Boutons secs pruriants au-dessous de la paupière, avec démangeaison augmentée après le grattement.

Diminution de l'ouïe.

Boutons suppurants à leur pointe et entourés d'un cercle rouge au-dessous du nez et au menton. — Boutons rouges, comme des grains de millet, sur les côtés et sous le bord de la mâchoire inférieure; ils paraissent le soir après de la cuisson et de la démangeaison.

La lèvre supérieure est épaisse, gercée, avec dartre autour de la bouche.

Tiraillements et battements tiraillants dans les dents creuses, augmentés par le froid; les gencives sont rugueuses au toucher et douloureuses comme par une brûlure.

Accumulation de salive âcre, astringente. — Douleur du voile du palais, comme s'il était écorché et dépouillé de l'épiderme. — Tumeur dure, de la grosseur d'un œuf, au palais. — Bouche desséchée le matin au réveil.

Pression à la gorge le soir, comme si une boule, qui semble toujours grossir, allait éclater.

Renvois pressifs. — Hoquet continuel après le dîner.

Pression à l'estomac et dans le basventre, comme par quelque chose de dur. Selles fétides, comme de la viande putride.

Fréquente envie d'uriner, avec cuisson pendant l'émission. — Brûlure et élancement dans l'urètre, hors le temps de l'émission de l'urine.

Règles trop tôt.

Obstruction des narines le matin; on mouche du mucus sanguinolent. — Coriza sec. — On mouche du mucus rouge et verdâtre. — Coriza sec alternativement avec coriza fluent. — Le matin, sécheresse de la trachée-artère, avec enrouement. — Enrouement qui ne permet pas de parler haut. — Excitation continuelle à tousser, dans la trachée, comme par la vapeur du soufre, ou s'il y avait un mucus épais collé dans le pharynx qu'on fait effort pour l'expulser. — Expectoration demucus épais verdâtre du larynx.

Toux, étant couché sur le côté gauche. Battements de cœur dans le repos et le mouvement.

Tension et faiblesse dans les muscles du cou et de la nuque, qui force à fléchir la tête en avant avec la sensation d'un fardeau sur la nuque.

Pesanteur et faiblesse engourdissante dans les articulations des bras et des doigts. — Élancements continuels dans tous les membres. — Serrement dans les articulations, et pendant le mouvement on a la sensation comme s'ils étaient gonflés ou foulés. — Lourdeur de tout le corps.

Fourmillement dans différentes parties au-dessous de la peau, sans prurit.

Sommeil agité, interrompu, avec jactation continuelle et beaucoup de rêves.

Frissonnement à la poitrine, au basventre, aux membres inférieurs, avec chair de poule et bâillement.—Froid continuel, comme si les organes intérieurs étaient contractés et trémoussants.— Sueur matinale avec prurit qui force à gratter.

Disposition au chagrin, mécontentement ou mépris. — Caractère sot.

#### 98. PETROLEUM.

DURID'ACTI, 50 jours. - ANTID. : Nux. PUISS., VI.

Vertige en se baissant et quand on se redresse. - Vertige chronique.

Le matin, pesanteur et plénitude de la tête, surtout en se baissant. — Tête entreprise. — Défaut de mémoire. — On n'est pas disposé à la méditation.

Céphalalgie occipitale pressive. — Céphalalgie pressive, élançante, pincements douloureux à la tête. — Battements dans l'occiput. — Céphalalgie semi-latérale qui force à se coucher. — Sensation, comme si tout était vivant dans la tête. — Céphalalgie le matin à jeun et le soir après la promenade.

Douleur du cuir chevelu au toucher, comme s'il était meurtri et en suppuration. — Croûtes sur le cuir chevelu. — Éraption à la tête et à la nuque. — Chute des cheveux.

Inflammation des yeux. — Scintillement devant les yeux. — Voile devant les yeux. — Presbyopie qui ne permet pas de lire un petit caractère. — Diplopie, convulsion des yeux.

Tintement d'oreilles. —Bruit dans l'oreille. — Bourdonnement et bruissement devant les oreilles. — Surdité (surtout après l'usage de l'acide nitrique). — Sécheresse et sentiment de sécheresse désagréable dans les oreilles. — Écoulement de sang et de pus par les oreilles. —Rougeur et excoriation humide derrière les oreilles.

Chaleur de la face après le dîner. — Visage jaune et pâle.

Sécheresse dans les narines. — Obstruction des narines. — Epistaxis.

Boutons croûteux autour des levres et aux commissures. — Gonflement des glandes sous-maxillaires.

Odontalgie par le contact de l'air avec gonflement des joues, plus fort la nuit.—Grande facilité de luxation de l'articulation maxillaire droite, le matin au lli avec forte douleur. — Gencives gonflées, brûlantes et élançantes au toucher. — Engourdissement des dents avec douleur en les serrant.

Langue blanche chargée. — Odeur fétide de l'haleine, comme celle de l'ail. — Mucosités dans la bouche et dans la gorge. La via le commune de la suite

Gonflement et sécheresse de l'intérieur de la gorge. — Grande sécheresse de la gorge et de la bouché et forte soif de bière. — Les matières ingérées refluent dans les arrière-narines.

Faim vive. — Manque d'appétit. — Dégoût pour la viande et les choses grasses. — Goût amer et acide à la bouche. — Renvois bruyants après le dîner. — Obscurcissement et vertiges.

Aigreurs. — Envie de vomir — Vomissement amer de matières verdâtres. — Malaise et vomissement des femmes enceintes.

Douleur dans la région précordiale, comme si quelque chose s'en détachait.

—Pression à l'estomac.—Grande faiblesse de l'estomac.

Sensation de vide dans le bas-ventre.

— Tranchées. — Gargouillement dans le bas-ventre. — Accumulation de vents dans le bas-ventre. — Mal de ventre après le dîner.

Selles dures. — Selles fréquentes pendant la journée. — Diarrhée. — Selles muqueuses et sanguinolentes. — Mal de ventre avant la selle diarrhéique. — Brûlure à l'anus après la selle.

On urine, fréquemment et peu, une urine brune, rouge, fétide. — L'urine coule goutte à goutte, involontairement. — Rétrécissement de l'urêtre. — Guisson dans l'urêtre.

Prarit et humidité au scrotum. — Dartre pruriante au scrotum et au périnée. — Pollutions fréquentes. Règles trop hâtives, d'un sang qui cause des démangeaisons. — Difficulté des règles à la puberté. — Leucorrhée comme le blanc d'œuf.

Coriza. — Obstruction des narines. — Enrouement.

Toux par sécheresse dans la gorge. —
Toux le soir après le coucher. — Toux
nocturne sèche. — Toux sèche qui vient
du fond de la poitrine.

Oppression de la poitrine par l'air froid.

Elancement dans le côté de la poitrine.

Oppression nocturne. — Dartres sur la poitrine.

Douleur au sacrum qui empêche de se tenir debout. — Douleur au dos. — Faiblesse et raideur de la nuque et du dos. — Dartre à la nuque.

Déchirement dans les mains. — Taches brunes au poignet. — Raideur goutteuse des articulations des doigts. — Brûlure dans la paume des mains. — Fissures, crevasses saignantes dans la paume des mains et aux doigts, l'hiver. — Grande faiblesse dans les bras. — Sueur aux mains.

Craquement dans les articulations des membres inférieurs. — Dartres aux genoux. — Brûlure aux talons. — Gonflement chaud des talons.

Tiraillements douloureux dans les membres. — Engourdissement et raideur des membres. — Craquement, raideur des articulations.

Cors aux pieds. — Verrues. — Engelures. — Furoncles. — Délicatesee de la peau; ses lésions guérissent difficilement. — Chair luxuriante dans les ulcères. — Malaise des glandes après contusion. — Éruption urticaire miliaire.

Éloignement pour le grand air.—Frissonnement à l'air libre. — Chaleur passagère. — Bouillonnement du sang et sueur après une courte promenade ou un léger chagrin. — Malaise et faiblesse après être allé en voiture. —Grande lassitude le matin et le soir. —Facilité à se refroidir. — Malaise universel insupportable, avec

faiblesse et trémoussement. - Accès épileptique.

Somnolence pendant la journée et le soir quand on est assis tranquille. — La nuit, demi-sommeil avec rêvasseries. — Réveil fréquent. — Chaleur et angoisses. — Le matin on n'a pas assez dormi.

Frisson avec céphalalgie et froid des mains et de la face. — Fièvre intermittente avec frisson, ensuite chaleur de la face et froid aux pieds. — Chaleur de la face avec soif. — Aussitôt après le froid, sueur. — Sueur nocturne.

Anxiété et disposition à s'effrayer.— Caractère violent. — Emportement avec injures. — Grande irrésolution.

#### 99. PETROSELINUM.

Puiss. : Tinet.

Gonorhée ordinaire, avec envie continuelle, presque inutile, d'uriner.

## 100. PHELLANDRIUM AQUATICUM.

Dur. D'ACT., incon. - ANTID.: Incon. - Puiss., II.

Vertiges à tomber; amélioration étant couché.

Lourdeur et faiblesse de la tête qui tombe facilement d'un côté et de l'autre. — Chaleur augmentée dans la tête.

Les paupières tombent facilement, avec frémissement. — Obscurcissement com me d'un brouillard quand on fixe un objet.

Tension dans la peau du visage.

Boutons pruriants qui deviennent confluents dans les narines.

Gencives rouges, gonflées, avec douleur d'ulcération.

Goût douceâtre ou amer après avoir bu de l'eau. — Appétit pour les acides. — Soif pour le lait et la bière avec dégoût et aversion pour l'eau.

Sensation de froid dans les intestins.

Selles dures avec pression douloureuse à l'anus. — Selle aqueuse suivie de tenesmes et de douleur d'excoriation à l'anus.

Urine pâle en moindre quantité.

Règles trop hâtives.

Obturation du nez la nuit qui force à s'asseoir pour respirer. — Enrouement et coriza avec inflammation et gonflement des narines.

Toux sèche, suffocante, avec respiration courte et accumulation de mucosité à la gorge.

Oppression de poitrine étant debout et en respirant profondément. — Respiration courte en marchant. — Élancements douloureux à la poitrine.

Déchirements dans les membres supérieurs et inférieurs, sensation comme si tous les vaisseaux du corps éprouvaient un mouvement de tremblement. — La plupart des symptômes paraissent étant assis et couché, s'améliorent pendant le mouvement et à l'air libre.

Somnolence pendant la journée avec bâillement fréquent. — Long sommeil le matin.

Prédominence du froid et tremblement. — Horripilation comme quand on est inondé d'eau froide.

Caractère triste, pensif, chagrin, farouche.

#### 101. PHOSPHORUS.

Dur. D'ACT., 50 j.—Antid.: Camph., coff., nux, vin.
—Purss., X.

Fréquents accès de vertiges d'un caractère différent et à des heures diverses de la journée. — Vertiges tournoyant en quittant le lit. — Vertige avec céphalalgie et nausée. — Vertige chronique.

Grand afflux d'idées difficiles à coordonner. — Le matin, grande facilité à oublier.

#### Phosphorus.

Céphalalgie engourdissante, souvent avec forte congestion et visage pâle. — Congestion du sang à la tête. — Céphalalgie après chagrin. — Déchirement dans un côté de la tête. — Céphalalgie nocturne après un malaise le soir. — Le matin céphalalgie. — Faiblesse de la tête qui ne peut supporter le bruit du rire, de la musique, de la marche, etc. — A l'air libre le malade se trouve mieux de sa tête.

Élancements extérieurs au côté de la tête. — Grande disposition au refroidissement de la tête; à l'air libre on a la sensation comme si le cerveau devenait raide. — Sensation au front comme si la peau était trop étroite, avec anxiété. — Chute des cheveux.

Difficulté d'ouvrir les paupières. —
Brûlure, cuisson à l'angle externe des yeux. — Larmoiement des yeux au vent.
— Ophtalmie avec cuisson et fort larmoiement. — Ophtalmie avec chaleur et pression comme le produit un grain de sable. — Yeux larmoyants qui suppurent la nuit. — Obscurcissement de la vue. — Faiblesse de la vue le matin au réveil. — Myopie. — Taches noires qui voltigent devant les yeux. — Cécité le jour où tous les objets paraissent gris. — Obscurcissement des yeux à la lumière artificielle. — Amaurose.

Battements et pulsations dans l'oreille.—
Sensation de sécheresse dans l'oreille.—
Bourdonnement. — Dureté de l'ouïe
pour la perception de la parole. — Fort
résonnement des paroles dans l'oreille,
qui produisent une vibration dans la tête.
— Dureté de l'ouïe alternant avec un
écoulement d'une humeur jaune des
oreilles.

Couleur de la face pâle, sale, terreuse.

— Alternative de pâleur et de rougeur de la face comme une bouffée de chaleur.

— Rougeur circonscrite des joues. — Tension dans la peau de la face, quelquefois d'un seul côté. — Face gonflée surtout audessus des yeux, avec enfoncement des yeux,

entourés d'un cercle bleuâtre. — Éruption de boutons à la face. — Douleur d'un côté de la face en ouvrant la bouche.

Sécheresse pénible du nez. — Odeur désagréable du nez. — Écoulement continuel de mucus par les narines. — On mouche du sang. — Épistaxis. — Éphélides sur le nez. — Excoriation des angles du nez. — Gonflement et rougeur du nez.

Dartres et boutons autour de la bouche. — Ulcération des commissures des lévres. — Lèvres bleuâtres. — Lèvres gercées.

Gencives gonflées qui saignent facilement. — Odontalgie au grand air et en mangeant chaud, seulement la nuit.

Langue blanche.—Excoriation de l'intérieur de la bouche. — Mucus collant dans la bouche. — Salive douceâtre, salée. — Le matin, renaclement pour expulser le mucus du pharynx. — Au palais, sensation comme si la membrane voulait se détacher; elle se ride. — Crachement de sang.

Gonflement du cou. — Sécherèsse dans la gorge, jour et nuit.

Goût muqueux à la bouche. — Goût de fromage. — Grand désir des choses rafraîchissantes. — Faim après le dîner. — Goût acide de la bouche surtout après le dîner.

Renvois spasmodiques. — Renvois acides. — Rapports avec douleur au cardia comme si quelque chose voulait se déchirer. — Régurgitation des aliments ingérés, quelquefois acides. — Aigreurs augmentées après le dîner. — Brûlure dans les mains après le dîner. — Paresse et somnolence après le dîner.

Le matin nausée avec sensation de faim. — Nausée après le dîner. — Vomissement des aliments le soir.—Vomissement de bile la nuit. — Vomissement de sang. — Choléra. — Choléra asiatique.

Douleur comme par rétrécissement du cardia, surtout en avalant du pain. — Espèce de rétrécissement du cardia, de manière que l'aliment, à peine ingéré, re-

vient dans la bouche. — Douleur au toucher dans la région précordiale le matin. — Fouillement dans la région précordiale. — Ptenitude d'estomac. — Brûture à la région précordiale. — Malaise par tout le corps, surtout à l'estomac.

Ballonnement après le repas. — Malaise dans le ventre après le déjeuner. —
Bruit et borborygme dans le ventre. — Déplacement des vents. — Souffrances par les vents. — Coliques venteuses profondes dans le bas-ventre, augmentées étant couché. — Mal de ventre le matin au lit. — Déchirement dans le bas-ventre avec envie fréquente d'aller à la selle.

Selles molles, ténues, chroniques. — Selles sous forme de bouillie. — Diarrhée muqueuse. — Diarrhée des femmes enceintes. — Selles retardées. — Sortie du sang pendant la selle. — Paralysie du canal intestinal. — Selle involontaire. — Boutons hémorrhoïdaux. — Écoulement de mucus de l'anus qui est toujours ouvert.

Urine fréquente, toujours en petite quantité. — Urine avec un sédiment blanc muqueux, ou un sédiment de sable rouge ou jaune. — Pissement de sang. — Cuisson en urinant. — Tension dans l'urêtre. — Brûlure dans l'urêtre en urinant. — Tressaillement brûlant dans l'urêtre hors le temps où l'on urine.

Appétit vénérien très augmenté. — Envie continuelle du coît. — Éjaculation trop prompte et sans force. — Érection trop violente le soir. — Pollutions très fréquentes. — Mauvaises suites de l'onanisme.

Règles trop tôt et trop fortes. — Écoulement de sang pendant la grossesse. — Leucorrhée avec prurit qui produit des vésicules. — Élancements dans le vagin jusqu'à l'utérus. — Stérilité par une trop grande lascivité.

Coriza sec. — Obstruction des narines. — Écoulement jaune, verdâtre, par le nez. — Apreté de la gorge. — Enrouement chronique. — Aphonie, et quand on parle c'est faiblement. — Respiration difficile. — Le soir oppression avec anxiété dans la

poitrine, plus forte quand on est assis.— Expectoration de mucosités du larynx. — Croup.

Toux produite par un chatouillement dans la poitrine. - Toux avec âpreté et enrouement de poitrine. - Toux nocturne avec élancement du larynx. — Toux avec mal de ventre. - Toux seche fatigante produite par l'air froid ou la lecture à haute voix. - Toux ancienne sèche, comme s'il y avait des tubercules ou une inflammation chronique dans les poumons. - Toux des femmes enceintes. -Expectoration de mucosité épaisse ou de sang avec cuisson dans la poitrine. - Le matin et le soir toux avec crachats puriformes, salés. - Toux avec crachats de sang, avec règles peu abondantes. quelquefois suspendues.

Oppression pendant le mouvement. Elancements dans le côté gauche de la poitrine, même au toucher. - Élancements chroniques dans les côtés. - Douleur d'écorchure dans la poitrine.-Douleur dans le côté gauche de la poitrine étant couché dessus. - Congestion vers la poitrine. - Oppression comme si le sang montait avec chaleur vers le cou. - Sensation de plénitude dans la poitrine. - Phthisie pulmonaire. - Pneumonie. - Érysipèle des mamelles avec brûlure et élancements. — Ulcère suppurant des mamelles. - Battements du cœur étant assis. - Battements violents du cœur et congestion de sang vers la poitrine sous l'influence des affections morales.

Raideur de la nuque. — Douleur à la nuque et au dos après être resté longtemps assis. — Douleur brûlante au sacrum.

Elancements déchirants dans les bras et les omoplates. — Tremblement des mains. — Engourdissement des doigts et du bout des orteils. — Gonflement de la main pendant la nuit. — Dartre furfuracée au bras. — Sueur fétide sous les aisselles. — Contraction fréquente des doigts comme par une crampe.

Gonflement osseux au tibia. — Secousse dans le pied le jour et la nuit avant de s'endormir. — Le soir gonflement du pied. — Douleur dans la hanche droite.

Déchirements dans les membres après un refroidissement, surtout la nuit au lit.

— Facilité à se refroidir. — Susceptibilité aux variations de l'atmosphère. — Sensation de trémoussement dans les membres.

— Brisure dans les articulations. — Brûlure dans les membres. — Chaleur brûlante dans les paumes des mains.—Tremblement des membres pendant le travail.

— Le matin au lit grande faiblesse. — Bouillonnement fréquent et violent du sang.

Taches jaunes au bas-ventre et sur la poitrine. — Taches brunes au corps. — Dartres sèches. — Cors aux pieds. — Engelures. — Maladie des glandes après meurtrissures. — On ne peut supporter le grand air. — De petites plaies saignent beaucoup. — Saignement de presque tous les organes. — Fongus hématode. — Furoncles.

Beaucoup de douleurs commencent pendant le repas et durent pendant tout le temps qu'on mange. — Ce médicament est surtout efficace après le kali.

Le soir on s'endort tard. — Somnambulisme. — Insomnie par agitation. — Le matin on n'a pas assez dormi. — Cauchemar.

Froid le soir et horripilation sans soif, suivie ou non suivie de chaleur.—Frisson ou froid, suivi de chaleur, avec soif et sueur, surtout la nuit et après midi.—Chaleur passagère.—Sueur le matin.—Sueur visqueuse la nuit.

Facilité à s'effrayer. — Timidité. — On s'effraie d'être seul. — Irritabilité et anxiété. — Humeur chagrine. — Grande irritabilité et disposition d se mettre en colère, après quoi les symptômes s'aggravent. — Horreur du travail. — Misanthropie. — Hypochondrie.

#### 102. PHOSPHORICUM ACIDUM.

Dur. D'ACT., 2 sem.—Antid.: Camph., coff.— Puiss., III.

Vertiges vacillants en marchant et debout-

Impossibilité de méditer. — Absence de pensée. — Erreurs des sens. — Esprit obtus sans imagination.

Céphalalgie pressive. — Déchirements de la tête. — Élancements au-dessous des yeux et dans les tempes. — Céphalalgie continuelle qui oblige à se coucher et que le bruit et la plus petite commotion augmentent considérablement.

Yeux ternes, vitreux. — Douleur ardente dans les paupières et dans les angles. — Froid du bord intérieur des paupières. — Pression dans les yeux. — Larmoiement des yeux. —Sensation comme si le globe des yeux était trop grand. — Éblouissement en regardant les objets rolumineux. — Trouble de la vue, comme par un brouillard. — Myopie. — Taches jaunes dans le blanc des yeux.

Élancements dans les oreilles augmente par le bruit de la musique seulement. — Aversion pour la musique. — Dureté de l'ouïe. — Tiraillement de crampe dans l'oreille. — Bruit dans l'oreille en se mouchant.

Pâleur du visage, yeux caves, cernés, et le nez essilé.

Le dos du nez est gonflé, couvert de taches rouges. — Épistaxis.

Gerçures aux lèvres. — Gonflement de la lèvre inférieure qui suppure.

Gonflement et saignement des gencives.—
Les gencives sont spongieuses décollées.
— Boutons douloureux aux gencives. —
Odontalgie déchirante augmentée par la
chaleur du lit, et en général par le chaud
et le froid. — Douleur brûlante dans les
dents incisives, la nuit.

Sécheresse à la bouche sans soif. -

Mucus épais, collant, dans la bouche et sur la langue. Douleur dans la mâchoire inférieure, comme si elle était luxée. — Voile du palais gonflé. — Douleur cuisante dans la cavité de la bouche en mâchant des aliments solides.

Elancements à la gorge en avalant.

Douleur contractive dans la fossette du
cou. — Douleur d'excoriation à la gorge.

Le goût se conserve long-temps après avoir mangé quelque chose, surtout celui du pain. — Dégoût pour le pain. — Le pain a un goût amer.—Grande soif pour le lait froid et pour la bière.

Renvois, incomplets, brûlants, aci-dules.

Nausée qui force à se coucher.

Pression à l'estomac comme par un poids, avec somnolence après chaque repas.

Bruit et borborygmes dans le ventre. — Gargouillement dans le ventre comme s'il était plein d'eau. — Douleur de ventre spasmodique dans la région du nombril. — Tranchées. — Gonflement météorique de l'utérus.

Selles diarrhéiques qui n'affaiblissent pas. — Diarrhée muqueuse. — Diarrhée blanche grisâtre.—Selles dures, difficiles, qui sortent par morceaux. — Selles involontaires, comme de la bouillie, en croyant rendre un vent.

Fréquente envie d'uriner, avec très peu d'urine. — Urine aqueuse, formant de suite un nuage blanchâtre et épais. — Cuisson dans l'urètre en urinant.

Douleur lancinante dans le gland. —
Fourmillement et vésicules autour du frein. — Éruption au scrotum. — Condylomes. — Pollutions fréquentes très débilitantes. — Érections fréquentes sans désir du coït. — Défaut d'appétit vénérien. — Suites fâcheuses de l'onanisme.

Leucorrhée après les règles.

Fort enrouement.

Toux produite par un chatouillement au-dessous de la région précordiale ou dans la fossette du cou. — Le soir toux sèche et le matin avec crachats blancs jaunâtres. — Toux avec mal de tête et envie de vomir. — Toux avec erachats purulents et douleur dans la poitrine.

Oppression de poitrine qui est comme serrée. — Élancements dans les côtés de la poitrine. — Douleur pressive dans la poitrine et dans la gorge, pendant le coriza. — Affections inflammatoires de la poitrine.

Tiraillements et déchirements dans les membres. — Courbature dans le trone et dans les membres, comme par l'effet de la croissance.—Douleur comme celle d'un raclement avec un couteau sur le périoste de tous les os.—Douleur de brisement dans toutes les articulations, matin et soir. — Grande maigreur.

Faiblesse par perte d'humeurs. —Grande fermentation du sang avec forte agitation.

Fourmillement dans le dos, le sacrum et les autres parties du corps. — Taches rouges sur les membres qui brûlent comme du feu. — Éruption de petits boutons qui sont en groupes.—Éruption de boutons avec douleur brûlante, ou douleur d'écorchure. — Les doigts deviennent ridés et comme morts, seulement dans une moitié, avec une ligne de démarcation prononcée. — Cuisson des plaies, même de celles des os. — Maladies des os.

Grande somnolence le jour et le soir de bonne heure. — Grande envie de dormir. — Grande somnolence le matin, avec difficulté extrême de s'éveiller. — Carpologie pendant le sommeil.

Froid de sièvre, surtout le soir et sans soif. — Chaleur de sièvre le soir sans soif, avec anxiété et grande accélération de circulation. — Froid et chaleur alternativement. — Sueur le matin. — Fièvre nerveuse.

Inquiétude et précipitation. — Tristesse et indisposition d parler. — Inquiétude de son avenir. — Suites de chagrins continuels et d'amour malheureux.

#### 103. PLATINA.

Dur. D'ACT., 6 à 7 sem.—Antid.: Puls.—Puiss., II.

Accès de vertiges le soir avec perte de connaissance.

Distraction. — Oubli. — Perte de connaissance. — Délire. — Aberration de l'esprit produite par frayeur, par chagrin ou par colère.

La tête est entreprise avec tension, comme s'il y avait une planche devant la tête. —Pression et crampe douloureuse dans les tempes, dans le front, comme si la pression se dirigeait en dedans; elle s'aggrave en se baissant et par le monvement. — Douleur dans le côté de la tête comme par une cheville enfoncée dans les pariétaux. — Fourmillement dans les tempes. — Sensation d'engourdissement dans la tête et extérieurement dans le vertex. — Céphalalgie qui augmente lentement jusqu'à être très forte et diminue avec la même progression.

Sensation de contraction du cuir chevelu sur le vertex.

Tension dans les orbites avec douleur d'excoriation pruriteuse sur leur bord. - Douleur de crampe au bord des orbites. -Frémissement et tremblement crampoïde des paupières. - Fourmillement dans les angles des yeux. - Sensation de chaleur dans les yeux. - Sensation de froid et de cuisson dans les yeux. - Tension contractive dans le globe des yeux. - Pression somnolente dans les yeux. - Douleur dans les yeux par les efforts de la vue.-Yeux convulsés. -- Voile devant les yeux qui semble voltiger, sans douleur. -Tremblement et lueur devant les yeux. - Les objets paraissent plus petits qu'ils ne sont réellement.

Serrement de crampe dans l'oreille. — Sensation de froid avec sensation d'engourdissement dans l'oreille qui s'étend par la joue jusqu'aux lèvres. — Fourmillement avec démangeaison aux oreilles. —Bruit lointain comme le roulement d'une voiture, dans l'oreille. — Secousses dans les oreilles.

Douleur de crampes tensives avec sensation d'engourdissement ou pression engourdissante à l'os de la pommette. — Sensation de froid avec fourmillement et sensation d'engourdissement dans tout le côté de la face. — Chaleur brûlante et rougeur ardente de la face avec soif violente; la bouche sèche surtout le soir. — Face creuse, pâle. — Distension des muscles de la face et des angles de la bouche. — Trismus.

Douleur de crampes avec sensation d'engourdissement au nez.

Sensation de froid avec sensation d'engourdissement autour de la bouche et au
menton. — Démangeaison cuisante qui
force à gratter aux lèvres et au menton.
— Vésicules avec prurit, élancements
aux lèvres. — Lèvres sèches, gercées.—
Réseau veineux au menton.

Cuisson dans les gencives. — Tiraillement par secousses dans les dents, et serrement douloureux. — Battement et fouillement dans les dents.

Sensation de brûlure à la langue. —
Ardeur au-dessous de la langue.

Grattement à la gorge, avec accumulation de beaucoup de salive. — Renaclement de mucosités. — Douleur vive d'excoriation dans la gorge, pendant et hors le temps de la déglutition. — Tiraillement crampoide dans la gorge, comme celui d'un étranglement. — Sensation comme si la luette était tombée.

Goût douceâtre au bout de la langue.
— Goût muqueux. — L'appétit se perd la la première bouchée. — Degoût pour le manger par tristesse. — Dégoût pour la viande. — Faim violente; on mange précipitamment et avec dédain. — Absence de soif.

Efforts inutiles d'éructation. — Rapports bruyants à vide. — Renvois d'un liquide désagréable, douceâtre, amer.

Nausées continuelles avec anxiété, tremblement et lassitude.

Pression à l'estomac après le diner. — Douleur contractive dans la région précordiale comme si elle était fortement serrée. — Pression ou coup, ou battement, élancement et pincement dans la région précordiale. — Brûlure dans la région précordiale de la gorge jusqu'au bas-ventre.

Pression obtuse dans le bas-ventre. — Rongement dans le bas-ventre. — Sensation d'étranglement dans le ventre. — Élancements dans les côtés du ventre et dans la région du nombril. — Pincements dans la région du nombril. — Accumulation de vents dans le ventre avec expulsion difficile par intervalle. — Pression dans le bas-ventre et pression en bas vers les parties génitales. — Tiraillement qui part du sacrum et va dans les aines.

Fréquente envie d'aller à la selle; les matières ne sont expulsées que par parties et avec de grands efforts. — Constipation. — Après la garde-robe sensation de faiblesse dans le bas-ventre ou horripilation universelle. — Tenesmes fréquents, fourmillants, à l'anus. — Fourmillements pruriants à l'anus, surtout le soir. — Élancements violents et obtus dans le rectum.

Brûlure et rongement au scrotum. — Sur-excitation de l'appétit vénérien chez les hommes et les femmes, avec sensibilité douloureuse des parties internes et externes.

Règles trop hâtives, trop fortes, et de trop peu de durée. — Avant les règles, dou-leurs comme celles de l'enfantement avec tranchées dans le bas-ventre. — Crampes à l'apparition des règles. — Pendant les règles, pression sur les parties génitales, avec une grande sensibilité. — Excrétion de sang épais, rouge, avec tiraillement dans les aines. — Métrorrhagie avec vive excitation de l'appétit vénérien. — Perte de sang après l'avortement. — Chez les femmes, fourmillement voluptueux dans les parties

génitales et dans le bas-ventre. — Nym-phomanie.

Fourmillement dans les narines avec envie inutile d'éternuer.—Respiration profonde, anxieuse.— Accès d'étoussement.

— Aphonie.

Toux sèche, brève.

Oppression anxieuse, et il s'élève une boufée de chaleur de la région précordiale. — Respiration courte, comme si la poitrine était serrée. — Sensation de poids sur la poitrine, avec besoin de respirer profondément; on est empêché par un sentiment de faiblesse dans la poitrine. — Douleur serrante dans la poitrine qui est faible; elle s'élève jusqu'à une certaine hauteur, pour redescendre. — Pression crampoïde dans une moitié de la poitrine. — Elancements obtus dans un côté de la poitrine pendant l'inspiration. — Pression et coup obtus dans la poitrine. — Palpitation de cœur anxieuse.

Faiblesse et sensation d'engourdissement tensif dans la nuque. — Raideur de la nuque. —Douleur de brisure dans le sacrum et le dos en se redressant ou par la pression. —Douleur de crampe au sacrum. — Sensation d'engourdissement au coccix.

Affaiblissement des bras avec tiraillements paralytiques .- Battements comme par un dépôt dans les doigts et dans les pieds.-Rongement aux bras et aux mains. - Tension dans les membres comme s'ils étaient fortement enveloppés. -- Sensation de faiblesse, tremblement et inquiétude fourmillante dans les membres, surtout dans le repos et au grand air .-Tressaillement et tiraillements dans les membres et les articulations, surtout dans la main en voulant saisir quelque chose. Sensation de raideur et d'engourdissement cà et là, quelquefois avec tremblement et palpitation de cœur. - Tétanos hystérique avec pleine connaissance (éclampsie). - Faiblesse extraordinaire.

Les douleurs sont pressives, du dehors en dedans, constringentes, parcoups émoussés. — Douleur comme par coups. — Meurtrissures surtout après une pression sur la partie douloureuse. — Les symptômes, qui commencent faiblement, s'élèvent par intervalles mesurés jusqu'à un certain point et disparaissent de la même manière. — Les symptômes, qui s'améliorent à l'air libre, s'aggravent vers le soir dans la chambre. — La plupare des symptômes augmentent dans le repos et diminuent par le mouvement. — Avant tout, les symptômes du sexe féminin trouvent dans le platine leur médicament.

Prurit fourmillant, avec titillations brûlantes, élançantes, avec douleur d'excoriation et besoin de gratter, dans différentes parties de la peau. — Ulcères aux mains et aux orteils.

Bâillements spasmodiques, convulsifs, après midi.—Grande somnolence le soir.

— Rêves anxieux de guerre et d'assassinats.—Sommeil voluptueux.—Le matin au réveil on est couché sur le dos, les mains placés derrière la tête, les pieds fléchis, et envie de se découvrir les jambes. — Le matin sommeil prolongé.

Frissonnement et horripilation générale continuelle le matin, surtout à l'air libre.

GRANDE ANGOISSE ET PEUR DE LA MORT QU'ON CROIT PROCHAINE, avec tremblement, respiration courte et battements de cœur.—Grande facilité à s'effrayer.— Grande disposition à la colère et après on reste long-temps de mauvaise humeur. -Tristesse le soir, avec envie de pleurer; cet état alterne avecune joie extravagante.-Pleurs involontaires.—On crie au secours à haute voix. - Distraction et indifférence. - Fierté orgueilleuse. - Trop GRANDE OPINION DE SOI, MÉPRIS DE TOUT, MÊME DE CE QU'ON AIME ET ESTIME LE PLUS, qui augmente dans la chambre, moins à l'air libre et au soleil. - Les symptômes de l'esprit et du corps sont alternatifs; quand les uns apparaissent, les autres s'effacent.

#### 104. PLUMBUM.

Dur. D'Act., 4 à 5 sem. — Antid: Op., plat., électr., alum., bell., dat., hyon. — Purss., X.

Vertiges en se baissant et en regardant en-haut.

La tête est lourde et entreprise, surtout au front et à l'occiput. — Congestion pressive vers la tête.

Pression comme si le globe de l'œil était trop grand, surtout quand on le fait mouvoir. — Contraction dans les paupières. — Agglutination des paupières avec vue trouble, nébuleuse. — Myopie.

Souvent diminution subite de l'ouïe. Visage pâle, jaunâtre. — La peau de la face est luisante comme si elle était huilée, quelquefois avec des picotements douloureux. — Déchirement dans la mâchoire supérieure et inférieure; le frottement les dissipe; ils reparaissent sur d'autres parties du corps.

Inflammation érysipélateuse de la face.

Petits boutons pleins de pus épais se montrant dans les angles du nez, rouges et enflammés.

Desquammation des lèvres quoti-

Gencives pâles, quelquefois gonflées.

Boutons durs et douloureux aux gencives.

Dents creuses, fétides, friables.

Odontalgie déchirante par saccade, augmentée par le froid.

Beaucoup de nucosité jaunâtre aux dents.

Aphtes et ulcères fétides dans la bouche. — Lourdeur de la langue avec la parole difficile. — Accumulation de saive douceâtre à la bouche avec séchecesse à la gorge.

Pendant l'action de manger tiraillement sans la gorge comme si l'œsophage devait se déchirer.—Sensation sans douleur d'un corps étranger dans la gorge, qui descend n avalant et remonte ensuite. — Sensation comme si quelque chose remontait par a gorge à la base du crâne.

Goût douceâtre. — Goût acide sulfureux. — Faim vive, même après avoir mangé. — Goût particulier pour le pain et les fritures. — Forte soif, surtout pour l'eau froide.

Renvois à vide avec brûlure à l'estomac. — Renvois douceâtres. — Régurgitation d'une eau acide ou douceâtre.

Renvois fréquents qui remontent jusque dans la poitrine. — Vomissement des aliments. — Vomissement de substances verdâtres ou noirâtres. — Vomissement de sang. — Vomissement de matières fécales avec coliques violentes et constipution.

Pression à l'estomac après le dîner comme par un poids ou comme quand l'estomac est surchargé. - Coliques pressives dans le bas-ventre avec une contraction crampoide. - Coliques violentes dans la région du nombril, avec dureté et ballonnement du basventre. - Coliques avec retraction du basventre de manière qu'une partie est déprimée et l'autre saillante. - Colique de miserere. - Ardeur dans le ventre avec tournoiement autour du nombril. - Sensation dans la partie supérieure du ventre comme si quelque chose s'en était détaché et tombé dans la partie inférieure. - Pincements et tranchées dans le bas-ventre avec rétraction du nombril. - Il se forme continuellement des vents qui se déplacent avec bruit. - Souffrance hypochondriaque opiniâtre dans le bas-ventre.

Constipation opiniatre. — Selles dures comme des crotles de mouton. — Envie continuelle et inutile d'aller à la selle. — Forte contraction et serrement de l'anus. — Sensibilité douloureuse et envie de laisser échapper des vents, ce qu'on ne peut faire.

Excrétion d'urine diminuée, supprimée.

Gonflement inflammatoire des parties génitales.

Voix âpre, enrouée. — Beaucoup de mucosités épaisses dans la trachée artère et les narines postérieures. — Expectoration d'une mucosité transparente ou

Plumbum.

— Mécontentement de son sort. — Dé-

jaune verdâtre, - Difficulté anxieuse de respirer; on est obligé, la nuit, de sortir du lit et de chercher le grand air.

Toux avec crachat de sang.

Oppression subite de la poitrine, qui se répète par intervalle. — Pression sur la poitrine surtout en respirant profondément et en riant. — Bouillonnement dans la poitrine avec anxiété autour du cœur et palpitations du cœur sensibles.

Déchirements dans le dos et les membres, qui, par le frottement, passent sur les autres parties. — Douleur de raideur dans les membres inférieurs en montant un escalier. — Contraction crampoïde dans le talon pendant le repos, qui diminue pendant le mouvement.

Tiraillements et déchirements dans les membres. — Brûlure sur différentes parties du corps. — Douleurs ostéocopes violentes par secousses et avec fourmillement. — Les douleurs dans les membres sont plus fortes la nuit. — Les effets médicamenteux se développent très lentement, disparaissent pendant quelque temps et reviennent.

Couleur jaune de la peau ou bleuâtre.

— Ictère.

Faiblesse et lassitude dans le pied, surtout sensible quand on est assis. — Grande faiblesse et lassitude après le mouvement; on est obligé de se coucher; on sent le battement des artères dans tout le corps et les membres éprouvent un léger tremblement. — Paralysie des membres. — Tremblement crampoïde. — Tressaillement des membres. — Convulsions. — Grampes épileptiques suivies de paralysie. — Grande maigreur des parties paralysées qui se gonfient. — Grande susceptibilité à l'air d'un lieu où il y a beaucoup de monde; on craint de s'évanouir.

On s'endort tard.

Prédominence du froid, surtout aux membres.

Peur et grande anxiété. — Ennui et peu de disposition à causer et à travailler.

## 105. PRUNUS SPINOSA.

goût de la vic.

Puiss., oo.

Malaise continuel avec dégoût pour tous les aliments (et diarrhée).—Anasarque universel.

#### 106. PULSATILLA.

Dur. D'Act., 3 ou 4 sem. dans les maladies chron. — Antio.: Cham., coff., ign., nux. — Purss., IV.

Vertiges comme par ivresse, avec chaleur intérieure et pâleur de la face surtout le soir ou après avoir mangé. — Vertige en levant les yeux. — Vertige étant assis. — Vertige avec envie de vomir.

Pesanteur de la tête qui force à se coucher; on ne peut supporter la lumière. —Vide dans la tête avec indifférence pour ce qui se passe. — Abondance d'idées qui varient. — Précipitation. — Inadvertance avec impossibilité de trouver l'expression juste, et en écrivant on oublie des lettres. — Affaissement par le travait de l'esprit.

Céphalalgie déchirante qui augmente le soir et qui dure toute la nuit. — Élancements térébrants dans les pariétaux avec obscurcissement de la vue. — Bruissement dans l'oreille et vertige. — Céphalalgie battante, élançante, le matir après le réveil et le soir après le coucher. — Céphalalgie qui paraît partir de la nuque qui semble se contracter; — Céphalalgie battante en se baissant, ou par les efforts de l'esprit. — Déchirement élançants par secousse dans les tempes. — Hémicranie élançante. — Crépitation dans la tête en marchant. — Céphalalgie comme après une ivresse et des veilles.

Douleur tiraillante dans le cuir chevelu en

rebroussant les cheveux. — Démangeaison sur le cuir chevelu.

Obscurcissement de la vue quelquefois avec vertige et envie de vomir. — Cercles de feu devant les yeux. — Diplopie. — Obscurcissement de la vue comme s'il y avait quelque chose sur la cornée qu'on peut enlever. — Myopie. — Orgelet aux paupières. — Ophtalmie douloureuse avec agglutination des paupières. — Inflammation des glandes de Meibomias. — Inflammation rhumatismale et scrofuleuse. — Elancements dans les yeux avec photophobie. — Térébration sécante dans les yeux. — Amaurose commençante. — Cataracte commençante. — Opacité de la cornée.

Assourdissement comme si les oreilles étaient obstruées. — Difficulté d'oute après la répercussion d'une miliaire. — Douleur de serrement, de déchirement, de tressaillement à l'oreille. — Douleur dans les oreilles comme si quelque chose voulait en sortir. — Inflammation des oreilles, chaleur et rougeur de l'oreille extérieure. — Inflammation érysipélateuse du conduit auditif et de l'oreille extérieure. — Écoutement de pus par les oreilles. — Eruption brûlante avec démangeaison au tragus (avec gonflement des glandes du cou).

Horripilation sur un des côtés de la face. — Visage pâle. — Tension à la face comme si elle allait se tuméfier. — Sensibilité comme de douleur d'excoriation au toucher.

Enflure des ailes du nez.—Épistaxis.— On mouche du sang.— Odeur dans les narines comme d'un vieux rhume de cerveau.

Gonflement sensible dans la lèvre inférieure avec cuisson.

Odontalgie tiraillante, tressaillante, comme si les ners étaient tendus et vibrant avec de petits élancements dans les gencives.—Odontalgie fouillante qui vient par accès et augmente le soir et la nuit.—Odontalgie avec frisson et pâleur de la face. — Odontalgie qui est produite en

se curant les dents, aggravée par la chateur de l'appartement et par la chateur du tit, et diminuée par l'air frais —Odontalgie qui se renouvelle à chaque repas et paraît toujours quand on porte quelque chose de chaud à la houche. — Douleur d'excoriation aux gencives.

La langue est enduite de mucus épais.
— Sensation sur la langue comme si elle était brûlée et insensible. — Odeur putride désagréable de la bouche le matin et la nuit. — Salivation avec envie de vomir.

Elancements douloureux à la gorge avec pression et tension en avalant. — Dou-leur vive d'exceriation à la gorge pendant et hors le temps de la déglutition. — Sécheresse et mucus épais à la gorge et dans la bouche, le matin et après minuit. — Douleur à la gorge en avalant comme s'il y avait un gonflement intérieur.

Goût dia bouche comme celui de la viande putréssée, avec envie de vomir. — Goût de pus à la bouche le matin. — Le matin goût empyreumatique. — Goût imaginaire. — Goût douceâtre de la salive et de la bière. — Goût amer en buvant, en mangeant, surtout du pain, ou après la déglutition des aliments et des boissons. — Dégoût pour le pain, le lait et le beurre. — Dégoût et nausée pour la sumée du tabac. — Diminution du goût pour tous les aliments. — Faim avec désir pour les aliments sans savoir lequel. — Défaut de soif.

Renvois amers et acides. — Les renvois ont l'odeur et le goût des aliments ingérés. — Dérangement de l'estomac par les aliments trop gras. — Hoquet en fumant du tabac. — Refroidissement de l'estomac par la glace, par les fruits, etc.

Envie de vomir le soir après avoir mangé ou bu. — Vomissement des aliments ingérés, surtout le soir ou la nuit. — Vomissement chronique des aliments après le repas. — Vomissement suivi d'amertume à la bouche — (Émoussements des dents.)

Douleur de crampe à l'estomac qui finit

par le vomissement. — Pression dans la région précordiale après avoir mangé et vomissement des aliments ingérés quelques heures après le repas. — Douleur dans la région précordiale et dans les hypochondres chez les femmes enceintes. — Élancements dans la région précordiale, en faisant un faux pas. — Battements sensibles à la main, comme une pulsation des artères dans la région précordiale.

Tension dans le bas-ventre comme s'il était plein et dur, avec gonflement dur.

— Coliques de vents avec mouvement douloureux et bruit dans le ventre surtout après
avoir mangé le soir. — Tranchées le soir. —
Tranchées avec diarrhée. — Coliques de
vents pressives après minuit. — Expulsion
de vents avec tranchées. — Mal de ventre
chez les femmes enceintes comme celles de
l'enfantement. — Grampes du bas-ventre
chez les femmes enceintes. — Grande sensibilité des téguments du ventre.

Selle disticile avec efforts douloureux et douleur au dos. — Envie d'aller à la selle fréquemment, avec sortie seulement de mucosité jaunâtre mêlée de sang, quelquesois précédée de tranchée. — Excrétion de mucosité jaunâtre diarrhéique, bilieuse, la nuit, précédée de mouvement dans les entrailles. — Diarrhée aqueuse la nuit. — Selles blanches. — Selle muqueuse, àcre, qui cause du prurit. — Boutons hémorrhoidaux avec cuisson et douleur d'écorchure.

Pression sur la vessie. — Envie d'uriner avec tiraillements dans le bas-ventre chez les femmes enceintes. — Retention d'urine. — Urine involontaire, même la nuit. — Pissement au lit. — Urine aqueuse sans couleur. — Urine d'une rouge-brun. — Urine avec un sédiment rouge briqueté. — Pissement de sang avec brûlure à l'orifice de l'urètre.

Instammations des testicules après avoir supprimé une blénorrhée. — Gonstement des testicules, pressif, douloureux, avec forte rougeur et gonstement au scrotum. — Douleur déchirante, tiraitlante, dans le

cordon spermatique, jusque dans le testicule. — Hydrocèle. — Ecoulement blénorrhoique par l'urètre. — Grande excitation de l'appétit rénérien avec fort désir du coil et de fréquentes érections. — Pollutions.

Règles retardées: - Suppression des règles, Difficulté qu'ont les premières regles à paraître. - Règles trop tôt. Crampes du bas-ventre pendant les règles. - Crampes du bas-ventre et autres symptômes après des règles supprimées ou retardées. - Métrorrhagie avec écoulement de sang coagulé, toût à coup supprimée et qui revient ensuite plus forte. - Écoulement de sang de l'utérus avec de fausses douleurs d'enfantement. -Douleurs d'enfantement fausses ou très faibles. - Douleurs trop fortes ou qui durent trop long-temps pour l'expulsion des lochies. - Violentes douleurs au sacrum avec de fausses douleurs d'enfantement. - Leucorrhée âcre, brûlante. - Leucorrhée épaisse.

Obturation du nez avec mouchement de mucus épais, jaune. — Goriza chronique avec écoulement d'une matière jaunâtre, verdâtre et fétide. — Coriza avec perte de l'odorat et du goût. — Raucité et enrouement tels qu'on ne peut dire un mot à haute voix. — Respiration courte après le dîner. — Accès de suffocation la nuit. — Gêne de la respiration et battement du cœur étant couché sur le côté gauche.

Toux seche, nocturne, comme si l'estomac se soulevait pour vomir. — Toux ébranlante le matin, avec étranglement e envie de vomir. — Toux avec expectoration copieuse d'un mucus jaune d'un goût amer — Toux avec crachats verdêtres et sangui nolents. — Toux de consomption.

Oppression le soir comme si la poitrine était trop pleine ou comme si la traché était étranglée. — Oppression anxieus crampoide après le repas du soir et pendan la nuit, avec serrement de la gorge dan la position horizontale. — Asthme produit par la vapeur du soufre. — Tiraille ment tensif dans la poitrine en respirant

La Tension crampoïde contractive dans la poitrine avec fermentation du sang et chaleur intérieure. — Douleur d'ulcération dans la poitrine. — La nuit, congestion vers la poitrine et le cœur, avec rêves anxieux. — Palpitations du cœur avec anxiété et manque de respiration étant couché sur le côté gauche. — Accès de palpitations avec obscurcissement de la vue. — Maladies chroniques du cœur. — Pesanteur, pression et ardeur au cœur. — Gonflement tensif des mamelles comme par une turgescence laiteuse.

Courbure de la partie supérieure de la colonne dorsale (bosse). — Douleur au sacrum. — Raideur douloureuse dans le dos et le sacrum comme quand on est resté long-temps courbé. — Tiraillement et tension rhumatismale dans la nuque et dans les lombes, avec difficulté de se mouvoir. — Gonflement à la nuque, douloureux au toucher comme par un dépôt.

Lourdeur pesante dans le bras, de l'aisselle jusqu'aux doigts, avec engourdissement de la main, de sorte qu'on ne peut rien tenir. — Sensation de pesanteur et de raideur dans l'articulation des épaules en levant le bras. — Le soir, ardeur dans le bras, avec sensation d'engourdissement dans les doigts. — Raideur dans l'articulation de la main. — Tiraillements noclurnes dans les bras. — Tiraillements dans les doigts. — (Panaris.) — Les veines tont gonflées à l'avant-bras et aux mains.

Grande lourdeur et lassitude dans les ambes avec tremblement, surtout dans le genou. — Lourdeur tiraillante dans le pied. — Faiblesse dans le pied qui ne vermet presque pas de marcher. — Gonlement inflammatoire du genou, avec douveur fugitive élançante. — Gonflement des ieds et surtout du dos. — Gonflement es pieds le soir. — Gonflement rouge, haud, des pieds, des jambes, après la suppression d'une sièvre intermittente par le puinine. — Gonflement rouge, brûlant u dos du pied et du talon, avec douleur

elançante au toucher et par le mouvement.

— Douleur aux muscles de la fesse, des jambes et des talons, comme par une suppuration profonde.

Douleur déchirante tressaillante dans les membres. - Tension dans les tendons des fléchisseurs du bras, des articulations des doigts, des jarrets et des mollets. - Tiraillements tressaillants dans les muscles. -DOULEUR OUI PASSE PROMPTEMENT D'UNE PAR-TIE A L'AUTRE, AVEC CONFLEMENT DES PAR-TIES MALADES. - Douleurs rhumatismales qui s'améliorent à l'air libre, mais en entrant dans un lieu chaud et dans le lit elles s'aggravent. - Tiraillements et picotements dans les articulations, avec douleur de brisure au toucher. - Arthrite aiguë des articulations. - Suites fâcheuses des eaux de Carlsbad et d'Égra. -Suites fâcheuses d'abus de soufre et de sulfate de quinine. - LES DOULEURS SONT ACCOMPA-GNÉES DE FROID OU DE FRISSON. - Douleur comme par un ulcère intérieur. — Douleur d'excoriation en saisissant les parties malades. - MANQUE DE SOIF PENDANT LES SOUF-FRANCES. — Des symptômes étrangers à la poitrine sont cependant accompagnés d'oppression. - Les symptômes ne paraissent QUE D'UN SEUL CÔTÉ DU CORPS.

Les symptômes diminuent ou passent au grand air, de même par une pression exterieure et se renouvellent étant assis et dans le repos. - Le contraire a rarement lieu. -Les symptômes qui se sont montrés étant couché sur le dos diminuent quand on se met sur son séant. Les symptômes qui poraissent quand on est assis se dissipent par la marche et le mouvement; le contraire a rarement lieu. - Les symptômes augmentent quand on se lève après avoir été longtemps assis, ou augmentation des symptômes en s'asseyant après un mouvement prolongé. - La position sur le côté produit ou augmente les symptômes.-La position sur le dos les diminue. -(Quelquefois les symptômes qui ont paru étant couché sur le dos s'effacent en se conchant sur le côté malade ). - Vers

150

Picotements et prurit à la peau. -- Miliaire. — Varioloide. — Les ulcères saignent très facilement. - Douleurs élancantes. - Prurit dans les ulcères. - Démangeaison brûlante autour des ulcères, avec rougeur luisante.-Fréquente rougeur, même des parties malades.- Varices .- Gonflement des veines .- Les doigts et les orteils sont enflammes, ont des engelures et un prurit violent.

Battements fréquents, désagréables, des artères dans tout le corps, sensible surtout au toucher. - Tremblement fréquent, anxieux, dans tous les membres. -Malaise et agitation qui ne laissent ni reposer ni dormir, avec envie continuelle d'étendre les membres.-Lourdeur paralytique et lassitude dans tous les membres, avec douleur des articulations comme au début d'une fièvre intermittente.

On s'endort tard Le soir, à cause du bouillonnement du sang. - Congestion vers la tête et grand afflux d'idées. - Tressaillement général ou isolement des membres en s'endormant. - Sommeil agité avec des rêves effrayants et soubresauts. - On est couché sur le dos pendant le sommeil, avec les pieds courbés, les mains au-dessus de la tête ou les bras croisés sur le ventre. -- Anxiété au réveil comme si on avait commis un crime. - Envie continuelle de dormir.

Fièvre avec prédominence du froid et absence de soif. - Sensation de chaleur intérieure, sans chaleur au dehors et sans soif. -Soif avant ou après le froid, pendant la chaleur.-Sueur sur une moitié du corps. - Fievre puerpérale. - Fièvre typhoïde .- Rechute d'une fièvre intermittente supprimée par le quinine.

CARACTÈRE TIMIDE, PLEUREUR, DISPOSÉ AU CHAGRIN, DOUX, FACILE. TEMPÉRAMENT FLEGMATIQUE. - Anxiété et agitation avec crainte de la mort. - Anxieté, surtout dans la région précordiale; elle entraîne jusqu'au suicide, avec palpitation de cœur et tremblement .- Soucis des affaires domestiques: - Indécision. - Humeur hypochondriaque. - Misanthropie. - Découragement. -Défiance. - Affections morales des femmes enceintes et en couches.

## 107. RANUNUCLUS BULBOSUS.

Dun. D'ACT., plus. sem. - ANTID. : Incon. Puiss., III, IV.

Vertige tournoyant à tomber en sortant de la chambre à l'air libre.

Difficulté à penser .- Perté de la pensée. - Hébétude.

Sensation de gonflement de toute la têtes - Congestion sanguine d la tête. - Douleur pressive comme pour éclater, au front et au vertex. - Déchirement et pression dans les tempes. - Battement subit à l'occiput. - Céphalalgie semi-latérale au-dessus de l'œil droit, avec abattement moral et disposition à pleurer. Céphalalgie par changement de température, du chaud au froid, et vice versâ.

Fourmillement douloureux sur le cuit chevelum after inflational archive

Démangeaison et douleur d'écorchur dans les angles des yeux. - Douleur pressive dans les globes des yeux .- Inflamma tion et larmoiement des yeux. In heist

Elancements dans les oreilles.

Rougeur et chaleur à la face. - Dou leur crampoïde (frémissante) à la face. Crampes des lèvres. Antes l'oblancele

Douleur brûlante inflammatoire à l gorge. - Douleur brûlante au palais. Sécrétion de mucus épais à la gorge. - Sa livation. - Salive blanche cui a un gou de cuivre. - Sensation crampoide qu remonte dans le pharynx et l'œsophage

Gout amer empyreumatique pendar ou après avoir mangé des aliments sec --- Goût douceâtre. --- Après midi so augmentée, a mineral a surprise

Rapports sanglotants. - Hoquet cran poide.

Nausée avec mal de tête après midi.

Pression ardente comme avec excoriation tans la région précordiale, comme dans le cardia, plus fort au toucher.

Douleur de brisure dans les hypochondres sans toucher ou par le toucher. — Douleur pinçante, fouillante, comme de coliques dans les entrailles, avec la sensation, par la pression extérieure, comme si tout était ulcéré à l'intérieur. — Affections du foie avec elancements dans le côté droit de la poitrine. — Sensation d'écorchure brûlante dans le bas-ventre, comme celle d'une inflammation lente des intestins.

Selles fréquentes, abondantes.

Leucorrhée acre, rongeante.

Obturation du nez. — Fourmillement dans le nez. — Nez gonflé plein de croûtes.

Oppression de poitrine comme après un chagrin, avec envie de respirer profondément et beaucoup de pleurs. - Douleur pressive à la poitrine. - Douleur à la poitrine comme si elle était ulcérée, ou comme celle du rhumatisme. - Douleurs élançantes d la poitrine. - Pression brûlante sur la poitripe. - Élancements au côte droit de la poitrine, qui se propagent vers le foie. Douleur à l'extérieur de la partie inférieure de la poitrine et dans la région précordiale. - Douleur des parties extérieures de la poitrine, des muscles intercostaux, de la plèvre, qui se montrent et s'aggravent surtout par le mouvement et par le toucher, et quand le corps est étendu. -(Adhérence de la plèvre.) ac instintarió

Douleur de brisure rhumatismale entre les omoplates et dans le tronc.

Douleur crampoïde, déchirante, élancante et tressaillante dans les bras. — Froid des mains. — Prurit des mains et des doigts. — Fourmillement dans les doigts. — Dartres, vésicules et ulcères aux doigts. — Dartres dans la paume des mains.

Douleur tiraillante dans les cuisses de haut en has. — Douleur térébrante, serrante et pruriante au milieu de la cuisse. — Craquement dans l'articulation du genou. — Douleur de raideur dans les articulations du pied (pendant un vertige). — Serrement de crampe sur le dos du pied. — Douleur d'excoriation et élancement dans les orteils. — Élancement pulsatif au calcanéum.

Élancements dans différentes parties du corps, qui finissent avec prurit. — Prurit fréquent et qui dure long-temps dans différentes parties de la peau. — Lassitude et courbature du corps. — Faiblesse subite vertigineuse à s'évanouir. — Tressaillements isolés dans les muscles. — Tremblement des membres, même après un léger chagrin. — Secousses fréquentes à travers tout le corps.

Beaucoup de symptômes paraissent en changeant de température, par exemple de la chambre au grand air et vice versâ. — La plupart des symptômes paraissent le matin et le soir. — Le toucher, le mouvement ou le changement de position produisent surtout des douleurs sur les parties extérieures du tronc, de la poitrine et des membres. — Plusieurs symptômes s'accompagnent quelquefois d'horripilation.

Somnolence pendant le jour. — Agitation la nuit et insomnie, quelquesois par oppression de la poitrine ou congestion vers cette cavité, mais le plus souvent sans cause. — On s'endort tard. — On se réveille fréquemment et on a de la peine à se rendormir. — On se réveille de bonne heure le matin. — Sueur nocturne. — Impossibilité de se coucher sur le côté. — On rêve de périls.

Accès de fièvre qui consiste surtout dans le froid après le dîner ou le soir, avec mal de ventre ou autres symptômes, ou chaleur dans la tête avec mains froides.

Irritabilité chagrine, colérique, avant midi; le soir pusillanimité avec anxiété.

#### 108. RATANHIA.

DUR. D'ACT., quelq. sem. - ANTID.: Incon. Puiss., X.

Cephalalgie frontale comme si la tête devait éclater et comme si le cerveau voulait sortir, quand on est assis, courbé et quand on fait effort pour aller à la selle.

- Céphalalgie tressaillante déchirante.

- Chaleur et lourdeur dans toute la tête. - Congestion sanguine d la tête.

Le soir brûlure et contraction dans les yeux, avec ophtalmie et la sensation comme s'il se formait une pellicule devant l'œil. - Myopie.

Tintement d'oreilles la nuit.

Narines enflammées, croûteuses.

Déchirement dans les dents et les os de la face. - Le soir et la nuit creusement et battement dans les dents, augmenté par le manger. - Par la succion il s'échappe du sang acide des gencives.

Contraction crampoide dans la gorge qui empêche de proférer un mot à haute

Fort hoquet qui cause une douleur à l'estomac. - Défaut d'appétit avec nausée pour tous les aliments et les boissons.

Fort ballonnement de l'estomac. Douleur de resserrement de l'estomac qui cesse quelquefois à la suite d'un renvoi.

Élancements douloureux dans la partie supérieure du ventre, dans la région prêcordiale, quelquefois si forts qu'ils arrachent des cris.

Selles compactes, dures, après de grands efforts. - Efforts inutiles pour aller à la selle avec pression douloureuse dans le sacrum. - Selle molle, liquide, après des tranchées préalables, et avec brûlure à l'anus avant et après. — Diarrhée sanguinolente. - Après la garde-robe, douleur à la tête comme si elle devait éclater.

Ratanhia. Fréquente envie d'uriner avec exerétion diminuée.

Les règles viennent trop tôt et trop fort. Règles de trop longue durée. - Metrorrhagie. - Leucorrhée avec une pression vers en-bas comme quand les règles veulent paraître.

Coriza sec. Properties to the sections

Toux sèche avec douleur d'ulcération dans la poitrine.

Oppression et gêne de la respiration. - Constriction de la poitrine des deux côtés. - Élancements dans la poitrine avec gêne de la respiration en montant l'escalier. — Congestion vers la poitrine avec chaleur et respiration difficile.

Déchirements dans le dos avec pesanteur de la tête. - Tension tiraillante de la nuque, le long de la colonne vertébrale, comme dans la moelle épinière.

Déchirements dans les membres. Contraction comme par une corde dans les fléchisseurs des membres.

Tressaillements dans différentes parties du corps. — Douleur d'excoriation picotante. - Hémorrhagies par diffé-RENTES PARTIES DU CORPS.

On s'endort tard, on se réveille fréquemment et on est long-temps à pouvoir se rendormir. - Réveil avec tremblement, anxiété et pleurs. - Malaise nocturne, étranglement et vomissement des aliments ingérés le soir.

Prédominence de frissonnement et d'horripilation. Atsolit de la la comme

Humeur chagrine; on cherche les querelles.

#### 109. RHEUM.

DUR. D'ACT., quelq. jours .- ANTID.: Incon. Puiss., II, III.

Vertige avec obnubilation frontale étant debout. Il ob anidadurs un

Embarras de la tête comme après l'ivresse. - Céphalalgie assourdissante avec aeum.

anxiété comme si on avait commis quelque crime. — Battements et palpitations à la tête qui montent du bas-ventre. — Pesanteur et chaleur à la tête avec déchirement. — Engourdissement de la tête avec gonflement des yeux.

Faiblesse de la vue avec pression douloureuse comme par la lassitude qu'on éprouve en fixant long-temps le même objet. — Battements dans les yeux.

Battements dans les oreilles. — Bruissement dans les oreilles avec diminution de l'ouïe et sensation comme du relâchement du tympan.

Tension dans la peau de la face.—Disposition à se rider la peau du front.

Sensation de froid dans les dents avec accumulation de salive à la bouche. — Souffrance pendant la dentition des enfants.

Perte du goût et de la sensibilité de la langue. — Goût amer des aliments, même des aliments doux. — Dégoût pour les aliments gras, muqueux, et cependant appétit pour différentes choses; il passe à la première bouchée.

Malaise avec mal de ventre.

Plénitude et pression à l'estomac comme s'il contenait trop d'aliments.

Tranchées quelquesois de suite après le dîner; on est forcé à se courber en avant; elles sont plus fortes étant debout. — Ventre ballonné, tendu. — Les vents paraissent monter vers la poitrine et y produire une pression et une tension.

SELLES TÉNUES SOUS FORME DE BOUILLIE FÉTIDE, AVEC TRANCHÉES APRÈS DE FRÉQUENTS EFFORTS, SUIVIES D'EFFORTS INUTILES RENOUVELÉS AVEC PINCEMENTS DANS LE VENTRE. — Selles de consistance de bouillie, d'odeur acide, avec horripitation pendant l'évacuation, suivies de tenesmes et de pincements spasmodiques dans les intestins. — Diarrhée muqueuse grisâtre. — Diarrhée des femmes en couches.

Augmentation d'urine. — Urine de couleur rougeatre ou d'un jaune vert. — Ardeur en urinant, même dans la vessie et dans les reins. — Faiblesse de la vessie; on est contraint de faire des efforts pour expulser toute l'urine.

Oppression en respirant profondément comme si un poids sur la poitrine empêchait sa dilatation.

Raideur dans le sacrum et dans les hanches qui rend la marche difficile.

Bruit dans l'articulation du coude et du genou. — Douleur dans les articulations pendant le mouvement. — Engourdissement des membres sur lesquels on est couché. — Lassitude et pesanteur dans le corps comme si on sortait d'un sommeil profond.

Inspiration ronflante pendant le sommeil.—Sommeil agité avec gémissements, cris et jactation, ou avec tiraillements convulsifs dans les doigts, dans les paupières et dans les muscles de la face, surtout chez les enfants.

Horripilation sans froid extérieur. — Alternativement froid et chaleur, avec anxiété; dégoût et aversion pour tout. — Chaleur aux mains, aux pieds, avec le visage frais. — Sueur froide à la face, surtout autour de la bouche et du nez. — Facilité à suer au front et au cuir chevelu, produite par des efforts légers.

Indifférence, paresse et éloignement pour la conversation. — Caractère chagrin, pleureur; violent désir pour différentes choses tantôt l'une, tantôt l'autre.

# 110. RHODODENDRON CHRISANTHUM.

Dur. D'Act., 6 sem. — Antid.: Rhs., camph., clem.
—Puiss., IV, X.

Vertiges avec anxiété.—Vertiges tournoyants étant au lit, comme si la tête tombait en arrière.

Perte subite de la mémoire. — Grand oubli. — Ivresse. — Embarras de la tête avec somnolence après le lever.

Pression tiraillante dans la partie antérieure de la tête et dans les tempes, surtout 1 Anococcutation curistitutum. 1thousacturon curistitum.

dans les os. L'elancements à la partie antérieure et aux parties latérales de la tête. L'elancements au front Déchirements dans les os de la tête. Battement dans la tête. Le vin et la température humide produisent et augmentent les douleurs de la tête.

Le cuir chevelu est douloureux au toucher, comme s'il y avait de la suppuration au-dessous.—Douleur comme un coup à l'occiput. — Démangeaison rongeante le soir au cuir chevelu. — Boutons suppurants, douloureux, au front.

Cuisson sèche, périodique, dans les yeux, surtout à la clarté du jour et en regardant fixement.—Pression dans les yeux, d'un seul côté.—Frémissement tressaillant des paupières. — Dilatation d'une pupille et contraction de l'autre.—Obscurcissement de la vue en lisant et en écrivant.—Agglutination des paupières. — Élancements pressifs au bord de l'orbite, avec contraction spasmodique des paupières.

Serrement tressaillant, déchirant, dans l'oreille. — Déchirement et térébration dans l'oreille et près de l'oreille. — Sensation comme d'un ver dans l'oreille. — Bruit continuel dans l'oreille, augmenté par la déglutition.

Horripilations qui parcourent la face.

Lèvres sèches brûlantes. — Vésicules avec cuisson en mangeant, à la lèvre inférieure.

Épistaxis. - Diminution de l'odorat.

Prurit aux gencives. — Gonflement et douleur d'excoriation entre les gencives de la mâchoire inférieure et les joues. — Tiraillement déchirant dans les dents, pendant un fort orage et une température froide, augmenté par le toucher. — Odontalgie la nuit, avec étreinte de l'oreille.

Sécheresse au palais avec heaucoup de salive à la bouche. — Vésicules avec prurit au-dessous de la langue.

Constriction et ardeur dans la gorge.—Grattement dans la gorge, comme par de la mucosité.

Goût diminué - Insipidité des ali-

ments.— Satiété prompte, suivie de malaise quoiqu'on ait bon appétit, Soif augmentée.

Malaise avec envie de vomir et pression à l'estomac et dans la région précordiale, avec aigreur, soulagée par le renvoi.

Pression à l'estomac la nuit ou par la boisson d'eau froide. — Pression contractive dans la région précordiale, avec gêne de la respiration. —Élancements pressifs dans la région précordiale et les hypochondres.

Élancements dans la rate en marchant vite. — Tension dans la région de la rate après s'être baissé. — Douleur de crampe dans les hypochondres. — Déplacements de vents douloureux, dans les hypochondres et dans le sacrum. — Sensation de plénitude qui gêne la respiration, avec gonflement de l'épigastre, le matin et le soir. — Borborygmes et bruit dans le ventre, avec rapport et sortie de vents fétides.

Besoin d'aller à la selle, selle retardée.— Excrétion dissicle de selles molles, quelquefois aussi de consistance naturelle. — Évacuation muqueuse. — Selle de consistance de bouillie. — Diarrhée après l'usage du fruit ou par l'effet de l'humidité. — Battement à l'anus, tiraillements du rectum aux parties génitales.

Fréquente envie d'uriner avec tiraillements dans la région de la vessie et dans l'aine. — Urine accrue, fétide.

Douleur d'excoriation entre les parties génitales et aux cuisses. — Défaut d'érection et dégoût pour le coît. — Battements et élancements au gland. — Les testicules sont gonflés et tirés en-haut. — Élancements dans les testicules, jusqu'à l'anus. — Dour leur de meurtrissure et de tiraillement dans les testicules, qui se propage jusque dans le ventre et dans les cuisses. — Prurit, sueur et corrugation au scrotum.

Règles trop tôt et trop fortes. — Suppression des règles.

Obturation d'une narine le matin. — Coriza fluent avec obturation d'une narine et diminution du goût et de l'odorat.—Symptômes du catarrhe.—Augmentation de sécrétion du mucus nasal augrand air.

Toux avec grattement et crachats peu abondants. — Toux sèche, satigante, avec oppression, apreté à la gorge, surtout la nuit et le matin.

Oppression constrictive.—Douleur pressive de la poitrine avec gêne de la respiration. — Ondulations (chaudes) dans la poitrine et au cœur.—Congestion vers la poitrine. — Douleur extérieure de brisure à la poitrine.

Tiraillement rhumatismal et tension dans les muscles du cou et de la nuque.—Raideur de la nuque.—Déchirement rhumatismal dans les omoplates et dans le dos.—Douleur de foulure et de brisement dans le sacrum, surtout dans le dos.

Douleur tiraillante dans le bras quand la température est âpre. — Faiblesse four-millante et lourdeur dans le bras jusqu'à la pointe des doigts dans le repos. — Sensation d'engourdissement dans le bras. — Chaleur des mains augmentée.

Sensation de froid et de corrugation de la peau dans différentes parties des jambes.

— Gonflement œdémateux des jambes et des pieds. — Sueur des jambes. — Grand froid aux pieds. — Corsavec élancements douloureux.

Tiraillements et déchirements arthritiques et rhumatismaux violents dans les membres, surtout comme sur le périoste des avantbras, des mains, des jambes et des pieds, plus forts dans le repos. — Agitation et fourmillement dans les membres. — Rougeur, gonflement et tiraillements fouillants dans les articulations. — Douleur de foulure dans les articulations des hanches, des genoux et des mains. — Nodosités arthritiques. — Faiblesse et sensation de raideur paralytique dans les membres. — Grand affaissement et courbature par les moindres efforts.

Les symptômes sont rémittents et d des intervalles plus ou moins longs, et apparaissent surtout le matin. — La tempéra-

ture humide et froide, l'approche d'un orage augmentent les symptômes. — Les symptômes augmentent surtout dans le repos.

Grande somnolence pendant la journée avec cuisson dans les yeux. — Avant minuit on dort profondément après s'être endormi de très bonne heure le soir. — Insomnie après minuit. — Vers le matin le sommeil est troublé par la douleur et l'agitation.

Froid et chaleur alternatifs. — Chateur augmentée, surtout dans les mains. — Fièvre le soir avec chaleur à la face, froid aux pieds. — Brûlure aux yeux et dans le nez. — Douleur de courbature et absence de soif, suivie de chaleur nocturne et insomnié. — Sueur avec prurit et fourmillement à la peau; la sueur a une odeur aromatique.

Caractère morose, sombre. — Indifférence au plus haut degré avec aversion pour tout travail.

## 111. RHUS TOXICODENDRON.

Dur, D'Act., 6 à 8 sem. dans les mal. chron.—Antid.: Bryo., camph., coff., sulph.—Puiss., IV, X.

Vertiges comme d'ivresse à tomber en avant ou en arrière en sortant du lit. —
Titubation en marchant, sans vertige. —
Vertige en se couchant avec peur comme si on devait mourir.

Perte des sens. — Oubli. — Faiblesse de la mémoire. 17 form a formant et de

Embarras de la tête avec engourdissement.—Fourmillement douloureux dans la tête.—Pesanteur pressive à la tête.—A chaque pas il semble que te cerveau ballotte. —Céphalalgie battante, ardente.—Pulsation sensible des artères derrière les oreilles.—Congestion vers la tête.— Céphalalgie de suite après le dîner.— Céphalalgie par la boisson de la bière.

Contraction du cuir chevelu comme si on était tiré par les cheveux. — Endolorissement du cuir chevelu (comme s'il suppurait) au toucher et en rebroussant les cheveux. — Teigne humide. — Teigne avec croûtes épaisses qui ronge et détruit les cheveux, avec sécrétion d'un pus verdâtre et prurit violent pendant la nuit. — Teigne périodique; elle revient chaque année. — Dartre sèche du cuir chevelu.

Pression dans les yeux. — Yeux rouges larmoyants qui se collent la nuit. — Les yeux sont larmoyants, continuellement pleins d'eau. — Démangeaison dans les yeux, dans les paupières. — Ophtalmie. — Gonflement ædémateux de l'æil et des parties environnantes. — Raideur des paupières. — Amaurose.

Parotidites.

Visage pâle, maladif, hâve; yeux cernés, nez pointu, figure contractée irrégulièrement. — Desquammation de la peau de la face. — Gonflement de la face rouge luisant, avec élancements et tension pressive et fourmillement brûlant, et beaucoup de vésicules pleines d'un liquide jaune (érysipèle vésiculeux). — Éruption chronique sanieuse à la face. — Eruption dartreuse, croûteuse, autour du nez et de la bouche, avec tressaillement pruriant et brûlure. — Gonflement de la face et de la tête. — Pression brûlante dans les joues avec chaleur et âpreté.

Epistaxis, la nuit aussi et en se baissant, et en renaclant. — La pointe du nez est rouge, douloureuse au toucher, comme si elle devait suppurer.

Douleur de crampe dans l'articulation de la mâchoire, avec craquement pendant le mouvement. — Gonslement douloureux des glandes sous-maxillaires. — Éruption brûlante de boutons aux lèvres et autour du menton.

Odontalgie rhumatismale, arthritique, avec douleur d'écorchure. — Odontalgie fourmillante. — Odontalgie déchirante. — Odontalgie diminuée par la chaleur. — Exhalation fétide des dents creuses. — Ebranlement des dents.

Accumulation de beaucoup de salive dans la bouche, qui coule même pendant le sommeil. — Accumulation de salive salée au pharynx. — Sensation de sécheresse à la bouche, que la boisson ne dissipe pas. — La soif est grande.

Mal de gorge comme par un gonfiement intérieur, avec élancements douloureux et pression en avalant.

Goût putride à la bouche, surtout le matin et après le dîner. — Goût cuivreux. — Goût âcre, acide, amer. — Inappétence complète avec aversion pour tout aliment. — Aversion pour la viande. — Goût amer du pain (et des acides). — Manque d'appétit produit par une sensation de plénitude et de satiété. — Pen-

Renvois violents avec fourmillements dans l'estomac quand on se redresse de la position horizontale. — Amélioration en se couchant. — Renvois à vide après avoir mangé et bu. — Grande somnolence après le dîner. — Après le repas horripilation. — Faiblesse et vertige après le dîner.

chant pour les friandises.

Malaise après avoir mangé et bu.— Malaise avec envie de vomir le matin quand on se lève. — Amélioration par le coucher.

Plénitude d'estomac après le repas. — Pression à l'estomac et dans la région précordiale qui produit la gêne de la respiration. — Battement dans la région précordiale.

Sensation de plénitude et de gonflement du bas-ventre après le dîner. — Pression lourde dans le bas-ventre. — Torsion fouillante dans le ventre comme par un ver. — Mal de ventre pinçant. — Mal de ventre spasmodique, contractif, qui force à marcher courbé. — Contraction visible du bas-ventre dans la région du nombril. — Fermentation dans le bas-ventre. — Vents fétides. — Pression dans l'aine comme s'il s'y formait une hernie.

Tenesme avec malaise, déchirements et pincements dans les entrailles — Selle aqueuse, gélatiniforme, écumeuse, avec des stries jaunes, blanches ou sanguino-lentes. — Diarrhée nocturne avec coliques

violentes. — Diarrhée chronique de plusieurs années. — Selle dyssentérique.

Fréquent besoin d'uriner avec accroissement de sécrétion. — Urine foncée qui se trouble bientôt. — Urine aqueuse avec dépôt blanchâtre. — Urine trouble, blanchâtre. — Gonflement de l'urêtre. — Incontinence d'urine. — L'rections fréquentes la nuit avec pression sur la vessie. — Forte propension à l'éjaculation le matin. — Éruption aux parties génitales. — Éruption humide au scrotum avec gonflement du prépuce et du gland.

Règles trop longues. — Règles trop tôt et trop fortes. — Douleur vive dans

le vagin.

Éternuements fréquents, violents, presque spasmodiques. — Écoulement abondant de mucus des natinés sans coriza. — Anxiété et enrouement. — Oppression en allant à la selle. — Après une marche courte sensation comme si la trachée était serrée.

Toux sèche, brève, anxieuse, produite par chatouillement, avec respiration courte le soir et avant minuit.—Toux avec ébranlement de la tête et de la poitrine.—Toux le matin au réveil. — Toux avec crachat de sang pur et malaise dans la poitrine. — Hémoptysie chronique.

Oppression anxieuse, tensive, constringente, avec la respiration courte, la nuit aussi. — Faiblesse de poitrine qui rend la parole difficile après avoir marché au grand air. — Élancements dans la poitrine en parlant, en respirant profondément et quand on est assis penché en avant. — Inflammation typhoide et nerveuse de la poitrine. — Cessation de sécrétion du lait. — Sensation de faiblesse et de trémoussement au cœur. — Battement violent du cœur quand on est assis tranquille, de sorte que chaque palpitation ébranle le corps.

Raideur de la nuque et du cou avec tension douloureuse par le mouvement qui arrache des cris. — Raideur à la nuque pendant le mouvement. — Déchi-

rement rhumatismal entre les omoplates, augmenté par le froid et diminué par la chaleur.

Déchirement et brûlure dans les omoplates avec paralysie du bras, surtout pendant la saison froide, dans le repos et la chaleur du lit. - Paralysie du bras avec froid et perte du mouvement et du sentiment. -Exostose au bras avec douleur brûlante et ulcère sanieux. - Faiblesse et tremblement dans l'avant-bras et dans les doigts pendant les efforts modérés et le mouvement. -- Gonflement douloureux des glandes axillaires. - Le soir gonflement chaud des mains. - Gonflement érysipélateux et pustules brûlantes, pruriantes aux bras et aux mains. - Eruption de boutons brûlants, pruriants, aux mains et aux doigts.

Sciatique. — Douleur dans l'articulation de la hanche en se mettant debout et en montant un escalier avec tiraillements et brûlure sourde dans le repos, et élancements en appuyant le pied. — Élancement et déchirement de l'articulation de la hanche au jarret avec la marche pénible et difficile. — Élancement et douleur d'entorse dans les mollets en appuyant le pied. — Le soir, gonflement sans douleur des pieds. — Grampes dans les fesses, cuisses et mollets, la nuit au lit et quand on s'assied après avoir marché. — Brûlure et douleur vive dans les cors.

Tension et déchirement rhumatismal dans les membres, plus forte dans le repos, avec sensation d'engourdissement après le mouvement. — Tiraillements dans tous les membres, étant couché. — Souffrances arthritiques. — Tiraillements déchirants quand on est assis et dans le repos, améliorés par la marche. — Étancements tensifs et raideur dans les articulations, surtout en quittant son siège, et à l'air libre. — Raideur dans les membres surtout au commencement du mouvement. — Gonflement rouge luisant de la partie malade avec élancement vif au toucher. — Sensation douloureuse dans les membres

comme si les chairs étaient meurtries, décollées, et comme si on ruginait les os. — Foulure. — Tour de reins.

Miliaire urticaire avec prurit ardent. — Éruption vésiculaire qui forme des croûtes sur différentes parties du corps. — Dartres. — Éruption dartreuse alternant avec affection de poitrine et selles diarrhéiques. — Envies. — Engelures, verrues, qui gâtent la peau.

Les symptômes les plus forts paraissent quand le membre est dans le repos le plus absolu.— Les symptômes paraissent souvent d'un seul côté.

vent a un seur cote.

Grande somnolence pendant la journée, même le matin au lit. — Bâillements fréquents, violents, spasmodiques, comme si la mâchoire allait se luxer. — Insomnie avant minuit produite par une sensation de chaleur, une fermentation du sang, ou par une agitation qui ne permet pas de rester au lit. — Tressaillement et ébranlement du corps produits par la peur avant de s'endormir. — Sommeil agité avec jactation et afflux d'idées fâcheuses. — Souffrances nocturnes gastriques.

On ne peut supporter le grand air quand it est froid; il produit de la douleur à la peau. — Froid avec tremblement et grande soif au grand air frais. — Froid et chaleur alternatifs dans différentes parties du corps. — Fièvre le soir; froid, chaleur avec soif et diarrhée avec tranchée l'un après l'autre. — Fièvre la nuit avec soif. — Fièvres nerveuses de toute espèce. — Fièvre puerpérale. — Fièvre typhoidé.

Humeur chagrine avec dégoût pour toute occupation. — Anxiété triste avec besoin de la solitude et de répandre des larmes. — Anxiété comme si on devait mourir. — Agitation qui éloigne tout repos. — Peur d'être empoisonné. — Anxiété, penchant au suicide.

#### 112. RUTA GRAVEOLENS.

Dur. D'Act., incon.—Antid.: Camph.—Puiss., I.

Vertiges tournoyants à tomber. Lenteur de pensée. — Perte des sens fréquente.

Céphalalgie pressive. — Céphalalgie extérieure comme après une contusion surtout au périoste. — Prurit rongeant sur le cuir chevelu comme par des poux.

Vue troublée par la lecture protongée.—
Cuisson dans les yeux en lisant à la lumière. — Regard fixe, involontaire. —
Crampe des paupières.

Douleur pressive à l'oreille. — Douleur dans le pavillon de l'oreille et l'apophyse mastoïde comme après une meurtrissure.

Douleur engourdissante dans le périoste des os de la face comme après un coup.

— Érysipèle au front. — Rongement et prurit à la face et sur les joues.

Pression forte sur la racine et dans la partie supérieure du nez.

Eruption de boutons aux lèvres.

Geneives douloureuses qui saignent facilement.

Grande soif d'eau froide après midi.—Goût fade, sec des aliments; ils sont comme du bois. — A peine commence-ton à manger, qu'un dégoût suivi de satiété et de sentiment de plénitude au basventre se manifeste. —Hoquet en fumant du tabac.

Rongement pressif dans la région précordiale et hépatique. — Pression pinçante dans le bas-ventre. — Fouillement et douleur de brisure dans la région des lombes. — Élancement qui sort du basventre quand on s'assied. — Chaleur et cuisson, ou froid et fraîcheur dans le bas-ventre.

Selle difficite; elle n'est possible que par de grands efforts à cause de l'inertie du rectum. — Chute du rectum pendant Ruta graveolens.

nuta gravediens.

la garde-robe. — Déchirement dans le rectum et dans l'urètre. — Écoulement de sang pendant la garde-robe.

Besoin pressant d'uriner quoiqu'on rende peu d'urine. — Pression sur la vessie même après avoir uriné; il semble que la vessie est encore pleine.

Appétit vénérien augmenté. — Pollutions.

Fraîcheur agréable ou chaleur dans la poitrine. — Rongement dans la poitrine. — Oppression et plénitude dans la poitrine avec gêne de la respiration. — Élancements dans la poitrine avec gêne de la respiration en montant un escalier.

Douleur de brisement dans le dos avec

gêne de la respiration.

Douleur de courbature ou celle qu'on éprouve après un coup dans les articulations et dans les membres. - Faiblesse dans les extrémités qui empêche de tenir quelque chose avec les mains ou de rester debout. - Déchirements pressifs, serrants, dans les membres supérieurs et inférieurs. - Sensation de grande plénitude dans tout le corps avec oppression de poitrine. - Lassitude et lourdeur dans les membres surtout quand on est assis, avec agitation dans les jambes telle qu'on est forcé de les mouvoir. - Après une courte promenade, quand on s'assied, on a une grande courbature dans les membres avec douleur au sacrum et aux lombes. - Douleur dans le périoste. Fréquents bâillements et pendicula-

Fréquents baillements et pendiculations. — Grande somnolence le soir et après le repas, avec réveil au plus léger attouchement; on pousse des cris affreux. — Agitation nocturne avec jactation et

réveil fréquent.

Horripilation même près du feu; les mains et les pieds sont froids, avec chaleur de la face, embarras de la tête et soif. — Chaleur générale avec agitation. — Anxiété comme si on allait mourir, gêne de la respiration et céphalalgie pressive.

Anxiété comme si on avait commis un

crime. — Propension à la querelle et à la contracdition. — Dégoût pour le travail. — Mécontentement de soi et des autres.

#### 113. SABADILLA.

Dun. n'Act., 75 j.—Antid.: Camph., puls.—Purss., X ou VI dans les mal. chron.

Vertige avec évanouissement, obscurcissement de la vue en quittant son siège.

Pensée difficile. — Excitation des facultés intellectuelles avec calme des facultés affectives, et vice versû.

Céphalalgie pressive assourdissante, frontale et temporale. — Céphalalgie par la méditation prolongée. — Céphalalgie tournoyante, térébrante, après la promenade. — Fourmillements et picotements brûlants au front et au cuir chevelu.

Larmoiement des yeux, en marchant au grand air, en fixant la clarté, en toussant, en bâillant, et par la plus légère douleur dans d'autres parties.

Étreinte pressive, serrante aux oreilles.

— Dureté de l'ouïe comme si quelque chose était placé devant l'oreille. — Bruit, murmure et craquement dans les oreilles.

Chaleur et rougeur brûlante à la face.

— Chaleur à la face après avoir bu du vin. — Cercle bleu autour des yeux. — La peau du visage est tachetée ou dartreuse.

Demangeaison contractive et fourmillement pruriant dans le nez. — Épistaxis.

Brûlure et douleur d'écorchure aux lèvres.

Elancements douloureux dans les dents molaires (creuses).

Douleur d'excoriation à la langue dans la cavité de la bouche qui est comme brûlée; il y a des vésicules sur la langue.

— Au bout de la langue, aux lèvres et aux gencives, un picotement fin, avec amertume désagréable ou douceur nauséeuse. — Les gencives et le bout de la

langue sont d'une couleur bleue.

Accumulation de beaucoup de salive douceâtre à la bouche.

Mat de gorge comme par un gonflement intérieur, avec âpreté, grattement et envie continuelle d'avaler ou de renacler. — Sensation d'un corps étranger dans la gorge, pendant et hors de la déglutition. — Brûlure et pression à la gorge pendant et hors le temps de la déglutition. — Sensation de constriction à la gorge. — Sécheresse à la gorge.

Goût amer, désagréable à la bouche, ou d'une douceur nauséabonde. — Grande soif pour l'eau, même le matin. — Faim vive matin et soir. — Dégoût pour les aliments et pour le café. — Faim avec aversion pour les aliments.

Renvoi douloureux qui ne remonte que jusqu'au milieu de la poitrine. — Renvoi à vide avec horripilation.

Malaise avec envie de vomir, quelquefois avec horripilation. — Malaise diminué par le manger. — Vomissement de lombrics.

Douleur brûlante à l'estomac. — Brûlure qui commence à l'estomac, s'étend au travers de la poitrine jusqu'au pharynx. — Fouillement dans la région précordiale avec douleur d'excoriation au toucher. — Fréquente et subite oppression avec anxiété dans la région précordiale.

Brûlure dans le bas-ventre. — Térébration et fouillement dans le ventre. — Affections vermineuses. — Tænia.

Forte envie d'aller à la selle, excrétion peu abondante. — Selle dure, insuffisante (Diarrhée brune). — Fourmillement dans le rectum comme par les vers.

Urine augmentée. — Le soir, envie fréquente d'uriner.

Appétit vénérien diminué. — Érection tensive, douloureuse, sans envie du coït. — Pollutions sans érection.

Éternuement ébranlant. — Obturation tantôt d'une narine, tantôt de l'autre. — On mouche de fortes masses de mucus épais, blanchâtre et transparent, sans co-

riza. — Voix rauque. — On crache du sang vermeil qui s'échappe des narines postérieures. — La respiration est gênée comme si un poids pesait sur la poitrine.

Toux courte, sèche, même la nuit.

Pression sur la poitrine. —Brûlure dans la poitrine comme par l'eau bouillante. —Élancement dans le côté de la poitrine, en respirant et en toussant, qui empêche de dormir et d'être couché sur le côté; il est accompagné de toux et de crachats. — Palpitation de cœur, avec la sensation comme si toutes les artères du corps battaient.

Douleur des épaules jusque dans la poitrine, comme si la circulation éprouvait un obstacle; ce symptôme est plus fort dans le froid et au grand air.

Mouvement convulsif des bras. — Taches rouges aux bras et aux mains. — Taches jaunes aux doigts. — Sécheresse de la peau des mains. — Desquammation de la peau, sur les côtés des ongles des doigts. — Tremblement des mains et des bras, comme dans la vieillesse. — Contraction crampoïde des doigts.

Pesanteur des pieds. — Forte sueur aux talons. — Tension dans les mollets.

Tension douloureuse dans les membres comme si elle avait lieu au milieu des os, avec envie d'étendre les membres, améliorée dans le repos. — Sensation dans tous les os, surtout dans les articulations des os, comme si on les ruginait, plus forte au toucher et améliorée par le mouvement des parties. — Fourmillement dans les membres. — Élancement brûlant, fourmillant au-dessous de la peau.

Beaucoup de symptômes se montrent d'abord du côté droit et ensuite du côté gauche. — Étant couché on se trouve mieux qu'en marchant et debout. — Les douleurs des membres, la lassitude et la somnolence augmentent dans les heuresqui précèdent midi.

Taches rouges sur le bas-ventre, les bras, les mains et sur la poitrine, qui paraissent plus fortes pendant le froid.

Bâillement fréquent. — Pendiculation des membres avec envie insurmontable de dormir. — On s'endort tard à cause d'une grande abondance d'idées. — Demisommeil le soir. — Sommeil agité qui n'est pas réparateur.

Grande susceptibilité au froid qui augmente l'état de souffrance. — Fièvre sans soif qui consiste seulement dans le froid et des accès isolés de chaleur. — Fièvre qui consiste en frisson qui se renouvelle souvent avec envie de vomir. — Quelquefois alternativement avec des accès de chaleur fugace qui s'observent plus à la face, aux mains qu'aux autres parties du corps. — Frisson avec chaleur et manque de soif. — Fièvre intermittente à heure fixe avec soif entre le froid et la chaleur.

Égarement de l'imagination, se rapportant cependant toujours à soi-même;
on croit être couché chez les morts; on
pense que l'estomac est rongé, etc., etc.
— Anxiétés, inquiétudes. — Caractère
méticuleux. — Dégoût pour le travail.
— Colère. — Caractère chagrin.

#### 114. SABINA.

Dur. D'ACT., plus. sem.—Antid.: Camph.—
Puiss., II, III.

Vertige étourdissant à tomber avec obscurcissement de la vue.

Faiblesse de la mémoire.

Pesanteur pressive à la tête, de la région frontale à la nuque. — Céphalalgie pressive térébrante.

Diminution de l'ouïe.

Visage pâle. - Yeux ternes, cernés.

Le soir et la nuit odontalgie pressive comme si la dent allait éclater, augmentée par la boisson, la fumée de tabac et la chaleur du lit, améliorée en quittant le lit. — Odontalgie pendant et après le manger.

Douleur pressive au cou en avalant la salive comme s'il y avait gonflement intérieur ou par la présence d'un corps étranger.

Salive blanche qui devient écumeuse en parlant. — Goût de sang ou de quelque chose de gras avec salive rougeâtre. — Goût fétide de la bouche. — Goût désagréable comme on l'a quelquefois dans un vieux coriza. — Goût amer à la bouche, surtout après avoir bu du lait. — Goût amer des aliments, du lait et du café.

Renvois à vide. — Malaise et sensation de plénitude dans la région de l'estomac. — Vomissement de bile. — Vomissement des aliments.

Sensation de plénitude et de gonflement dans la région de l'estomac.—Pression dans l'estomac et dans la région du foie. — Mal de ventre pressif, pinçant comme par refroidissement ou comme si une diarrhée devait survenir. — Entérite. — Douleur contractive dans les intestins et dans la région de l'utérus.

Selle molle diarrhéique avec bruit et expulsion de vents abondants. — Selle muqueuse, sanguinolente.

Forte envie d'uriner. — Urine abondante, même la nuit. — Urêtre enflammé, douloureux, avec écoulement gonorrhéique purulent.

Appétit vénérien augmenté, avec érection violente prolongée, facilement provoquée par la plus légère cause.

Règles trop fortes avec sang coagulé, ou excrétion d'un sang vermeil par accès. — Métrorrhagie avec douleur qui s'étend du sacrum aux aines. — Métrorrhagie après l'accouchement. — Avortement. — Leucorrhée pruriante. — Leucorrhée avec ménostasie.

Toux sèche produite par un chatouillement avec expectoration qui est striée de sang. — Hémoptysie.

Pression sur la poitrine. — Tremblement dans la poitrine avec crépitation et râle obscur. — Gonflement des mamelles. — Fourmillement voluptueux dans les

mamelles.

Sabina.

Douleur tiraillante dans le dos jusque dans la région de l'aine.

Déchirement élançant dans les membres supérieurs et inférieurs. — Faiblesse des mains en écrivant. — Raideur arthritique de l'articulation des mains.

Douleur dans l'articulation coxo-fémorale, surtout en appuyant le pied. — Tension douloureuse des extenseurs de la cuisse comme s'ils étaient trop courts. — Ulcère suppurant, lardacé, sur le tibia. — Douleur de goutte dans le gros orteil.

Élancements déchirants dans toutes les articulations avec sensation de gonflement et tiraillement élançant à travers les cavités osseuses. — Brûlure sensible au toucher dans les parties malades. — Brûlure par la pression dans le périoste gonflé. — Battement tressaillant dans toutes les artères. — Maladies chroniques du sexe féminin.

Sommeil agité avec réveil fréquent, bouillonnement du sang, chaleur et sueur.

Horripilation et froid avec chair de poule et obscurcissement de la vue. — Chaleur au visage avec les pieds et les mains glacés.

Humeur chagrine, caractère pleureur.

## 115. SAMBUCUS NIGRA.

Dur. D'ACT., quelq. h.—ANTID.: Incon.—Puiss., suc pur, 1 goutte.

Étourdissement avec tension à la tête; pendant le mouvement, sensation comme s'il y avait de l'eau, le matin. — Céphalalgie pressive, déchirante, frontale et temporale.

Taches rouges sur les joues avec brûlure. — Tension et sensation d'engourdissement aux joues comme par une enflure.

Pincement dans le ventre comme par refroidissement, avec expulsion de vents.

## Sambucus nigra.

Envie fréquente d'uriner avec excrétion abondante d'urine, même la nuit.

Enrouement produit par une grande quantité de mucosité visqueuse dans la trachée-artère.

Toux profonde, âpre, creuse, avec anxiété et soif.

Oppression de poitrine avec élancement dans un côté ou pression sous le sternum. — Contraction subite dans les deux côtés de la poitrine.—Accès d'asthmes avec pleurs après être sorti d'un sommeil maladif, dans lequel on a la bouche et les yeux demi-ouverts, avec gêne de la respiration étant couché. — Respiration sibilante comme pour suffoquer quand on se redresse; avec jactation des mains. — Gonflement bleuâtre du visage et de la tête, et chaleur sans soif, surtout la nuit. — Asthme spas modique. — Angine pectorale. —Angine membraneuse. — Asthme de millar.

Traction fréquente, subite, douloureuse dans différentes parties de la peau, étant assis.—Tremblement des mains en écrivant.—La plupart des symptômes se montrent quand on est dans le repos et se dissipent par le mouvement.

Somnolence sans sommeil.—On se réveille fréquemment par soubresaut, avec anxiété, tremblement et asthme, jusqu'à la suffocation.—Délire périodique où l'on voit des choses affreuses.

Froid avec tremblement avant de s'endormir.—Horripilation avec les mains et les pieds froids, et fourmillement picotant çà et là. — Chaleur insupportable sans soif, avec crainte de se découvrir.—Forte sueur de fièvre, surtout la nuit.— Fièvre intermittente avec sueur extraordinaire.

Caractère très méticuleux. — Mauvaise humeur; toute chose produit une fâcheuse impression.

## 116. SASSAPARILLA.

Dur. D'ACT., 5 sem.—ANTID.: Incon.—Puiss., X.

Vertige avec nausée. — Vertige en fixant long-temps un objet.

Céphalalgie lancinante. — Céphalalgie pressive. — Céphalalgie qui augmente par le toucher et la marche. — Bruit dans la tête comme la vibration d'une cloche. — Céphalalgie pressive.

Sensibilité du cuir chevelu. — Chute

des cheveux.

Trouble de la vue. — Sensibilité douloureuse des yeux à la clarté du jour. — Le soir le papier blanc paraît rouge. — Les angles intérieurs des yeux sont bleuâtres. — Élancements dans les yeux.

Elancements dans les oreilles.

Éruption à la face comme de gerçure.

Raideur et tension dans les muscles et articulations de la mâchoire. — Sensibilité des dents supérieures du côté droit.

Le matin sécheresse et âpreté à la gorge. — Serrement spasmodique de la gorge avec respiration difficile.

Nausée même en pensant aux aliments.

— Insapidité des aliments. — Après le dîner sensation à l'estomac comme si on n'avait pas mangé.—Goût amer du pain.

— Goût herbacé.

Brûlure à l'estomac après avoir mangé du pain. — Grouillement et sensation de vide dans le bas-ventre.

Selles retardées, dures et en petite quantité. — Selle difficile et doulou-reuse.

Envie fréquente et difficulté d'uriner. — Diminution de l'urine. — Tenesme urinaire avec sortie d'une matière âcre, blanche, trouble et muqueuse. — Calculs de la vessie et des reins. — Gravelle. — Contraction douloureuse de la vessie. — Urine trouble comme une eau chargée d'argile.

Règles tardives, trop peu abondantes et âcres. — Leucorrhée muqueuse. Grande gêne de la respiration qui force à desserrer les vêtements pour prendre haleine. — Serrement de poitrine comme par une crampe qui empêche de respirer.

Déchirements paralytiques dans toutes les articulations et membres, avec tremblement des mains et des pieds.—Déchirement au front et pincement dans le ventre.—Douleurs arthritiques chroniques, avec diminution de la sécrétion d'urine, produite par un refroidissement dans l'eau (ou gonorrhée arrêtée). — Raideur ou immobilité des membres. — Douleur de suppuration dans le bout des doigts.— Lassitude surtout dans les membres inférieurs, dans les cuisses et les articulations des genoux.

Peau rugueuse avec maigreur. — Boutons rouges, secs, qui ne causent du prurit que dans la chaleur. — Gerçures profondes et brûlantes dans la peau des doigts. — Grosse tumeur. — Ulcères après l'abus du mercure. — Éruption miliaire en sortant d'une chambre chaude et passant à l'air froid.

Le soir on s'endort de bonne heure et on s'éveille en sursaut. — Insomnie nocturne ou réveil fréquent.

Froid jour et nuit. — Froid universel même près du feu, surtout aux pieds, non au visage ni à la poitrine. — Chaleur le soir avec bouillonnement du sang; palpitations de cœur et sueur au front.

Morosité avec disposition au travail. — Anxiété avec tremblement des pieds. — Humeur changeante.

#### 117. SECALE CORNUTUM.

Dur. D'ACT., plus. sem.—Antid.: Sol., nig., camph.
—Puiss., III ou IV.

Vertige à tomber. — Vertige assourdissant avec titubation comme par ivresse.

Faiblesse de la mémoire. - Erreur

des sens. — Assourdissement et vide de la tête.

Embarras douloureux de la tête. — Hémicranie. — Chute des cheveux.

Contraction spasmodique des pupilles.

— Dilatation des pupilles. — Yeux convulsés. — Regard féroce, fixe. — Diplopie. — Brouillard, taches et voile devant les yeux. — Faiblesse de la vue. — Amaurose. — Enfoncement des yeux.

Diminution de l'ouïe. - Surdité passagère.

Face d'un rouge brun. — Fourmillement à la face. — Visage jaune, pâle, décoloré, hypocratique. — Face hâve, traits contractés; cercles bleus autour des yeux. — Épistaxis.

Contraction spasmodique; les lèvres sont fortement serrées. — Trismus.

Grincement des dents. — Ébranlement et chute des dents.

Fourmillement douloureux dans la langue. — Gonflement de la langue. — Langue de couleur brune-noire. — Parole indistincte, lourde, balbutiante. — Écume blanche, ou sanguinolente, ou jaune verdâtre, devant la bouche.

Fourmillement insupportable à la gorge. — Brûlure dans la gorge.

Faim insatiable surtout pour les acides. — Soif inextinguible. — Goût émoussé.

Étranglement et vomissement de matières crues, bilieuses. — Vomissement de mucosité et de lombrics. — Vomissement sans effort. — Malaise continuel et vomissement par la plus petite quantité de substance ingérée.

Pression à l'estomac. — Crampe d'estomac. — Douleur extraordinaire dans la région précordiale avec oppression, avec envie continuelle et inutile de vomir. — Anxiété indéfinissable et brûlure dans la région précordiale.

Brûlure dans le bas-ventre, l'estomac et l'œsophage. — Gangrène de l'estomac et du foic. — Le bas-ventre est extrêmement gonflé et tendu. — Coliques convulsives douloureuses. — Sensation d'un froid intense dans le bas-ventre et au dos.

Selle diarrhéique aqueuse. — Diarrhée involontaire. — Diarrhée fréquente de matière aqueuse, muqueuse. — Expulsion de vers. — Diarrhée colliquative avec perte subite des forces. — Choléra asiatique.

Difficulté d'uriner. — Urine augmentée. — Sécrétion d'urine supprimée. — Hématurie.

Règles de trop longue durée et trop fortes.

— Écoulement de sang par l'utérus. —
Avortement. — Le placenta fort adhérent.

— Absence des douleurs d'enfantement. —
Lochies trop prolongées. — Gonflement et verrues à l'orifice de l'utérus qui reste béant. — Afflux du sang vers l'utérus. —
Inflammation chronique de l'utérus avec suppression des lochies ou des règles.

Voix rauque, enrouée.

Respiration difficile, anxieuse, avec soupirs et sanglots. — Asthme spasmodique. — Violentes palpitations du cœur. — Battements crampoïdes du cœur. — Hémoptysie.

Fourmillement dans le dos et engourdissement qui s'étend jusque dans l'avantbras, surtout à la pointe des doigts. — Brûlure dans les mains et dans les pieds. — Gonflement des mains et des pieds avec des vésicules noires qui suppurent. — Crampes aux mollets.

Douleur crampoïde dans les membres.

— Tiraillements et déchirements dans les membres et dans les articulations, avec fourmillement. — Fourmillement dans la peau du corps. — Brûlure dans dissérentes parties du corps, comme si des étincelles brûlantes y tombaient.

Tressaillements et crampes.—Contraction crampoide des membres.—Mouvements convulsifs des membres.—Accès épileptique.

— Tétanos. — La plupart des symptômes paraissent la nuit. — Les crampes et les convulsions reviennent périodiquement.—Les crampes dans tous les membres diminuent par une forte extension.

Grande lassitude et paresse. — Faiblesse, lourdeur et engourdissement des membres. - Tremblement des membres. - Paralysie des membres.

Peau âpre, sèche.-Peau rugueuse, de couleur de plomb; elle est fanée. -Engourdissement et insensibilité de la peau. Pétéchies. Desquammation de l'épiderme. - Furoncles. - Vésicules sanguinolentes qui passent à la gangrène.-Sphacèle des extrémités, surtout des doigts et des orteils.

Grande somnolence. - Envie de dormir. - Sommeil profond, engourdi.

Froid violent suivi de chaleur brûlante et d'une grande soif. - Froid intense au dos, dans le bas-ventre et les membres. - Sueur froide.

Découragement et timidité. -- Anxiété. - Manie. - Fureur avec envie de se nover. - Fureur avec envie de mordre.

#### 118. SELENIUM.

DUR. D'ACT., plus. sem. - ANTID. : Incon. -Puiss., IV-VI.

Grand oubli, surtout dans les affaires. - Dans un demi-sommeil on se souvient de tout.

Céphalalgie quotidienne après-midi. -Céphalalgie après avoir bu de la limonade, du vin et du thé. - Accès d'élancement douloureux à la tête au-dessus de l'œil gauche, qui force à se coucher, avec sensibilité à l'extérieur de la tête. - Beaucoup d'urine, manque d'appétit et tristesse produite par la marche au soleil ou par les odeurs fortes.

Chute de cheveux en se peignant.

Chute des sourcils. - Petits boutons pruriants qui produisent une douleur pressive au bord des paupières et dans les sourcils. - Douleur profonde dans les orbites.

Augmentation du cérumen; il se durcit dans l'oreille sourde.

La peau du visage est grasse.

Prurit dans le nez et au bord des ailes. - Besoin de porter les doigts dans les narines.

Lèvre supérieure gercée.

Odontalgie comme si les dents étaient creuses, qui force à les curer jusqu'à ce qu'elles saignent. - Les dents ne se couvrent pas de mucosités; elles sont plus dures et plus polies et crient quand on les frotte.

Le matin la langue est blanche, chargée. Manque d'appétit le matin. — Faim la nuit. - Aversion pour les choses salées. - Desir frequent d'eau-de-vie. - Goût douceâtre désagréable aux lèvres par la fumée du tabac. - Hoquet et renvois par la fumée du tabac avant le dîner.

Après le dîner battement des artères dans tout le corps, sensible surtout dans le ventre. - Douleur dans le côté droit audessous des fausses côtes, jusqu'à la région des reins, surtout dans l'inspiration, avec sensibilité à la pression extérieure. Miliaire rouge pruriante dans la région du foie. - Elancements forts dans la rate pendant la marche.

Selles dures, enveloppées de mucosité ou de sang.

Après avoir été à la garde-robe on urine encore.-Urine foncée en moindre quantité. - Urine rouge le soir.

Écoulement d'humeur prostatique en allant à la selle ou sans y aller. - Écoulement inaperçu de semence pendant le sommeil. - Pollution sans érection. -Impuissance avec des idées lascives. Érection lente, incomplète.-Éjaculation trop précipitée, et après le coit on éprouve encore des sensations de volupté. - Faiblesse et mauvaise humeur après le coït.

Coriza fluent tous les soirs. - Mucus nasal jaune, épais comme de la gélatine. - Enrouement quand on commence a chanter. - En renaclant le mucus est quelquefois mêlé à un petit globule de

Toux le matin, à laquelle toute la poitrine prend part, et crachats de mucosités floconneuses et avec du sang. — On respire fréquemment avec soupir et profondément. — La nuit la respiration est empêchée par des douleurs de poitrine, dans les côtés et au sacrum étant couché.

Raideur dans les lombes le matin.

Miliaire à l'avant-bras. — Déchirements dans les mains pendant la nuit. — Prurit aux doigts et entre les doigts et au poignet. — Boutons pruriants sur le côté des doigts.

Craquement dans le genou pendant le mouvement quand on est couché. — Crampes dans les mollets et les talons. — Boutons pruriants aux fesses, entre les cuisses et au scrotum. — Ulcères de la peau sans profondeur, aux jambes. — Prurit autour des chevilles et le soir aux pieds.

Fourmillement fréquent dans différentes parties qui force à se gratter. — Les parties excoriées par le grattement restent tong-temps humides.

Envie insurmontable de se coucher et de dormir, ce qui augmente tous les symptômes. — On ne supporte pas les courants d'air. — Douleur dans tous les membres comme par refroidissement. — Amaigrissement remarquable, surtout au visage, aux mains et aux cuisses. — La respiration du quinquina produit des symptômes extraordinaires et augmente tous les symptômes actuels à les rendre insupportables. — Envie de se coucher avec esprit abattu pendant la chaleur de la journée.

Somnolence de très bonne heure suivie d'un demi-sommeil. — Réveil fréquent; on ne s'endort profondément que le matin. — On s'endort très tard le soir. — Tressaillement du corps le soir en s'endormant. —On se réveille la nuit au plus petit bruit. — On se réveille de bonne heure et toujours à la même heure. — Après le sommeil on est très mal. — On se réveille toujours à la même minute d'un sommeil profond, plein de rêves, de l'après-midi. — Très grande disposition à suer en mar-

chant et après le sommeil de midi.—Sueur sur la poitrine, dans le creux de l'aisselle, qui fait sur le linge des taches blanches et raides. — Ardeur dans différentes parties isolées de la peau, dans les côtés, sur la poitrine, le ventre et les lombes.

Grande inaptitude pour le travail. — Grande fatigue par un travail d'esprit prolongé dans la nuit. — Grande loquacité.

#### 119. SENEGA.

Dur. D'Act., 3 à 4 sem. — Antid.: Arn., bell., bryo., camph. — Puiss., III ou IV.

Vertige avec murmure devant les oreilles.—La tête est entreprise.— Vide avec pression dans les yeux.

Congestion sanguine à la tête et sur les yeux en se baissant. — Céphalalgie pressive frontale et dans les orbites avec sensibilité des yeux. — Céphalalgie battante avec pression dans les yeux. — Tiraillements dans le front et dans les tempes jusque dans la face. — Tous les maux de tête affectent aussi les yeux; ils augmentent dans un lieu chaud et diminuent au froid et au grand air.

Horripitation et prurit sur le cuir chevelu.

L'ruption à la tête.

Gonflement des paupières avec pression et fourmillement brûlant. - Tressaillement et traction crampoide dans les paupières. - Sécrétion abondante de chassie qui se dessèche promptement. - Tiraillement oblique des paupières inférieures. - Pression dans les yeux, surtout en se baissant, et le soir à la lumière. -- Mal d'yeux comme si les globes étaient poussés en dehors et distendus .- Le soir, ardeur dans les yeux en lisant et en écrivant.-Larmoiement au grand air ou en fixant un objet. - Sécheresse des yeux. - Opacité de la cornée. - Regard fixe. - Vue trouble. - Scintillement devant les yeux en lisant et confusion des lettres; ces symptômes augmentent par le frottement.— Vue trouble; tous les objets paraisseut ombragés. — Taches brillantes devant les yeux. — Lueur dans les yeux en lisant. — Sensibilité à la lumière.

Pression dans l'oreille en marchant. — Sensibilité douloureuse de l'ouïe.

Sensation de sécheresse pénible des narines. — Odeur comme celle qu'exhale un ulcère.

Sensation paralytique des muscles de la face. — Vésicules brûlantes à la levre supérieure et aux angles de la bouche.

Sensibilité douloureuse et fourmillement dans les dents pendant l'inspiration.

Le matin et avant midi grande sécheresse de la bouche et du larynx. — Saivation augmentée. — Accumulation de beaucoup de mucosité épaisse dans la gorge; elle
est expulsée par le renaclement sous
forme de petits globules. — Brûlure au
palais et sur la pointe de la langue. —
Gonflement inflammatoire du pharynx et de
la luette. — Langue blanche, chargée,
avec un goût muqueux désagréable. —
Odeur fétide de la bouche.

Sensation de constriction dans la gorge.

— Brûlure; grattement, sécheresse dans la gorge, avec difficulté de parler et besoin continuel de tousser. — Sensation d'excoriation et douleur vive à la gorge.

Goût urineux à la bouche. — Goût métallique. — Diminution de la saveur des aliments. — Manque d'appétit complet, surtout le matin. — Faim rongeante avec sensation de vide dans l'estomac. — Grande soif.

Renvois, nausée et envie de vomir, et étranglement. — Vomissement avec anxiété. — Vomissement avec diarrhée.

Crampe pressive à l'estomac la nuit. — Ardeur à l'estomac.

Douleur de colique térébrante, fouillante, dans les hypochondres et dans la partie supérieure du ventre. — Rongement dans le bas-ventre. — Chaleur et oppression dans la partie supérieure du ventre pendant l'inspiration. — Flatuosités avec pression vers le bas-ventre. — Tiraillements dans les téguments du ventre.

Selles dures, retardées, et en trop petite quantité, suivies de pression dans le rectum. — Diarrhée fréquente de consistance de bouillie.

Urine diminuée. — Urine augmentée. —
Pissement au lit la nuit. — Urine écumeuse. — Urine mêlée de filaments muqueux; par le refroidissement elle devient trouble et nuageuse. — Sédiment des urines rouge avec des flocons muqueux. — Brâlure et élancements dans l'urêtre pendant et après l'action d'uriner. — En urinant sensation comme si les parois de l'urêtre étaient collées.

Appétit vénérien accru avec érections douloureuses.

Leucorrhée muqueuse.

Éternuements avec vives douleurs d'excoriation dans la poitrine. — Respiration courte en marchant vite et en montant un escalier. — Mucosité abondante dans le larynx, la trachée-artère; elle gêne fortement la respiration. — Angine membraneuse catarrhale. — Phthisie trachéale.

Toux brève, sèche, brûlante, produite par un chatouillement dans le larynx; elle est plus forte au grand air; elle rend la voix rauque et enrouée. — Toux avec crachats muqueux, épais et abondants.

Congestion à la poitrine avec pulsation bouillonneuse jusqu'd la syncope. — Grattement et fouillement dans la poitrine. — Sensation d'engorgement des poumons avec respiration difficile. — Mucosité abondante dans la poitrine. — Phthisie muqueuse. — Douleur pressive d la poitrine surtout dans le repos, le matin, le soir et au réveil. — Oppression pressive de poitrine, comme si le thorax était gêné, surtout en se baissant en avant et au grand air. — Hydrothorax. — Serrement et coarctation de poitrine avec inquiétude, anxiété, augmenté quand on est couché sur le

côté. — Ardeur et tiraillement dans la poitrine. — Grande sensibilité de l'intérieur des parois de la poitrine par la pression extérieure. — Douleur d'excoriation dans la poitrine, augmentée par la pression extérieure, par l'éternuement et la toux. — Élancements dans la poitrine, surtout en toussant et en respirant. — Pneumonie. — Pression et térébration dans la région précordiale. — Battements de cœur violents qui ébranlent. — La plupart des symptômes sont plus forts dans le repos et ne gênent guère la respiration.

Pression et tiraillement dans le dos, entre et au-dessous des omoplates. — Brûlure et fourmillement au-dessous de la peau de tout le dos.

Tiraillement paralytique dans l'avantbras jusque dans les doigts. — Douleur de foulure dans l'articulation de la main.

Grande sensation de lassitude dans les jambes. — Douleur de foulure dans l'articulation coxo-fémorale. — Faiblesse paralytique dans les articulations, surtout aux membres inférieurs.

Grand affaiblissement physique et moral, avec pendiculation des membres.—Vide, pesanteur et battement à la tête. — Grande sensation universelle de lassitude, avec tremblement, surtout dans les membres inférieurs.—Grande faiblesse qui paraît émaner de la poitrine. — Évanouissement en marchant au grand air.

Beaucoup de symptômes, surtout ceux de la poitrine, s'augmentent dans le repos et s'améliorent pendant la marche au grand air. — Ce médicament convient surtout au tempérament mou, phlegmatique, et à teint fleuri.

Anasarque général.—Plaie par suite de morsure d'animaux venimeux.

Grande somnolence le soir avec sommeil profond et prompt. — Sommeil troublé par les symptômes de la poitrine ou le matin par des crampes d'estomac.

Frissonnement fréquent avec lassitude dans les jambes. — Horripilation dans le dos avec chaleur à la face. — Cuisson aux yeux, respiration difficile, élancements dans la poitrine et battement dans la tête.

Grande anxiété avec respiration quelquefois très accélérée. — Mélancolie, hypochondrie avec grande susceptibilité pour les offenses. — Hilarité avec grande disposition à passer d'elle à l'emportement, à la colère.

#### 120. SEPIA.

Dur. p'act., 40 à 50 jo. — Antid., Acon., acid., veg. ant., cru., tar., em., coff. — Puiss. X.

Vertige comme si tous les objets se mouvaient.—Vertige au grand air comme si quelque chose roulait dans la tête.— Vertige le matin en se levant.—Vertige tous les jours après midi.

Faiblesse de la mémoire. — Lenteur dans l'enchaînement des idées. — Distraction.

La tête est entreprise; elle est inapte aux travaux d'esprit.—Accès de migraine avec céphalalgie térébrante qui force à crier, accompagnée de vomissements.—Le soir pesanteur de la tête et quand on est couché hémicranie déchirante. — Hémicranie élançante. — Tous les matins céphalalgie vive avec nausée jusqu'à midi. — Battement douloureux dans la tête, surtout dans l'occiput.—Forte congestion vers la tête avec chaleur, surtout en se baissant.

Prurit à la tête, dans le nez et dans les oreilles. — Ghute des cheveux.

Pesanteur et chute de la paupière supérieure. — La nuit impossibilité d'ouvrir les yeux. — Paralysie des paupières. — Orgelet. — Grande susceptibilité des yeux à la clarté du jour, qui produit une céphalalgie pressive au-dessus des yeux. — Inflammation des yeux. — Fongus hématode de la cornée. — Agglutination des paupières la nuit. — Voile ou taches noires devant les yeux. — Trouble de la vue en lisant et en écrivant. — Le soir on voit une auréole verte autour de la lumière.

— Les yeux sont comme vitrés, le matin au réveil ils semblent nager dans un liquide. — Coloration en jaune du blanc des yeux.

Bourdonnement et bruissement devant les oreilles. — Susceptibilité extrême de l'ouïe pour la musique. — Dureté de l'ouïe. — Surdité subite comme si on avait bouché une oreille. — Écoulement de pus liquide par les oreilles, avec prurit. — Douleur d'excoriation dans l'oreille. — Gonflement à l'oreille extérieure. — Dartre au lobe de l'oreille.

Face jaune. — Bouffissure pâle de la face. — Douleur crampoïde dans les os de la face. — Gonflement au front et audessous des tempes. — Ligne jaune sur le dos du nez, qui s'étend aux joues. — Éruption rouge au front et à la face. — Joues pâles avec cercle bleu autour des yeux.

Sécheresse pénible des narines. — Nez enflammé, gonflé. — Cancer de la narine. — Défaut d'odorat. — Tannes sur le nez. — Croûtes à la pointe du nez.

Tension dans la lèvre inférieure. — Couleur jaunâtre autour de la bouche. — Éruption dartreuse autour de la bouche.

Gonflement des gencives. — Excoriation des gencives. —Saignement des gencives. —Odontalgie elançante. — Odontalgie tiraillante, qui s'étend jusqu'à l'oreille. — Les dents deviennent creuses. — Odontalgie en serrant les dents. —Odontalgie des femmes enceintes.

Excoriation à la pointe de la langue.— Stomacace.—Sécheresse dans la bouche. — Langue blanche, chargée.

Gonflement et inflammation dans la partie supérieure de la gorge. — En avalant sensation comme s'il y avait une grosseur. —Saccade subite dans la gorge. —Le matin, crachats muqueux.

Odeur fétide de la bouche.—Goût putride. — Goût acide. — Soif le matin. — Absence de soif. — Dégoût pour les aliments; ils ne peuvent descendre par l'œsophage. — Répugnance pour la viande et le lait. — Grande voracité.

Renvois. — Renvois douloureux pendant lesquels il vient du sang à la bouche. — Aigreur après avoir bu. — Goût acide à la bouche après avoir mangé. — Sueur après le dîner.

Malaise en allant en voiture.—Nausée le matin à jeun en se rinçant la bouche, ce qui n'a pas lieu quand on a mangé quelques bouchées. — Vomissement de bile.

Douleur à l'estomac après le dernier repas. — Pression sur l'estomac comme par une pierre. — Crampe d'estomac. — Brûlure à l'estomac et dans le bas-ventre. — Douleur violente au cardia pendant la déglutition des aliments. — Douleur dans la région précordiale en marchant. — Battement dans la région précordiale.

Térébration dans les hypochondres.

— Douleur au foie en allant en voiture.

— Sensation de vide dans le bas-ventre et dans l'estomac. — Sensation de dureté dans le bas-ventre. — Ventre volumineux chez les femmes qui ont eu des enfants. — Fréquente production et déplacement des vents. — Gargouillement et borborygmes dans le ventre, surtout après avoir mangé. — Tranchées après un exercice du corps.

Retard des selles. — Constipation chez les femmes enceintes. — Selles trop molles. — Selles peu abondantes, produites avec des efforts et un tenesme pressif. — Excrétion de mucosités seulement avec des vents. — Diarrhée après l'usage du lait. — Diarrhée qui affaiblit. — Diarrhée verdâtre (surtout chez les enfants). — Chute du rectum pendant l'exonération. — Sortie du bourlet hémorrhoïdal. — Hémorrhoïdes fluentes. — Suintement humide du rectum. — Douleur contractive dans le rectum, dans le périnée et dans le vagin.

Pression sur la vessie. — Envie fréquente d'uriner ; impossibilité de la sa-

170 Sepia.

tisfaire. — On urine pendant la nuit. — Écoulement involontaire de l'urine pendant le premier sommeil. — Urine foncée. — Urine déposant un sédiment blanc abondant. — Cuisson dans l'urètre en urinant.

Appétit vénérien augmenté. — Pollutions nocturnes (après l'onanisme). — Suites fâcheuses de l'onanisme. — Faiblesse des parties génitales. — Prurit aux parties génitales. — Sensibilité douloureuse des testicules. — Gonorrhée chronique. — Gonorrhée bâtarde.

Règles trop tôt. — Règles supprimées. — Chute de la matrice. — Stérilité. — Pression dans l'utérus qui gêne la respiration. — Gonflement et éruption avec violent prurit et suppuration d la partie interne des grandes tèvres. — Leucorrhée jaunâtre, aqueuse, avec élancements dans le vagin. — Leucorrhée rongeante. Coriza sec.

Coriza avec enrouement. — Endurcissement du mucus nasal. — Épistaxis.

Toux matin et soir avec crachats salés.—
Toux humide après le refroidissement.
— Expectoration difficile. — Toux spasmodique chronique. — Toux seche qui paraît venir de l'estomac, le soir au lit, avec nausée et vomissement amer. — Toux avec beaucoup d'expectoration qui a un goût sanguinolent matin et soir et dans la journée un goût muqueux, salé ou putride. — Toux chez les femmes enceintes.

Douleur d'excoriation au milieu de la poitrine. — Douleur de poitrine dans le mouvement. — Oppression de poitrine. — Serrement de la poitrine produit, soit par des crachats qui ne peuvent sortir, soit par une expectoration trop abondante. — Accès d'asthme la nuit. — Élancements dans le côté gauche de la poitrine. — Élancements dans la poitrine pendant un travail de tête. — Douleur dans les côtés en respirant et en toussant. — Fermentation dans la poitrine avec forte palpitation de cœur. — Excoriation des mamelons. — Phthisie pulmonaire. — Pneumonie.

Sepia.

Douleur du dos. — Frissonnement dans le dos. — Déchirement et crampe dans le dos. — Raideur de la nuque.

Sueur sous l'aisselle. — Gonssement de l'aisselle. — Gonssement inslammatoire, rouge, dur, tacheté au milieu du bras. — Gale et mauvaises croûtes aux mains. — Raideur dans les bras. — Faiblesse des bras. — Élancement dans l'articulation de la main pendant le mouvement. — Brûlure dans la paume des mains. — Desquammation de la peau de la paume des mains. — La pointe du coude est croûteuse. — Vésicules ulcéreuses à la pointe des doigts et au dos des mains. — Panaris.

Raideur des jambes surtout après le chagrin. — Raideur des jambes jusqu'à l'articulation des cuisses, après être resté assis un moment. — Froid des jambes et des pieds. — Douleur tiraillante dans la jambe et dans le gros orteil. — Tressaillement des pieds pendant le sommeil de midi. — Crampes au mollet. — Gonflement des jambes et des pieds. — Sueur des pieds. — Suppression de la sueur des pieds. — Brûlure dans les pieds. — Fourmillement et engourdissement de la plante des pieds. — Ulcère au calcanéum à la suite de vésicules rongeantes.

Engourdissement des bras et des jambes après un travail manuel.—Raideur et engourdissement des articulations des mains, des genoux et du pied. — Raideur et doubleur picotante dans les membres et dans d'autres parties du corps. — Sensibilité douloureuse de toutes les parties du corps. — Facilité de se fouler les membres. — Grande facilité à se donner des tours de reins. — Douleur brûlante dans différentes parties du corps. — Gonflement universel, avec respiration courte, sans soif.

Bouillonnement de sang et palpitation de cœur. — Fermentation du sang la nuit, assez forte pour sentir le battement des artères dans tout le corps. — Agitation et battement dans tous les membres, avec

anxiété qui force à changer de place. — Grande disposition à se refroidir et sensibilité à l'air froid, surtout quand il l'est par le vent du nord. — Après avoir été mouillé, violent frisson de fièvre suivi d'évanouissement et plus tard de coriza. — Manque de chaleur naturelle. — Suites fâcheuses du chagrin. — Paresse et difficulté à se mouvoir. — Faiblesse avec tremblement. — Manque de force le matin au réveil.

Les symptômes disparaissent à chaque mouvement violent, excepté par l'équitation; ils se montrent plus forts quand on est assis tranquille, le matin et le soir.

Grande sensibilité de la peau. — Taches brunes au coude. — Taches rougeâtres dartreuses au-dessous de la hanche. — Dartres en forme d'anneau. — Éruption avec prurit et excoriation dans les plis des membres. — Dartres humides avec prurit et brûlure. — Furoncles à la cuisse et dans le jarret. — Ulcère douloureux à la pointe des doigts et des orteils. — Ulcères aux articulations des mains et des orteils.

Grande somnotence pendant la journée.

— On s'endort tard le soir. — Sommeil agité avec rêves fantastiques et un fort bouillonnement de sang dans tout le corps; on n'a pas assez dormi le matin.

Accès de chaleur passagère. — Accès de chaleur (et de froid) avec soif. — Accès de chaleur étant assis et en marchant au grand air. — Chaleur continuelle avec rougeur à la face et beaucoup de soif. — Sueur étant assis. — Sueur violente pendant un léger mouvement. — Sueur la nuit. — Sueur le matin. — Le matin sueur acide. — Fièvre intermittente avec soif pendant le frisson.

Anxiété le soir au lit. — Anxiété avec inquiétude et chaleur passagère; on est très méticuleux. — Dégoût pour ses propres affaires. — Indifférence pour ses proches. — Humeur chagrine avec sensibilité. — Découragement et mélancolie.

#### 121. SILICEA.

Dur. D'act., 40 à 50 jours. — Antid.: Calc., sulph, camph. — Puiss., X.

Vertiges à tomber. — Accès de vertiges qui paraît partir du dos, traverser la nuque jusque dans la tête. — Vertige avec nausée. — Vertige en regardant en haut. — Vertiges en allant en voiture.

Faiblesse de la mémoire. — Fatigue par la lecture et par l'écriture. — Embarras de la tête. —Le soir étourdissement comme d'ivresse.

Chaleur à la tête, congestion du sang vers la tête avec battement. - Céphalal. gie pulsative. — Céphalalgie de la nuque jusqu'au vertex; elle empêche le sommeil la nuit. - Cephalalgie quotidienne déchirante avec chaleur au front avant midi. - Tous les jours, de midi jusqu'au soir, pesanteur à la tête comme si quelque chose devait s'échapper du front. - Tiraillement dans le front du dedans en dehors. - Céphalalgie comme si la tête allait éclater. - Hémicranie avec déchirement et élancement à travers les yeux et dans les os de la face. - Céphalalgie produite par le travail d'esprit, en se baissant et par la parole.

Le soir sueur à la tête. Teigne. Éruption humide, pruriante, au cuir chevelu. Élévation tubéreuse sur les téguments de la tête. — Augmentation de sensibilité de la peau de la tête, au point que le chapeau fait mal. — Accroissement de volume de la tête avec écartement des sutures. — Chute des cheveux.

Presbyopie. — Éblouissement des yeux par la clarté du jour. — Taches noires qui voltigent devant les yeux. — Obscurcissement de la vue, comme par un voile gris. — Amaurose. — Scintillement devant les yeux. — Faiblesse de la vue; en lisant, les caractères se confondent. — Accès de cécité subite; on est aveugle

pendant quelques minutes. — Larmoiement au grand air. — Démangeaison dans les yeux. — Collement des paupières. — Rougeur dans les yeux avec douleur de prurit dans les angles. — Gonssement de la glande lacrymale. — Ophtalmie. — Cuisson dans les paupières. — Fongus hématode de la cornée. — Ulcère de la cornée.

Tintement et bruit dans les oreilles.

— Obturation des oreilles qui s'ouvrent quelquesois avec un claquement. — Dureté de l'ouie. — Grouillement dans l'oreille. — Très grande susceptibilité de l'oreille au bruit. — Douleur térébrante dans l'oreille. — Élancements dans les oreilles du dedans au dehors. — Grande quantité de cérumen humide. — Croûtes derrière les oreilles.

Visage pâle. —En lisant tout paraît blanc. — Gerçure et fendillement de la peau du visage. — Dartres au menton.

Épistaxis. — Sensation de sécheresse pénible dans le nez. — Défaut d'odorat. — Écoulement âcre par les narines qui les excorie. — Éruption de boutons au nez. — Furoncle au nez et au menton. — Ulcère dans le nez. — Douleur rongeante dans le haut du nez avec pesanteur en se baissant et grande susceptibilité à la pression. — Douleur des os du nez au toucher.

Exostose à la mâchoire inférieure. — Gonflement de la mâchoire inférieure, des glandes du cou et de l'oreille. — Ulcération de la muqueuse de la lèvre inférieure. — Cancer de la lèvre.

Douleur térébrante dans les dents. — Déchirements dans les dents et les joues, jour et nuit, mais plus forts la nuit.

Excoriation de la langue. — Gonflement sans douleur d'une moitié de la langue. — Sensation comme d'un poil sur la langue. — Stomacace. — Muco-sité abondante dans la bouche. — Perte du goût.

Manque d'appétit avec forte soif. - Aversion pour les aliments cuits et chauds.

— On aime les aliments froids. — Dégoût pour la viande. — Aversion de l'enfant pour le sein de sa mère; il vomit après avoir tété.

Renvois avec le goût des aliments ingérés. — Accumulation de salive acide à la bouche, avec horripilation. — Le matin nausées suivies de régurgitation d'eau amère. — Malaise et vomissement continuel. — Malaise après chaque mouvement qui échausse. — Nausée après le dîner. — Tous les matins nausée avec céphalalgie et mal aux yeux quand on les meut. — Vomissement après avoir bu.

Pression à l'estomac comme par une pierre.—Pression à l'estomac après avoir bu vite.—Pesanteur chronique à l'estomac suivie d'accumulation d'une eau acide à la bouche et de vomissements, toujours après avoir mangé. — Douleur au toucher dans le creux de l'estomac. — Serrement dans la région précordiale comme par une griffe, même après avoir mangé.

Ballonnement après avoir mangé. — Dureté et tension du bas-ventre (chez les enfants). — Bruit et borborygmes dans le bas-ventre pendant le mouvement. — Déplacement des vents. — Hernie dou-loureuse. — Pincements dans le bas-ventre, tranchées. — Tranchées dans le bas-ventre sans diarrhée. — Mal de ventre pendant lequel les mains deviennent jaunes et les ongles bleus.

Plusieurs selles dans la journée comme de la bouillie. — Dureté des selles. — Constipation. — Selles dures qui font faire beaucoup d'efforts inutiles. —Selles muqueuses.

Tenesme urinaire.

Appetit vénérien exalté. - Hydrocèle.

Règles trop faibles. — Retard des règles pendant plusieurs mois. — Règles qui viennent trop tôt et trop fort. — Écoulement sanguin de l'utérus pendant l'allaitement. — Avortement. — Leucorrhée qui coule en urinant. — Leucorrhée laiteuse qui coule par intervalle, précédée de tranchée dans la région de l'om-

bilic. — Leucorrhée démangeante. — Prurit aux parties génitales chez la femme.

Éternuement qui avorte. — Éternuement extraordinaire et fréquent. — Obturation ancienne des narines. — Obturation penible des narines comme par un bouchon de mucus.

Coriza sec. — Coriza continuel. — Coriza fluent fréquent. — Coriza fluent qui fait cesser une obturation chronique des narines. — Enrouement.

Oppression et respiration courte dans le repos. — Respiration courte et halètement par un léger travail manuel. — Gêne de la respiration étant couché sur le dos ou en se baissant, en courant ou en toussant.

Toux avec crachats de pus. — Toux avec expectoration abondante de mucus transparent. — Toux sèche avec douleur vive dans la poitrine. — Toux profonde, creuse, avec crachat de sang. — Toux nocturne suffocante. — Phthisie pulmonaire.

Pression sur la poitrine aussi en toussant et en éternuant. — Oppression de la poitrine comme si la gorge était serrée. — Battements sous le sternum. — Élancements de la poitrine jusqu'au dos. — Élancements au-dessous des fausses côtes. — Inflammation des mamelles chez les femmes en couches. — Suppuration des mamelles chez les nourrices.

Douleur au sacrum par le toucher ou sans le toucher. — Tiraillements crampoïdes dans le sacrum qui empêche de se redresser et force à rester couché. — Élancements dans le dos. — Déchirement dans le dos. — Douleur au dos comme celle d'une courbature. — Gonflement et déviation de la colonne vertebrale. — Raideur de la nuque. — Élancements dans les lombes étant assis et couché. — Gonflement inflammatoire et suppurant dans les muscles lombaires.

Engourdissement des bras étant couché dessus ou en s'appuyant sur une table. — Raideur et tremblement des bras par le plus léger travail. — Tiraillement douloureux dans les bras. — Déchirements
dans les bras. — Verrues aux bras. —
Commencement de paralysie de l'avant-bras
de manière qu'on laisse échapper ce
qu'on tient dans la main. — Paralysie des
mains. — Élancements nocturnes dans
le poignet jusqu'au haut du bras. — Fourmillement dans les doigts et brâlure au
bout des doigts. Vésicules suppurantes,
rongeantes, aux doigts avec brûlure.

Tiraillements et raideur dans les jambes. - Pression dans les muscles des cuisses. - Gonslement du genou. - Fongus du genou. - Tiraillements douloureux dans les jambes. - Engourdissement des mollets. - Le soir engourdissement des pieds. - Crampes des mollets .- Le soir, après un travail physique, crampes aux mollets. - Élancements dans les chevilles en appuyant le pied. - Froid des pieds. - Sueur des pieds. -Suppression de la sueur des pieds avec froid. - Odeur fétide des pieds. - Gonflement des pieds. - Le plus léger chatouillement à la plante des pieds produit une sensation de volupté à faire perdre la raison. - Élancements dans les cors.

Élancements nocturnes dans toutes les articulations. - Déchirements dans les bras et dans les jambes. - Grande disposition à se donner des tours de reins. - Engourdissement des membres. - Le soir brisement et raideur des membres. - Agitation après être resté long-temps assis. - Fermentation du sang et soif (après avoir bu peu de vin). - Facilité d se refroidir, même en se découvrant les pieds. - Impressionabilité qui fait pressentir tous les changements de température dans la tête et les articulations. - Grand affaiblissement, faiblesse et somnolence pendant les orages. - Les symptômes augmentent à la nouvelle lune. - Grande faiblesse générale. -Evanouissement quand on se couche sur le côté. - Grand amaigrissement.

Grande sensibilité de la peau jusqu'à la

douleur. - Ulcère avec douleur térébrante, lancinante et de suppuration intérieure. - Ulcère avec pus rongeant, fétide. - Odeur fétide des ulcères. - Ulcères des jambes avec pâleur maladive de la face. - Ulcères pruriants aux cuisses et aux malléoles. - Suppuration de TOUTE ESPÈCE, bonne, benigne et maligne, surtout dans les tissus membraneux. Chair luxuriante dans les ulcères. - Carie. - Rachitis. - Panaris. - Ganglion. - Anthrax. - Verrues. - Scrofule. -Ulcères par abus de mercure. — Gonflement lymphatique qui suppure.-Taches rosées et tubéreuses sur la peau. - Induration des glandes sans douleur, quelque fois seulement avec un prurit désagréable.

Bâillements fréquents; on s'endort tard.
— Sommeil trop lèger. — Rêves fréquents, anxieux et fantastiques avec réveil fréquent. — Tressaillements du corps pendant le sommeil de la nuit. — On parle pendant le sommeil de la nuit. — Insomnie occasionnée par une grande agitation du sang et la chaleur à la tête. Somnambulisme. — Cauchemar.

Frissonnement, même à chaque mouvement. — Sueur pendant une marche modérée. — Sueur nocturne. — Sueur nocturne abondante d'odeur acide. — Fièvre vermineuse chez les scrofuleux.

Anxiété et agitation. — Humeur chagrine. — Démoralisation et dégoût de la vie. — Caractère souple, complaisant.

#### 122. SPIGELIA.

DUR. D'ACT., 4 sem .- ANTID.: Camph. - Puiss., X.

Vertige à tomber étant debout, en marchant et en regardant en-bas. —Vertige avec nausée et malaise dans la cavité du ventre et torachique. — Vertige comme d'ivresse.

Faiblesse de la mémoire. — Absence d'idées. — Le travail intellectuel fatigue.

Céphalalgie en remuant la tête. — Céphalalgie pressive et avec sensation d'écartement, augmentée en se baissant en avant. — Sensation de fluctuation dans le cerveau à chaque pas. — Céphalalgie térébrante, fouillante, déchirante, surtout pendant le mouvement. — Céphalalgie en parlant à haute voix, en toussant, comme si la tête allait éclater. — Céphalalgie brûlante au front, aux tempes, jusque dans les yeux. — Céphalalgie qui s'aggrave par le plus lèger mouvement, par le bruit et même en ouvrant la bouche. — Douleur à l'occiput avec sensation de raideur ou d'engourdissement à la nu-

Endolorissement du cuir chevelu et des cheveux au toucher.

Pression au-dessous des orbites. -Douleur et chute des paupières, qui sont dures, immobiles et difficiles à soulever. - Ulcération des paupières avec douleur vive et prurit. - Douleur des yeux dans leur mouvement. - Douleur dans les globes des yeux, comme s'ils étaient chassés de l'orbite, avec fouillement et térébration, et élancements dans leur intérieur.-Pression sur le globe des yeux, surtout en les tournant. - Larmoiement très fort. - Larmes âcres. - Ardeur dans les yeux, qui contraint à les fermer. à ne pouvoir les ouvrir. - Inflammation des yeux. - Presbyopie. - Dilatation des pupilles. - Rougeur de la sclérotique avec gonflement des veines. - En fixant un objet la vue se trouble. -Scintillement devant les yeux.

Serrement, prurit et cuisson à l'oreille extérieure. — Douleur pressive dans l'oreille comme par une cheville. — Déchirement tressaillant dans les oreilles. — Étreintes dans les oreilles. — Sensation d'obturation dans les oreilles, quelquefois avec dureté de l'ouie, d'autres fois sans dureté. — Surdité périodique. — Mouvement, bruit et pulsation dans les oreilles.

Prurit fourmillant au nez. — Fourmillement et térébration élançante dans le nez. — Éruption dartreuse qui produit une vive douleur au nez.

Gonflement, bouffissure de la face avec pâleur après le réveil du matin et même après le sommeil dans la journée.

— Pression tressaillante, déchirante, et brûlure dans la région des os de la pommette. — Cercle jaune autour des yeux.

Brûlure et tension des lèvres.

Odontalgie pulsative déchirante, augmentée par l'eau froide, par l'air; elle se dissipe quand on se couche. — Odontalgie de suite après avoir mangé. — Odontalgie le soir en fumant du tabac. — Odontalgie tressaillante dans les dents creuses.

Fendillement de la langue, comme si clle allait se dépouiller de l'épitélium.— Vésicules sur la langue et au palais avec douleur brûlante. — Sensation de gonflement à la base de la langue. — Accumulation de mucosité aqueuse ou jaunâtre dans la bouche et le pharynx. — Grande quantité de mucus semblable à la salive, qu'on est forcé de cracher souvent. — Odeur fétide de la bouche.

Gonflement dur, sans douleur, des glandes du cou.

Goût fétide, putride dans la bouche.

— Défaut d'appétit avec forte soif. —
Dégoût entier pour le tabac et le café. —
Boulimie avec nausée.

Renvois fréquents à vide, après chaque repas. — Renvois acides.

Pression dans l'estomac et dans la région précordiale comme par un poids.— Elancements dans l'épigastre.

Pincements de coliques dans le bas-ventre. — Tranchées après midi, dans la région du nombril, avec froid. — Diarrhée et abondance d'urine.

Elancements dans le bas-ventre. — Mal de ventre dans la région du nombril comme par un gonflement dur, semblable à une pelote. — Bruit et borborygmes dans le ventre par des vents. — Expulsion de vents fétides.

Selle blanche chaque jour. — Expul-

sion de masses de mucosités épaisses quand on croit ne chasser qu'un vent. — Fréquents et inutiles efforts pour aller à la selle. — Selle dure, enveloppée de beaucoup de mucosités, qui ne s'échappe qu'après de grands efforts. — Diarrhée de matière ténue et de mucus. — Symptômes de vers.

Fréquente envie d'uriner, avec excrétion abondante, même la nuit. — Urine avec sédiment blanchâtre. — Évacuation subite et involontaire de quelques gouttes d'urine avec cuisson au bout de l'urètre.

Érections fréquentes avec des pensées voluptueuses sans avoir une véritable disposition physique.

Écoulement de beaucoup de mucus nasal par l'ouverture postérieure des narines, avec obturation et sécheresse du nez. — Fièvre catarrhale avec enrouement. — Chaleur sèche sans soif, yeux proéminents, céphalalgie violente et envie de pleurer avec coriza fluent.

Toux subite, violente, avec péril de suffocation, comme produite par l'afflux d'une grande quantité de fluide dans la trachée.—Toux sèche, creuse, violente, avec respiration entrecoupée.

Pression violente, douloureuse sur la poitrine. - Douleur déchirante à la poitrine. — Contraction élançante, sécante de la poitrine, avec anxiété et respiration difficile. - Douleurs élançantes dans la poitrine.-Elancements rhythmiques dans la région du cœur avec oppression de poitrine. - Élancements tensifs dans la poitrine, surtout pendant la respiration. - Élancements pinçants dans le diaphragme, avec gêne de la respiration.-Palpitations de cœur violentes, telles qu'oh peut les entendre et les apercevoir au travers des vêtemens; quelquefois elles ont lieu avec oppression penible de la poitrine, augmentent quand on s'asseoit et qu'on se penche en avant. - Maladies du cœur. - In-

Élancements douloureux dans le dos, même pendant la respiration.

flammation du cœur.

176 Spigelia.

Petits boutons brûlants, pruriants, durs, dans la paume de la main. — Petits boutons suppurants aux doigts. — Tiraillement dans les fléchisseurs des doigts tels qu'ils deviennent contractés.

Excroissances verruqueuses aux orteils. Douleurs élançantes dans les membres.

Douleurs élançantes dans les membres. — Déchirements arthritiques dans les membres. — Sensibilité douloureuse au toucher dans tout le corps, avec douleur et horripilation quand on touche la partie malade, ou fourmillement dans tout le corps. — Pesanteur et douleur de brisement dans tous les membres avec disposition au vertige quand on se met debout. — Lassitude avec tremblement des mains, en saisissant un objet, et pesanteur dans les pieds, surtout après un mouvement modéré au grand air.

Grande somnolence le soir; on s'endort très tard quand on est couché. — Sommeil agité avec inquiétude dans les membres. — Sommeil qui ne repose pas; on se lève plus fatigué que quand on s'est couché.

Beaucoup de frissonnement, surtout le matin et par le plus léger mouvement. — Chaleur avec soif pour la bière.

Agitation, anxiété et souci pour l'avenir. — Mauvaise humeur.

## 123. SPONGIA TOSTA.

Dur. D'ACT., 20 à 30 j. — ANTID.: Camph. —
Puiss., X.

Vertige comme si la tête allait tomber de côté. — Titubation.

Faiblesse et émoussement de l'intelligence, qui rend inapte au travail d'esprit.

Lourdeur et plénitude de la tête. — Congestion sanguine à la tête, avec la sensation comme si le cerveau voulait s'échapper par le front. — Pulsation et battement dans la tête. — Céphalalgie pressive comme si la tête allait éclater.

Spongia tosta.

Sensibilité désagréable au cuir chevelu, avec la sensation comme si les cheveux se hérissaient.

Pesanteur pressive et contraction dans les paupières.— Pression et élancements dans les yeux.— Larmoiement et céphalalgie quand on fixe un objet longtemps.

Ulcération de l'oreille extérieure. — Serrement pressif dans l'oreille. — Dureté de l'ouie.

Visage pâle, yeux enfoncés. — Prurit et élancements aux joues. — Gonflement de la face. — Douleur tensive dans les articulations de la mâchoire. — Gonflement des glandes sous-maxillaires, avec douleur tensive.

Éruption à la pointe du nez et aux lèvres.

Boutons brûlants, élançants, qui s'excorient, au bord de la langue et la face interne des joues.

Gonflement douloureux des gencives.

Douleur élançante dans les muscles du cou. — Goître. — Pression et fourmillement dans le goître.

Goût amer à la gorge. — Renvois amers. — Hoquet fréquent. — Faim vive. — On ne peut supporter la fumée du tabac. — Goût douceâtre à la bouche.

On ne peut supporter des vêtements qui serrent la région du nombril.

Tranchée après le dîner. — Fouillement et étranglement spasmodique dans le bas-ventre. — Douleur dans l'anneau inguinal comme par une hernie. — Gonflement des glandes de l'aine.

Selle diarrhéique, blanche.—Tenesme pendant la selle. —Élancements dans l'anus et grouillement dans le ventre avant la garde-robe. — Fourmillement au rectum et sortie des ascarides.

Excrétion d'urine augmentée.—Le jet d'urine est mince.—Urine avec sédiment grisâtre, gris blanchâtre ou jaunâtre. — Gonflement dur des testicules et du cordon spermatique, avec douleur pressive.

Règles trop tôt et trop fortes.—Tiraillements dans les cuisses pendant les règles.—Palpitations de cœur avant les règles.

Enrouement.—Voix faible, cassée.—
Toux avec coriza fluent ou sec.—Grande sécheresse avec ardeur et constriction dans le larynx. — Douleur au larynx, au toucher et en tournant la tête.—Respiration difficile comme si la trachée-artère était bouchée.—Accès de râle dans la trachée-artère.—Inspiration sifflante.—Respiration lente, profonde, comme quand on est fatigué. — Angine membraneuse. — Phthisie laryngée.

Toux creuse, sèche et d'aboiement jour et nuit. — Toux avec douleur brûlante dans la poitrine, comme si elle était excoriée. — Toux chronique.

Faiblesse dans la poitrine produite par le plus petit effort ou le plus léger mouvement, avec congestion, gêne de la respiration, anxiété et nausée jusqu'à la syncope. — Élancements dans la poitrine.

Tension douloureuse, avec raideur à l'extérieur de la gorge et au cou en tournant la tête.

Grande vésicule à l'avant-bras droit.— Gonflement des mains avec raideur des doigts. — Épaisseur et raideur de la première phalange du médium, avec raideur quand on fléchit les doigts.—Engourdissement et insensibilité des bouts des doigts.

Déchirements dans les jambes. — Raideur dans les jambes.

Douleur de courbature dans toutes les extrémités.—Pesanteur du corps.—Sensation d'engourdissement dans la partie inférieure du corps.—Affaissement physique et moral au plus haut degré. — Maladies des glandes. — Maladies du système lymphatique. — On se trouve mieux couché horizontalement.

Fourmillement à la peau.—Prurit rongeant avec sensation de froid; quand on se gratte, il paraît des boutons miliaires.  Élancements fréquents avec prurit qui force à gratter. Éruption pruriante.
 Éruption rouge pruriante sous forme de taches.

Insomnie avec rêvasseries avant de s'endormir. — Rêves tristes, anxieux, effrayants.

Froid général, intense, surtout dans le dos. — Accès de chaleur passagère, avec anxiété, pleurs, douleur dans la région précordiale et désespoir.

Grande timidité, caractère méticuleux, rétif. — Gaîté démesurée. — Grande envie de chanter.

## 124. SQUILLA MARITIMA.

Dur. D'ACT., 14 j .-- ANTID.: Camph.-Puiss., IV.

Le matin, vertige à tomber de côté.— Vertige avec nausée.

Embarras pressif et pesanteur de la tête.—Céphalalgie élançante, tiraillante.

— Tous les matins une sensibilité dou-loureuse au vertex.

Contraction des yeux. — Rétrécissement des pupilles. — Regard fixe.

Aspect du visage très changeant; il exprime tantôt la gaîté, tantôt il devient altéré; les traits sont tendus, ils grimacent; les yeux sont fortement ouverts et le regard est fixe.

Le mucus des narines est si âcre qu'il produit des exceriations. — Éruptions rongeantes, pruriantes, élançantes, humides, au-dessous du nez.

Apreté et ardeur au palais et à la gorge. — Boutons sur la langue.

Insipidité des aliments. — Goût douceâtre, désagréable, des aliments, surtout de la viande et des potages. — Perte d'appétit. — Forte boulimie.

Nausée et envie de vomir.—Envie de vomir alternant continuellement avec le travail pour la diarrhée.

Faiblesse d'estomac qui ne digère que

difficilement.—Pression à l'estomac comme par une pierre.

Gargouillement bruyant dans le basventre comme par des vents. — Pincement dans le ventre comme par des vents. — Expulsion fréquente de vents. — Inflammation des entrailles.

Selle dure, insuffisante. — Diarrhée brune, ténue, muqueuse, avec beaucoup de vents. — Ascarides et des filaments blanchâtres. — Selles sanguinolentes.

Grand besoin d'uriner, avec émission abondante d'urine (diabétès.)

Métrorrhagie.

Coriza fluent avec démangeaison, éternuement fréquent et narines ulcérées.

Toux par chatouillement au-dessous du cartilage xiphoïde ou produite par une inspiration profonde. — Toux avec crachats muqueux. — Toux avec douleur ébranlante dans le bas-ventre. — Toux riolente avec élancement dans les côtés de la poitrine à chaque secousse et expectoration.

Oppression de la poitrine avec respiration accélérée, anxieuse, et élancement dans la poitrine pendant l'inspiration. — Élancement pressif, tressaillant, dans la poitrine, dans les côtés de la poitrine, avec difficulté de respirer. — Pneumonie. — Fièvre aiguë, pleurétique.

Raideur à la nuque et à la gorge.—Tiraillement rhumatismal et serrement dans les muscles du cou. — Sensibilité extérieure des téguments du cou quand on les frotte.—Boutons au cou, douloureux au frottement.—Éruption pruriante au dos.

Sueur sous les aisselles.—Élancements dans les articulations de la main, du poignet aux doigts.

Tressaillements convulsifs dans les extrémités. — Tiraillement rhumatismal dans les cuisses étant assis et en marchant. — Douleur brûlante comme celle d'engelure au talon. — Sueur aux orteils.

Douleurs obtuses de rhumatisme augmentées par le mouvement et diminuées par le repos. — Grande facilité à s'excorier dans les plis des jointures. — Ondulation artérielle dans les muscles de différentes parties du corps. — Inquiétude dans les membres supérieurs et inférieurs qui force à les mouvoir continuellement.

Taches rouges sur différentes parties du corps, qui se transforment en boutons comme ceux d'une gale confluente, avec prurit brûlant.

Sommeil inquiet, agité, avec réveil fréquent et jactation.

Les mains et les pieds sont froids et le corps est chaud. — Frissonnement. — Chaleur sèche, brûlante. — Chaleur légère à la face par le plus petit mouvement et par la parole.

Mauvaise humeur avec dégoût pour toute espèce de travail.—Anxiété et peur de la mort.

### 125. STANNUM.

DUR. D'ACT., 3 sem .- ANTID.: Puls .- Puiss., II.

Vertige étant assis avec perte des

Le matin céphalalgie, nausées et mauvaise humeur.—Céphalalgie avec battements dans les tempes.—Céphalalgie frontale vague avec pression et assourdissement.—Chaleur dans la région frontale, dans le nez, dans les yeux, avec nausées.

Tressaillements et frémissements des paupières. — Élancements brûlants aux paupières. — Orgelet. — Suppuration nocturne des yeux. — Ulcération à l'angle interne des yeux, comme une fistule lacrymale. — Yeux ternes, troubles, enfoncés. — Convulsions des yeux.

Tiraillement et serrement dans l'oreille. — Tintement d'oreilles. — Le trou des boucles des oreilles suppure. — Bruit dans les oreilles en se mouchant.

Face pâle et cave. — Tiraillements et pressions douloureuses dans les pommet-

tes et les orbites. — Serrement dans les mâchoires. — Gonflement de la mâchoire supérfeure et des joues. — Gonflement douloureux des glandes sous-maxillaires. — Douleur et ardeur des muscles de la face.

Sensation d'obturation et de pesanteur dans la racine du nez.

Ébranlement des dents.

Faiblesse et difficulté de la parole par manque des forces. -- Odeur désagréable de la bouche.

Beaucoup de mucosités dans la bouche et dans la gorge, avec envie de crachoter, ce qui produit une forte douleur d'écorchure dans la gorge. — Apreté dans la gorge. — Après avoir craché la voix est plus haute.

Faim insatiable. — Soif augmentée. — Goût herbacé de la bière.

Après le dîner malaise dans le pharynx et le gosier, suivi d'un vomissement amer. — Vomiturition violente suivie de vomissements d'aliments non digérés.— Vomissement de sang.

Tension pressive dans la région précordiale.—Pression violente à l'estomac. — Crampe chronique de l'estomac. — Crampe et serrement comme une griffe à l'estomac et autour du nombril, avec malaise générale. — Crampe d'estomac avec renvois amers.— Sentiment de faim dans l'estomac, avec diarrhée.

Douleur crampoïde spasmodique audessus et au-dessous du nombril.—Pression dans la région du foie. — Sensation de vide dans le bas-ventre.—Déplacement des vents.—Fouillement dans le bas-ventre avant chaque selle.—Pression dans le bas-ventre comme avant l'apparition des règles et augmentée par la pression extérieure.

Envie fréquente et efforts inutiles pour aller à la selle. — Selle sèche, dure, globuleuse. — Selle peu abondante, verdâtre. — Selle muqueuse.

Urine rare. — Envie faible d'uriner comme si la vessie était insensible; la

plénitude de la vessie indique le besoin. — Envie fréquente d'uriner.

Augmentation de l'appétit vênérien. — Irritation violente et voluptueuse qui porte à l'émission du sperme. —Pollutions nocturnes.

Menstrues abondantes. — Anxiété et mélancolie avant les règles. — Leucorrhée muqueuse transparente avec grande perte des forces.

Coriza sec d'un seul côté. — Enrouement et âpreté dans la trachée. — Mucosités abondantes dans la trachée, facilement expectorées après une toux légère. — Phthisie trachéale.

Toux violente, sèche le soir, au lit, jusqu'à minuit. — Toux par chatouillement dans la poitrine. — Toux pendant la journée avec crachats verdâtres, douceâtres. — Toux avec crachats avec goût putride. — Toux avec expectoration de mucosité abondante. — Douleur d'excoriation dans la poitrine après l'expectoration. — Phthisie ulcéreuse. — Phthisie muqueuse.

Le soir oppression avec sensation de vide dans la région précordiale et anxiété qui force à desserrer ses vêtements. — Oppression en marchant et en montant. — Ronflement dans la poitrine. — Élancements dans le côté gauché de la poitrine en respirant et étant couché sur le côté droit. — En inspirant profondément sensation d'une légèreté agréable. — Tension au-dessous de la poitrine. — Le soir constriction de la poitrine avec apxiété. — Sensation de faiblesse dans la poitrine. — Hydrothorax.

Elancements dans les omoplates et dans la nuque. — Opisthotonos. — Faiblesse des muscles de la nuque et craquement des vertèbres en remuant la tête.

Douleur dans l'articulation de l'aisselle qui la rend raide. — Lourdeur et raideur des bras. — Gonflement des mains le soir. — Engelures aux mains. — Envie douloureuse. — Chaleur brûlante aux mains et aux pieds. — Tressaillement dans les

mains. — Crampes contractives dans les doigts. — Petites taches rouges sur le dos de la main.

Lassitudes paralytiques et pesanteur des extrémités inférieures. — Tiraillement pressif dans la hanche jusqu'audessous des lombes.—Raideur et tension dans les jarrets. — Le soir gonflement des malléoles. — Sensation pénible de chaleur aux pieds.

Grande lassitude physique et morale avec de légers tremblements, même quand on se meut lentement. — Grand amaigrissement. — Grande fatigue en parlant. — Crampes hystériques et hypochondriaques et douleur dans le bas-ventre et la région du diaphragme. — Épilepsie le soir avec jactation et les pouces fermés. — Convulsion épileptique des enfants pendant la dentition. — Paralysie des bras et des jambes. — Tiraillements pressifs dans les membres.

En marchant tous les symptômes disparaissent, excepté la lassitude; mais ils reviennent dans le repos.—Les symptômes, surtout le tiraillement pressif, commencent doucement, parviennent graduellement jusqu'à un degré d'intensité remarquable et se dissipent de la même manière.

Somnolence pendant la journée. — Bâillements fréquents avec serrement de la poitrine comme par un cercle. — On s'endort tard. — La nuit agitation avec beaucoup de rêves. — Insomnie le matin.

Avant midi frissonnement et horripilation avec froid des mains et insensibilité du bout des doigts.— Le soir frissonnement qui parcourt le dos, quelquefois seulement il a lieu à la tête, avec soif. Sensation de chaleur avec anxiété au plus léger mouvement. — Sueur nocturne très débilitante. — Le matin forte sueur.

Grande agitation. Dépit. Morosité taciturne. Misanthropie et aversion pour la conversation. Emportement colérique qui se dissipe rapidement. Maxiété et pleurs. Découragement.

### 126. STAPHISAGRIA.

Dur. D'ACT., 3 sem.—Antid.: Camph.—Puiss., X.

Vertige dans la chambre étant assis ou couché, amélioré en marchant.

La tête est vide, embarrassée.—Grand émoussement de l'esprit qui rend inapte au travail. — Faiblesse de la mémoire.

Lourdeur de la tête soulagée en la soutenant. — Céphalalgie pendant le mouvement comme si le cerveau tendait à s'échapper par le front. — Céphalalgie pressive, comme si le cerveau était dans un étau ou comme si la tête allait éclater. — Élancements douloureux au front.

Douleur rhumatismale tiraillante à la tête. — Démangeaison et douleur vive au cuir chevelu. — Il se forme sur le cuir chevelu des écailles qui causent de la démangeaison. — Teigne humide, fétide, avec prurit violent. — Chute des cheveux.

Diminution de la faculté visuelle. — Frémissement devant les yeux pendant le jour et scintillement la nuit. — Le soir la lumière est entourée d'une auréole. — Prurit brûlant dans les yeux, surtout aux angles. — Chassie abondante, sèche, aux angles des yeux. — Petits boutons sur le bord des paupières. — Inflammation et suppuration des bords des paupières. — Pression et grande sécheresse dans les yeux.

Élancements dans les oreilles.—Éruption derrière les oreilles.

Visage fatigué, effilé; yeux creux, entourés d'un cercle bleu comme après une grande débauche ou une forte affection morale. — Battement et pression douloureuse dans toute la face, depuis les dents jusqu'aux yeux. — Elancements brûlants dans les os de la pommette. — Inflammation des os de la pommette. — Grande facilité de se luxer l'articulation de la mâchoire. — Eruption avec prurit à la face.

Ulcération des narines remplies de croûtes.

Lèvres croûteuses, ulcérées, avec douleur de brûlure. - Gonslement des

glandes sous-maxillaires.

Douleur et gonflement des gencives. - Les gencives deviennent pâles. - Ulcération des gencives. - Excroissances aux gencives et à l'intérieur des joues. -Odontalgie produite en inspirant l'air frais. — Odontalgie avec gonflement de la joue. - Odontalgie de suite après avoir maché ou avoir bu froid. - Odontalgie tiraillante plus forte la nuit. - Les dents deviennent noires et s'écaillent. - Les dents deviennent creuses.

Accumulation de salive à la bouche. Salive sauguinolente. - Parole faible par faiblesse des organes.

Apreté, sécheresse et grattement dans la gorge et au palais avec douleur d'excoriation en parlant et en avalant.

Goût fade, aqueux. - Goût acide du pain. - Appétit, quoique les aliments ne soient pas sapides. - Faim ardente, même quand l'estomac est plein.-Boulimie.

Renvois .- Pyrosis en fumant du tabac. Nausée et envie de vomir tous les matins.

Le matin, au lit, pression à l'estomac. Le matin, à jeun, tension anxieuse audessus des hypochondres, qui gêne la respiration. - Pression tensive dans le bas-ventre. - Tranchées après avoir mangé ou bu. - Tranchées spasmodiques avec besoin d'aller à la selle. - Gros ventre chez les enfants. - Flatuosités abondantes, déplacement des vents. -Expulsion de beaucoup de vents fétides. -Vents chauds. - Gonflement des glandes de l'aine.

Evacuation involontaire d'une selle liquide quand on n'a que la sensation d'expulsion d'un vent. - Constipation ou selle dure et peu abondante (rarement liquide) avec mal de ventre et besoin d'aller. - Selle entremêlée de vents. -Après les selles, tranchées et tenesmes. - Tranchées brûlantes. - Pression et constriction dans l'anus en allant à la selle. - Selle dyssentérique. - Prurit à l'anus.

Envie fréquente d'uriner, avec émission de peu d'urine foncée, avec un jet mince et même par gouttes. - Après avoir uriné on en sent encore le besoin comme si la vessie ne s'était pas vidée. - Cuisson dans l'urètre en urinant. -- En toussant écoulement involontaire d'urine.

Appétit vénérien très augmenté. - Érections fréquentes surtout la nuit. - Pollutions fréquentes, même pendant le sommeil de la journée. - Évacuation d'humeur prostatique pendant une garderobe dure. - Suites fâcheuses de l'onanisme. — Prurit voluptueux au scrotum qui excite l'évacuation du sperme. - A la fin du coît oppression de la poitrine. - Inflammation des testicules (condylomes).

Sensibilité douloureuse des parties génitales de la femme. - Inflammation des

ovaires (règles trop tôt).

Coriza violent avec obstruction des narines d'un seul côté. - Éternuement fréquent et larmoiement. - Mucus visqueux et adhérent dans la trachée-artère. - Coriza avec ulcération des parines.

Toux avec expuition de mucosité. -Toux avec crachats puriformes jaunes, surtout la nuit. - Douleur derrière le sternum, comme celle d'une ulcération en toussant.

Pesanteur pressive dans la poitrine étant assis, améliorée par la marche. -Oppression contractive de la poitrine avec agitation qui force à changer de place. - Elancements dans la poitrine. - Douleur d'excoriation au-dessous et au milieu du sternum. - Palpitations frémissantes du cœur par le plus léger mouvement et en écoutant la musique. - Palpitation du cœur après le sommeil de midi.

Douleur au sacrum en se levant de son siège et en tournant le corps dans le lit. - Douleur au sacrum; il est comme brisė. -- Douleur au sacrum, surtout dans le repos, comme quand on s'est donné un tour de reins. — Pression et tension rhumatismale avec raideur dans la nuque. — Éruption de boutons pruriants à la nuque. — Abcès dans les muscles des lombes. — Les glandes du cou sont gonflées.

Tiraillement et pression avec raideur dans les extrémités, plus forts pendant le mouvement et au toucher. — Pression douloureuse dans le périoste de l'humérus, surtout au toucher. — Gonflement des glandes de l'aisselle. — Dartres aux mains avec prurit le soir et cuisson après le grattement. — Engourdissement et insensibilité du bout des doigts, comme s'ils étaient enveloppés d'une membrane épaisse. — Déchirement tressaillant dans les doigts, surtout à leur extrémité.

Douleur de brisure dans les muscles des cuisses en marchant. — Élancements dans les jarrets et autour des genoux. — Déchirement dans les membres inférieurs. — Dartre pruriante aux cuisses et aux jambes. — Crampe nocturne dans les mollets et dans les talons. — Exostose à l'os du métatarse qui soutient le petit orteil, douloureuse au toucher. — Gonflement du dos du pied. — Prurit dans les orteils comme s'ils avaient été gelés.

Tiraillement et raideur dans les articulations, surtout pendant le mouvement de ces parties. - Déchirement tiraillant dans les muscles, surtout étant assis. -Elancements aigus et profonds dans différentes parties du corps. - Douleur générale des muscles au toucher et des articulations pendant le mouvement. --Forte courbature et lassitude, surtout dans les genoux, plus fortes pendant le mouvement, améliorées étant assis et couché, - Grande lassitude le matin, avec raideur de toutes les articulations, surtout de l'épaule, du sacrum et des hanches. - Suites fâcheuses de l'abus du mercure.

Prurit fourmillant qui parcourt la tête et le corps, surtout le matin. — Éruptions

de nodosités pruriantes, humides, avec douleur brûlante au corps et aux cuisses.

— Miliaire chronique. — Éruption dartreuse. — La peau s'ulcère très facilement. — Furoncles fréquents. — Ulcères avec élancements déchirants, ou vive démangeaison. — Nodosités arthritiques des articulations des doigts. — Symptômes de scrofule. — Maladies des os. — Carie.

Bâillements fréquents et pendiculation à faire couler les larmes. — Grande somnolence pendant le jour. — Lourdeur des membres après le sommeil de midi. — On s'endort tard ou on se réveille de très bonne heure. — On ne peut s'endormir, étant assailli par la foule d'idées, ou par le prurit, l'ardeur des dartres et des ulcères, ou par de violentes crampes des mollets. — Rêves lascifs. — Sommeil agité par des rêves effrayants ou par des soubresauts. — Tressaillements et soubresauts pendant le sommeil.

Prédominence de froid et d'horripilation même la nuit. — Fièvre intermittente le soir, qui ne se caractérise que par le froid. — Sensation de chaleur brûlante extérieurement, avec bouillonnement du sang et soif. — La nuit chaleur violente aux mains et aux pieds qu'on est obligé de mettre à l'air. — Forte sueur nocturne. — Sueur nocturne d'odeur putride. — Grande disposition à suer, même dans le repos, assis pendant le jour.

Anxiété et agitation qui ne permet pas le repos dans aucune situation.—Crainte de l'avenir. — Mauvaise humeur; on s'afflige sur son état. — Tristesse; on craint toujours quelque chose de pire. — Humeur hypochondriaque et indifférence pour tout. — Suite fâcheuse de l'onanisme. — Dégoût pour tout travail physique et intellectuel. — Aberration de l'imagination avec désir de la mort.—Mauvaise suite de chagrin, de souci, de chagrin avec indignation.

### 127. STRONTIANA.

DUR. D'ACT., 30 j.-ANTID.: Camph.-Puiss., X.

Vertige avec céphalalgie et nausée. Grand oubli.

Pression douloureuse au front. — Cephalalgie lancinante. — Résonnement dans les tempes le soir. — Après midi grande sensation de chaleur dans la tête et au visage, qui est rouge, avec anxiété et somnolence en marchant. — Tension douloureuse à la tête comme si le cuir chevelu était tendu.

Pression sur la partie supérieure du globe de l'œil. — Guisson dans les yeux. — Tressaillement et fourmillement violent aux paupières. — Après avoir frotté les yeux ardeur comme s'il y avait du sable; on voit des anneaux bleus et rouges. — On voit dans l'obscurité des taches rouges devant les yeux.

Rougeur de la face avec chaleur brûlante. — Prurit au visage. — Douleur violente, térébrante, dans la pommette droite.

On mouche des croûtes sanguinolentes.

Frémissements dans le côté gauche du

Odontalgie tressaillante. — Tiraillements douloureux dans les dents, précédés d'une augmentation de salive dans la bouche. — Gencives gonflées, douloureuses au toucher.

Le matin sécheresse et douleur d'engourdissement dans la bouche; cependant la salive n'est pas moins abondante.

Manque d'appétit; on n'a de goût que pour le pain bis. — Faim après le dîner. — Grande soif pour la bière. — Hoquet violent. — Goût imaginaire.

Malaise avec chaleur brûlante à la face. Pression à l'estomac avec sensation de plénitude dans le bas-ventre.

Mal de ventre dans la région du nombril. — Tranchées avec diarrhée et froid.— Abondance de flatuosités. — Élancements dans les hypochondres.

Selles retardées, dures, noueuses, qui ne s'effectuent que par de grands efforts et avec douleur. — Diarrhée liquide jaunâtre. — Après l'évacuation brûlure à l'anus. — Douleur hémorrhoïdale dans l'anus.

Diminution de l'urine. — Urine pâle, d'odeur fortement ammoniacale.

Règles très retardées, d'abord séreuses, ensuite en caillots.

Enrouement et rudesse à la gorge qui provoque la toux.

Toux sèche par chatouillement dans la trachée, plus forte la nuit.

Oppression en marchant, avec chaleur au visage. — Douleur pressive à la poitrine. — Douleur tiraillante dans les muscles de la poitrine. — Palpitations de cœur.

Douleur tiraillante dans le dos et les lombes. — Douleur de brisure dans le sacrum et dans le dos.

Déchirement dans les membres, surtout dans les articulations, plus violent le soir et la nuit au lit. — Le soir, étant au lit, tension de la peau de la tête, de la poitrine, du dos, des lombes et des pieds. — Le soir les mouvements des membres d'un côté sont gênés comme par l'effet d'une paralysie. — Le matin et le soir grande lassitude et courbature. — Grand amaigrissement.

Les symptômes commencent lentement, s'élèvent à une certaine intensité, pour diminuer de la même manière. — Les douleurs sont extrêmement fugaces; on ne peut guère déterminer leur siège; cependant elles paraissent exister dans le canal médullaire des os longs. — On se trouve mieux au grand air, à la chaleur en général, surtout au soleil.

Éruptions de petits boutons dans différentes parties du corps, avec prurit brûlant, surtout après le grattement.

On s'endort tard. — Tressaillement et sursauts en s'endormant. — La nuit ré-

184 Strontiana.

veil fréquent, occasionné surtout par une toux sèche. — Sommeil plein de rêves fantastiques.

Avant midi et le soir frisson. — Chaleur qui sort du nez et de la bouche. — Soif. — Chaleur sèche la nuit. — Forte sueur nocturne et douleur subite dans un membre quand on le découvre. — Sueur sur une partie malade.

Anxiété et crainte. — Mauvaise humeur avec disposition à la colère.

### 128. SULPHUR.

Dur. D'act., 40 j.—Antid.: Camph., merc., nux, puls., sep.—Puiss., VI-X.

Vertige étant assis. — Vertige avec épistaxis. — Vertige en passant une rivière.

Embarras de la tête avec difficulté de penser. - Grande faiblesse de la mémoire. - CÉPHALALGIE AVEC BATTEMENT, CHA-LEUR INTÉRIEURE PRODUITE PAR UNE CON-GESTION SANGUINE, SURTOUT LE MATIN ET LE SOIR. - Fourmillement, bruissement, bourdonnement dans la tête. -- Céphalalgie comme par un bandeau serré autour de la tête. - Céphalalgie avec nausée. - Élancements au front. - Pression dans les tempes de dedans en dehors. -La céphalalgie augmente en plein air et diminue dans la chambre. - Céphalalgie périodique de huit en huit jours, qui consiste en pression, déchirement et assourdissement. - Céphalalgie battante, déchirante.

Éruption du cuir chevelu. — Teigne. — Chute des cheveux, même chez les femmes en couches. — Éruption abondante au front.

Rougeur et instammation des paupières avec brûlure et sécrétion abondante de chassie. — Contraction des paupières le matin. — La vive lumière du jour est insupportable. — Scintillement devant les yeux. — Presbyopie. — Voile devant les

Sulphur.

yeux. — Ophtalmie. — Douleur comme
par un corps étranger introduit dans les
paupières. — Cornée trouble comme cou-

verte de poussière. — Amaurose commençante. — Cécité dans le jour. Bruit et murmure devant les oreilles.

— Bourdonnement et bruissement dans les oreilles. — Sensibilité excessive de l'ouïe. — Obturation des oreilles avec congestion. — Écoulement purulent par l'oreille. — Bruit dans l'oreille comme s'il y avait de l'eau. — Ardeur violente dans les oreilles du dedans en dehors. — Élancements derrière l'oreille jusqu'aux yeux,

Face pâle, maladive. — Chaleur, rougeur de la face, taches rouges. — Érysipèle. — Gourme. — Éruption chronique d la face. — Yeux caves, bordés de bleu.

après du chagrin.

Sécheresse des narines. — Épistaxis. — Ulcère sec des narines. — Taches noires sur le nez, la lèvre supérieure et au menton. — Cuisson dans la partie supérieure du nez. — Éphélides sur le nez. — Odeur des narines comme celle du coriza ou de corne brûlée.

Tache hépatique sur la lèvre supérieure.—Gonflement des lèvres et des glandes sous-maxillaires. — Cancer des lèvres.

Gonslement et saignement des gencives. — Gonslement aux gencives avec douleur et battement. — Odontalgie le soir. — Odontalgie au grand air et par un courant d'air. — Secousses élançantes dans les dents creuses. — Grande sensibilité des dents. — Ébranlement des dents.

Le matin sécheresse de la bouche avec soif, la langue humide, écumeuse et muqueuse. — Aphtes chez les enfants. — Salivation. — Stomacace. — Odeur fétide de la bouche après le repas.

Gonslement de la luette et des amygdales. — Douleur chronique à la gorge
comme s'il y avait un corps étranger. —
Mal de gorge à vide en avalant, comme
si on avalait un morceau de chair. — Inflammation de la gorge avec douleur
d'excoriation, élancement hors le temps

de la déglutition et douleur au toucher.

Manque complet d'appétit avec dégoût pour la viande et pour le pain. — Appétit trop fort. — Faim violente. — Soil continuelle surtout pour la bière. — (Insipidité des aliments.) — Goût amer ou trop salé des aliments. — On ne désire que des choses acides. — Après avoir mangé, oppression sur la poitrine comme par un poids. — Goût douceâtre, putride. — Amertume à la bouche le matin; elle se dissipe par le manger.

Renvois fétides la nuit pendant le sommeil. — Rapports acides. — Régurgitation des aliments. — Aigreurs.

Malaise avant le repas. — Nausées après le dîner. — Le matin nausées. — Après midi et la nuit nausées et vomissement acide et amer, et sueur froide au visage. — Vomissement de sang. — Vomissement des aliments. — Vomissement aqueux.

Sensibilité de la région de l'estomac.

— Pression à l'estomac après le repas.

— Crampes à l'estomac la nuit. — Fouillement dans la région précordiale. — Brûlure dans l'estomac et la région précordiale.

Élancements dans le côté gauche du ventre en marchant. — Élancements dans le côté gauche de l'ombilic en marchant. — Inflammation chronique du foie. — Coliques hémorrhoidales. — Mal de ventre après avoir bu. — Déplacement des vents. — Pression dans toute la région hypogastrique comme s'il y avait quelque chose de serré dans l'intérieur. — Gonflement des glandes de l'aine. — Hernie. — Hydropisie ascite.

Envie fréquente et inutile d'aller à la selle. — Selles dures, noueuses. — Constipation chronique. — Selle seulement tous les deux ou trois jours. — Selles diarrhéiques, dyssentériques, avec mal de ventre et tenesme violent. — Diarrhée chez les femmes enceintes. — Diarrhée nocturne avec forts tenesmes après chaque évacuation. — Diarrhée aqueuse ou de mucosité blanche jour et nuit. — Chute du rectum.

— Expulsion d'ascarides. — Hémorrhoïdes fluentes.

Pendant la nuit on urine abondamment et fréquemment; l'urine coule avec force. — Tenesme urinaire. — Hémorrhoïdes de la vessie. — Pissement au lit la nuit. — Suppression de la sécrétion des urines. — Rougeur et inflammation de l'orifice de l'urètre.

Faiblesse de l'action génitale.—Accroissement de l'appétit vénérien. — Inflammation du prépuce. — Gonorrhée bâtarde. — Gonorrhée chronique. — Suites fâcheuses de l'onanisme. — Excoriation humide du scrotum. — Hydrocèle. — Engorgement des testicules.

Règles trop tôt et trop fortes. — Règles en trop petite quantité. — Suppression des règles. — Céphalalgie avant l'apparition des règles. — Stérilité. — Leucorrhée. — Leucorrhée muqueuse. — Pression sur les parties génitales. — Avortement.

Coriza. — Apreté dans la gorge avec enrouement et abondance de mucosité dans la poitrine. — Chatouillement dans le larynx qui cause la toux. — Respiration difficile. — Oppression avec sifflement et ronflement de poitrine et palpitations visibles du cœur. — Respiration gênée en marchant au grand air. — Accès noclurne de suffocations.

Toux nocturne. — Toux sèche jour et nuit, avec contraction crampoïde de la poitrine et étranglement à vomir. — Coqueluche chronique.

Plénitude de la poitrine, — Sensation de froid dans la poitrine et ardeur qui s'étend jusqu'au visage, avec palpitation de cœur. — Pression sur le sternum. — Phthisie ulcéreuse. — Inflammation des mamelles. — Écorchure des mamelons. — Gerçures et douleur brûlante aux mamelons. — Cancer des seins. — Palpitations du cœur. — Forte congestion sanguine vers la poitrine et le cœur.

Douleur au sacrum en marchant et en quittant son siège. — Tirailtements dans le dos. — Déviation rachitique de la co-

lonne vertébrale. — Ankylose des vertèbres. — Corps courbé en marchant.

Tiraillements dans les articulations du coude, de la main et des doigts.—Faiblesse dans les bras et les genoux.— La peau des mains est gercée. — Gonflement luisant des doigts et des orteils. — Desquammation de la peau des mains et des doigts. — Exostose au bras. — Gonflement (et suppuration) des glandes axil-

Lourdeur des jambes. — Raideur de l'articulation du pied. — Pieds froids. — Froid et raideur des orteils. — Érysipèle aux jambes. — Plaques rouges, douloureuses et humides à l'intérieur des cuisses. — Abcès douloureux aux fesses. — Vésicules qui s'ulcèrent aux orteils. — Vésicules rongeantes aux talons. — Tuméfaction blanche des jambes. — Tiraillements et déchirements dans les jambes.

laires. - Sueur dans les aisselles.

Douleurs fugaces, élançantes, dans les articulations des membres. — Goutte des articulations avec gonflement et chaleur. — Engourdissement des membres. — La tête est fléchie en marchant. — Douleur aux os comme si la chair en était détachée. — Rachitis.

Fatigue par la parole. — Sensibilité au grand air. — Accès de convulsion épileptique, sensation de l'aura qui s'échappe des bras et du dos. — Forte effervescence du sang. — Agitation dans tous les membres qui empêche de rester long-temps assis. — Lassitude dans tous les membres qui se dissipe en marchant. — Engour-dissement des membres. — Amaigrissement. — Douleurs lors des changements de température. — Paralysie des membres avec évacuations alvines et d'urine involontaire.

La plupart des symptômes paraissent seulement dans le repos et se dissipent par le mouvement de la partie malade ou par la marche. — On se trouve plus mal debout. — Diminution des douleurs par la chaleur, augmentation par le froid. — Suites de l'abus du mercure.

Prurit à la peau, plus fort la nuit et le matin au lit quand on se réveille. — Gerçures à la peau. — Inflammation érysipélateuse avec battements et élancements. — Engelures. — Excoriations chez les enfants. — Éruption chronique. — Dartres. — Taches hépatiques. — Galle. — Éruption urticaire. — Envies. — Verrues. — Varices. — Ulcères fistuleux. — Panaris. — Enflure pâle, chaude, tendue. — Hydropisie. — Induration des glandes. — Scrofules. — Rachitis. — Carie. — Exostose. — Déviation des os. — Cors douloureux aux pieds.

Somnolence insurmontable pendant le jour.

On s'endort tard le soir. — La nuit, insomnie, agitation. — Le matin on reste long-temps endormi d'un sommeil qui ne délasse pas. — Soubresauts. — Rêves effrayants avec agitation. — On parle en dormant. — Cauchemar. — Secousses et tressaillements du corps en dormant. — Somnambulisme.

Froid, frissonnement sans soif.—Chaleur avec soif vive. — Sueur acide toutes les nuits. — Sueur au lit, matin et soir. — Sueur trop abondante en travaillant.

Irritabilité. — Irascibilité et découragement. — Inquiétude et précipitation. — Anxiété le soir. — Caractère méticuleux. — Pleurs et rires alternatifs. — Tristesse et abattement. — Éloignement pour l'habitude des lotions.

## 129. SULPHURICUM ACIDUM.

Dur. D'ACT., 8 à 10 jours.—Antid.: Puls.—Puiss., III.

Vertige étant assis dans la chambre et qui passe au grand air.

Sensation comme s'il y avait de la fumée dans un des côtés de la tête. — Sensation comme si on enfonçait un instrument obtus dans la tête par des coups de plus en plus forts. — Céphatalgie avec pression et élancement obtus

qui augmente par degrés et disparaît subitement.

Douleur d'ulcération à l'extérieur de la tête.

Pression brûlante dans les yeux au grand air, qui continue dans la chambre en regardant fixement quelque chose. — Ophtalmie chronique. — Difficulté à ouvrir les paupières.

Déchirement dans l'oreille. — Bourdonnement d'oreilles le soir. — Diminution de l'ouïe comme si une feuille était placée devant l'oreille.

Sensation de gonflement à la face et comme s'il y avait de l'albumine desséchée. — Pâleur du visage. — Gonflement des glandes sous-maxillaires.

Le soir, épistaxis.

Lèvres gercées qui s'exfolient.

Émoussement des dents. — Odontalgie plus forte le soir dans le lit, après s'être couché, augmentée par le froid, diminuée par la chaleur.

Sensation de sécheresse à la bouche.

— Forte salivation. — Aphtès dans la bouche chez les enfants.

Apreté dans la gorge.

Goût putride. — Hoquet continuel. — Sueur froide immédiatement après avoir pris des aliments chauds. — Les boissons refroidissent de suite l'estomac si on n'y ajoute pas quelques spiritueux. — Grand désir de fruits frais. — Pyrosis. — Renvois acides.

Malaise à l'estomac. — Vomissement, d'abord d'eau, ensuite des aliments.

Pression à l'estomac. — Resserrement à l'estomac le soir, comme produit par un refroidissement. — Contraction dans la région précordiale.

Sensation de chaleur dans la région du nombril. — Élancements dans les lombes. — Élancements dans la rate. — Tressaillements aigus et superficiels qui parcourent le bas-ventre. — Cuisson dans la région de l'aine. — Forte saillie d'une hernie inguinale. — Coliques de vents dans le bas-ventre avec la sensation

comme s'il devait paraître une hernie.

Envie inutile d'aller à la selle. — Selle retardée, compacte, noueuse et noire. — Diarrhée aqueuse ou de consistance de bouillie. — Évacuation de mucosités striées de sang. — Selles hachées (chez les enfants). — Selles extrêmement fétides.

Diminution de l'excrétion d'urine. — Urine d'un rouge brun qui, dans le repos, devient trouble comme si elle était mêlée d'argile. — Urine avec sédiment muqueux.

Règles trop tôt et trop fortes. — Leucorrhée. — Stérilité avec des règles trop hâtives et trop abondantes.

Coriza sec avec perte d'odorat. — Écoulement d'eau par le nez avec obturation d'une parine.

Toux brève, sèche, le matin après le lever. — Toux chronique avec crachats de sang.

Oppression. — Pression sur le côté gauche de la poitrine et la région précordiale. — Elancements dans la poitrine. — Battements du cœur sans anxiété.

Le matin raideur du dos.

Sensibilité douloureuse dans les glandes axillaires. — Déchirement et tiraillement dans tout le corps, même dans la face. — Élancements dans les articulations. — Douleur qui s'accroît et disparaît subitement comme si on appuyait un instrument obtus; elle se fait sentir dans différentes parties du corps.

Lassitude dans tout le corps avec sensation de tremblement, sans que cependant des tremblements aient lieu. — Au grand air les symptômes semblent augmenter.—Le côte gauche paraît plus fortement attaqué. — La plupart des symptômes augmentent avant midi et dans la soirée.

Petites taches bleuâtres à l'avant-bras comme produites par du sang coagulé.

— Taches rouges et prurigineuses au tibia.

— Engelures aux doigts. — Suites fâcheuses de coups, pressions ou meurtrissures.

180 Sulphüricum acidum.

Ons'endorttardetons'éveille de bonne heure. — Rêves anxieux.

La chaleur prédomine.—Sueur à chaque mouvement: Sueur matinale abondante.

Mauvaise humeur.—Alternative de sévérité et de plaisanterie. — Disposition aux pleurs.

## 130. TABACUM.

Dur. D'ACT., incon. — ANTID.: Camph., nux, ipée. — Puiss., II.

Vertige tournoyant comme si l'appartement tournait. — Vertige avec nausée et pression dans le front et les tempes.

Lourdeur de la tête, qu'on ne peut presque porter. — Congestion de sang vers la tête avec chaleur fugace et battement aux tempes. — La céphalalgie diminue au grand air. — Céphalalgie pressive.

Ardeur à l'extérieur de la tête, suivie de fourmillement.

Mal aux yeux comme quand on a longtemps pleuré. — Pression dans les yeux pendant le mouvement, avec faiblesse et vertige. — Contraction des paupières avec démangeaison dans le globe. — Vue trouble comme par un voile. — Obscurcissement de la vue en fixant quelque chose de blanc.

Élancements déchirants dans les oreilles, surtout au grand air et en écoutant la musique. — Gonflement dur, rouge, derrière les oreilles, avec élancement douloureux.

Diminution de l'odorat qui reste très sensible pour le vin.

Chaleur à la face d'un seul côté. — Elancements dans l'articulation de la mâchoire quand on rit. — Élévations granuleuses aux joues, qu'on sent au toucher.

Lèvres âpres et gercées.

Odontalgie tiraillante, déchirante. — Douleur élançante dans les dents creuses Tabacum.
quand, en mâchant, quelque chose les

Parole faible, entrecoupée.

touche.

L'eau a un goût comme si elle était mélée de vin.—Absence de faim et d'appétit. — Faim continuelle et malaise si on ne l'apaise pas.

Renvois sonores, surtout après le diner. — Renvois acides, chauds. — Pyrosis qui s'étend jusqu'à la gorge. — Hoquet.

Malaise fréquent jusqu'à la syncope, surtout pendant le mouvement.—Malaise avec pincement dans le ventre ou élancement dans les tempes. — Vomissement à chaque mouvement.—Vomissement d'un liquide putride mêlé de mucus.

Crampe contractive, serrante, à l'estomac. — Sensation de froid à l'estomac, avec envie de vomir. — Pression à l'estomac et dans la région des hypochondres, comme par un corps pesant et rond. — Élancements à travers la région précordiale jusque dans le dos.

Sensibilité dans le ventre qui ne permet pas le toucher et suivie de selle molle.—Douleur dans la région du foie, jusqu'à la région précordiale quand on la comprime.

Envie fréquente d'aller à la selle; tenesme et évacuation peu abondante.— Constipation. — Selle molle comme la bouillie. — Diarrhée jaune, verdâtre.— Tenesme et ardeur à l'anus pendant et après la garde-robe.

Urine jaunâtre, rougeâtre et augmentée.

Règles plus abondantes.

Éternuements fréquents.— Sécheresse et obturation du nez.

Toux seche produite par chatouillement, avec hoquet comme si on allait suffoquer.

— Oppression anxieuse de la poitrine. — Elancements brûlants d'excoriation dans la poitrine. —Palpitations de cœurétant couché sur le côté gauche.

Douleur contractive au sacrum, surtout

pprès avoir été à la garde-robe. — Raideur du cou qui empêche de tourner la

Tiraillements douloureux dans les membres. — Élancements dans le coude qui empêche d'étendre le bras et de s'en servir. — Raideur et faiblesse dans les bras, les mains et les pieds. — Brûlure dans les genoux et aux talons. — Taches sous l'aisselle, rouges, brûlantes au toucher.

Douleur pressive avec agitation de tout le corps et sueur et angoisse. — Convulsion dans tout le corps, avec pulsation et battement de cœur. — Faiblesse et tremblement surtout des mains et des pieds. — Amaigrissement surtout an dos et aux joues.

Somnolence surtout après le repas et vers le soir. — Sommeil agité avec soubresaut. — Le matin on se réveille très difficilement.

Prédominence du froid et de frissonnement, jusqu'au claquement de dents. — Sueur froide aux mains.

Anxiété et tristesse qui est soulagée par les pleurs. — Humeur gaie, exaltée. — Difficulté de réunir des idées; elles se succèdent rapidement.

### 131. TARAXACUM.

Dur. D'ACT., 24 j. - ANTID.: J. gutt.-Puiss., tinét.

Vertige avec chancellement en mar-

chant au grand air.

Céphalalgie pressive surtout au front.

Lourdeur à l'occiput et pression dans e fond de l'occiput. — Céphalalgie violente jui ne se manifeste qu'étant debout et en marchant. — Élancement dans le front et dans es tempes. — Sensation dans la tête comne si le cerveau était serré de tout côté ou distendu.

Le matin les paupières sont collées par à chassie.—Ardeur dans les yeux.—Inflammation des yeux avec larmoiement et photophobies mes service mei leuris etc.

Eruption de boutons suppurants aux joues, à l'aile du nez et dans les angles de la bouche.

Il s'échappe du sang acide des dents creuses.

Desquammation de la langue.—Accumulation de salive acidulée à la bouche. —
Le mucus de la bouche paraît acide et agace les dents.

Mal de gorge pressif, comme par un gonflement intérieur ou comme si le larynx était comprimé. — Tressaillement et élancement pressif dans les muscles de la gorge et de la nuque.

Goût salé, acidule des aliments.—On ne goûte pas la fumée du tabac; elle produit le pyrosis et gêne la respiration. — Renvois à vides, surtout après avoir bu. —Goût amer à la bouche et renvois amers. —Après le dîner, surtout après avoir bu, grand frissonnement.

Nausée avec céphalalgie pressive, assourdissante qui se dissipe au grand air.

Travail subit dans le bas-ventre, avec bruit comme s'il se formait des vessies qui éclatent. — Pincements dans le ventre.—Élancements pressifs dans les côtés du ventre, surtout du côté gauche.

Selles fréquentes, non consistantes, mais qui ne s'effectuent qu'avec effort.—Prurit voluptueux au périnée, qui porte à gratter.

Frequente envie d'uriner, urine abon-

Érection prolongée, pollutions fréquentes.

Éternuement fréquent en marchant au grand air.

Élancements dans la poitrine. — Tressaillements dans les muscles des côtes.

Pression au sacrum. — Élancements pressifs dans la colonne vertébrale, surtout au sacrum, avec difficulté à respirer étant couché. — Frémissement dans les épaules au-dessous des omoplates, avec froid dans tout le corps.

Taraxacum. 190

Tressaillements et battements pulsatifs dans l'humérus, comme des secousses électriques.

Tressaillements dans les muscles des bras. - Les bouts des doigts sont glacés.

Élancements dans les cuisses, les mollets et les talons. - Brûlure dans les genoux, dans les jambes et les orteils .--Sueur abondante entre les orteils.

Presque tous les symptômes paraissent seulement quand on est assis et disparaissent en marchant. - Douleur de tous les membres au toucher et dans une fausse position. - Sensation de faiblesse et de maladie dans tout le corps, avec envie continuelle de se coucher ou de s'asseoir, avec un état incertain entre la connaissance et la perte de connaissance. - Affections gastriques et bilieuses.

Bâillements fréquents et somnolence pendant la journée étant assis. - Sommeil nocturne plein de rêves; réveil fréquent, agitation. - Au réveil du sommeil de la journée envie d'uriner avec cuisson; le soir, quand on s'endort, sueur générale avec chaleur, surtout au visage.

Sensation de chaleur à la face avec rougeur. - Frisson avec céphalalgie

pressive.

Indécision et horreur pour le travail. - Loquacité; grande disposition à rire.

## 132. TARTARUS EMETICUS.

Dur. D'Act., 8 j. - Antid.: Cocc., ipéc., puls., asa. -Puiss., II.

Vertiges et lueur devant les yeux.

La tête est embarrassée, assourdie, avec la sensation du besoin de dormir.-Perte de tous les sens.

Céphalalgie avec palpitation de cœur et vertiges. - Pesanteur de la tête, surtout de l'occiput. - Céphalalgie pressive; coarctante. - Céphalalgie frontale presTartarus emeticus.

sive. - Elancement pressif au front qu descend de haut en bas, avec envie de fermer les yeux. - Céphalalgie dans la moitié droite ou gauche de la tête, comm si le cerveau était durci, coagulé, le soi et la nuit. -Tension tiraillante et fouil lement au-dessous de la racine du nez

Lassitude dans les yeux, qui donne le besoin de les fermer fortement. - Fré missement devant les yeux, surtout en se mettant sur son séant, avec troubl de la vue comme par un voile. - Amau rose commençante. - Pression sur le yeux. — Cuisson des yeux.

Face pâle.

Langue chargée, grise. - Manque de

Goût salé. - Insipidité des aliment et du tabac. - Peu d'appétit et beaucou de soif. - Fort appétit pour les fruit frais. - Soif pour l'eau froide et grande somnolence le soir. -Bon appétit, sou vent vif; mais aussitôt qu'on a pris un peu d'aliment on éprouve du dégoût.

Renvois à vide comme le hoquet. -Régurgitation d'une eau âcre. - Forte accumulation de salive à la bouche.

Étranglement violent avec sueur a front. - Une grande quantité d'eau s'é coule de la bouche.-Faiblesse des jam bes. - Malaise avec embarras de la tête pression dans la région précordiale e anxiété. — Renvois à vide. — La sorti des vents diminue la nausée pour quel que temps. - Nausée avec aversio pour le lait et pincements dans le ventre - Nausée continuelle avec envie de vomir

Vomissement avec grands efforts tremblement et contraction dans l corps. - Avant le vomissement étran glement violent avec pression dans l'es tomac et le bas-ventre comme par un pierre, et tranchées dans le ventre. Après le vomissement, quelquefois froi ( diarrhée ), grande lassitude et somne lence. - Dégoût pour les aliments. -

Visage pâle, creux. - Yeux troubles

larmoyants. - Désir de quelque chos

de rafraîchissant. — Vomissement, d'abord d'aliments, ensuite d'eau.

Sensation comme si l'estomac était surchargé, la nuit et après le dîner. — Forte pulsation dans la région de l'estomac.

Tranchées violentes et pincements dans le basventre. — Pression dans le basventre comme par une pierre, surtout
quand on est assis et courbé. — Les douleurs dans le bas-ventre produisent une
grande inquiétude morale, avec éloignement pour tout travail. — Douleur
crampoïde dans le bas-ventre, avec contraction violente des paupières et besoin
insurmontable de dormir. — Pulsations
dans le bas-ventre. — Beaucoup de flatuosités avec borborygmes et pincements
dans le bas-ventre.

Évacuation alvine de consistance de bouillie. — Diarrhée de couleur brune, jaunâtre, ou aqueuse. — Selles diarrhéiques précédées de tranchées et d'un grand travail dans le ventre. — Diarrhée précédée de vomissement. — Selles sanguinolentes. — Cuisson dans l'anus après l'évacuation. — Palpitations violentes du cœur pendant une évacuation (diarrhéique).

Sensation très pénible d'un chatouillenent brûlant qui s'étend du rectum, par 'urètre, jusqu'au gland. — Tension vioente dans le périnée en marchant, avec grande envie d'uriner.

Urine foncée, rouge, brunâtre, trouble t âcre. — Urine rouge, enflammée, qui lans le repos laisse former des filaments ougeâtres. — Forte envie d'uriner avec uisson dans l'urètre et émission d'une etite quantité de sang, quelquefois avec iolente douleur de vessie. — La nuit nvie fréquente d'uriner avec soif vioente, mais l'urine est peu abondante. — Diabétès. ) — Sensibilité. — Élancenents dans la partie postérieure de l'uètre et le bas-fond de la vessie.

Ecoulement de sang aqueux par la ulve.

Coriza violent fluent avec éternue-

ments fréquents, ulcération des narines, froid, perte de l'odorat et du goût. — Respiration courte. —Respiration difficile avec péril de suffocation le soir et le matin au lit, étant couché, et qui est soulagée en se mettant sur son séant ou par l'expectoration.

Toux après le diner avec vomissement des aliments. — Toux avec chaleur, sueur aux mains, à la tête, surtout au front. — Toux avec expectoration vers deux ou trois heures après minuit. — Accès de toux précédé de gêne de la respiration, à craindre de suffoquer, et recherche de l'air.

Oppression de poitrine; il s'élève jusqu'au cœur quelque chose de chaud. — Douleur d'excoriation par secousses dans la poitrine, qui fait naître le découragement. — Palpitations visibles du cœur qui produit la mauvaise humeur. — Inflammation du poumon.

Douleur rhumatismale dans le dos. — Douleur dans le dos et dans les jambes, comme par fatigue, surtout étant assis.

Craquement dans l'articulation de l'aisselle, avec déchirement jusque dans la main. — Les mains sont froides, les bouts des doigts glacés. — Les bouts des doigts se paralysent, sont insensibles, secs et durs. — Taches jaunes foncées aux doigts. — Tressaillement des tendons aux bras et aux mains.

Pieds froids. — Engourdissement des pieds quand on s'asseoit.

Tiraillement rhumatismal et déchirement dans les membres, avec sensation de courbature. — Grande pesanteur dans les bras et les pieds. — Les douleurs augmentent beaucoup étant assis, en s'asseyant ou en se levant de son séant. — Les enfants désirent continuellement d'être portés. — Quand on les touche ils crient, contractent les orteils et les doigts. — Tressaillements convulsifs et mouvements crampoïdes. — Fortes pulsations dans toutes les artères, surtout au cœur. — Évanouissement. — Grand abattement et paresse.

192 Tartarus emeticus.

Éruption miliaire aux bras, sur la poitrine et à l'occiput. — Boutons pruriants aux parties génitales, à l'humérus et au métacarpe. — Pustules suppurantes qui se couvrent d'une croûte, laissent des cicatrices comme celles de la variole.

Bâillement et pendiculations continuelles.— Envie insurmontable de dormir, même au grand air et en montant à cheval. — Pendant la journée et le soir le sommeil est si profond qu'il ne peut être interrompu même en ôtant les vêtements. — La nuit on s'éveille subitement en criant, avec les yeux fixes et des secousses dans différentes parties du corps.

Prédominence du froid. — Froid avec tremblement et frémissement du corps, visage pâle, misérable. — Forte chaleur du corps, surtout à la tête et à la face, pendant le plus léger mouvement. — Abondante sueur. — Sueur froide. — Absence de soif. — Fièvre intermittente avec grand besoin de dormir.

Anxiété avec palpitation du cœur ou tremblement, surtout de la tête. — Désespoir. — Désolation avec frissonnement. — Douleur à la poitrine et grande envie de dormir. — Gaîté excessive dans le jour. — Tristesse le soir. — Anxiété et souci de l'avenir.

# 133. TEREBINTHINÆ OLEUM.

Dur. D'Act., incon.—Antid.: Incon.—Puiss., incon.

Accès subit de vertige à tomber, avec obscurcissement de la vue. — Tournoiement dans la tête avec nausée.

Céphalalgie pressive avec envie de vomir. — Plénitude pressive et lourdeur à la tête.

Épistaxis.

Chaque matin douleur vive aux gencives; elles sont spongieuses, saignent facilement, sont douloureuses au toucher.

Diminution de l'appétit. — Dégoût pour les viandes. Terebinthina oleum.

Étranglement et vomissement de mu-

Pression dans l'estomac et la région précordiale. — Brûlure dans l'estomac.— Inflammation de l'estomac et des intestins.

Brâlure et pression dans les hypochondres. — Pesanteur pressive et plénitude dans le bas-ventre. — Tranchées dans l'épigastre et l'hypogastre. — Sensation de froid violent dans le bas-ventre, surtout extérieurement et dans la région du nombril qui est rétractée. — Brûlure pressive et tiraillements dans la région des reins. — Bruit, gargouillement dans l'estomac et les intestins.—Douleur dans la région de l'aine, comme si une hernie s'y formait. — Gonflement douloureux des glandes de l'aine.

Envie inutile d'aller à la selle. — Constipation avec gonslement du bas-ventre — Selle dure peu abondante. — Selle sèche, maronée. — Évacuation liquide ver dâtre, jaunâtre, avec expulsion du tœniet d'ascarides. — Selle de consistance de bouillie avec pincement et brûlure à l'anus. — Fourmillement brûlant à l'anu comme par des vers.

Tenesme crampoïde et tranchée dan la vessie. — Diminution de l'urine. — Suppression d'urine. — L'urine a une fort odeur de violette. — Urine avec sédiment épais, muqueux, jaunâtre, blanchâtre — Pissement de sang. — Ardeur dan l'urètre en urinant.

Tiraillement crampoïde dans les testi cules et les cordons spermatiques.

Règles retardées, peu abondantes.

Coriza subit avec écoulement par le narines d'un liquide ténu, aqueux sat autre symptôme.

Respiration difficile comme si le poumons étaient trop pleins.

Tiraillements douloureux depuis nuque jusqu'à l'occiput. — Douleur t raillante dans le dos et dans le sacrum.

Tiraillements dans les cuisses et le humérus. — Pesanteur dans tous le membres.—Marche difficile; les muscles sont comme raides; la marche lente, le corps courbé comme dans la vieillesse.

Éruption scarlatineuse à la peau.

Hydropisie.

On s'endort tard. — Cauchemar. — Sommeil inquiet, réveil fréquent avec agitation.

Accroissement de la chaleur générale.

— Fièvre avec soif violente. — Sueur abondante aux jambes le soir au lit.

Manie.

### 134. TEUCRIUM MARUM.

Dur. D'ACT., de 10 à 20 jours. — Antid.: Incon.
—Puiss., incon.

Céphalalgie obtuse, serrante. — Cephalalgie pressive dans le front et dans les tempes.

Démangeaison dans les yeux et larmoiement; il semble qu'on ait beaucoup pleuré.

Tiraillement et sissement dans l'oreille en poussant un son.

Grande pâleur du visage, aspect maladif. — Yeux caves. — Très souvent sensation de chaleur passagère à la face sans chaleur extérieure.

Fourmillement fréquent dans le nez avec larmoiement. — Polype maqueux des narines.

Déchirement dans les racines des dents et dans la gencive des dents incisives droites inférieures.

Démangeaison et picotements à la racine de la langue et dans le pharynx, surtout sur le côté gauche, comme par le poivre. — Envie extraordinaire de cracher, avec augmentation de sécrétion de mucus.

Augmentation d'appétit, sensation de faim comme si l'estomac était vide. — Hoquet fréquent et fort pendant le dîner, avec des coups violents dans la région précordiale.

Sensation de faiblesse à l'épigastre.— Sensation de vide avec bruit dans l'estomac et le bas-ventre.

Après avoir bu de l'eau, bientôt tranchées profondes dans le ventre, ou envie subite de vomir. — Expulsion fréquente de vents chauds, fétides et sans bruit.

Fourmillement pruriant à l'anus comme par des vers; il cause l'agitation et la jactation pendant la nuit. — Fourmillement dans le rectum après chaque selle. — Ascarides.

Emission abondante d'une urine aqueuse.

Diminution d'appétit vénérien. — Défaut d'érection.

Éternuement fréquent avec fourmillement dans le nez sans coriza. — Obturation des narines.

Pression serrante dans la partie inférieure de la poitrine et la région précordiale, avec malaise angoissant dans le bas-ventre qui cesse en marchant.

Déchirement dans les membres supérieurs et inférieurs, surtout dans les articulations. — Tiraillements déchirants dans les doigts et dans les os des avantbras. — Fort battement du pouls avec douleur arthritique tiraillante dans les phalanges de l'indicateur. — Brûlure et fourmillement dans les bouts des doigts. — Tressaillements des muscles des bras et des jambes.

Élancements ou élancements pruriants dans différents endroits du corps. — Mouvements irréguliers, tremblotants, avec chancellement; en marchant les pieds se croisent. — Grande excitation nerveuse.

On s'endort tard, on se réveille fréquemment. — Sommeil inquiet, agité, avec rêves et soubresauts.

Frissonnement et tremblement de froid, quelquefois avec les mains glacées, et baillements fréquents. — Le soir, chaleur augmentée; l'esprit est très agréablement disposé. — Grande loquacité.

Très mauvaise humeur, paresse. — Éloignement pour toute occupation. — Irascibilité chagrine. — On y est excité par la conversation. — Désir très grand de chanter.

## 135.THERMÆ TEPLITZENSES.

DUR. D'ACT., incon. - ANTED. : Incon. - PUISS., incon-

Vertiges comme par ivresse. —Vertige à tomber avec sueur froide dans tout le corps.

Grand oubli. — Faiblesse de la mé-

moire.

Congestion vers la tête. — Céphalalgie frontale, pressive, assourdissante, avec propension à tomber en avant. — Céphalalgie obtuse avec indisposition à penser pendant le mouvement et dans le repos. — Déchirements et battement violent dans les tempes, qui s'étendent de la première vertèbre du cou à l'os frontal. — Mal de tête à devenir fou.

Ophtalmie avec rougeur vive de la sclérotique, et grande sueur au visage et aux mains. — Inflammation du bord des paupières, comme des orgelets.

Bruit et murmure dans les oreilles. — Surdité subite qui commence et finit avec

un claquement.

Visage pâle, terreux. — Déchirement violent dans la face, comme si on y enfonçait des couteaux; il diminue par la chaleur. — Érisypèle de la joue gauche pendant l'odontalgie.

Éruption suppurante au nez. — Sécheresse et gerçure des lèvres.

Odontalgie violente qui monte de la mâchoire inférieure jusqu'au cerveau; elle est diminuée en introduisant quelque chose de chaud dans la bouche. — Décollement des gencives.

Mal de gorge qui empêche d'avaler. Goût acide à la bouche, et aussi des aliments. — Boulimie extraordinaire. Malaise avec assourdissement, comme celui que produit la fumée du tabac quand on n'en a pas l'habitude. — Envie de vomir par la plus petite quantité d'aliment.

Pesanteur dure d'estomac. — Grattement dans la région de l'estomac jusqu'aux intestins, comme par une brosse dure.

Bruit et borborygmes dans le bas-ventre, comme par des grenouilles; il s'étend du côté droit du nombril jusqu'à l'anus; il est suivi d'expulsion de vents ou d'une selle liquide. — Beaucoup de vents remontent de l'estomac jusqu'à la gorge sans s'échapper.

Selle dure, insuffisante. — Selle dure avec défaut d'envie. — Constipation. — Évacuations mêlées de sang et brûlure violente à l'anus et des nœuds hémorrhoïdaux.

Émission d'urine retardée; on est obligé de l'attendre long-temps; enfin elle coule par gouttes, ensuite par jet, s'arrête, et coule encore long-temps par gouttes. — Émission abondante d'urine. — Urine avec sédiment blanchâtre.

Règles trop hâtives.—Leucorrhée qui coule par gouttes quand on est debout.

Sécheresse des narines. — Éternuement violent avec éclat. — Sissement dans la trachée-artère comme si elle était pleine de mucosité. — Respiration dissicile comme par un poids sur la poitrine, surtout pendant le mouvement.

Douleur violente d'entorse à la nuque et dans le bras droit; elle en rend le mouvement difficile. — Déchirement dans les omoplates avec raideur et difficulté de mouvoir les membres inférieurs. — Petits boutons rouges entre les doigts, qui s'effacent par le grattement, mais qui bientôt reparaissent. — Tremblement des mains surtout le matin à jeun qui empêche de rien tenir avec fermeté. — Raideur crampoïde des mains.

Douleur violente au genou. - Les deux pieds sont comme paralysés; on Déchirement douloureux dans les membres du haut en bas, comme s'ils étaient traversés par des fils. — Grande pesanteur des mains et des pieds; ils sont comme gonflés; leur usage est difficile. — Raideur de tous les membres à ne pouvoir garder le siège.

Éruption galeuse sur tout le corps. Sommeil agité avec jactation continuelle.

Forte soif pour les liquides froids. — Absence de soif. — Sueur forte (et froide) générale.

Mauvaise humeur chagrine. — Mélancolie profonde.

### 136. THUJA OCCIDENTALIS.

Dur. D'ACT., 30 jours. — Antid.: Camph. — Puiss., X.

Vertiges en quittant son siège et en se levant, étant couché, et qui s'aggrave en regardant en-haut, avec la sensation comme si on était sur une balançoire.

La tête est embarrassée et saible, avec dissicultéde penser; le cerveau est comme engourdi. — La pensée est très lente et en parlant on cherche les mots. — La tête est vide, surtout le matin, comme dans les cas d'ivresse et avec nausées.

Céphalalgie obtuse assourdissante. — Céphalalgie comme d'un clou enfoncé dans le vertex. — Céphalalgie frontale comme si le cerveau devait s'échapper, avec frissonnement intérieur, améliorée par la marche au grand air. — Céphalalgie le matin comme après un sommeil trop profond, ou après s'être baissé, avec rougeur à la face. — Céphalalgie pressive par saccade au front et dans les tempes. — Pulsation dans les tempes. — Compression dans les tempes. — Lourdeur pressive à la tête, surtout à l'occiput, le matin au réveil, avec mauvaise humeur et peu de dis-

position à parler. — Déchirements par saccade à l'occiput. — Déchirement, d'un seul côté de la tête, au front et à la face jusqu'à l'os de la pommette, surtout le matin et le soir. — Congestion vers la tête, — Élancements à travers le cerveau. — Céphalalgie aggravée en se baissant en avant et diminuée en renversant la tête.

Grande douleur du côté gauche de la tête, même dans les cheveux, la nuit étant au lit, et au toucher. — Traction pressive au muscle temporal, surtout en marchant. — Élancements aux tempes. — Gonflement des veines aux tempes. — Prurit et démangeaison rongeante au cuir chevelu.

Boutons pruriants entre les sourcils. Verrues dans les sourcils. — Déchirement dans les sourcils. - Gonflement dur et inflammatoire des paupières. - Chaleur et sensation de sécheresse aux angles externes. -- Agglutination des paupières. - Le blanc des yeux est rouge, enflammé, avec la sensation qu'y produit le sable. - Cuisson aux yeux. - Elancements dans les yeux par une vive lumière ou un air vif. - Larmoiement, surtout de l'æil gauche, en marchant au grand air. Myopie. — Vue troublée comme par un voile. - Des points noirs voltigent devant les yeux. - Disposition à dormir avec obscurcissement de la vue en lisant.

Serrement spasmodique dans l'oreille avec fort élancement surtout le soir. — Dou-leur serrante dans l'oreille extérieure. — Le soir au lit martellement et dechirement dans l'oreille, avec urine fréquente, les jambes et les pieds froids. — Élancements dans l'oreille jusqu'au pharynx. — Dou-leur pressive derrière les oreilles.

Fouillement et térébration dans l'os de la pommette (gauche), amélioré par le toucher. — Chaleur passagère à la face. — Chaleur brûlante et rougeur du visage. — Sueur à la face. — Éruption croûteuse pruriante. — Nodosités rouges, douloureuses aux tempes et aux bords des paupières.

1 mija occiaentaus.

Croûtes douloureuses dans les narines.

— Dureté et gonflement de l'aile du nez avec tension douloureuse. — Tension tiraillante dans le périoste du nez. — Mouchement de sang. — Épistaxis fré-

quent, surtout après s'être échauffé.

Mouvements convulsifs des lèvres. —
Éruption des boutons aux lèvres et au menton. — Élancements dans la mâchoire inférieure, jusque dans l'oreille. —
Gonflement des glandes sous-maxillaires et du cou.

Gencives gonflées, douloureuses. — Odontalgie fortement tiraillante dans les dents inférieures, surtout en mangeant. — Rongement dans les dents creuses avec douleur de tout un côté de la tête, augmentée par le froid et en marchant. — Pression dans les dents, jusque dans les mâchoires, après avoir bu du thé.

Aphtes et boutons dans la bouche. — Gonflement de la langue avec douleur au toucher. — La parote est lente. — Douleur vive au bout de la langue au toucher. — Douleur d'excoriation au palais, en avalant. Fort gonflement des glandes salivaires avec plus grand afflux de salive à la bouche. — Salive sanguinolente. — Salive amère. — Crachotement de mueus de couleur rouge de sang.

Gonslement des amygdales et de l'intérieur de la gorge avec douleur d'excoriation. — Envie d'avaler, avec douleur vive et pression à la gorge. — Apreté et grattement à la gorge.

Goût pâteux, douceâtre, le soir et après avoir mangé. — Goût amer du pain. — Les aliments ne paraissent pas assez salés. — Désir d'aliments et de boissons froides. — Satiété prompte en mangeant. — Effets nuisibles de l'usage des aliments gras et des oignons.

Renvois avec goût rance, surtout après avoir pris des aliments gras. — Renvois amers. — Renvois putrides. — Renvois des aliments ingérés après le repas. — Après le dîner faiblesse, anxiété, palpitation du cœur. — Grande paresse après le dîner.

Thuja occidentalis.

— Après chaque repas fort ballonnement de vents.

Malaise et faiblesse dans la région de l'estomac. — Vomissement d'un liquide acide et des aliments.

Crampe d'estomac qui augmente beaucoup le soir. — Après le repas, pression dans la région précordiale avec douleur au toucher. — Anxiété dans la région précordiale qui s'élève jusqu'à la tête. — Battement dans la région précordiale.

Pression dans la région du foie (et des reins). - Ballonnement du bas-ventre, souvent avec des douleurs spasmodiques contractives. - Tension dans le bas-ventre comme s'il était serré: - Mal de ventre pressif, surtout dans les côtés, avant d'aller à la garde-robe. - Sensation dans le bas-ventre comme si quelque chose y remuait.—Grouillement et borborygmes dans le bas-ventre. - Douleur pressive de dehors en dedans dans l'aine. - Tiraillements dans l'aine en marchant et étant debout, avec élancements à travers les cuisses en s'asseyant. - Gonflement douloureux des glandes de l'aine, avec tiraillement dans les cuisses jusqu'aux genoux. The first transfer of the second

Envie inutile d'aller à la selle (avec des érections). — Constipation qui dure plusieurs jours, surtout après des pollutions. — Sortie difficile d'une selle noueuse, grosse et dure, qui est quelque fois enduite de sang. — Écoulement de sang pendant la selle. — Contraction douloureuse de l'anus pendant la selle. — Brûlure à l'anus et entre les fesses. — Condylomes à l'anus. — Déchirements dans le fondement.

Fréquente envie d'uriner; émission d'urine abondante, aqueuse, même la nuit. — Urine avec sédiment nuageux. — Urine sanguinolente. — Après avoir uriné il s'échappe encore des gouttes pendant long-temps. — Sensation dans l'urètre comme si une goutte y coulait, après avoir uriné et hors le temps où l'on a uriné. — Cuisson dans l'urètre, surtout le matin et à midi, après avoir uriné comme en uri-

Thuja occidentalis.

I huja occidentatio.

nant. — Démangeaison dans les parties sexuelles de la femme en urinant. — Élan-vements dans l'urètre et à l'orifice pendant l'émission de l'urine et hors ce temps. — Prurit dans l'urètre.

Gonflement du prépuce. - Ulcères comme des chancres au prépuce. - Condylomes au gland, au prépuce, qui deviennent humides et suppurent. - Gonorrhée bâtarde. - Ecoulement fort, aqueux, par l'uretre. - Gonorrhée avec condylomes. -Elancements dans la verge, le scrotum, le long du cordon spermatique jusqu'au nombril. - Tiraillements dans les testicules et traction en haut de l'un d'eux. (La gravelle.) - Forte sueur aux parties génitales surtout au scrotum. — Erection continuelle, douloureuse, avec élancement dans l'urètre, la nuit et le matin. - Pollutions nocturnes avec sensation de rétrécissement dans l'urètre. - Ecoulement d'humeur prostatique.

Prurit et démangeaison brûlante dans les organes sexuels chez les femmes. — Contraction douloureuse crampoïde dans le vagin jusque dans le bas-ventre. — Gonflement et excoriation des grandes lèvres. — Excroissances verruqueuses sèches (non sycotiques) à l'orifice de l'utérus, avec fort élancement douloureux et brûlure en urinant. — Règles trop peu abondantes. — Leucorrhée.

Coriza sec qui devient fluent au grand air, avec céphalalgie continuelle. — Coriza fluent avec enrouement et toux. — Oppression de la poitrine, avec forte soif pour l'eau et grande anxiété. — Enrouement comme par contraction du larynx. — Elancements et fourmillements dans la trachée-artère.

Toux produite par un chatouillement dans la trachée le matin. — Expectoration de petits globules gris, jaunâtres ou verdâtres. — Toux par échauffement. — Toux avec expectoration de mucosité jaunâtre, et douleur dans la région précordiale après midi.

Oppression de poitrine comme s'il y avait

des adhérences intérieures. — Gêne de la respiration avec besoin de respirer profondément. — Oppression tantôt dans le côté gauche de la poitrine, tantôt dans l'hypochondre, avec envie de tousser. — Pression sur la poitrine après le dîner. — Inquiétude et sensation de gonflement dans la poitrine. — Élancements dans la poitrine après avoir bu froid. — La peau autour des clavicules est bleue. — Bouillonnement du sang dans la poitrine avec de fortes palpitations qu'on peut entendre surtout en montant un escalier. — Douleur dans la région précordiale.

Les veines du cou sont enflées. — Inquiétude dans le cou, la nuque et la poitrine. — Tension de la peau de la nuque dans les mouvements de la tête. — Tiraillements dans le dos et dans le sacrum étant assis. — Pulsations dans la colonne vertébrale. — Térébration dans le dos. — Raideur et brisure dans la nuque, dans le dos, surtout le matin, après le lever, dans le sacrum et dans les lombes. — Furoncles au dos.

Battements dans l'articulation de l'omoplate. - Douleur déchirante pulsative comme celle d'un dépôt, de l'omoplate jusqu'aux doigts. - Douleur de foulure dans les omoplates et les humérus avec craquement. - Fortes sueurs dans les aisselles. - Taches brunes au-dessous des bras. ( Nœvus. ) - Tiraillements fouillants dans les bras comme dans les os ou le périoste. - Tressaillements involontaires des bras pendant le jour. - La nuit sensation de froid aux bras. - Elancements dans les bras et les articulations. - Taches rouges, marbrées, dans l'avant-bras. - Tremblementdes bras et des mains en écrivant. - Sensation de sécheresse dans la peau des mains. - Sueur des mains. - Les veines des mains sont gonflees. - Froid, insensibilité des doigts, quelquefois jusqu'à l'avant-bras. - Fourmillements et élancements dans les bouts des doigts. -Gonflement rouge, douloureux, du bout des doigts. - Dans la chaleur et quand on go I myu vectuentutts.

laisse pendre les bras, les douleurs augmentent; elles diminuent par le mouve-

ment, par le froid et par la sueur.

Tiraillements dans les jambes. - Étancements dans les extrémilés inférieures et leurs articulations. - Grande faiblesse et lassitude des jambes surtout en montant un escalier. -- Pesanteur et raideur des jambes en marchant.-Sueur abondante aux cuisses et aux parties génitales.-Prurit aux cuisses. - Éruption de boutons sur les fesses, aux cuisses et aux genoux. - Ulcères aux cuisses. - Vésicules qui suppurent aux genoux. - Nodosités blanches qui causent une grande démangeaison aux mollets .- Gonflement inflammatoire rouge douloureux au dos du pied et aux orteils, avec tension quand on appuie le pied et pendant le mouvement. -Taches rouges marbrées sur le dos du pied. - Sueurs aux pieds, surtout aux orteils .- Engelures aux orteils.

Craquement dans les articulations, surtout des coudes, des genoux et des pieds, pendant l'extension des membres. - Les bras et les jambes sont très facilement engourdis la nuit, surtout au réveil. - Raideur et pesanteur dans les membres, surtout dans le haut des bras et dans les cuisses. - Faiblesse physique sans fatigue morale. - Frequents tressaillements dans la partie supérieure du corps pendant la journée. - Le soir, fermentation violente du sang avec battement et pulsations dans toutes les artères, aggravés pendant le mouvement, améliorés étant assis. - Gonflement des artères, surtout aux tempes, au cou et aux mains.-Palpitations violentes fréquentes du cœur avec malaise, et qu'on peut entendre. - Horreur pour le mouvement.

Sensibilité douloureuse de la peau. Élancements pruriants dans la peau, surtout le soir et la nuit. - Boutons purulents comme ceux de la varioloïde, aux cuisses, aux coudes et à l'avant-bras. Les affections de la peau sont soulagées par le toucher.

## Thuja occidentalis.

Les symptômes s'aggravent pour la plupart après minuit et après midi vers trois heures; ils empêchent de s'endormir. - Beaucoup de symptômes s'aggravent dans le repos et la chaleur, surtout celle du lit; ils s'améliorent par le mouvement, par le froid et la sueur. - Un grand nombre des symptômes se montrent de présérence sur le côté gauche.

Grande somnolence le soir; on s'endort très tard à cause de l'inquiétude et la chaleur sèche.-Insomnie nocturne avec agitation et froid du corps.—Convulsions pendant le sommeil. - Après s'être endormi on a de suite des rêves accablants, anxieux; on se réveille avec cris et soubresauts.-Étant couché sur le côté gauche on rêve de péril et de mort.-Rêves voluptueux sans émission de sperme, avec érection douloureuse au réveil .- Sommeil non réparateur.

Après minuit frissonnement et bâillement. - Tous les matins froid sans soif. - Tous les soirs (vers six heures) froid avec chaleur extérieure, sécheresse de la bouche et soif. - Chaleur le soir, surtout à la face. - Sueur au commencement du sommeil. - Soif seulement la nuit et le

Agitation morale, telle que tout déplaît. - Mauvaise humeur et abattement. -Mauvaise humeur. - Longues reflexions sur de petites choses. - Inquiétude anxieuse pour l'avenir. - Dégoût de la vie.

### 137. VALERIANA MINOR.

Dur. D'Act., 4 à 5 jours. - Antid.: Camph. -Puiss., II-IV.

Vertiges tournoyants en se baissant en avant, comme dans l'ivresse. - L'imagination est excitée; les pensées se succèdent rapidement, comme dans une sorte d'ivresse. - Étourdissement avec manque d'idées.

Céphalalgie élançante ou pressive (hysté-

rique), surtout au front, vers les orbites, tantôt avec embarras de la tête, d'autres fois alternativement avec embarras. — Douleur tiraillante dans le côté droit de la tête, après s'être exposé à un courant d'air. — Sensation douloureuse, engourdissante, contractive, qui part du vertex et embrasse toute la tête, comme si on avait reçu un coup violent sur le vertex. —Sensation de froid glacial dans la partie supérieure de la tête en appuyant fortement le chapeau. — Céphalalgie qui vient subitement par intervalles sous forme de secousses.

Démangeaison et cuisson dans les yeux — Gonflement et endolorissement des paupières. — Pression sur les yeux, avec douleur d'excoriation et sensation de gonflement aux paupières. — Vue trouble. — Myopie. — Le soir, dans l'obscurité, sensation de clarté qui fait croire qu'on peut distinguer les objets. — Scintillement devant les yeux.

Aberration de l'ouie, avec tintement comme si on entendait le bruit d'une cloche.

Tiraillements crampoïdes dans les os de la face.—Les joues deviennent rouges et chaudes au grand air, sans sueur.—Boutons blancs, douloureux au toucher, à la lèvre supérieure et aux joues.

Odontalgie élançante.

Aberration du goût et de l'odorat, on sent une odeur de suif fétide avant le dîner.

Renvois fréquents à vide. — Renvois rances comme pyrosis. — Le matin, de suite après le réveil renvois comme des vents sulfureux.

Malaise avec envie de vomir, avec la sensation comme si un fil s'étendait du nombril au pharynx; elle produit une forte accumulation de salive. — Nausée avec évanouissement, les lèvres blanches, froid glacial du corps, et suivie de vomissement. — Vomissements de bile, de mucus, avec fort tremblement de froid. — Vomissement nocturne.

Pression's subite dans la région précordiale, qui se dissipe aussi subitement, avec gargouillement, et qui semble s'élever du ventre. — Faiblesse de l'estomac et de la digestion.

Secousses douloureuses dans les hypochondres. - Douleur de la partie supérieure du ventre et de la région hépatique au toucher .- Le soir fort mal de ventre, et dans le côté gauche du ventre sensation comme celle d'un travail de suppuration. - Bas-ventre dur et gonflé. - Pincements douloureux et tranchés dans le bas-ventre en produisant la rétraction des parois. - Douleur de brisure pressive, tiraillante, dans le bas-ventre. dans l'aine et dans les muscles du ventre, comme par refroidissement. - Douleur crampoide au bas-ventre, le soir ou avant minuit étant au lit, dans les premières heures de l'après-midi, et qui n'est soulagé par aucun changement de position. - Coliques hémorrhoïdales.

Évacuations alvines, fréquentes, diarrhéiques.—Évacuations verdâtres de consistance de bouillie mêlée de sang. —

Douleur de térébration dans le rectum. Emission fréquente et abondante d'urine.

Oppression pressive de la poitrine, avec anxiété. — Secousse et élancement subit dans la poitrine, avec pression du dedans en dehors (pendant l'inspiration).

Douleur dans la partie gauche des lombes au-dessus de la hanche et dans le côté gauche du ventre, comme si on avait fait effort à faux pour lever un fardeau.

Déchirement rhumatismal dans les membres; ces douleurs sont hors des articulations; elles paraissent surtout dans le repos, ou deviennent seulement sensibles dans le repos, après un mouvement, et diminuent par lui (en marchant, elles se changent en une autre sensation et dans d'autres parties). — Douleur violente, subite, tressaillante et par secousses. — Douleurs qui paraissent quand on conserve long-temps une même position et qui diminuent quand on en change. —

Tiraillements et tressaillements dans les membres et dans les os. — Douleurs paralytiques dans les genoux, dans les coudes, dans l'articulation de l'humérus, quand on cesse de marcher. — Grande lassitude et brisure dans les membres inférieurs le matin après le réveil. — Excitation et irritation maladive avec grande faiblesse dans les yeux, les bras et les jarrets, malgré qu'on paraisse plein de force et de bien-être. — Souffrances hystériques. — Affections périodiques qui reviennent après deux ou trois mois.

Éruption d'abord rouge, confluente; ensuite il se forme de petits boutons blancs, durs, au-dessous des bras et à la

poitrine.

Fièvre précédée de froid court et suivie d'une chaleur de longue durée, avec embarras de la tête et forte soif. — Sueur frequente qui paraît subitement, cesse de même, surtout au visage et au front.

Timidité anxieuse, désespérante. — Inquiétude hypochondriaque. — Aberration de l'ouïe, de la vue et des sensations.

## 138. VERATRUM ALBUM.

Dur. D'act., 5 j.—Antid.: Coff., camph., acon., chin.—Purss., IV-X.

Vertige tournoyant comme par ivresse.

Absence d'idées. — Perte de mémoire.

— Perte de connaissance. — Egarement de l'esprit. — Étourdissement avec la sensation comme si tout remuait dans la tête.

Céphalgie avec malaise et vomissement (de mucosités verdâtres). — Céphalalgie battante. — Hémicranie pressive avec douleur d'estomac. — Céphalalgie par accès, avec sensation de meurtrissure du cerveau. — Céphalalgie contractive avec douleur de resserrement au gosier. — Céphalalgie avant les règles et qui cesse quand elles paraissent. — Ébranlement dans la tête avec tressaillement dans le

bras et pâleur des doigts. — Céphalalgie avec écoulement d'urine. — Céphalalgie avec raideur douloureuse à la nuque.

Sensation simultanée de chaleur et de froid à la tête et sensibilité des cheveux. —
— Froid sur le vertex et en même temps aux pieds. — Sueur froide au front.

Resserrement des pupilles avec douleur compressive dans les yeux. - Dilatation des pupilles. - Yeux fatigués et cernés. -Yeux convulsés, proéminents. - Diplopie. - Scintillement devant les yeux et taches noires, surtout en se levant de son séant ou étant couché. - Nyctatopie. -Extrême sécheresse des paupières. — Sensation de chaleur et cuisson dans les yeux, quelquefois avec céphalalgie. — Ophtalmie douloureuse avec céphalalgie violente qui empêche de dormir. - Ophtalmie avec douleur déchirante. - Larmoiement avec rougeur, chaleur et sensation de sécheresse. - L'œil gauche est bleu avec renvois violents. — Paralysie des paupières.

Bourdonnement d'oreilles. — Dureté de l'ouïe comme si les oreilles étaient bouchées.

Visage pâle. — Visage bleuâtre. — Face hippocratique, froide. — Chaleur brûlante et rougeur de la face. — Éruption pruriante à la face qui suppure. — Éruption miliaire aux joues. — Couperose à la face, autour de la bouche et au menton. — Gonslement du visage. — Sueur froide au visage.

Sensation de sécheresse pénible au nez.

— Nez glacé.

Lèvres gercées. — Éruption aux angles de la bouche. — Écume devant la bouche.

Odontalgie avec gonflement de la face.

— Grincement des dents. — Trismus.

Sensation d'engourdissement au palais.

— Bégaiement. — Défaut de parole. —
Sécheresse et viscosité de la bouche. —
Inflammation de la cavité de la bouche avec gonflement rouge de la langue, précédé de nausée. — Salivation abondante avec goût âcre, salé, sur la langue.

v eratrum atvam.

Mal de gorge. — Étranglement crampoïde et serrement dans le gosier surtout en avalant, avec gonflement des glandes sous-maxillaires. — Rétrécissement du gosier, comme par un gonflement pressif. — Ardear à la gorge, à la bouche, sur la langue et dans le gosier. — Gonflement du gosier avec crainte de suffocation. — Sensation comme si quelque chose de froid remontait à la gorge, avec sensation de froid au palais, et régurgitation d'un liquide très chaud, muqueux, doux, salé. — Apreté, grattement à la gorge.

La salire n'a pas de goût. — Goût putride. — Goût à la bouche et à la gorge comme celui que produisent les pastilles de menthe, ou sensation de froid, ou démangeaison dans la gorge et chaleur qui s'en élève jusqu'à la bouche et qui se joint au vomissement. — Goût pour les choses acides et rafraîchissantes. — Voracité. — Grande faim avec soif violente, quelque fois accompagnée d'écoulement abondant d'urine. — Boulimie. — Appétit et désir pour les aliments entre les accès de vomissement et d'évacuations alvines.

Renvois violents à vide, même après le repas. — Renvois continuels avec envie de vomir et toux violente. — Renvois fréquentssuivis d'expectoration de mucosité. — Sensation de plénitude dans la poitrine qui force toujours à éructer. — Hoquet fréquent. — En dînant malaise avec faim et pression dans la région de l'estomac qui passe après le repas. — Après avoir bu horripilation avec chair de poule. — Après la plus petite quantité de boisson, de suite diarrhée et vomissement.

Grand malaise avant et pendant le vomissement. — Malaise avec grande soif et excrétion abondante d'urine et de salive. —
Malaise avec rougeur et sueur au visage.
— Envie de vomir avec goût de bile à la
bouche. — Envie de vomir avec écume
devant la bouche, trismus et salivation
abondante. — Envie continuelle de vo-

mir, jusqu'à l'évanouissement. — Vomissement des aliments ingérés. — Vomissement écumeux et de mucosités verdâtres,
d'une odeur acide. — Vomissement de bile
noire et de sang. — Vomissement de mucosité pendant la nuit. — Avant le vomissement horripilation générale. — Grande
faiblesse pendant le vomissement; on est
forcé de se coucher. — Chaleur du corps
pendant le vomissement. — Avant le vomissement, mains froides; après elles
deviennent chaudes avec fermentation
du sang. — Choléra sporadique et asiatique.

Malaise douloureux et sensation de vide à l'estomac comme par la boulimie.

— Pression violente dans la région précordiale, qui s'étend dans le sternum, aux hypochondres jusqu'aux os iliaques.

— Brûlure dans la région précordiale.

— Sensibilité excessive de la région précordiale.

Tranchées violentes avec diarrhée ou avec soif et écoulement d'urine. — Tension dans les hypochondres, crampes dans le bas-ventre comme les coliques. — Coliques de vents avec bruit et horborygmes dans le bas-ventre. — Expulsion difficile des vents. — Sortie fréquente et violente des vents par haut et par bas. — Mal de ventre autour du nombril. — Mal de ventre la nuit avec insomnie. — Mal de ventre avant et pendant la diarrhée. — Sensation dans l'aine comme s'il devait y paraître une hernie. — Douleur du ventre au toucher.

Diarrhée forte et douloureuse. — Pendant la sortie des vents évacuation alvine liquide, involontaire. — Diarrhée nocturne. — Diarrhée sanguinolente. — Diarrhée de matière âcre avec brûlure à l'anus. — Anxiété pendant l'évacuation alvine, avec crainte d'apoplexie. — Pendant la garde-robe grande faiblesse, froid avec horripilation, visage pâle et forte sueur au front. — Constipation par dureté et volume de matières, ou comme par inactivité du rectum. — Constipation avec

r eruirum aivum.

chaleur et mal de tête. — Constipation chronique.

Sortie involontaire de l'urine. — Écoulement fréquent d'urine, même quand on est constipé. — Écoulement d'urine avec coriza. — Urine âcre. — Urine foncée.

Grande sensibilité des parties génitales.

Règles trop tôt et trop fortes. — Suppression des règles. — Céphalalgie avec envie de vomir, vertige et bourdonnement des oreilles avant et pendant les règles.

Toux sèche (brûlante) la nuit et le matin. — Toux avec douleur dans les côtés. — Faiblesse et difficulté à respirer. — Toux avec crachats, couleur bleue de la face et écoulement involontaire d'urine. — Toux le soir avec salivation. — Toux creuse et profonde comme celle qui vient du bas-ventre et avec tranchées. — Coqueluche.

Respiration courte par le plus léger mouvement. — Accès de constriction suffocante crampoide du larynx, avec resserrement des pupilles et proéminence des yeux. — Oppression de la poitrine avec respiration difficile, même étant assis.— Respiration souvent entrecoupée.

Constriction douloureuse de la poitrine avec respiration entrecoupée. — Pression dans la poitrine comme par plénitude, surtout après avoir mangé ou bu. — Serrement dans la région du sternum, surtout après avoir bu. — Contraction crampoïde des muscles de la poitrine. — Accès de violente anxiété au cœur, qui coupe la respiration, et palpitations violentes qui soulève les côtes.

Pesanteur à la nuque; les muscles du cou paraissent trop faibles pour soutenir la tête. — Les muscles de la nuque sont comme paralysés. — Raideur rhumatismale de la nuque, avec vertige en tournant la tête. — Douleur de courbature rhumatismale, pression dans le dos et dans le sacrum en se baissant et en se redressant.

Douleur de meurtrissure pressive dans tous les membres. — Raideur dans tous les membres comme après une grande fatigue. — Engourdissement des membres. — Douleur de meurtrissure dans les os. — Douleurs des membres qui se manifestent vers quatre ou cinq heures du matin, qui augmentent quand on se couvre étant au lit, qui diminuent en quittant le lit, ét disparaissent en marchant. — Douleurs des membres qui s'aggravent en automne, au printemps et dans le mauvais temps. — Accès de douleur qui produit toujours pour un temps court du délire et la manie.

Les forces tombent subitement, comme si on était paralysé. — Faiblesse chronique très grande. — Relâchement des muscles. — Affaissement au grand air avec facilité à suer à chaque mouvement. — Évanouissement au plus léger mouvement, même en allant à la garde-robe. — Tremblement dans tous les membres, avec grande anxiété et disposition à s'évanouir. — On est obligé d'être toujours assis ou couché, car en se redressant on éprouve une anxiété extraordinaire. — Étant couché beaucoup de symptômes cessent et se renouvellent quand on se lève.

Éruption miliaire pruriante qui brûle après l'avoir grattée. Éruption urticaire. Éruption sèche qui ressemble à la gale.

Coma-vigil avec demi-connaissance, soubresauts effrayants, un œil ouvert et l'autre fermé ou demi-ouvert. — Rêves anxieux. — Gémissements pendant le sommeil.—Insomnie nocturne et anxiété. — Sueur en s'endormant.

Frisson, horripilation et froid général.

—Fièvre intermittente qui ne consiste qu'en froid extérieur. — Fièvre avec chaleur intérieure et urine foncée. — Sueur froide générale, surtout au front — Sueur du corps avec chaleur forte au cerveau. — Fièvre quotidienne avant minait, au début froid violent, après vertige, malaise et alternativement chaleur, suivie de chaleur continuelle, embarras de la tête et

face rouge; pendant le froid et la chaleur soif inextinguible pour les boissons froides, glacées.

Grande disposition au silence; quand on excite le malade il prosère des injures.

Dépit pour les plus petites causes, suivi d'anxiété et de palpitation de cœur.

Agitation inquiète, mouvement continuel pour s'occuper.—Découragement désespérant. — Mélancolie. — Abattement. — Tristesse. — Pleurs. — On ne peut être consolé; on pousse des cris, des hurlements. — Anxiété craintive. — Anxiété de conscience. — Fureur; on cherche à mordre, à déchirer et à s'enfuir. — Manie; on chante, on sisse, on rit, on se livre à des actions comiques. — Souffrances hypochondriaques.

### 139. VERBASEUM TAPSUS.

Dur. d'act., quelques jours. — Antid.: Incon. —
Puiss., tinct., gutt., j.

Accès subit de vertige avec pression sur la tête en comprimant la joue gauche.

Faiblesse de la mémoire. — Distraction. — Grand afflux d'idées et d'imagination.

Céphalalgie frontale pressire, assourdissante, quand on passe de la chaleur au froid. — Pesanteur et vide dans la tête. — Douleur de pincement dans les tempes.

Chaleur dans les yeux avec sensation de contraction dans l'orbite.— Vue troublée comme par un voile.

Pression par accès et tension assourdissante dans les joues, de l'os de la pommette et l'artículation de la mâchoire, aggravée en serrant les dents et par la pression extérieure, quelquefois avec le sentiment de compression dans l'articulation de la mâchoire. — Douleur nerveuse à la face.

Déchirement dans l'oreille, ayec la sen-

sation de traction de l'oreille en dedans.

— Dureté de l'onïe, comme s'il y avait quelque chose placé devant l'oreille. — En lisant à haute voix sensation d'obturation de l'oreille, du nez et du larynx.

Tension continuelle dans les téguments du menton, des muscles masseters et de la gorge.

Langue couverte d'un enduit brun, le matin après avoir mangé. — Goût sade avec l'haleine sétide. — Faim et cependant pas de goût pour les aliments.

Renvois à vide. — Renvois amers avec envie de vomir. — Régurgitation d'un liquide sans sayeur.

Élancements dans le bas-ventre. — Mal de ventre qui s'étend jusqu'au bas, avec contraction crampoïde de l'an uset envie passagère d'aller à la selle. — Constriction du bas-ventre dans la région du nombril.

Selles supprimées. — Selles comme des crottes de mouton (avec pression).

Envic fréquente d'uriner avec sortie abondante d'urine.

Enrouement qui se montre en lisant à haute voix. — Symptômes catarrhals de la poitrine. — Catarrhe de la trachée-artère avec toux creuse, profonde.

Tension au-dessous de la poitrine avec élancement dans la région précordiale le soir après être couché. — Élancements assourdissants dans la poitrine qui coupent la respiration.

Extension des membres et lassitude des membres inférieurs avec éloignement pour le travail, et bâillements fréquents.

Grande somnolence après le dîner. — Sommeil agité qui ne dure que jusqu'à quatre heures. — Horripilation, surtout d'un côté du corps, comme s'il était arrosé d'eau froide. — Froid passager général, qui est aussi sensible à l'extérieur, aux mains et aux pieds.

Indifférence pour toutes les choses qui environnent. — Chagrin, mauvaise humeur, avec disposition au travail et à 204 Verbaseum tapsus.

prendre part à la société. — Grande timidité. — Gaîté avec rire. — Imagination exaltée et voluptueuse.

## 140. VIOLA ODORATA.

Dur. b'Act., quelq. jours.—Antid.: Camph.—Puiss., II-IV.

Vertige tournoyant, même en étant

Grande abondance d'idées Incohérentes qui se succèdent rapidement. — Faiblesse de la mémoire. — Susceptibilité d'esprit. — Prédominence des facultés intellectuelles sur les affectives.

Pesanteur de la tête avec la sensation comme si les muscles de la nuque étaient trop faibles. — Fourmillement dans la région frontale par congestion du sang.

Tension dans les téguments de l'occiput et du front, qui s'étend quelquesois sur le haut de la face, le nez et jusqu'aux oreilles, et qui force de froncer les sourcils.

Somnolence avec besoin de fermer les yeux. — Crampe des paupières. — Cuisson des yeux. — Myopie. — Scintillement devant les yeux.

Elancement dans les oreilles. — Aversion pour la musique.

Sensation d'engourdissement au bout du nez comme si on y avait reçu un coup.

Odontalgie déchirante.

Constipation. (Urine augmentée.)

Pollutions nocturnes.

Respiration courte. — Oppression violente avec pression de la poitrine comme par une pierre. — Respiration difficile qu'on a peine à apercevoir; expiration douloureuse, grande anxiété et courte palpitation de cœur.

Ardeur passagère dans différents endroits. — Douleur tiraillante dans les membres. — Les souffrances sont modérées et cependant bien tranchées, et ne changent pas en changeant de position.

## Viola odorata.

Tremblement des mains. — Relâchement de tous les muscles. — Souffrances hypochondriaques et hystériques.

Tous les matins bâillements; les yeux sont pleins d'eau. — Le matin après le réveil douleurs de brisement dans toutes les articulations, qui se dissipent quand on se lève.

Horripilation. - Sueur nocturne.

Tristesse profonde, mélancolique. — Hystèrie avec pleurs continuels sans savoir pourquoi:

### 141. VIOLA TRICOLOR.

DUR. D'ACT., incon.—ANTID.: Incon.—Puiss., IV.

Céphalalgie de la racine du nez jusqu'au cerveau; elle cesse au grand air. — Lourdeur de la tête qui la tire en arrière, surtout quand on se redresse; elle diminue quand on se baisse. — Céphalalgie pressive surtout dans le front et les tempes, avec embarras de la tête et remuement du cerveau en marchant. — Elancements dans l'occiput jour et nuit.

Compression et chute des paupières avec somnolence.

La peau épaisse et dure à la face. — Gourme, tension dans la peau et les muscles de la face et du front.

Gonflement des glandes du cou. — Mal de gorge le soir.

De suite après le dîner grande chaleur générale, surtout à la face, avec sueur, oppression de poitrine et grande anxiété qui agite.

Tranchées dans le ventre avec hurlements, cris et besoin d'aller à la selle. — Elancements dans le bas-ventre.

Selle molle, hachée. — Selle précédée de vents.

Envie d'uriner fréquente, urine abondante, urine fétide, comme celle du chat.

Ejaculation avec rêves voluptueux. — Gonflement du prépuce.

Leucorrhée.

Élancements dans la poitrine. - Op-

v tota tricotor.

pression et élancements dans la région du cœur étant assis et en se fléchissant en avant. — Anxiété dans le cœur avec pulsation et ondulation dans le cœur étant couché.

Serrement de crampes pinçantes, contractives, entre les épaul es.

Douleurs élançantes dans les membres.

Eruption miliaire élançante, rongeante.

Sommeil agité avec réveil fréquent, on s'endort tard par afflux des idées. — Tressaillement dans les mains pendant le sommeil, le pouce est fléchi. — Chaleur sèche générale et rougeur à la face.

Frissonnement et grande disposition à sentir le froid au grand air. — Sueur la nuit.

Indisposition pour tout travail sérieux.

— On est renfermé en soi-même, peu disposé à parler. — Précipitation comme par une anxiété intérieure et sensation de grande faiblesse.

## 142. VITEX AGNUS CASTUS.

Dur. D'ACT., incon. — ANTID. : Incon. —
Puiss., incon.

Grande distraction. — Perte des sens et oubli.

Céphalalgie contractive, surtout en lisant. — Déchirement pressif dans les tempes et le front, dans le cerveau, plus violent pendant le mouvement.

Prurit rongeant au cuir chevelu. — Tension dans les téguments de la tête avec horripilation, malgré qu'ils paraissent chauds au toucher.

Prurit rongeant au-dessus des sourcils et aux sourcils, aux paupières et au-dessous des yeux. — Pupilles très dilatées.

Tintement bruissant dans l'oreille.

Fourmillement et démangeaison rongeante aux joues qui force à se gratter. — Déchirement dans la branche droite de la mâchoire inférieure.

Pression dure comme par une pierre à

la racine du nez et sa partie supérieure; elle se dissipe par la compression.

Goût métallique cuivreux à la bouche.

— Dégoût pour toute boisson et absence de soif.

Hoquet fréquent avec mauvaise humeur et dépit.

Malaise d'abord dans la région précordiale, ensuite dans le bas-ventre, comme si les entrailles tombaient dans le bas. — Borborygme bruyant dans l'estomac pendant le sommeil. — Pression dans la région hépatique, augmentée par le toucher.

Selles molles. - Selles dures.

Prurit rongeant au périnée. — Sortie d'humeur prostatique en faisant effort pour aller à la garde-robe.

Urine augmentée.—Écoulement jaune par l'urètre. — Faculté reproductive affaiblie, avec parties génitales froides, relâchées et peu disposées au coît.

Pression sur le sternum, surtout en respirant profondément. Toux le soir au lit avant de s'endormir.

Pression dure dans l'aisselle et dans l'humérus, aggravée par le toucher. — Pesanteur tiraillante qui s'étend vers le pied. —Déchirement dans les pieds, dans les orteils, surtout en marchant.

Prurit rongeant dans différentes parties du corps.

Sommeil agité avec soubresauts et réveil.

Tremblement continuel du corps par un froid intérieur malgré qu'il soit chaud au toucher. — Frissonnement ou alternative de chaleur et de froid sans soif et les mains froides au toucher. — Chaleur passagère avec les genoux froids au lit.

Anxiété violente comme si une diarrhée devaitse manifester avec grande faiblesse.

— Caractère mélancolique, hypochondriaque.

— Extravagance avec abnégation de soi-même.

Zincum.

143. ZINCUM.

Dur. D'act., 4 sem. — Antid.: Camph., hep., ign. —
Puiss., X.

Vertiges profonds dans le cerveau, surtout dans l'occiput, comme si on aliait tomber du côté gauche. — Vertige assourdissant avec obscurcissement de la vue et faiblesse générale.

(Tous les matins) céphalalgie frontale pressive. — Élancements déchirants dans les côtés de la tête, aggravés après midi. — Tiraillements dans le front et l'occiput. — Céphalalgie après avoir bu du vin. — La céphalalgie diminue au grand air et augmente dans la chambre.

Sensation d'écorchure et démangeaison cuisante au euir chevelu. — Sensation comme si les cheveux se hérissaient.

Sensation de lassitude dans les yeux avec grande faiblesse dans la tête. — Sensation comme si les yeux étaient enfoncés dans la tête. — Démangeaison cuisante dans les yeux. — Inflammation des paupières. — Pression sur les yeux. — Paralysie des paupières supérieures.

Étreinte dans l'oreille avec élancement déchirant et gonflement extérieur, surtout chez les enfants. — Écoulement purulent par l'oreille.

Pression insupportable à la racine du nezavec serrement de crampes. — Gon-flement du nez en dedans et en dehors, avec perte de l'odorat.

Visage pâle. — Éruption rouge et pruriante au menton.

Lèvres gercées, ulcérées intérieurement, ainsi qu'aux commissures. — Mucosité épaisse, visqueuse, sur les lèvres.

Odontalgie tiraillante, déchirante, surtout dans les molaires. — Saignement des geneives.

Petits ulcères jaunes à la partie intérieure des joues. — Fourmillement à l'intérieur des joues avec sécrétion abondante de salive d'un goût métallique.

Sensation de crampes dans l'æsophage, dans la région de la fossette du cou. — Mal de gorge déchirant, tiraillant, en arrière, au fond du gosier, et qui est plus sensible hors le temps de la déglutition que quand on en fait le mouvement. — Beaucoup de mucosités à la gorge.

Appétit diminué. — Faim vive. — Dégoût pour la viande, le poisson et les aliments cuits et chauds.

Renvois avec douleur pressive dans la poitrine. — Pyrosis après l'usage des choses douces. — Vomissement de sang.

Serrement et pression dans la région précordiale. — Ardeur dans l'estomac. — Sensation désagréable de chaleur aucardia et dans l'œsophage. — Déchirement et élancement dans la région précordiale.

Pression tensive à l'épigastre. - Douleur crampoide dans l'hypochondre, qui alterne avec l'oppression. - Dureté et pression dans les hypochondres et les côtés du ventre, augmentées par le mouvement et par la marche. - Elancement dans la rate. — Élancement dans la région du foie.-Élancement et douleur d'écorchure et pression dans la région rénale. - Mal de ventre crampoide autour du nombril. -Sensation désagréable de pression sur les parois intérieures du tronc comme provenant des nerfs, sans apparence de flatuosités. — Accumulation de beaucoup de vents dans le ventre, surtout après le repas. - Colique pressive des vents, surtout le soir. - Sortie d'une abondance de vents. - Hernie inguinale.

Selle molle diarrhéique, de consistance de bouillie. — Selle dure, sèche, insuffisante. — Constipation. — Selle molle avec excrétion de sang rouge vermeil. — Mal de ventre pendant et après la selle. — Sensation d'écorchure à l'anus. — Four-

millement à l'anus comme par des vers.— Prurit violent à l'anus.

Pression à la vessie quand elle est pleine. — Émission fréquente et abondante d'urine de couleur citrine, qui plus tard dépose un sédiment blanc floconneux. — Émission douloureuse d'urine suivie de la sortie de sang par l'urètre. — Calculs de la vessie.

Grand désir du coït avec excrétion difficile du sperme. — Horripilation et contraction au scrotum. — Douleur d'écorchure au scrotum. — Tiraillement dans les testicules et rétraction vers les anneaux.—Gonflement, dureté et rétraction des testicules.

Suppression des règles. — Lochies supprimées avec diminution de la sécrétion du lait. — Nymphomanie chez les femmes en couches, avec grande susceptibilité des parties génitales. — Disposition de l'avortement.

Coriza fluent avec enrouement et ardeur dans la poitrine. — Obturation du nez.

Toux sèche avec élancement dans la poitrine et douleur comme si elle allait se déchirer. — Toux avec expectoration de mucosité épaisse (suivie de sensation de creux et de froid dans la poitrine).

Oppression et pression sur la poitrine.—
Ardeur dans la poitrine. — Élancements dans la poitrine, surtout dans la région précordiale. — Déchirements dans la poitrine.—Asthme spasmodique.—Respiration courte après le dîner par des vents. — Suppression de la sécrétion du lait chez les accouchées. — Palpitations du cœur sans anxiété.

Douleur rhumatismale au dos.—Élancements dans les omoplates. — Déchirements et raideur dans le cou.

Déchirements dans les bras, autour des articulations, dans les mains et les doigts.

— Douleur paralytique du bras. — Insensibilité des mains avec paralysie. — Furoncles aux bras. — Faiblesse de la main; en écrivant elle tremble.

Déchirements dans les membres inférieurs.

— Déchirements dans l'articulation du pied. — Douleur d'entorse dans l'articulation du pied. — Élancements pulsatifs dans les orteils. — Douleur dans le genou pendant la nuit. — Raideur et tiraillements dans les mollets en marchant. — Sueur fétide des pieds, avec excoriation des orteils en marchant. — Gonflement, prurit, chaleur et rougeur aux orteils, comme par des engelures. — Gonflement et inflammation érysipélateuse du tendon d'Achille. — Paralysie des pieds.

Douleur déchirante dans les membres supérieurs et inférieurs, aggravée par l'échauffement et les mouvements. — Hémiplegie.
— Frémissements et tressaillements dans
différentes parties. — Tremblement violent
général. — Fortes palpitations dans tout
le corps.—Grande lassitude en marchant
et le matin au réveil, comme après un
profond sommeil.—Violent déchirement
tiraillant dans la cavité des os de tous les
membres, tel qu'on ne peut se soutenir
à cause de la douleur.

Les douleurs paraissent avoir leur siège entre cuir et chair. — Le vin augmente fortement tous les symptômes. — Le vin, la camomille, la noix vomique augmentent les symptômes, les provoquent, surtout l'agitation nocturne et la constipation. — La plupart des symptômes se montrent après le dîner et vers le soir.

Prurit violent, lancinant, surtout le soir au lit; il se dissipe promptement par le toucher.—Dartres.—Ulcères dartreux.—Éruption chronique.—Gerçures de la peau. — Fourmillement entre la chair et la peau.

Somnolence continuelle dans la journée avec bâillement. — Envie continuelle de dormir. — Sommeil entrecoupé avec rêve et agitation. — Rêves effrayants, dégoûtants. — Forte sueur des pieds la nuit.

Frisson fébrile le long du dos. — Frissonnement continuel avec accroissement 208 Zincum.

de la chaleur intérieure. — Horripilation avec chaleur passagère. — Tremblement violent de tous les membres. — Respiration courte, brûlante, et battement dans tout le corps.

Humeur hypochondriaque après le dîner, avec pression au-dessous des fausses côtes. — Morosité, taciturnité surtout le soir. — Grande susceptibilité au bruit et en entendant parler, avec tremblement qui dure long-temps après chaque excitation. — Emportement facile qui a des suites nuisibles. — Humeur variable à midi, triste le soir. — Gaîté vive.

PIN DES MÉDICAMENTS HOMOEOPATIQUES.





